

raztegovanja peruti in počitkom. Pa tudi z obračanjem glave. Verjetno sem se srečal z osebk v družinski navezi, ki so za počitek na selitvi izbrali obsežne in z vodo obdane blatne površine pretežno izpraznjene akumulacije.

Borut Štumberger, SI-2282 Cirkulane 41, Slovenija, e-mail: stumberger@siol.net

KASPIJSKA ČIGRA *Hydroprogne caspia*

Caspian Tern – one individual observed while hunting over Medvedce reservoir (UTM WM53, SE of Pragersko, NE Slovenia) on 8 Apr 2009 and one over Družmirsko jezero (UTM WM03, E of Šoštanj, NE Slovenia) on 29 Jul 2009; this is the third record for Medvedce and the second for Družmirsko jezero

V Sloveniji je kaspijska čigra redek gost na selitvi. Z vrsto sem se prvič srečal 8.4.2009 med spomladanskim obiskom zadrževalnika Medvedce (UTM WM53). Nad ribnikom v vtočnem delu zadrževalnika sem opazil veliko čigro z močnim rdečim kljunom, temnimi nogami ter jasno vidnimi temnimi primarnimi peresi na spodnji strani peruti. Ugotovil sem, da opazujem kaspijsko čigro. Osebek je večkrat preletel omenjeni ribnik v obeh smereh, nato pa še nekaj časa lovil nad osrednjim ribnikom. Vrsta je bila dotlej na zadrževalniku opazovana dvakrat (BORDJAN 2007A, BORDJAN & BOŽIČ 2009). Drugič sem vrsto opazoval 29.7.2009 nad ugrezninskim Družmirskim jezerom, ko je en osebek dalj časa uspešno lovil ribe. Gre za drugo opazovanje kaspijske čigre na Šaleških jezerih (GREGORI & ŠERE 2005).

Aleksander Koren, Zg. Leskovec 18c, SI-2285 Zg. Leskovec, Slovenija, e-mail: akoren@volja.net

KASPIJSKA ČIGRA *Hydroprogne caspia*

Caspian Tern – 10 individuals observed at Medvedce reservoir S of Pragersko (UTM WM53, NE Slovenia) on 6 Sep 2009, while fish hunting at a clay-pit nearby. This is the fourth record for Medvedce and the highest number of individuals recorded in Slovenia to date.

6.9.2009 sem bil na zadrževalniku Medvedce (UTM WM53). Štetje ptic sem opravil že dan prej, zato sem beležil samo vrste, ki jih prejšnji dan nisem opazil. Ko sem že mislil, da bodo trije labodi grbci *Cygnus olor* edina nova vrsta tega dne, sem zaslišal zame nenavadno oglašanje. Bilo je nekaj med oglašanjem sive čaplje *Ardea cinerea* in čopastega ponirka *Podiceps cristatus*. Ob pogledu v nebo sem opazil samo rečne galebe *Larus ridibundus*, ki so se vračali na zadrževalnik. Ker nisem opazil nič takega, čemur bi lahko pripisal oglašanje, sem se začel ozirati v vse smeri. Vsakokrat, ko sem pogledal v smer oglašanja, sem opazil prej omenjene rečne galebe. Šele ko sem jih pogledal četrtrič, sem opazil, da



Slika 5 / Figure 5: Kaspijska čigra / Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, 6.9.2009, glinokop severno od zadrževalnika Medvedce. Foto: D. Bordjan

gre v resnici za kaspijske čigre. Po velikosti in obarvanosti so bile na hitro podobne rečnim galebom, vendar so imele črno kapico na glavi ter močan in izrazito rdeč kljun. Bilo jih je 10. Čigre so najprej nekaj minut krožile nad zadrževalnikom, nato pa so se na njegovem zahodnem delu pričele dvigovati. Ob menjavi daljnogleda s teleskopom sem jih izgubil iz vidnega polja. Ko sem že menil, da so odletele v običajni smeri selitve, so se ponovno prikazale nad zadrževalnikom. Po nekaj krogih so odletele proti severu ter se nad novim glinokopom pri smetišču blizu Pragerskega začele naglo spuščati in dvigati. Kmalu sem ugotovil, da to vedenje pomeni, da lovijo. Med njimi so letali še mlad sokol selec *Falco peregrinus* in rečni galebi. Z avtomobilom sem se odpeljal z zadrževalnika proti glinokopu in jih tam opazoval med lovom. Pri tem so letale nad vodno površino, se vsake toliko ustavile v zraku, namerile in naglo strmoglavile v vodo. Kadar so bile pri lovu uspešne, so jih takoj pričeli preganjati rečni galebi (slika 5). V nekaj primerih so galebi pripravili čigre, da so svoj plen izpustile. Po dobrih 15 minutah lova so čigre posamič odletele proti zadrževalniku, kjer so še nekaj časa krožile in se nato usedle na meni nevidno mesto. To je šele četrto opazovanje kaspijske čigre na zadrževalniku (BORDJAN & BOŽIČ 2009, KOREN 2009). Kljub več objavljenim opazovanjem kaspijske čigre v Sloveniji (KOMISIJA ZA REDKOSTI 1993, SOVINC & ŠERE 1994, ČELIK 1993, BOŽIČ 1994, GOMBAČ 1994, DENAC 1995, KMECL & RIŽNER 1995, ŠTUMBERGER 1996A, BOŽIČ 1997, KOŠIR 1997, SOVINC 1999, CIGLIČ 1999, BORDJAN & BOŽIČ 2009), je bilo doslej opazovanih največ šest osebkov. Takšno število kaspijskih čiger je bilo zabeleženo štirikrat (KOMISIJA ZA REDKOSTI 1993, SOVINC & ŠERE 1994, GOMBAČ 1994, BOŽIČ 1997), enkrat pa so bili opazovani štirje osebki (KOŠIR 1997). Tako kot pri mnogih drugih opazovanjih kaspijske čigre je tudi mojemu opazovanju verjetno botrovalo deževno vreme prejšnjih dni.

Dejan Bordjan, Ulica 8. februarja 50, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija, e-mail: dejan.bordjan@gmail.com