

obročkana tudi brkata sinica. *Dare Šere, Langu-sova 10, 61000 Ljubljana*

Poročila od koderkoli Records from everywhere

OSREDEK NA CERKNIŠKEM JEZERU OSREDEK ON LAKE CERKNICA

Ves dan sem z različnih mest jugozahodnega dela Cerkniškega jezera pogledoval proti Osredku, kamor me je pritegovala jata belih ptic. Tega dne, 9. 6. 91, je bilo v jezeru veliko vode. S skalnega razgledišča na Otoku je bilo mogoče videti vsa gnezda lisk in ponirkov, saj so plavala med vršički trstja. Samo vedno suhi Osredki je molel iz vode in vse je kazalo, da bo mogoče peš priti tja.

Nekako ob štirih popoldne sem od Žerovnice zabredel med redko travo proti belim pticam na Osredku. Izkazalo se je, da je bila voda med travo precej globlja, kot je kazalo, tako da sem na Osredki pritaval premočen in izčrpan, a zadovoljen, saj je ptičev mrgolelo.

Vse naokrog so prepevale repaljščice *Saxicola rubetra* in poljski škrjanci *Alauda arvensis* in se spreletavale rumene pastirice *Motacilla flava*. Med hojo prek Osredka sta ločeno splašeni vzleteli dve kozici *Gallinago gallinago* in en kosec *Crex crex*, drugi pa je občasno pel na drugi strani. Med pari in skupinicami mlakaric *Anas platyrhynchos* sem prepoznal samca žličarice *Anas clypeata*, v vodi med travo je pristal par dolgorepk *Anas acuta*, par regeljcev *Anas querquedula* pa se je splašen dvignil. Ves čas me je obletavalo in se razburjalo več deset prib *Vanelus vanellus*, na severovzhodnem delu Osredka pa kasneje še bolj glasno in odločno trije rdečeno-gartinci *Tringa totanus*. Očitno so tam gnezdili 2-3 pari.

In še tiste bele ptice: šlo je za kakih 30 rečnih galebov *Larus ridibundus*, med katerimi sem presenečen zagledal severno čigro *Sterna caspia*.

Mučno pot nazaj mi je na koncu popestrila še družina škrjančarjev *Falco subbuteo* z dvema mladima, ki je krožila nad žerovniškimi travniki. *Tomaž Jančar, Gorenje Blato 31, 61291 Škofljica*

ZADRŽEVALNIK VRBJE PRI ŽALCU VRBJE RESERVOIR NEAR ŽALEC

Zadrževalnik leži za vasjo Vrbe, dva km južno od Žalca in ga od struge Savinje ločita cesta in

nasip. Nastal je leta 1980 na območju nekdanje gramoznice za intenzivno gojitev rib bližnje Hmezadove ribogojnice. Ribnik meri ca 6 ha. Zanimivo je, da je nivo vode v ribniku približno 2 m višji od nivoja Savinje, ker se polni 1 km višje iz struge. Posledica tega je nihanje gladine, saj ob sušnih obdobjih voda odteka v podtalnico. Brežine so umetno narejene in gosto porasle z rastlinstvom, predvsem severozahodna tudi s trstičjem. Severna in zahodna stran sta plitki in zaraščeni z rogozom, kar je pomembno za nekatere vrste gnezdilcev. Žal ima tudi ta ribnik v pogledu ptic »prirojeno hibo«, kakršno navaja Borut Štumberger v reviji »Moj mali svet«, ker ga občasno praznijo zaradi biološke obnove in odlova rib. Ribnik je v ornitološkem smislu zanimiv tako v preletnem kot gnezditvenem obdobju, saj leži osamljen sredi Savinjske doline, prek katere poteka JZ selitvena pot.

Na to lokacijo hodim od leta 1985 dalje, podatke si beležim zadnja leta. Tako opažam, da se gnezditvena gostota iz leta v leto večja. Na začetku opazovanja sem odkril le dve gnezdi čopastega ponirka, za leto 1990 pa imam zabeleženih 15 gnezditcev, od tega 8 črnih lisk, 5 čopastih ponirkov, 2 zelenonogi tukalici, opazil pa sem tudi malega ponirka z mladiči. Pri gnezdenju je čopasti ponirek izbiral mesta na odprti globji vodi, medtem ko je črna liska gnezdila v plitvejšem delu ribnika med rogozom. Ker je ribnik neposredno ob Savinji, je pestrost ptičjih vrst toliko večja; zlasti bližino reke izkoriščajo race v času, ko je ribnik zamrznjen.

Na tem območju sem opazoval 70 vrst ptic, od teh naj omenim nekaj tistih, ki so stalno prisotne, in nekaj tistih, ki so na tej lokaciji redkeje, vendar se mi zdijo zanimive.

Stalno prisotne: mlakarica (*Anas platyrhynchos*), črna liska (*Fulica atra*), čopasti ponirek (*Podiceps cristatus*), mali ponirek (*podiceps ruficollis*), zelenonoga tukalica (*Gallinula chloropus*), reglja (*Anas querquedula*).

Občasni gostje: mala bela čaplja (*Egretta garzetta*), rjava čaplja (*Ardea purpurea*), sabljarka (*Recurvirostra avosetta*), krehelj (*Anas crecca*), žličasta raca (*Anas clypeata*), čopasta črnica (*Aythya fuligula*) sivka (*Aythya ferina*), navadna žvižgavka (*Anas penelope*), dolgorepa raca (*Anas acuta*), labod grbec (*Cygnus olor*) in več vrst martincev. *Miha Kronovšek, Ložnica 35e, Žalec*