

gospodarske, obrtniške in narodne.

Izhajajo vsako sredo po celi pôli. Veljajo v tiskarnici jemaje za celo leto 3 gld. 40 kr. za pol leta 1 gld. 70 kr. za četrt leta 90 kr pošiljane po pošti pa za celo leto 4 gld., za pol leta 2 gld. 10 kr., za četrt leta 1 gld. 10 kr.

V Ljubljani 17. septembra 1890.

O b s e g: Čebelam nevarna sovražnica. — Krompirjev sovražnik in sredstvo zoper njega. — Kako obdeluj vrt ob suhih poletjih? — Sredstvo, da drevesa bolje rode. — Razne reči. — Vprašanja in odgovori. — Zemljepisni in narodopisni obrazi. — Naši dopisi. — Noviĉar.

Gospodarske stvari.

Čebelam nevarna sovražnica.

Kadar prijetno pomladanjsko solnce staja sneg, začne se gibanje po zemlji in pod zemljo. Živali, ki so spale po zimi, prebude se, rastline jamejo poganjati in se razcvitati, in razni prirodni pevci letajo pojoĉ in žvrgoleĉ po duhteĉem vzduhu. Posebno zgodaj upajo si pridne čebele iz svojega domovja, v katerem so preživele trdo zimo, da breneĉ pregledajo vso okolico, kje bodo iz nova začele delo in si nabirale hrane. S paznim oĉesom leti čebela ĉez travnike, polja in gaje in utrujena se povraĉa domov. Veĉkrat mora poĉivati, ker so jej peroti po zimi postale okorne in ob piĉli zimski hrani opešale moĉi, ali je o prvem izletu precenila moĉi svoje in na vsem dolgem potu ni dobila niĉ hrane. Take trenutke prete čebeli mnoge nevarnosti. Ptiĉi in druge laĉne živali preže na njo, in utrujena živalca jim je kaj dovoljen prigrizek, zlasti ker jo sedaj kaj lahko ujemo. Će je ušla vsem tem preteĉim nevarnostim, pride najveĉkrat vsa upehana domov in pade malo korakov pred uljnjakom na tla. Tu je pa že ĉaka zavratna hladnokrvna roparica — žaba. Pod listom kake rastline ali pa v travi preži s široko odprtimi oĉmi na izbrano žrtev, katero ujame s spretnim skokom v ugodnem trenutku. In da si potolaži glad, treba je nikdar siti žabi dokaj živalic (15—20), in toraj v malo dneh čebelarju napravi veliko škode. Posebno zjutraj in zveĉer hodi na plen in preži s svojimi tovarišicami pred uljnjakom. Će so pred njim nasajene cvetlice ali zelenjava, imajo te čebelne roparice kaj ugodno skrivališĉe in zbere se jih obilo. Će hoĉe čebelar varovati čebele, naj jih spomladi ne izpušĉa pre-zgodaj, ker veĉkrat poginejo, kadar nenadoma potegne mrzla sapa, ali jih pa polove ptiĉi, prostor pred ulnja-

kom naj pa potrebi vsakih, zlasti širokolistnatih rastlin in slednje jutro in veĉer poišĉe prežeĉe roparice in jih odpravi. Žab pa ni treba pobijati, ker so koristne, ampak prenese naj jih v zelenjak, kjer naj love škodljive žuželke, ĉrve i. t. d.

Krompirjev sovražnik in sredstvo zoper njega.

(Konec.)

18. septembra izkopali so krompir na 20 ^m/₂ od neškropljenega in ravno toliko od škropljenega dela.

Na neškropljenem delu so pridelali 4.15 ^h/_g, na škropljenem 62.5 ^h/_g krompirja. Ćrnega krompirja je bilo na prvem delu 8 ^h/_g (19.27%), na drugem pa 7.5 ^h/_g (12%).

Enkratno škropljenje zvršili so 26. julija. Na 1 ^h/_g vode vzeli so 4 ^h/_g modre galice in 8 ^h/_g apna (nalašĉ polovico veĉ). 28. avgusta bil je krompirjevec na škropljenem delu še lepo zelen, na neškropljenem pa skoraj popolnoma uniĉen, 13. septembra poznalo se je tudi škropljenemu nekoliko, 18. septembra pa je poparila slana, kar je bilo še zelenega.

Tudi na polji kmetijske šole „Strickhof“ pri Zürichu v Švici sponesle so se poskušnje.

Navedem naj še en vzgled iz ĉasopisa „Der Züricher Bauer.“

Na poskušališĉi (Versuchsstation) v „Champ-de-l'Air“ v „Lausanna“ odmerili so oddelke po 10 ^m/₂ in trikrat škropili: 24. junija, 16. julija in 6. avgusta.

Na škropljenem delu pridelali so 30 ^h/_g, na neškropljenem 18 ^h/_g krompirja.

Će vzamemo pridelke na neškropljenih njivah za enotno in preraĉunimo, za koliko je bil pridelek s škrop-

