

Prva najdba rakovice rodu *Ctenocheles* (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije

The first finding of the crab *Ctenocheles* (Decapoda) in Oligocene beds in Slovenia

Vasja MIKUŽ

Katedra za geologijo in paleontologijo,
Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ključne besede: rakovice, *Ctenocheles*, deseteronožci, oligocen, Čeplje pri Vranskem, Slovenija

Key words: crabs, *Ctenocheles*, Decapoda, Oligocene, Čeplje at Vransko, Slovenia

Kratka vsebina

V članku so obravnavani ostanki rakovic rodu *Ctenocheles*. Najdeni so v oligocenskem sivem laporastem muljevcu blizu Čeplje pri Vranskem. To so prvi ostanki tega rodu rakovic na Slovenskem. V oligocenskem muljevcu pri Čepljah so registrirani še številni drugi fosilni ostanki, pogostne so tudi septarijske konkrecije.

Abstract

In the paper remains of crabs of genus *Ctenocheles* are discussed. They were found in the Oligocene grey marly mudstone at Čeplje at Vransko. This is the first evidence of this crab genus in Slovenia. In the Oligocene mudstone at Čeplje also numerous other fossil remains were registered, and also abundant septarian concretions.

Uvod

Od leta 1995 do 1998 so na posameznih odsekih delali večje izkope za novo avtocesto Ljubljana – Šentilj. Pri zaselku Čeplje blizu Vranskega so leta 1997 naredili razkop skozi hribec nad Čepljami (slika 1), kjer je Franci Golob s Ptuja v oligocenskem sivem laporastem muljevcu našel problematične fosilne ostanke. Muljevec je poln fosilnih ostankov, rastlin, mehkuž-

cev, rakovic in vretenčarjev. V njem so pogostne tudi manjše in večje ovalno-ploščaste konkrecije, med katerimi so tudi takšne, ki kažejo značilnosti septarijskih konkrecij. V njihovih sredicah so pogostno rastlinski ali drugi fosilni ostanki. Vse konkrecije so mineralizirane, nekatere vsebujejo več, druge manj pirita. Za problematične fosilne ostanke pa se je kasneje izkazalo, da pripadajo rakovicam rodu *Ctenocheles*.



Sl. 1 Položaj nahajališča oligocenskih rakovic pri Čepljah

Fig. 1 Location sketch map of Oligocene crabs at Čeplje

Paleontološki del

Sistematička po: C. Beschin et al., 1998

Classis Malacostraca Latreille, 1806

Ordo Decapoda Latreille, 1803

Subordo Anomura H. Milne-Edwards, 1832
Familia Ctenochelidae Manning & Felder,

1991

Genus *Ctenocheles* Kishinouye, 1926

Po podatkih De Angeli-ja (1995) in Beschin-a et al. (1998) izvemo, da je pri rodu *Ctenocheles* poznanih vsega okoli 20 vrst, od zgornej krede do danes. Rod *Ctenocheles* živi danes v Tihem oceanu le z nekaj vrstami.

Ctenocheles sp.

Tab. 1, sl. 1-5

1971 *Ctenocheles* sp. – Philippe & Secretan, 128, Pl. C, Fig. 17

1995 *Ctenocheles* sp. – De Angeli, 10, Fig. 2-3a – 2-3c; Tav. 1, Fig. 3

1998 *Ctenocheles* sp. – Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier & Ungaro, 15, Figg. 5, 6-1

Materijal: Pet primerkov osrednjih delov klešč v sivem (N5-N4) laporastem mušljevcu. Vse je našel Franci Golob s Ptuj. ČG-1 (desni propodus ali propodit), ČG-1/1 (odtis primerka ČG-1), ČG-2 (levi propodus), ČG-3 (desni manus in propodus), ČG-4 (morda desni daktilopodit od primerka ČG-3?).

Nahajališče: Usek nove avtoceste Ljubljana – Maribor, skozi hrib pri Čepljah (slika 1) vzhodno od Vranskega v letu 1997. Primerki so najdeni v oligocenski morski glini – sivici, v kateri so še rastlinski ostanki, številni ostanki mehkužcev in ponekod tudi rib. V isti kamnini je bila najdena tudi kost sesalca.

Opis: Primerki iz zbirke F. Goloba pravljajo posameznim delom klešč rakovice rodu *Ctenocheles* in vsi so poškodovani. Pri primerkih ČG-1, ČG-2 in ČG-4 so ohranjeni medio-anteriorni deli klešč (tab. 1, sl. 2-5), le pri ČG-3 je deloma ohranjen tudi najvišji in največji okroglast posteriorni del propodusa, ki zavzema okrog tretjine celotne dolžine propodusa (tab. 1, sl. 1). Anteriorni deli klešč so dolgi, nizki in ozki. Notranja funkcionalna površina kleščnih robov je ravna, ozka in nazobčana. Število in velikost zobcev sta različni. Zobci ali trni so pokončni ali rahlo nagnjeni, več je manjših in manj velikih. Med dvema velikima (visokima) zobcema je različno število manjših (nizkih) trdnih zobcev. Primerek ČG-1 ima med dvema okrog 2 mm visokima zobcema po šest krajsih oziroma nizkih zobcev (1 mm) (tab. 1, sl. 4-5), ČG-2 pa ima po štiri nizke zobe med dvema visokima alternirajočima zobcema (tab. 1, sl. 3).

Dimenziije

v mm

(Dimensions

in mm):

	ČG-1	ČG-2	ČG-3	ČG-4
dolžina (Length)	23	34	24	15
višina (Height)	1,5-3	1,5-2	1,5-3	2-3
največja višina klešč (max. height of chela)	-	-	11	-

Oznake: od ČG-1 do ČG-4 = primerki iz Čeplj oziroma zbirke Francija Goloba s Ptuj, ali Č=Čeplje, G=Golob (The marks from ČG-1 to ČG-4 = the specimens from Čeplje or from the collection of Franci Golob from Ptuj, or Č=Čeplje, G=Golob).

Pripomba: Čeprav se pri določitvah vrst do sp. (*Ctenocheles* sp.) fosilnih ostankov ne uporablja sinonimika, je ta navedena, ker so prikazane oblike sicer starostno različne, vendar v marsičem zelo podobne, primerki opisanega rodu pa zelo redki.

Stratigrafska in geografska razširjenost: De Angeli (1995) opisuje ostanke rodu *Ctenocheles* iz zgornjeoceanskih skladov najdišča »Fontanella« di Grancona v pokrajini Vicenza v Italiji, Beschin sodelavci (1998) pa iz srednjepriabonijskih plasti Grancone v Vicenzi. Vrsta *Ctenocheles valdellae* je bila najdena v srednjeeocenskih plasteh najdišča Nanto, prav tako v Vicenzi. Po podatkih De Angeli-ja (1995) so jih našli še v eocenskih skladih Nemčije. Philippe & Secretan (1971) predstavljata ostanke spodnjega in zgornjega dela klešč opisane rakovice iz burdigalijskih skladov najdišča Saint-Martin-de-Castillon (Vaucluse) blizu Aptu v Franciji.

Zaključki

Po uporabljenih literarnih virih ugotavljam, da so najdbe primerkov rodu *Ctenocheles* razmeroma redke in ugotovljene pretežno v terciarnih - eocenskih in spodnjemiocenskih skladih. Naši primerki so iz vmesnih oligocenskih plasti. Štirje primerki iz Čepelj so prve najdbe rakovic iz družine Ctenochelidae v Sloveniji. Zaradi izredno tankih in nežnih sten njihovih skeletnih delov se zelo težko ohranijo v celoti. Vsi predstavljeni primerki rakovic najverjetneje pripadajo njihovim najbolj trdnim kleščnim delom.

The first finding of the crab *Ctenocheles* (Decapoda) in Oligocene beds in Slovenia

Conclusions

According to the utilized literature references the finds of individuals of the *Ctenocheles* genus are relatively rare and occurring largely in Tertiary – Eocene and Lower Miocene beds. The found individuals are from the intermediate Oligocene beds. The four Čepelje specimens are the first finds of crabs of the Ctenochelidae family in Slovenia. Owing to the extremely thin and fragile walls of their skeletal parts they are very rarely preserved as a whole. All presented specimens of crabs most probably belong to their hardest claw parts.

Zahvala

Najlepše se zahvaljujem gospodu Franciju Golobu s Ptuja za posredovanje fosilne ostanke rakovic iz Čepelj pri Vranskem, Marijanu Grmu za skico in fotodokumentacijo ter dr. Simonu Pircu za prevode v angleščino.

Literatura

Beschin, C., Busulini, A., De Angeli, A., Tessier, G. & Ungaro, S. 1998: Crostacei eocenici di »Cava Rossa« presso Monte di Malo (Vicenza – Italia settentrionale). – Studi Trentini Sci. Naturali – Acta Geologica, 73, (1996), 7-34, Trento.

De Angeli, A. 1995: Crostacei del Eocene superiore di »Fontanella« di Grancona (Vicenza – Italia settentrionale). – Studi Ricerche Assoc. Amici Mus. civ. «G. Zannato», 6, 7-24, Montecchio Maggiore.

Philippe, M. & Secretan, S. 1971: Crustacés décapodes du Burdigalien des Courrennes (Vaucluse). – Ann. Paléont. Inv., 57, 115-142, Pl. A-C, Paris.




Tabla 1 – Plate 1

- 1 *Ctenocheles* sp., ČG-3, spodnji del klešč, Čeplje pri Vranskem, x2
Ctenocheles sp., ČG-3, the lower part of cheliped, Čeplje at Vransko, x2
- 2 *Ctenocheles* sp., ČG-4, del klešč, Čeplje pri Vranskem, x2
Ctenocheles sp., ČG-4, the middle part of anterior cheliped, Čeplje at Vransko, x2
- 3 *Ctenocheles* sp., ČG-2, sprednji del klešč, Čeplje pri Vranskem, x2
Ctenocheles sp., ČG-2, the anterior part of cheliped, Čeplje at Vransko, x2
- 4 *Ctenocheles* sp., ČG-1, spodnji in sprednji del klešč, Čeplje pri Vranskem, x2
Ctenocheles sp., ČG-1, the anterior part of immovable finger, Čeplje at Vransko, x2
- 5 Odtis istega primerka, ČG-1/1, Čeplje pri Vranskem, x2
 The impression of same specimen, ČG-1/1, Čeplje at Vransko, x2