

O pomnoževanju smokev (fig).

Najuspešneje pomnožujemo smokeve s koreninskimi poganjki, ali prav za prav z mladikami, katere poganja smokva krog debela iz zemlje. Ker pa vsaka smokva nima takih poganjkov, rabimo tudi potaknence. Po nekaterih krajih pa sade smokeve potaknence narobe, češ, da je to zelo važno, vendar je povsem nepravilno. Ker vidim povsod, da napačno ravnaajo ter ne znajo gojiti tega imenitnega drevesa, namenil sem si objaviti ta članek. Ako želimo imeti kmalu mnogo in zdravih dreves, streči jim moramo, kakor zahteva njih narava.

Najbolje je saditi smokeve začetek meseca maja, t. j. takrat, ko začno brsteti. Tedaj naj se izkopljejo uže ukoreničena drevesa, oziroma narežejo potaknenci. Sicer sadimo lahko smokeve vse leto, le ondaj ne, kadar je zemlja zmrzla; še celo po leti po senčnih legah, vendar s slabim uspehom. Zda j imamo torej najugodnejši čas!

Ukoreničene poganjke treba takoj, kadar so izkopani, vsaditi, ne smeš pa odlagati, da bi se korenine na zraku posušile. Korenine lahko prav malo prikrajšaš, nikakor pa vrha, ker bi se rana vsled velikega stržena težko zarasla. Ako nimaš poganjkov s koreninami, rabiš lahko potaknence, s katerimi je tako ravnati: Na spodnjem konci jih odreži gladko pod popom. Ker pa ima smokva zunanji del luba zelo gost, vlaga težko predoren, zato je pri sajenji potaknencev zelo važno, da se ves spodnji del potaknenca, kolikor naj ga pride v zemljo, varno ostrže z nožem tako globoko, da se prikaže srednji lub, ki je zelen. Vsled tega vlaga veliko laže vpliva na potaknence, ki v kratkem poženo korenine in mladike. Potaknenec, 25—30 $\frac{1}{m}$ dolg, prime se ti vsak, ako ga na tak način vsadiš. Kakor pa uže ukoreničeni smokvi ni smeti vrha odrezati, ravno tako tudi ne potaknencu. Za potaknence je jemati enoletne, pa tudi večletne vršičke. Vsakakor najboljši so enoletni. Saditi jih je kakor trtne potaknence. Tudi mladike, ki so do 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{m}{y}$ dolge, primejo se in dobro uspevajo, ako jih po navedenem načinu vsadiš po kakih 25 $\frac{1}{m}$ globoko. Izkušnja mi je pokazala, da je mej debelnimi poganjki in potaknenci prav malo ali nič razlike, bodisi v rašči ali v rodovitnosti.


Glede lupljenja zunanje povrhnje lubadi naj še opomnim, da je to delo zelo važno pri vseh drevesnih plemenih, katera pomnožujemo s potaknenci, — ravno tako tudi pri trti. V 16 št. t. l. na strani 155. prijavlja strokovnjaški list „Weinzeitung“ pod naslovom: „Das Entrinden der Rebenstecklinge“ kot imenitno novost poskuse, ki so se zvršili v Montpelieru na tak način, ter piše, da se je prijelo 90 % potaknencev ameriške trte Jaquez, katera se izmej vseh trtnih vrst najteže ukoreniči kot potaknenec.

Znan mi je slučaj, da se je od navedenega plemena trt 250 nasajenih potaknencev prijelo le 11, čemur je bilo najbrže krivo to, ker jih niso olupili.

Josip Štrekelj.

Tehtnica za prasiče.

Pri nobeni drugi domači živali ni vrednost toliko zavisna od teže, kakor pri prasičih, zlasti pri pitanih. V mnogih krajih pa za tehtanje prasičev ni primerne tehtnice, in le z velikimi zaprekami jih je mogoče tehtati. Dunajski kmetijski list „Oeconom“ pa objavlja način, kako prirediti navadne stare tehtnice v ta namen. Podoba 2. sama kaže priprosto sestavo take tehtnice,



Podoba 2.

katero je lahko v vsaki vasi narediti, če je le dobiti kako tehtnico, ki tehta samo z eno utežjo. Viseč zaboj, ki ima ob vsaki strani vrata, postavi se tik pod svinjakova vrata. Pred zaboj se postavi trinog, čez katerega gre vzvod. Na en konec vzvoda obesi se tehtnica z zabojem, z drugim koncem se pa vse skupaj dvigne, kadar se tehta. V temnem zaboji je prasič popolnoma miren, in zato je lahko tehtati hitro in prav natanko.

Razne reči.

* Varujte kuščarice (martinčke ali gaščarice); Kuščarice so zelo požrešne roparske živali. Žive le ob raznih škodljivih žuželkah, ob gosenicah, muhah, hroščih, črvih in polžih in zato so koristne sadjarstvu. Ne preganjajte jih zatorej, ampak jih rajši naseljujte po svojih vrtih!

* Gosenice na jagodnem drevjiči. Župnik G. Göller v Alfdorfu piše: Da jagodno drevjiče, t. j. ribez, agras, malinje i. t. d., braniš gosenicam, ki lazijo hlastno na to grmovje, poškropi jih vsak dan, predno solnce prične pripekati, in sicer precej, kadar se gosenice prikažejo, s prav mrzlo vodo toliko, da je vse listje dobro zmočeno. Čez nekaj dni izgine vsa golazen.

* Zemeljske boljše, ki po zelenjadnih vrtih delajo silno škodo z objedanjem sadik, najbolje preženeš, če poštupaš napadeno gredico s kosteno moko, potem pa gredo prav dobro z vodo poškropiš. Kostena moka je ob enem izvrstno gnojilo, posebno za zelne rastline, katere boljše posebno rade napadajo.