

ložnost opazovati goloba grivarja, ki je v parku pobiral bilke za gnezdo v vrhu bližnje lipe, okrog 8 m visoko. Zanimivo, partner je čepel v gnezdu, potem pa sta skupaj urejala bilke. Medtem ko je prvi vneto prinašal gnezdno gradivo, se partner ni premaknil z gnezda, in mislim, da je že valil, čeprav sta gnezdo še dograjevala. Ob naslednjem obisku čez en teden je valjenje še vedno trajalo. 12. 7. 1997 pa sem na gnezdu že videl starega, ki je hranil mladiča, medtem ko je bilo gnezdo 12. 8. 1997 očitno prazno.

Golob grivar me je še enkrat razveselil, saj sem 7. 7. 1997 v bližini omenjenega gnezda na dvorišču pred plinarno videl na cestnih svetilkah dva odrasla, enega pa na tleh. Povrh vsega pa sem v bližini na drevesu ob cesti, okrog 10 m visoko, opazil manjše gnezdo, ki bi lahko bilo grivarjevo.

Gnezdo na lipi sem fotografiral 6. 12. 1997, ko je listje že v celoti odpadlo. Zelo verjetno je, da to gnezdenje blizu tovarne Litostroj ni bilo prvo in tudi ne edino tako na tem predelu Ljubljane kot drugje, še zlasti v večjih parkovnih in podobnih površinah s polji in travniki v bližini. Ivo A. Božič, Na jami 64, 1000 Ljubljana

SKALNA LASTOVKA *Ptyonoprogne rupestris*

CRAIG MARTIN *Breeding activity from 1994-97 under viaduct Moste (NW Slovenia)*

Prvič sem se s skalno lastovko, pravzaprav s tremi, srečal 14. aprila 1994. V jasnem in toplem vremenu so preletavale območje med jezo HE Moste in avtocestnim viaduktom. Občasno so izginile v sotesko ali na travnike in njive ob avtocesti. Naslednje leto sem že 23. marca opazil osebek, ki je letel nad jezo.

Leta 1996 pa sem skalne lastovke opazoval večkrat, vendar prvič dokaj pozno, šele 5. maja, in sicer tri osebe. Najbrž so se vrnile kot običajno v marcu ali začetku aprila. Na viaduktu sem 25. 5. 1996 odkril tri gnezda. Dve sta bili zasedeni, tretje pa še ni bilo dokončano. Gradivo so ptice nabirale kar na nasipu pod viaduktom, kjer je mešanica drobne- ga peska in prsti. Gnezda so bila pilep-

ljena na dveh vodoravnih nosilcih in enem pokončnem in obrnjena v smereh sever in zahod.

Naslednjič sem Kavčke, kot se imenuje soteska, obiskal 3. julija. V zraku sem opazil tri lastovke, četrta pa je sedela na železni palici, štrleči iz betona. Kmalu sem ugotovil, da opazujem mladiča, saj ga je druga ptica hranila. Tudi kljun je imel še "mladičji". 22. avgusta sem se še enkrat razveselil mladih skalnih lastovk. V dveh gnezdih so čepeli mladiči, ki so jih starši ves čas krmili. V zraku je bilo 6 ptic. Vrnil sem se 14. septembra. Opazil sem tri skalne lastovke, ki so krožile nad sotesko ob viaduktu. Še vedno so obiskovale eno gnezdo.

V letu 1997 sem šel pod viadukt le enkrat, in sicer 16. maja, ko sem opazil dve skalni lastovki. Iz teh skupih opazovanj ugotavljam, da ima skalna lastovka pri nas dva zaroda. Tone Trebar, Pestotnikova 17, 4000 Kranj

MALI MUHAR *Ficedula parva*
RED-BREASTED FLYCATCHER - *Juvenile caught on 11th September 1998 at Krakovski gozd (SE Slovenia)*

11. septembra 1998 smo v sodelovanju med našim muzejem in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto v Krakovskem gozdu pri Hrvaškem brodu organizirali obročkanje ptičev z namenom, da ugotovimo, katere vrste ptičev se pojavljajo na selitvi v tem času. V vrbovem grmovju smo imeli postavljenih 7 mrež in razen številnih črnoglavk in vrtnih penic smo obročkali tudi nekatere zanimive vrste, kot so:





rumeni vrtnik, mlinarček, kovaček, bičja, močvirska in srpična trstnica ter mokož in vodomec. Sredi dopoldneva pa me je v mreži presenetil ptiček, velik kot kovaček, ki je imel izredno belo obarvana repna peresa. Belina repnih peres je bila še najbolj podobna repaljščicini ali pa kupčarjevi. V roki sem ugotovil, da je to mali muhar, po svetlih pikah na sekundarnih krovcih peruti pa, da je v prvoletnem perju. Dolžina peruti je bila 66 mm in teža 9,4 grama. Seveda smo ga v roki fotografirali in nato obročkanega izpustili. Omenjeni podatek je eden redkih iz jesenskega obdobja pri nas, verjetno pa edini za Krakovski gozd. *Dare Sere, Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana*



PLAŠICA *Remiz pendulinus*
PENDULINE TIT - *New breeding locality discovered in 1998 at Vrbje near Žalec (C Slovenia)*

Plašica velja v Sloveniji za redko gnezdilko. Razširjena je predvsem v severovzhodni Sloveniji, in sicer ob reki Muri in Dravi. Iz osrednje Slovenije, razen z Ljubljanskega barja, do sedaj ni bila znana gnezditev te vrste.

V spodnji Savinjski dolini je plašica reden gost v času spomladanskega in jesenskega preleta. Najpogostejša je na ribniku Vrbje pri Žalcu. V letu 1998 sem plašico, tako kot pretekla leta, v marcu redno videval ob vsakem obisku. Kasneje sem ribnik zaradi pomanjkanja časa, delno pa zaradi nezanimivosti (bil je prazen) obiskal le mimogrede in po-

redko. Daljše obiske sem si privoščil znova v juniju. V tem času sem ob ribniku znova zaslišal značilno oglašanje plašice. Po vztrajnem iskanju sem zagledal plašico, ki se je prehranjevala v sestoju rogoza. Glede na velikost črnine na glavi sem osebek določil za samca. Takoj sem pomislil na gnezditev in še isti dan pregledal vse vrbe ob ribniku in okolici, vendar gnezda nisem našel. Naslednjič sem bil ob ribniku 2. 7. Tokrat sem v sestoju rogoza znova opazoval plašice, in to kar pet osebkov. Z lahkoto je bilo mogoče prepoznati samca in samico ter tri mlade osebkove. Vseh pet se je zadrževalo med rogozom, kjer so se prehranjevali, občasno pa so obletavali tudi vrbe na obrežju ribnika.

Glede na meni znane podatke in podatke iz literature je to prvo gnezdenje plašice v spodnji Savinjski dolini. *Milan Vogrin, Hotinjska c. 108, 2312 Orehova vas*

BELOGLAVI STRNAD *Emberiza leucocephalos*

PINE BUNTING - *Male caught and released on 22th March 1998 at Ormoško jezero (NE Slovenia)*

22. marca 1998 je bila temperatura zraka ob sedmih zjutraj 0°C, ob enih popoldne, ko se je skupaj s petimi trstnimi ujel beloglavi strnad, pa le 4°C. Ujeta ptica je bila po obliki in velikosti podobna rumenemu strnadu, vsekakor pa večja od trstnega. Zgoraj je bila pisano rjava, spodaj svetlosiva.

Po temenu je bila bela, po licih in okrog vratu bolj umazana, vendar še vedno svetla. Nadočesna maroga in podbradek sta bila rdečerjava, prsi in boki so bili na gosto posejani z rdečerjavimi packami. Takšna je bila tudi jurica. Belina v zunanjih repnih peresih je bila omejena: na šestem do polovice in na petem le na konici. Samec je tehtal 30,2 g, perut je bila dolga 92 mm, tretje, četrto in peto ter delno šesto letalno pero so bili posneti. V *Acrocephalus* sem prebral, da je bil beloglavi strnad nazadnje ujet v Sloveniji 18. 2. 1991 v Godoviču. *Iztok Vreš, Grogorova 6, 2310 Slovenska Bistrica*