

IA: zmanjšanje dorzifleksije gležnja s 15 stopinj do nevtralnega položaja;

IB: dinamična addukcija ali supinacija sprednjega dela stopala;

IIA: rigidni ekvinus;

IIB: rigidna addukcija sprednjega dela stopala;

III: kombinacija – ekvinus, varus, addukcija sprednjega dela stopala.

Pristopi k zdravljenju relapsa – tako kot zdravljenje začetne deformacije – temeljijo na manj invazivnih metodah. Opravimo lahko tudi popolno subtalarno sprostitev ali uporabimo zunanji fiksater po Lizarovem, medtem ko optimalna metoda ostaja ponovno mavčenje po Ponsetiju, ki je najbolj učinkovita pri relapsih pri mlajših od 5 let. Kasneje svetujemo kombinacijo metode po Ponsetiju s kirurškimi tehnikami in zdravljenja z opornicami.

Ključne besede: ekvinovarus, stopalo, otroci, zdravljenje.

IZOSPORIOZA

M. Šnajder¹, N. Orešič², J. Dolinšek³

(1) Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – Varstvo otrok in mladine, Maribor, Slovenija

(2) Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Maribor, Slovenija

(3) Univerzitetni klinični center Maribor – Klinika za pediatrijo, Enota za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano, Maribor, Slovenija

IZVLEČEK

Izhodišča: *Isospora belli* je enocelični kokcidijski parazit, ki pri ljudeh povzroča oportunistične okužbe. Parazit okuži predvsem epitelne celice tankega črevesa, redkeje tudi debelega črevesa. Težje oblike okužbe izosporioze prebolevajo imunokompromitirani bolniki, ogrožena skupina pa so tudi otroci, zaradi večjega tveganja dehidracije predvsem dojenčki. Pri večini imunokompetentnih oseb okužba poteka brez simptomov in je samoomejujoča. Zlati standard odkrivanja bolezni je dokaz oocist v blatu. Možen je tudi pojav eozinofilije v krvi. Ob nujnosti zdravljenja z zdravili kot zdravilo izbire uporabimo trimetoprim-sulfametoksazol.

Zaključki: Preučili smo nekaj primerov izosporioze pri otrocih, ki smo jih obravnavali na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ugotovili smo, da je bila klinična slika v večini primerov blaga. Okužbe praviloma niso zahtevale zdravljenja z antibiotiki; priporočali smo le redno jemanje probiotikov. Na okužbo s parazitom *Isospora belli* moramo pomisliti pravočasno, da se izognemo nepotrebnim diagnostičnim in terapevtskim postopkom.

Ključne besede: *Isospora belli*, infekcijska driska, otroci.