


Gnezditev pribe *Vanellus vanellus* na Sorškem polju
Breeding of Lapwing *Vanellus vanellus* in the Sorško plain



slika 1: razširjenost pribe *Vanellus vanellus* v Sloveniji
 figure 1: distribution of Lapwing in Slovenia



14.15. gnezdo in mahovec pribe *Vanellus vanellus* (T.Trilar)
 14.15. nest and downy young of Lapwing (T.Trilar)

Na posestvu kmetijske zadruge na Sorškem polju se priba *Vanellus vanellus* stalno zadržuje na svojih pomladanskih preletih. Zadnje tri leta (1979-1981) pa je opažena tudi gnezditev na tem področju.

- 9.3.1981 so bile opazovane prve pribe.
 16.3.1981 sem opazoval jato 20 prib.
 19.3.1981 se je po preletu letala dvignila vsa jata. Ocenil sem, da šteje okrog 70 ptic.
 19.4.1981 sem našel 13 parov. Po njihovem razburjanju sem sodil, da že gnezdijo, vendar nisem našel ne gnezda ne begavcev.
 30.4.1981 je Geister našel 2 gnezdi in obročkal 2 begavca.
 7.5.1981 sva skupaj z Geistrom našla dve novi gnezdi in obročkala 6 begavcev ter našla pred tednom dni obročkanega begavca.
 10.5.1981 sem našel novo gnezdo in obročkal 8 begavcev ter ujel pet že obročkanih begavcev.
 Kasneje opazovanje zaradi previsokega krompirja ni bilo mogoče.

Iz navedenih podatkov in opazovanj sklepam, da je bila gnezditev na tem področju uspešna in da je bilo izvaljenih 10 legel.

Vsa gnezda so bila na krompirišču in vedno ležijo na vrhu razora. Ptica izgrebe vdolbino v zemljo in jo izravna z nekaj šopi trave ali slame. Vsako leglo vsebuje 4 hruškasta jajca svetlo rjave barve s temno rjavimi lisami, ki so nekoliko gostejše posejane na topem koncu; velika so 48 mm x 34 mm. Jajca so vedno položena s konicami navznoter. V dveh leglih je bilo eno jajce uničeno, verjetno od naravnega plenilca.

Mladiči so rjavi s črnimi lisami. Imajo bel črno obrobljen ovratnik in zelo dolge in močne noge. Zanimivo je, da sem našel po tri, le redno po dva begavca skupaj in nikoli po štiri, kot bi se dalo sklepati po številu jajc v leglu. Mislim, da dejstvo, da ptica uspešno gnezditi na obdelanih površinah, daje upanje, da se bo vrsta uspešno prilagodila spremeni življenjskega prostora, ki jo povzroča agrarizacija.

Tomi Trilar, Škofjeloška 50, 64000 Kranj