

pri Kidričevem, domačinom bolj znanima kot »Halda« in »Kicverk«. Blato in pepel sta bila stranska produkta pri proizvodnji glinice v Tovarni glinice in aluminija. Z opustitvijo proizvodnje glinice se je nehalo tudi odlaganje blata in pepela. Sledile so neuspele »ekološke« sanacije (pogozdovanje), sedaj pa na tem območju gospodari narava po svoje. Haldo, ki meri približno 30 ha, preraščajo zdaj že povečini suhi travniki, le ponekod se širi robinija *Robinia pseudoacacia*. Kicverk prerašča grmovno rastje, ob vznožju nasipa je tudi nekaj fragmentov sekundarne loke z obveznim črnim odlagališčem odpadkov. Območje leži sredi širnih monokulturnih polj, le na severni strani je v bližini mešan gozd. Petje velikega strnada sem na Kicverku prvič poslušal 8.6.2000. Samček je v značilni strnadji pozi neutrudno pel na vrhu bezgovega grma *Sambucus nigra*. Kasneje mi je M. Vogrin povedal, da sta dva para gnezдила tudi v zahodnem delu odlagališča rdečega blata.

Matjaž Kerček, Kungota 44, 2325 Kidričevo

HRVAŠKA / CROATIA

RUMENOKLJUNI VIHARNIK *Calonectris diomedea* & SREDOZEMSKI VIHARNIK *Puffinus yelkouan*

Cory's Shearwater & Mediterranean Shearwater – observation of two shearwater species in mixed flocks together with Yellow-legged Gulls *Larus cachinnans*, one Mediterranean Gull *L. melanocephalus* and several Shags *Phalacrocorax aristotelis* near the coast of Korčula Island between 29th and 30th April 2000. In a flock near the village of Prižba 300 ex. of Cory's and 20 ex. of Mediterranean Shearwaters, and in flock near the Cape of Velo Dance 500 ex. of Cory's and 100 ex. of Mediterranean Shearwaters were observed (S Dalmatia, Croatia).

Med 29. in 30.4.2000 sva se s kolegom Borutom Rubiničem mudila na otoku Korčula. Oba dneva je zaznamovalo oblačno in vetrovno vreme, zato sva se odpravila opazovat morske ptice na južni obali otoka in tam začela s teleskopom prečesavati odprto morje. Valovita in razburkana morska gladina je lahko zelo primerna za opazovanje morskih ptic, zlasti cevonoscev Procellariiformes. Prvi dan, 29.4.2000, sva pregledala morje ob obali od Prižbe do Karbunov. Med (pol)otočkom Otočac in otočkom Vrhovnjak pri Prižbi sva poleg številnih rumenonogih galebov *Larus cachinnans* opazila tudi posamezne rumenokljune in sredozemske viharne, švigajoče med valovi. Pozneje sva ugotovila, da so se ptice zbirale v veliki mešani jati med čerjo Čerin in otočkom Stupa nasproti Prižbe. Očitno jih je privabila kakšna večja jata rib. S premikanjem plena (rib) se je naprej proti zahodu premikala tudi jata ptic. V njej sva med viharne naštel 300 rumenokljunih in 20 sredozemskih viharne, jati pa

so bili primešani še rumenonogi galebi (okoli 1.000 osebkov) in posamezni vranjeki *Phalacrocorax aristotelis*, ki sva jih ob koncu dneva naštel 30.

Naslednjega dne, 30.4.2000, sva opazovala ptice na zahodni strani Korčule, v okolici Vele Luke. Na podobno jato kot prejšnjega dne sva naletela blizu rta Velo Dance, ko se je jata zbrala le kakšnih 50 do 100 m od obale ob čeri Čančir. Tudi tokrat je bil vzrok za zgostitev ptic verjetno večja jata rib, v kateri so poleg ptic plenile tudi večje ribe. Te so se poganjale iz vode kar med jato na vodi plavajočih ptic. Tokrat so prevladovali viharne, saj sva v jati naštel prek 500 rumenokljunih in 100 sredozemskih viharne. Svoj delež plena pa je poleg rumenonogih galebov jemalo še deset (10) vranjekov in en (1) črnoglav galeb *Larus melanocephalus*. Zanimivo je, da se viharne, ki smo jih sicer vajeni na odprtem morju, ob slabem vremenu in razburkanem morju lahko zelo približajo obalam. Poleg tega pa lahko te povečini nočne ptice očitno ob takšnih priložnostih lovijo tudi podnevi. V jatah so bili rumenokljuni viharne precej številnejši od sredozemskih. S slovenskega stališča je torej zanimivo dejstvo, da so bili na naši obali, ki je od zgoraj opisane korčulanske obale oddaljena kakih 400 km, opaženi le sredozemski viharne, medtem ko rumenokljunega viharne v Sloveniji za zdaj še nismo zabeležili [SOVINC, A. (1999): Redke vrste ptic v Sloveniji in letu 1996. *Acrocephalus* 20 (92): 26-30].

Al Vrezec, Pražakova 11, SI-1000 Ljubljana

EGIPTOVSKI JASTREB *Neophron percnopterus*
Egyptian Vulture – 4 in June 1977 and 5 on June 24th 1978 above the channel near Mali Lošinj (Quarnero Bay, NW Croatia)

Z družino sem bil doslej na Lošinju dvakrat, prvič junija leta 1977. Ko smo takrat med 10. in 11. uro z barko prečkali preliv pri Malem Lošinju, sem nad njim opazil štiri (4) egiptovske jastrebe *Neophron percnopterus*, ki so krožili v termičnem vzgorniku. Starosti ptic nisem mogel ugotoviti. Z družino smo imeli namreč probleme z velikimi žuželkami, ki so ravno takrat vdrle v avto. Leto pozneje, 24.6. pa smo na poti domov na istem mestu ob 15.30 uri opazovali pet (5) egiptovskih jastrebov. Starosti opazovanih ptic tudi tokrat nisem mogel ugotoviti.

Max Dumpelnik, Dammweg 15, A-8605 Kapfenberg

ČRNA PROSENKA *Pluvialis squatarola*
Grey Plover – juvenile on February 23rd 2001 on Srakane Vele Island, Cres–Lošinj Archipelago (NW Croatia)

Triindvajseti februar je bil sončen, hladen in vetroven dan. Ko sem se okrog poldneva sprehajal po slemenu otoka (nič