

Zaporedna številka popisa (Number of relevé)		1	2	3	Pr.
<i>Geranium phaeum</i>	E1	1	.	.	1
<i>Galium mollugo</i>	E1	+	.	.	1
<i>Pimpinella major</i>	E1	.	.	+	1
<i>Trollius europaeus</i>	E1	.	.	+	1
<i>Thlaspietea rotundifolii</i>					
<i>Adenostyles glabra</i>	E1	.	.	1	1
<i>Astrantia carniolica</i>	E1	.	.	+	1
Mahovi (Mosses)					
<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	.	.	+	1
<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	.	.	+	1

A – apnenec (Limestone); L – laporovec (Marlstone); K – rjava pokarbonatna tla (brown calcareous soil); R – rendzina (Rendzina).

RAFAEL TERPIN, BRANKO ZUPAN, POLONA STRGAR,
PETER STRGAR & IGOR DAKSKOBLER

Viola pyrenaica Ramond ex DC.


Novost v flori Karavank in nova nahajališča v Julijskih Alpah **Novelty in the flora of the Karavanke range and new localities in the Julian Alps**

- 9648/1** (UTM 33TUM93): Slovenija: Primorska, Julijske Alpe, nad pl. Zapotok, strma rama pod Grivo, 1620 m n. m., kamnito subalpinsko travnišče, *Avenastro parlatorei-Festucetum calvae*. Leg. & det. I. Dakskobler, Polona in Peter Strgar, 27. 7. 2012 in I. Dakskobler, 14. 8. 2012. Novo nahajališče v že znanem kvadrantu, prvo znano nad Zadnjo Trento.
- 9649/2** (UTM 33TVM14) Slovenija: Gorenjska, Krma, Zasipska planina, okoli 880 m n. m. Det. B. Anderle, 11. 5. 2011, avtorjev popis.
- 9749/1** (UTM 33TVM12) Slovenija: Gorenjska, Bohinj, Ukanc, vznožje Pršivca nad Bohinjskim jezerom, blizu izvira Govic in na meliščih proti Ukancu, od okoli 560 do 650 m n. m., na več krajih. Det. B. Zupan in I. Veber, 3. 5. 2009, potrdil B. Zupan, 30. 3. 2011, popisi avtorjev. Nova nahajališča v že znanem kvadrantu.
- 9749/2** (UTM 33TVM22) Slovenija: Gorenjska, Bohinj, Nomenj, ob cesti proti Bitnjam, 490 m n. m. Det. B. Zupan in I. Veber, 19. 5. 2010, popis avtorjev. Novo nahajališče v že znanem kvadrantu.
- 9550/4** (UTM 33TVM34) Slovenija: Gorenjska, Karavanke ob poti na Stol, med Žirovniško in Zabreško planino, gruščnat stožec, porasel s kranjsko krhliko (*Rhamnus fallax*), 1260 m n. m. Leg. & det. I. Dakskobler, I. Veber & B. Zupan, 30. 8. 2012 in B. Anderle & I. Dakskobler, 28. 3. 2012, LJS; ob poti na Stol, Monštranca nad Valvasorjevim domom,

melišče, 1230 m n. m. Det. I. Dakskobler, I. Veber & B. Zupan, 30. 8. 2011; Žirovniška planina, pašnik na pobočnem gručču, 1170 do 1230 m n. m. Leg. & det. B. Anderle in I. Dakskobler, 28. 3. 2012, LJS.

9551/3 (UTM 33TVM34) Slovenija: Gorenjska, Karavanke, ob poti na Stol, Zabreška planina, poraslo melišče z bukvijo in sveže posekan pionirski smrekov gozd na pobočnem gručču, 1325 m n. m. Leg. & det. B. Anderle & I. Dakskobler, 28. 3. 2012, LJS.

Arealno karto vrste *Viola pyrenaica* v Sloveniji smo v zadnjih desetih letih že večkrat dopolnjevali, nazadnje leta 2011 v reviji Hladnikia (DAKSKOBLER 2011). Do zdaj znano razširjenost v Julijskih Alpah dopolnjujemo s tremi novimi nahajališči v njihovem gorenjskem delu, pri čemer je novo nahajališče v dolini Krme prvo zunaj Bohinja, in enim v primorskem delu, nad Zadnjo Trento. Bistvena novost je pojavljanje v Karavankah, kjer pirenejske vijolice do zdaj niso poznali (HARTL & al. 1992: 369). Ta vrsta je v avstrijskih vzhodnih Alpah zelo redka in ogrožena (FISCHER & al. 2008: 435). V Karavankah, na melišču Monštranca in med Žirovniško in Zabreško planino, smo jo prvič opazili konec avgusta 2011, najdbo pa potrdili zgodaj spomladi 2012. Večinoma raste na bolj ali manj poraslem gručču, ob robu pašnikov in na plaziščih izpod Stola in sosednjih vrhov. Nahajališč in primerkov je precej in vrsta tu ni ogrožena. Ker v splošnem velja, da je zaradi zgodnjega cvetenja in neuglednosti



Slika 1: Razširjenost vrste *Viola pyrenaica* v Sloveniji (dopolnjeno po DAKSKOBLER 2011). Zemljevid smo izdelali s programom FloVegSi (SELIŠKAR & al. 2003)

Figure 1: Distribution of *Viola pyrenaica* in Slovenia (supplemented after DAKSKOBLER 2011). The distribution map was made using the program FloVegSi (SELIŠKAR & al. 2003).

(poleti jo prerasejo druge vrste in se jo najlažje opazi pri podrobnem fitocenološkem popisovanju) bolj ali manj prezrta, so v prisojnem, slovenskem delu Karavank pričakovana še nova nahajališča. Po dosedanjem vedenju je torej pirenejska vijolica v Sloveniji razširjena v dinarskem, submediteranskem in alpskem fitogeografskem območju (Julijske Alpe in Karavanke). Mogoča so tudi njena nahajališča v Kamniško-Savinjskih Alpah in v zahodnem delu predalpskega fitogeografskega območja.

Literatura

- DAKSKOBLER, I., 2011: Novosti v flori zahodne Slovenije (Primorska). Hladnikia (Ljubljana) 27: 3–25.
- FISCHER M. A., W. ADLER & K. OSWALD, 2008: Exkursionsflora von Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Land Oberösterreich, Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, Linz. 1391 pp.
- HARTL, H., G. KNIELY, G. H. LEUTE, H. NIKLFELD & M. PERKO, 1992: Verbreitungsatlas der Farnund Blütenpflanzen Kärntens. Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Klagenfurt. 451 pp.
- SELIŠKAR, T., B. VREŠ & A. SELIŠKAR, 2003: FloVegSi 2.0. Računalniški program za urejanje in analizo bioloških podatkov. Biološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana.

IGOR DAKSKOBLER, BRANE ANDERLE,
IVAN VEBER & BRANKO ZUPAN

Verbascum phoeniceum L.

Novo subsponsantano nahajališče v Julijskih Alpah, novost za floro Gorenjske New subsponspontaneous locality in the Julian Alps, novelty of the flora of Gorenjska

9650/3 (UTM 33TVM23) Slovenija: Gorenjska, Julijske Alpe, Bohinjska Bela, nakladalna rampa na železniški postaji, ruderalno travišče, 490 m n. m. Leg. & det. I. Dakskobler, 8. 6. 2012, LJS in avtorjeve fotografije.

Vijolični lučnik (*Verbascum phoeniceum*) je jugovzhodnoevropska-zahodnoazijska vrsta, značilnica suhih travišč iz reda *Festucetalia valesiacea*. V Alpah je razmeroma redka, razširjena predvsem v južnih pokrajinah in deloma na njihovem severovzhodnem robu (AESCHIMANN & al. 2004: 188). V Sloveniji je najbolj pogosta na Krasu, precej nahajališč je v Prekmurju, posamična so tudi drugod (JOGAN & al. 2001: 398, BAKAN 2006: 163, WRABER 2007: 549). V Julijskih Alpah je redkost. POLDINI (2002: 511) objavlja podatek za osnovno polje 9546 (zahodno prigorje). V slovenskem delu tega gorovja je znano nahajališče na travnikih ob Soči pri Idrskem (v bližini Kobaridu), kjer jo je 29. 5. 1935 našel C. Zirnich (MEZZENA 1986: 435). Travnike ob Soči pri Idrskem smo fitocenološko preučevali pred nekaj leti, vendar vijoličnega lučnika nismo nikjer opazili. Tudi v Karavankah ni znanih nahajališč