

☿ EPHEMERIDES ANDREAE PERLACHII STIRI

ex Witschein, Artium & Philosophiæ magistri, Mathe/
maticarum disciplinarū studiū Viennensis professoris or/
dinarū, pro Anno domini & Saluatoris nostri Iesu Christi
M. D. XXXI. cum configurationibus & habitudinibus
planetarū inter se, & cū stellis fixis, cū ex secun/
do, tū ex primo mobili contingētibus. Insuper
adiunximus his nostris in hunc annum
Ephemeridibus, Prognosticon,
superioris anni eclipsium,
quarum effectus hoc
Anno appa/
rebunt.

I. ROSINVS.

Auræ conuexo surgant quæ sydera mundo,
Quæ ue obeant, uaria præcipitata uice.
Quo ruat errantum discrimine quæq; trahatq;
Quos ignes secum, qua radietue mora,
Hæc licet illustri fatorum nosse tabella,
Arte noua, certis indubitata notis.
Hinc habitus cœli pluuios, uentosq; n̄uesq;
Discet, ab irato missaq; tela Ioue
Prouida uenturi quem tangit cura pericli,
Et sapit, incautos plurima damna manent.

REVERENDO IN CHRISTO PATRI,
ac domino, Domino Ioanni Zolner celebratissimi ceno-
brj Runensis Abbati, Patri colendissimo, Andre-
as Perlachius Stirus ex Vvitschein,
felicitatem optat, ac sese
commendat.

Alno superiori Venerande in Christo pater/ac plurimū obseruande/
Ephemerides nostras per characteres ac numeros in compendiarīā
quandā formā/redegimus/Ita vt nostrū illud Ephemeridū opus/vnius an-
ni non excederet cōmunē Ephemeriduz modū/ac molē/ et in facie quidē sini-
stra motus Planetarū/vt in alijs fit/in dextra vero oēs configurationes tā
Planetarū interse/et Planetarū cum stellis fixis quibus vtinur in nostris
Ephemeridibus/annexa deniqz characterū ac stellaruz fixaruz tabella des-
scripsimus. At forma illa in breuiarium redacta a nobis/plerisque visa est
partim obscura/partim breuius descripta/quā vt ab illis facile capi et intel-
ligi queat/priorē illā nostrā editionē Ephemeriduz longe magis cōmenda-
bant. Horū igitur desiderio cessi libentius/etsi statueram/ eas Ephemerides
quas tā cōposuerā in annū tricesimū primū nequaquā in lucē edere/et id
non sine certa quadā ratione/Tamen euz a Magnifico ac integerrimo viro
Domino Viro Zolner/serenissimi Regis Ferdinandi camere magistrō/tue
deniqz paternitatis germano/tā assidue/tāqz diligenter/nuper essem admo-
nitus/vt eas ipsas quā primū in publicū emitterē/cuius tandē assiduis tū ad-
monitionibus/tuz precibus victus/mutavi libenter consiliū. Etenim est
qui singulari quodā amore cōplectitur omnes bonarū literarū studiosos/rtiqz
eos qui in rē astronomicā incūbunt/et precipue me/quē vnice charuz habet/
citra omnia mea merita/id quod non dubijs documentis indies magis ac
magis intelligo/cū ex suis erga me beneficijs/tuz etiā quod alijs magnis vi-
ris me charuz reddidit. Quare nihil est neqz tā paruum/ neqz tā magnū quod
sibi et suis negare possim/Cuz autem anno preterito Germanus R T P
et ego apud T R P effemus Rūne/animaduerti et T P preter ceteras ar-
tes Astrologie studio mirifice delectari/Atqz ego cū sim obseruantis.eoruz
hoim quibus syderaluz rerū cognitio cordi est/has Astrologicas Epheme-
rides in annū 71. vigili cura elaboratas/in lucē edere decreui/et te patronuz
idoneū iuneris huius iudicauī/ Quo Paternitas tua intelligeret/quātō esset
meus in te et in fratē tuuz amor et obseruantia/hoc enim munere non admodū
illiterato/re quasi strenua aliqua dono/maiora anī mihi hoc tēpore non sunt/
quod inquā donuz vt spero T P boni consulēt/atqz obujs (quod aiunt
manibus) accipiet. Valeat me pro tuo non vulgari in studiosos viros as-
more cōmendatum habeto. Viennē Austrie 12 Decēbris. Anno 1550.

De causis cœlestibus quæ potissimum vires suas
hoc anno exercebunt.



Voniam vero Solis ac Lune (que clarissima mundi
lumina a Vergilio poetarum summo/rectissime nun-
cupantur) influxus inter omnes alias stellas omniaq;
sydera/non ab hominibus motu verumetiã a beluis
aperte sentiri notissimum est/ quorum alterũ/ vt po-
te Solem sequitur annus/ et ad illius cursum anni tẽ-
pora vertuntur. Alterum utputa Lunã/quas mensũ
asserunt Astrologi moderatricem esse. Vnde a Lune
cursu pleriq; latinorum menses volunt esse sumptos.

Cum aut a Sole ac Luna/tanquam generationis authoribus/defluus effec-
tus in res has inferiores haud obscurus sit/experimento id in seipso quisq;
discit modo aduertit/nec mixũ/nam is (ut auro est Aristoteles) triplici fit
instrumento/motu/lunare/et influxu. Mo u quippe qualitates temporum de
Solis precipue accessu ac recessu non modo euacuantur inactẽ/verumetiã in-
crementum suum aut admittunt/aut pro motu illius minuitur. Motus autẽ
ipse a celi situ zodiaciq; (qui ab Aristotele in libro de generatione et corrup-
tione circulus obliquus/sub quo est omnis vita et interitus in rebus his infe-
rioribus/appellatur) positura/his ad res plurimũ adiuuenti desumat. Lu-
mine/nampe Sol ipse/vt doctissime scribit plinius celi tristitiã discunt/atq;
etiam humani animi nubila serenat. Sic suum lumen ceteris syderibus soene-
rat/precipue/etiamis/omniã videns omniã exaudiens/vt principi omnium
artiũ Homero placuisse video. Atqui lumen Lune/que cum siapte natura o-
paca sit/solaribus tñ a radijs per interiectam intercapedinẽ illustratur. So-
le est debilius/iquidem Lune calorem/tam philosophi/quã Astronomi pro-
biderunt esse umbecillum prorsus/adeo vt nequaquam ita vnquã augetur/
vt siccitatẽ queat inducere. Ceterum ad humectationẽ tantũ odo p.ogred./
vnde et ipsa a rerum cœlestium peritis mat. ac domina humorũ in rebus
his inferioribus rectissime dicitur/quod debili sio lumen non mediocre van-
ad humores in corpore insalubri ciendos agitandoq; sibi asciscat/nec re. o
mixũ cuiq; videri debet in corpore insalubri illud usũ venire/quod in maris
fluxu ac refluxu/quẽ ad Lune motum fieri non est dubiũ/quoq; euenit. Con-
stat autẽ (vt alius repetã) vita ipsa e calore maximo/quo humores ipsi ani-
mat/cuius Sol ac Luna authores et pene dixerim parentes sunt/Sol em ca-
lorẽ/Luna humorẽ suggerit omi animantium generi/et omibus terre nascenti-
bus/quo fit/vt Sol qui caloris est quasi quidam fons/cũ nos suo priuamur
lumine destituitur calor/ita cum Luna/que Solis ipsius ministra est/cum de-
ficiat lumine/humor naturalis corrumpitur. Necesse est igitur vitam terre na-
scentium/ob caloris ac humoris naturalis corruptionẽ/ad interitum prope-
rare. Ceterum corruptis terre nascentibus/corruptantur et ea que illis alunt-
tur. Hinc creditum est nec abs re quidẽ/ob terre nascentium corruptionẽ ori-
entum pestẽ/ac reliquas egritudines/tũ deniq; famem/tum demum bella/ac
mala cetera/quorũ omnium enumeratozum validissime in hoc mundo cau-
se existant luminarũ eclipses/que tamen si hoc anno nulle nobis visu conspi-

cue sint. Incidunt tamen maxime in annum presentem/superioris anni duorum eclipsium Solis ac Lune validissimi effectus.

¶ Contigu quoq; eclipsis Solis in opposito fere loco spicæ Virginis que prime magnitudinis stella est et Veneris ac Martis nature. Eclipsis autē Lune in Trino cordis Leonis prime magnitudinis Martis ac Jouis nature stella/que ambe eclipses circa stellas filii Piscium Saturni et Mercurij nature acciderunt.

¶ Et quo diximus/qua ratione et quo modo Solis et Lune defectus hec inferiora afficiant/et qđ precipue multaruz rerū cause sunt. Superest vt dicam? superiorū Planetaruz maleficas configurationes que post eclipses hoc āno secunduz locum habent. Itaq; primo occurrit oppositio infelicium stellaruz Martis ac Saturni/que mensis Januarij die septima prope tetragonuz conjunctionis magne/que fuit anno vigesimoquarto accidet. Tetragonus itē Jouis ac Martis mensis Martij die decimo/Jupiter quidem in opposito Lune/defectus/Mars vero in quarto eiusdem aspectu constitutus. Tetragonus preterea Saturni ac Martis/qui mensis Marij die vigesima sexta contingeret/verum Saturnus in fatili aspectu ad locum eclipsis solaris situs. Oppositio Martis ac Jouis mensis Julij tredecimo/Mars tñ locuz in quo facta est eclipsis Solis tenens. Ceterū oppositio eorundem repetitur decima octava die Septēbris/quorum tñ Mars retrogradus in vigesimo nono Arietis gradu constituitur/profectio preterea cōiunctiois magne anni 24 iuxta Arabū sententiā in Libram incidet.

¶ Erunt preterea hoc anno nonnulli in longitudine et latitudine conjuncti ones Lune cum Jove/Venere/Marte/ac oculo Tauri/stelle fulgentis ac rubicunde Martis nature capacis/Atq; ita ut Luna cū extremitate circumferētie sue non soluz Planetas iam nominatos et oculus Tauri attinget/versetis am erit quandoq; vt Luna dictos Planetas et Thauri oculus occultabit et eclipsabit. Inter omēs autē coniunctiones cū predictis planetis et oculo Tauri nulle visui nostro hoc anno profusus apparebunt/quod vel de die/vel sub terra contingant. Versū coniunctiones cum oculo Tauri secunda die Septēbris/circa decimā post meridiē et trigesima die eiusdē mensis circa quartam ante meridiē. postremo vero vigesimatertia Nouēbris circa nonā horas post meridiē (nubibus non obstantibus) a nobis conspicientur.

De tēpore quo effectus eclipsium erunt.

¶ Eclipsium autē effectuum vt morborum apud medicos/quatuor sunt tempora/principiuz/augmentū/status/et declinatio/Solaris itaq; deliquit effectus/anno superiori/ mensis Aprilis die quarto initium sumpserunt/ qui tamen si sub initio debiles fuerint/ tamen pedetentim in vicesimum primum diem mensis Nouēbris anni transacti mirum in modū aucti sunt/illud autē iam dictū intervallū tēporis ab initio effectū eclipsis Solis primū tertiu ab astrologis notatur. A quo postea primi tertij sine/ in 11 diē mensis Julij anni presentis apprimē grassabuntur/ nempe in statu/qui secundum tertium ab Astrologis dicitur/erunt. Postremum vero/quo declinatio fit/ a fine status/secūdi videlicet tertij/et in vicesimum sextū Februarij diem anni futuri/quo eclipsis solaris vires de die in diem diuiniuntur/ desinet/ hec de tēporibus effectuum eclipsis Solaris.

¶ Effectus autem Lunarís eclipsis / qui iuxta Ptholo. ac aliorum peritorú Astrologorú sententiá / decimo octavo die mēsis Febuarij anni presentis incipient / quorú tamen auctioris tempus / quod primus tertium vocant / in vicesimú sextus diem Martij porrigitur. Alterum quo defectus Lunarís vires plene sunt ac in statu a vicesimo sexto Martij / in scđm Maij diem extendetur. Postremum vero / quo declinatio viriú fit / a scđo Maij in septimum Junij diem protrahetur. Ex his itaqz que dicta sunt / patet / totam vim eclipsis Lunarís a capite ad calcem vsqz / quo effectus eclipsis solaris in summo siue in statu sunt omnino casuram.

De Gubernatoribus eclipsium.

¶ Ambe autē eclipses / in vno et eodē signo contigerunt / et dictarú eclipsiú idē quoqz precipuus dominator ac moderator Mars ipse erit / In principio tñ eclipsis Solis cū Marte participat in regimine Saturnus / a quo et insicitur / et alter alterus infeliciorem reddit / eo quod super eundē circulū positionis fere ambo cadunt. In medio autē eclipsis Saturnus cū Venere Marti in dominio associantur / Saturnus quidē et Mars in ascendente / Venus autem in duodecima extra dignitates suas / finē vero huius deliquit Saturnus et Mercurius cū Marte tenent / et in domū Carceris omnes planete (exceptis Venere et Jove) recedūt. Verū Venus benigno suo sextili radio platico angulū figure finis eclipsis tam precedentē quā sequentē / Martē vero vt precipuū Gubernatorē partiliter fere eodem radio intuetur.

¶ In eclipsis autē Lunarís principio cū Marte concurrūt Jupiter / vterqz in angulo quarte domus nō longe a cuspide sit / et fere in conjunctione / Atque ita Mars felicior a Jove / ita Jupiter a Marte infelicior efficitur / Ne die autē eclipsis dominium sibi vendicat cū Marte Saturnus / in domo fortune / que et amicorú dicitur / positus / Luna vero cū eclipsim patitur / domus religionú et sectarú occupat / cui Sol ac Mercurius et diametro opponuntur / Mars autē et Jupiter ex opposito domus iā dicte / et signi in quo sit eclipsis statuuntur. Ceterū finis eclipsis cū Marte dominium sibi arripit / Venus que circa stellas frontis Scorpionis cuspidē domus parentú fere sortitur / Mars autē vna cū predictis domū substantie occupat.

Cui generi rerum effectus eclipsiú magis minentur.

¶ Eclipses ambe contigerunt circa stellas imaginis Piscis. Dominator autē in eclipsi Solari circa stellas in fronte Tauri sitas / In eclipsi autē Lunarí circa stellas in ala australi Virginis deprehēditur / et dorsus Arietis atqz Piscis meridionalis / pars agitatoris / fusio Aquarú / super eodē circulo positionis coinciderunt. Cui eclipsi Lunarí aut venter Ceti / filia Piscis Andromeda / et Cassiopeia. At cui dominatore in eclipsi Solis / manus Genitricis antecedentis / in eclipsi Lunarí coruus et Hydra / hec indicant effectus eclipsiú in aquis / in piscib⁹ / in animalibus domesticiis vt sunt boues / vacce / sues et similia / similiter et in volatilibus atqz reptilibus grassaturis. In hominibus preterea eo quod dominator eclipsis Lune in signo hęcno / et super eodē cir

De effectuum deliquiorum luminarium qualitate.

¶ Ex premisis satis patet Martē esse principale dominatore eclipsium eius quo plurimū in domino participat Saturnus/et alter alterū infelicē reddit/plurima vitia et mala tū externa aeri/terre/mariqz/ tum etiam corporibus atqz animis hominum minantur.

¶ In aere quidam etsi Mars pro in nata sua natura/calorē vstium/ventos calidos ac perniciosos/corpora hominū dissoluentes/fulgura/et pluiarū paucitatē atque siccitatem in his inferioribus producat/At qz eclipses con- tigerunt circa stellas frigidās atque hūidas in filo piscium. Dominator autem eclipsis Solis quoqz circa stellas frigidās atqz hūidas in fronte Tan- ri repertus est/et extra dignitates suas essentielles a Saturno infectus/aurā sepe intēperatam et instabilem portendit/nunc cum multa humiditate vt has- tetenus in primo ipso tertio siue augmento effectus eclipsis Solis satis ex- pecti sumus nōnunquā tā frigiditate et siccitate nocua vruy id rarius/ ma- xime vero in hyeme et Vere quo tēpore effectus eclipsium in summo vitū suarū siue in statu erunt/ea aure dispositio apparebit.

¶ In mari autē magnā nauigandi difficultatē tur propter aerem obscurū/ tum ob plurimas insolitas tempestates portendunt/hunc non solum nauis- bus imo locis Maritimis multa incōmoda atqz pericula accident.

¶ In fluminibus et aquis stagnantibus multa quoque mala contingent/ partim per submersiones/partim per corruptiones aquarū/ex quibus demū- tum vegetantibus tū animantibus vitam in aquis aere et terra degentibus vitia corporis plura exoriantur.

¶ In animalibus atqz fructibus/ad vsum hominū pertinentibus mirā pau- citatē atqz defectus promittunt/fructus quidem propter frigus/et humiditatem intemperatā nociuā terre nascentibus. At eorum animalium/ quorum nullus hoibus vsus est/mirā multitudinē/hinc sequi necesse est penuriam mul- torū animalū/fructuū/ et aliarū rerum. In Edificijs ruinē plurimē et vastationes magne timende.

¶ In anis autē hominū eclipses et malefice stelle mouebunt dira bella/ri- zas/latrocinia/furta/incendia/ferocia/perfidia et reliqua mala que in bel- lis et ab impijs hominibus exercentur.

¶ In corpore itē/febres/pustulas/tubercula/ulcera/carbunculos/inustio- nes/precipitationes casus grauissimos/dāna quoqz et pericula ex bestijs fe- rocibus/atque ex igne et ferro.

¶ Saturnus itē precipue excitabit latentes quosdam et perniciosos humo- res in corporib⁹/et eū precipue quē atrā bilē vocam⁹/quē sequuntur/febres cū frigore et horrore et relique egritudines que ex eo humore originē trahū. Capiti autē inter omnia reliqua mēbra magis superius enumerate cause mi- nantur/eo quod vtraqz eclipsis in Arctis signo apparuit/ob id capitis et partū suorum egritudines timende sunt/vt sunt Cephalea/apoplexia/epilep- sia etc. debilitas visus/dolor oculorum/aurium/narū dentū/vuule et gutturis propter saturnū/Maniū itē incōmoda/Manus tñ Hipocundria et

ventrem supra umbilicum/molestabunt. Et iterum mitius pectori et venter sub
umbilico nocebunt/Morbi item splenis renum ossium et fellis ob Saturnus
infricentē Martē e/ t contra non parum seuient.

¶ Preterea mra paucitas erit eorum virorum qui bella vt decet/tractabūt/
pleraq; cōs fraudulenter/et non aperto Marte gerentur/ nullum nō facin⁹/
quantumuis detestandum audebunt / verum ex magna parte in capita ip⁹
forum hec omnia redundabunt.

¶ Reges/principes/magnates ac superiores tū seculares tū spirituales cū
subditis suis/et ab internis et externis hostib⁹ multis periculis,et incōmodis
affligētur/deficiētur preterea plures a dignitatib⁹/honorib⁹ atq; officijs su
is. Spiritualib⁹ hō et sectis quib⁹ dā eo magis timēdū est/ eo qđ vtraq; eclips
is in signo equinoctiali contigit./Et quod magis ponderandus/Lunā in do
mo religionum et sectarum integre et cum mora eclipsatā fuisse/Dño etiā eclips
is ex opposito cum Ioue (qui religioni quoq; et iustitie preest) quē et in
fortunatōrem reddit. Simul quod Mars ipse pro maiore anni parte per lo
ca in quibus contigerunt eclipses voluitur nunc regrediendo nunc progre
diendo/et Ioue e diametro repetitis vicib⁹ intuebitur/ob id non pauca hoc
anno pericula non solum possessionum suarum/verum et corporis sustine

¶ Mahumetica preterea secula hoc anno aliqua affi
cietur calamitate ex effectu eclipsis Solaris. Dominator enī eclipsis Solis
qui et significator illius est secte/ circa oculum Tauri/ ex opposi o stelle cor
dis scorpionis reperitur/cū hō piscorum e monumentis habent⁹/predictā sec
tā mahumeticā/originē traxisse ex cōiunctōe magna superioris planetarū
in scorpīōe/sine dubio nō lōge a stella (vt proprietates signi et stelle idicāt) que
in corde scorpionis sita est. Est enī gens perfida/truculenta/crudelis/ im
pia/apud quam omne genus scelerum locum habet/tales enī mores ac pro
prie ates cōiunctionis magne in hoc signo scorpionis circa eā stellam pre
cipue producunt.

¶ Est preterea et alia causa alicui⁹ nō parui infortunij/quod luna/insigne
illī⁹ secte/singulis mensib⁹ presertim vltimis mensib⁹ quatuor illī⁹ anni pro
pe accedet ad oculum tauri/que stella huic secte aduersa est/imo omnino eclips
abit eandem/ per hanc cōiunctionem Luna ipsa insigne Mahometice sec
te redditur infortunatior/precedentibus tamen mensibus quatuor in estate
videlz luna fortunis ipsis iungitur ob id illis mētib⁹ minus incōmodi sentiet

¶ Diximus autē stellam oculum Tauri dictā ex opposito situatam esse/ se
cundum longitudinem stelle Mahumeticę secte. Ascendentia autem opposi
ta animos et mores eiusmodi hōim multos variant et inuicem odiosos red

¶ pro dicit etiam ante paucos annos/ex stirpe Maximilia
ni Cesaris/perpetua memoria digni quidam/ qui dictam stellam in horos
copo/et quod eundem miraculi loco duxerim alteram infortunam in loco
stelle/ sub qua cepit secta Mahumetica habet/ Is si de⁹ vitā prolōgauerit/
proprijs ac suorum amicorū vtetur virib⁹ ad extirpandam/profligandā/
et pellendam hanc sectam ex his locis/que antecessoribus suis antea per vim
et inturiam ademit/ et erit vindex atq; vltor omnium malorū/que antea
his temporibus patrata sunt.

De effectuum magnitudine.

¶ Due tantū tertie e corpore Solari obtenebratē sunt/ et Dissidator in eclipsi Solari occidentalis/ in sextili R/ in Lunari autē defectu Orientalis/ ob id mala in precedēti capite enumerata/ clementius in omnibus animalibus/ hominibus/ et ceteris rebus/ quibus minantur/ accidēt. Et si eclipsis Lunaris/ integra et cum mora fuerit/ Dominator tamen eius scire in coniunctione cum Jove/ multo mitiores effectus eclipsis Lunaris promitteret/ at eo tempore quo eius eclipsis effectus in summo sunt utraq; fortuna Jupiter et Venus regressiam patitur/ maius itaq; infortune damnum eo tempore inferent.

Quibus Regnis, regionibus, prouintijs, aut ciuitatibus, prædictæ causæ magis timendæ sint.

¶ Cause coelestes nō ex equo omnes in hoc terrarum orbe existentes afficiūt/ alios magis alios minus/ id ex signis ipsis/ in quibus contigerunt sepe dicite eclipses / et e planetis dominantibus / Authore ptholo. consicere licet/ Cum autē utrumq; deliquim/ in Arietis signo accidit et Dis eius Mars a Saturno in eclipsi Solari infectus / maxime illis qui eidem/ et Geminis subijciuntur atq; quadrangulis suis. Mala super⁹ enūerata minantur/ Mitius vero qui Libræ et Sagittario subsunt. At foeliciores et magis immunēs ab his malis qui subsunt Libræ/ eo quod Jupiter illud signū hoc anno peragrāt/ at tūcō iram dei multo esse maiorem/ quam beneficentiam iufluxus illius stelle/ vel etiā ob solā nominis diuini blasphemiam id quod præter Christianos/ nulla natio quantūuis barbarā unquā fecit. At iterum mitius affligent eos quī Cancro/ Capricorno/ Virgini et Piscibus subijciuntur.

Sub quibus cœlestibus signis quædam Regna, prouintia, & ciuitates obseruatæ sunt, ab antecessoribus nostris astrologis partitoribus sequens figura per quadrangulos distincta patefacit.

Aries Germania/ Gallia/ pollonia minor/ Neapolis/ Florentia/ Fauentia/ Ancona/ Capua/ Cracouia Patauia.

Cancer Dania/ Norwegia/ prussia/ Holandia/ Selandia/ Vicentia/ Constantinopolis.

Libra Austria/ Alfatta/ placentia/ Suesia/ Caieta/ Tractectum/ Vienna Austria/ Salisburgum/ Augusta/ Regnum Apulie.

Capricornus Bauaria/ Sturia/ Romandiola/ Engolstadium/ Orenitium/ Rauenna/ Forliuim.

Quadrangulus secundus/

Taurus polonia maior/ Heluetia/ Bononia/ Scne/ Verona/ posnoia/ perusium/ Campania.

Leo magna pars Italie/ Bohemia/ Roma/ Mantua/ Damascus/ praga/ Vlma.

Scorpius magna pars Lombardie/ et Foriulq;/ Mediolanum/ Britia/ Genua/ patauium/ Mutinum/ Cremona/ Ternisum/ Ferras

Aquarius Saxonia Constantia/ Vrbinum/ pisa/ Cria/ Valentia/ saurum/ Bohemia secundum aliquos.

Quadrangulus tertius.

Gemini Aegyptus/ Anglia/ Slandria/ Wirtenberga/ Parisius/ Morinberga/ Efordia.

Virgo Greta/ Slesia/ Coletum papia/ Vratislavia/ Venetie secundum aliquos.

Sagittarius Hispania/ Ungaria/ Hierusalē/ Dalmatia/ Auinio/ Buda.

Pisces Portugalia/ Hibernia/ Normandia/ Venetie secundum aliquos/ Alexandria/ Colonia/ Agrepina/ Ratisbona.

¶ Stale pretereā per Zenith transeuntē aliquid occulte habent influentię in mutandis moribus/ conditiōibus/ et fertilitate/ et oim que ad mutationē rerū Regnorum/ prouinciarū/ et ciuitatū pertinent/ presertim cum in comūctiōnes magnas et eclipses incidunt. Motus autē spere stellarū fixarū in longitudine admodū tardus est/ multo tardior in declinatiōe/ at et is in declinatiōe motus/ uelocior circa equinoctia puncta/ tardior iuxta tropica/ hinc stelle transseuntē per zenith regionis/ quedā citius quedā tardius a zenith recedent/ quedā in Septentrionē/ quedā in meridiē/ et contra a septentrione et meridiē/ alie in locū priorum/ redeunt/ que cū per zenith regionis transeunt/ et alterius sūnt magnitudinis/ ac quelibet peculiaris cuiuspiam nature ac proprietatis. Hinc necesse erit et in locis per quorū zenith transeunt alios mores/ conditiōes ac effectus hominum sequi. Ex hoc etiā motu sūbere stellarum fixarum consecratiōem est/ quasoā stellas fixas esse/ tamen nostro seculo et multis sequētibus semper supra aut subtus Orionē fecerūt/ erit tñ tēpus quo multis etiā seculis occident et oriētur/ et nō semper supra aut subtus terrā uolūtur et cōtra. Atq; hec quidē de eodē Oriente intelligi uolo. Sūius rei de Vrsa maiore exemplum dare uolui/ que nostro tēpore et multis seculis post/ semper supra terrā circūfertur/ et tota inter stellas perpetue appariti

¶ Atque tñ stelle eiusdē uise post aliquod annorū milia (omnis nūeratur lenarios in nostro etiā orizonte occident et oriētur/ Ita de ara que subtus orizontem nostrū semper fertur/ et inter stellas perpetue occultationis nūerantur/ at post aliquot annorum millenarios oriētur et occidet. Verum de his oibus fusius et exactius dicā in meo astrolabio (quod iam in manibus est) arithmetico/ quod nuper excogitauit/ atq; ingenij mei uerbis ipse inuenit/ nihil enī tale in hac re cōmemini/ me uel uidisse unquā uel etiam (absit inuidia uerbo) audiuisse. In eo enī prorsus/ nullo opus erit circulo describēdo sed simplicissimo quodam quadrante/ pro altitudine stellarum capiēda/ reliqua oia plura erunt numeris in hoc ipsum in quodā libro descriptis/ quod quidē astrolabium oibus stellis fixis et erraticis accomodabitur mō longitudinē illarū et latitudinē quis nouerit/ In quo nostro astrolabio pretereā descripta est altitudo sigillatim per oēs gradus/ que res alioqui uix magno instrumento impleteret.

¶ Est mihi quoq; in manibus instrumentum/ quod uocatur organum pitho. sic a me cū stellis fixis/ etiā quibuscunq; auctū vnica uolubili tabella/ at sq; rethe (in eo enī cacumina stellarum facillime deprauātur) ut deinceps nocti quoq; seruet/ et merito Horoscopion vniuersale diei noctiq; seruetis nuncu

¶ Atq; hos meos labores/ eo libenti hoc loco recensui/ (pabitur. quod scio quosdam esse/ qui me ignauū prorsus et cuiuspiam superstitiose astro

logie deditū predicāt. Et reliquum quicquid solidi astronomiē mihi sit/mē ab altero quodā id accepisse dicunt/cum ille quē mihi fuisse in astronomia p̄ceptorē putant/prima rudimēta et astronomiē et astrologiē. Collūtio et mihi debeat/id quod ingenue ipse fassus est.

¶ Hoc quoq; anno die 2 Martij/erit coniunctio Veneris et Mercurij/ at Venus septētrionalior quinq; gradib. fere/ per Venerē itaq; a principio Martij ali quod diebus/p̄sertim die tertia eiusdē mensis quo simul occidūt/ in cōiunctionē stelle Mercurij deuenire quispiā poterit/querarissime alioqui in nostro orizonte apparet ob aeris inconstantiā/quam rem multum cōque si sunt doctissimi et excellentissimi viri oīm bonarū artium/ et in mathematice disciplinis imprimis peritissimi/ Joānes Stabius et Andreas Stiboriz/ quorū anime deo viuant/ alter nūquā alter hō semel tñ hanc se stellā vidisse aiebat hunc tantorū virorū de stella Mercurij sermonē magni feci quare si qui sunt/ qui huius stelle vidēde/ desyderio enētur hoc anno/ dieb; quib; dixi voti sui cōpotes erunt. Quauquā vt ingenue fatear/ in ea stella cognoscenda et videnda plures annos laboraui/ quam denum vir anno 1526 die 12. Februarij vidi et eodem tēpore oēs reliquos planetas p̄ter Solē/ nā oēs supra terrā erant/id quod visu rarissimū est/qb; etiā nōnullis illarū rerum studiosis ostendi. Verū hec mea diligētia quib; dā fuit ludibrio/ quippe qui dicerent parū esse stellā oculis contueri/ sed locū illius verū obseruare/ sed quis obseruabit nisi prius eandē nouerit/ alioqui facile decipietur.

¶ Idē meū agebatur cū anno 29 Martij stellā appariturā predicarem solito maiorē/ atq; hos canillos passus suz/ et ab hīs quos laborē et diligētiā meā probaturos sperauerā eo quod et ipsi illarū rerū peritiā tenerēt/ verū intolleranter mihi insultabant/ subinde queritantes/ quando tandē ea per lachry magna stella proditura esset/ illudebant p̄terea mihi corā/ quod tanti facerēt res illas imaginarias de eccentricis et epicyclis/ quas credere posse mutare stellarū magnitudines/ verū de his hactenus. Tunc aliā mei irritandi causam arripuerunt/ Quod eclipsim lunārē 29 anni nihil prozsus mali Austriē illatūram contenderim cōtra Charionis sententiā/ ab hac mea opinione et sententiā/ ne adhuc quidē discesserim/ quāuis Charionis Iudiciū verax extitit/id quod magno nostro periculo experti sumus/ Sed huius Austriacae calamitatis aūdictam eclipsim/ et Solis in Arietē introitum causas esse non poss. contra Charionis sententiā dispntari. Quis enī tam emotus mentis est/ qui eam eclipsim putet esse causam illius ruine et vastatiōis Austriacae/ que tū demū contigit cū Thurca abhisset/ nisi quis adeo impudens fuerit/ vt contra oīm philosophiē rationē dicere audeat/ effectū suam causam anteire/ id quod quidam nō erubescunt dicere. Bene de hīs p̄tholo. verbo 12 sui Centiloquij scripsit Amor et odiū auertāt hōiem a hō iudicio.

¶ Ac ne Solis in Arietē introitus tam efficax fuit/ vt oīa sic turbarentur in Austria/ p̄spectis enī a me/ multorū retro annorū talibus figuris introitus qualibus/ ac etiam multo magis minacibus/ nihil tamen in historia reperi quod Austriam ita horribiliter / et spacio non amplius quam menstreo/ concussisset/ proinde vt breuiter de tota hac re animi mei sensum aperiam/ is Solis introitus in Arietem (eclipsim de industria p̄tereo / quod ea secuta est abitū Turcarum) nullo pacto potuit Charioni predicere eā qualem passus sumus de vastationē / et plane hunc alterū p̄tholo. appellauerim/ qui ex unico illo Solis in Arietē ingressu/ p̄scire potuit tam subitiā et ind;

penatū casum/ Judiciū in hac referant doctissimi quiq; astrologi/ Quod si
 Charton aliunde/ id euenturū (id quod nō dubito) sciunt/ debebat has du-
 as causas missas facere/ et ea in medium asferre/ vnde illa euentura putabat/
 Sunt enī plures artes/ quibus futura presciri possunt/ vt Ptho. primo libro
 quadripartiti cap. sedo testatur/ quare nullā preter ipsam astrologiā ratiōi
 bus fundatā naturalib; in meo Iudicio secutus sum.

Canon Ephemeridum. |

A principio Ianuarij et cuiusq; mensis initio/ quedam principaliores cause
 premitantur/ Configurationes videlicet superiorum planetarum cum stellis
 fixis quorum effectus diutius durat propter tardum illorum motum/ simili-
 ter etiam inferiorum Planetarum si fuerint in stationibus/ nam et horum ef-
 fectus sensibilib; et efficacior/ atq; diuturnior fit si coinciderint cū ortu occa-
 su cuiuspiam syderis fixi/ aut corporaliter eidem copulati fuerint/ In capite
 preterea cuiusq; pagine offert se nomen mensis ad quem numerus dierum cū
 literis ferias representātes a sinistris h;positus spectat/ litera dominicali ma-
 iusculo caractere notata/ E regione autem cuiusq; diei mensis/ inuenies/ cu-
 iuslibet planete configurationes quas eo die habet/ cū alijs planetis aut cū
 stellis fixis vtiq; insignioribus aut singulari vi et efficacia illustrioribus. No-
 tate vero numerorum vulgariū 12 non excedentes inserte/ horas dimidijs
 horologij ante vel post meridiem representant/ prout punctus ipse indicat/
 ante enī versus sinistram positus/ horam ante meridiem/ post vero versus dex-
 tram pomeridianam insinuat/ tempus autem horarum non minutum docet/
 sed iuxta quā propius aī vel post configuratio ipsa que immediate sequitur
 contingat/ an videlicet corporaliter planeta quispiam iungitur stelle cuiuspiam
 vel cum aliqua tanquam insigniore aut nominatiore/ aut singulari vi et effi-
 cacia illustriore oriatur/ occidat/ mediat vel imat celum/ aut aliam configu-
 rationem siue aspectum habuerit non modo in zodiaco verum et per angu-
 los cum planetarum inter se tum cum stellis fixis insignioribus. Nomen pre-
 terea inuenitur et sinago cui stella fixa adscribitur et traditione Arati/ qui
 grecicelumen celebratissimum fuit. Et post eum Ptholomei et Alphonfi/ qui
 singulari diligentia eadem obseruauerunt et posteritati literis demandauerunt.
 Neq; hoc loco desiderabis tēpus conuinctionum oppositionū et quā-
 draturarum luminarum cum suis ascendētib; et dominatoribus et quam
 aure dispositionem portendant. Habes preterea tempus in horis et minutis
 quibus Sol signa zodiaci ingreditur itidem cum ascendētib; et stellis an-
 gulos occupantibus.

¶ Secundo/ post stellarum vel imaginum nomina quandoq; etiam ante/
 characteres quibus earum magnitudo significatur/ subscribitur vt sunt ●
 ☉ ☽ ☿ *

Hoc signum ● ☉ ☽ ☿ * prime secunde tertie magnitudinis representat.
 ☿ quartae
 * quinte
 ● sexte

¶ Tertio/ post stellarum magnitudines/ alijs duo characteres se offerunt/ quāq;

vnus tantum/licet nō vbiqz/naturas stellarum exprimentes/iuxta Ptolomei
doctrinam nempe tales.

♄ Saturnus	frigidus et siccus	♃ Jupiter	calidus et humidus
♂ Mars	calidus et siccus	☉ Sol	cali. et sic ^o ad tēpe.
♀ Venus	frigida et humida versus temperamentum.		
☾ Luna	frigida et humida		
☿ Mercuri ^o	ad naturam cui ungitur indifferens.		

¶ Hec autem res et aliorum characterum in Januario lucide expressa est in
alijs mensibus subtilitelligenda.

¶ Et vbi litera p inferitur sequentis planete naturā parum habere testatur.
Vbi vero character/et/vtriusqz planete tam precedentis quam sequentis na-
turam equaliter referre significatur.

¶ Quarto numerus quidam in fine configurationum subsequitur cum pun-
cro sibi ante vel retro adscripto differentiam representans minorum lon-
gitudina zodiaci/ quib^o planeta nō omnino in eadē cū stella Orionē vel meri-
dianum circulum petiverit. Siqz stella q̄ magna et differentia nulla/ aut ad
modum parua. Indicat iuxta suam naturam apud nos effectum efficaciorē/
si vero parua quantitate/ eo minus effectuum portenditur. Vbi dein multo rē
minorum fuerit differentia secundum punctorum predictorum significati-
onē/ manifestum sit/ planetam parum aut nihil effectuum suorum nobis/ sed a
lijs potius prout puncta ostendunt inferre. Puncto em̄ aā differentia sinistra
versus signato/ occidentalioribus/ vim et naturā suam promittit. Quē ad mo-
dum orient. alioribus si post in dextram scriptus reperitur. Atqz hoc foret
infallibile/ si et ipsi motus planetarum veritati penitus responderent. Ex his
quosqz medio cruce ingenij lector intelligere poterit quod antea pauci fuerāt
quā illam differentia peruestigatas annotassent/ quā semper tñ de aure mutati-
one presaguerint/ ex planete cum stellis insignioribus aut accessu aut ortu et
occafū. Proinde aliqñ vt predicterāt et res erat aliqñ secus euenerāt effectus/
c^o rei haud alia causa fuit/ quā magnitudo differentie nō obseruata/ excusati
one hac subinde vtantes et nō inepte/ si non hic tñ alibi effectus/ vt a me supra
dictū q̄ contingere. Quare aūt id fieri deberet/ et in quā partē pauci rationē

¶ Quanto sunt differentie aliquę nullis p̄ctis neqz aā neqz intellexerunt.
retro notate/ que indicāt minuta latitudis planete a stella/ atqz ea differentia/
eadē q̄ vbiqz locorum/ ad quā in multis regionibus in quib^o saltē possibilis
est aure mutatione eo tēpore fieri/ effectus hmoi cōtingunt. Et si dicta latitudo
nulla aut admodū parua fuerit/ et stella similiter notabilis magnitudinis ex-
titerit effect^o quoqz maiores erūt. Si que stella minoris quātutatis fuerit (ex-
ceptis nebulosis) minorē etiā operationē significat. Et tales effect^o planeta-
rū cū stellis fixis aut planetarū inter se diuti^o durāt/ quā qui ex ortu et occasu
cōtingunt aut ex alia cōfiguratione/ siue in zodiaco siue per angulos cōtingē-
tes. Tñ hi ad horas vnā atqz alterā/ qñqz ad dimidiū diē (nisi planetę fue-
rint in suis stationib^o) durāt/ illi vero ad diē vnus aut duos pluresqz scdm
planete motū vel tardiorē vel velociorē. Ideo Saturn^o ob mot^o sui tardita-
tem presertim in statib^o existēs/ plurimū virtutē suam exercet/ nō in vno lo-
co verū in multis. Ille em̄ cū stellis fixis planetarū cōiunctiones et cū pri-
mis si tardiores fuerit in motu suo/ magnas inundationes in estate. Hieme ve-
ro nimis tūz copā tū profunditatē minatur/ Solā demiqz lūqz/ propter velo-
citatē sui motus sibi tūz mutationē per accessus ad stellā aliquā/ aut or.

tuz et occasum operatur/que hñ cito transit.

¶ Determinata aut quãtitas illaruz drãruz tã lãgitudinis quã latitudis tuz planetaruz inter se quã cuz stellis fixis in qua effectũ producũt et in qua nullũ ignota est/qz a nemie hacten⁹ obseruata. Ratio hõ docet planetas inter se aut cum stellis fixis primũ honoris/in maiori drã effectuz producere. Cuz stellis hõ scđi honoris sub minori. Cuz stellis tertij honoris iteruz minori/et sic consequẽter. Hec hõ quãtitas nõ eadẽ est in omnibus regionib⁹. Sũt emũ alique regiones et loca a natura tẽperatiõis aure. Alique hõ pluuijs/alique calori/ali que frigori magis obnozie/alte vẽris plus expositẽ/Et syderuz aliud vni loco plus quã aliq suos effectus immittit. In humidis igitur locis sub maiore drã effectum producũt/si stella humiditatẽ significat/In siccis aut sub minore/ ille quoqz drẽ in vna regione nõ semper eadẽ manẽt. Variatur etenim iuxta drã foris naturã et eius fortitudinẽ. Neqz idẽ effect⁹ vbiqz locorum producitur et etiã regiõi et loco quib. presidet maiore effectuz portendit/ ob diuersas igitur illã varietatẽ nõ potui certaz tradere regulã de determinata drã qua operãtur et qua nõ. Relinquo igitur cuiqz studioso lectori in sua regiõe et loco eã diligentius inquirendam.

¶ Sexto sunt aliqui aspectus planetaruz tã in zodiaco quaz per angulos cõtingentes/signati hisce Characteribus $\text{♁} \text{♂} \text{♄} \text{♃}$

♁ Planetas simul esse in eodẽ gradu atqz in vno signi cuiuspiã significat/ differentia vero illic posita ostendit quantum distent latitudine.

♂ Planetã ab alio distare per 60 grad⁹ aut duo signa indicat/ et dicitur

♄ Planetarũ inuestitũ/docet trium signorũ aut (aspect⁹ sc̄tilis. 90 gradũ/etsi planetis vel nominib⁹ stellarũ fixarũ adijcitur syllab. or. in c. occ. aut i c. siue integre dictiones aspectum per angulos esse intelligas/qui hõ tales sint anguli quib⁹ statuuntur syllabe ipse indicant/Is aut aspectus nõ per 90 gra. zodiaci sed equinoctialis distat/et aspectus quaz

♃ Planetas quatuor signis siue 120 gradib⁹ distare testatur/et aspectus trinus nominatur. (tus dicitur.

♁ Planetas distare per sex signa vel 180 gradus docet/et dicitur aspectus opposit⁹/atqz si ibidẽ adscribãtur sillabe or. vel occ. m. c. vel i. c. nõ scđm longitudinẽ zodiaci abesse dicuntur sed secundum gradus equatoris

¶ Septimo adiecti plerũqz ad ort⁹ occasus atqz planetarũ accessus cũ stellis fixis/et presertim vbi maioris quãtitaris/aut notabilis vis et efficacie fuerit/ et vbi planetaruz inter se et per angulos/simul etiã cuz stellis fixis insigniorib⁹ aspectus incedunt/effect⁹ eorundẽ iuxta quorundã assessoruz obseruationem/Cui⁹ igitur planete mot⁹ minus a veritate recedit/eius quoqz operatio cert⁹ et frequẽtius respõdere expectatiõi videbitur. Et ob mot⁹ plerorumqz planetaruz incertitudinẽ precipue Martis/effect⁹ vt obseruatiõe perurbã hñ monemur qñqz/ per diẽ vnius et alteruz anticipabit/qñqz postponet hoc videlicet mō/si Mars ortũ vel occasus cuz stellis fixis habuerit/aut cõfiguratiõẽ aliquã cuz Saturno et Ioue. Tũc citi⁹ quaz hic prescribitur effectus cõtingit. At quecũqz cõfiguratiões erũt Martis cum Sole/Venere et Mercurio oēs postponunt et tardius suaz operationẽ manifestabũt/nisi Ven⁹ et Mercuri⁹ circa statidẽs fuerit et Marte fuerint tardiores/tunc de illis intelligẽdũ est/peride atqz de Saturno et Ioue. Deprehendi quoqz Vicenne Austrie post quã Ephemerides meas dedi in lucẽ/sepe effectus qui et ortu et occasu stellaruz fixaruz acciderunt etiã in alijs planetis anticipare quod manifestuz indit

tm est quinque planetarum motus nostro tempore esse incertos. Multarum etiam stellarum loca vera in longitudine et latitudine non admissum respice de eisdem inueni/ timeo id scriptorum et calchographorum vitio accidisse/ quapropter non mirum si non ex omni parte effectus respondeant/ neque hii effectus etiam si omnia veritati essent consona/ immediate eo momento quo configuratio ipsa accidit semper apparet/ vt plerique existimant/ sed post effectus enim causam sequitur. At inequali tempore/ quidam citius quidam tardius/ ex illis etiam quidam longiori quidam breuiori tempore durat iuxta situm celestis constitutionis/ vt eclipses ipse testantur/ quarum initium et finem Ptholomeus definiuit. Aliorum vero syderum nemo/ quorum cognitio multum ex vi et efficacia configuratorum syderum/ tum etiam e domo nature/ atque differentia pendet/ que ob multiplicem diuersitatem et variationem in hunc diem latuerunt/ quo videlicet momento initium sumerent et quanto tempore durarent.

Octauo queret forte quis quam utilitatem mortalibus nobis afferat coelestium configurationum sic descriptarum obseruatio et doctrina. Responsio est per quam vtilis esse artis Astrologie/ studiosis sectatoribus. Quia alie constellationes et configurationes serenitatem significant/ alie tempestatem portendunt/ alie ventos/ alie humiditatem/ alie frigiditatem/ alie siccitatem/ alie caliditatem/ et sic deinceps promiscue/ aut mutatis inones ingruere faciunt/ neque omnium illarum obseruatio hactenus in vsu fuit/ vt illarum natura constaret. Quod si nouerint studiosi huius artis que configurationes et habitudines syderum quotidie contingant/ intelligere quilibet poterit ex rerum euentu naturam syderum/ et quod magis minusve suo loco presit/ et quod plus vel minus illi foelix aut aduersum fuerit. Per Lunam item in multarum stellarum cognitionem peruenire. Et qui non sit omnino hebetis ingenij/ facile elicere poterit/ quod signum qualibet hora oritur/ occidit/ aut mediat coelum absque astrologico aut aliqua alia supputatione/ ob id recte opus hoc sphaera mundi arithmetica ratione mobilis intulari posset. Cum igitur accidit complures habitudines et configurationes syderum vnus nature/ siue qualitatis vno et eodem tempore/ aut vniam saltem euentissime operationis coincidere/ pro natura et qualitatis ratione maiorem effectum quoque inducunt. Quod si non vnus sed diuersae nature siue qualitatis extiterint aut mutatio pluribus eiusdemque nature aut qualitatis existentibus/ aut euentioribus configurationibus respondebit. Quae si diuersae fuerint et equalis potentie et virtutis mutuo se impediunt/ et aura nihil a sua dispositione mutabitur/ quod sic se habere accipe/ si eodem momento tales configurationes aut effectus talium configurationum coincidunt.

Nam vbi diuersis temporibus eas accidere constabit instabilem aut re dispositionem significant. Virtutes autem stellarum propriae et innate nos magna ex parte lateant/ et quarundam tantum scilicet Quadraginta octo imaginum vim et naturam vtrunque/ et iuxta septem planetarum naturas tenemus/ neque certum nobis sit cui syderi/ quodlibet regnum aut prouincia subiaceat. Multum abest vt vrbium quaruncumque sua sydera sciamus. Quisque etiam mediocriter doctus intelliget ut diebus annis cuiuslibet regionis respondens prescribere et edere difficile

limum esse. Non quod arti idipsum imputandum sit. Sed partim ingeniorum nostrorum imbecillitati / partim labori ac studio immenso / quo ad huius rei absolutam cognitionem quam maxime opus est / etasq; hominis id perficiendum in vno etiam loco non sufficit. Atque in hoc coniectura haud dubia est / deum talium rerum noticiam nobis incertam / sibi soli certam obseruasse / cuius solius interest singula et scire et suo arbitrio dispensare / et partem tantum huius artis nobis communicasse sua singulari benignitate / que sola inter omnes disciplinas naturales hominū amicos ad altissimarum rerum studium eleuat / vt per varium / tum syderum inexpectatum motum / tum illozum multiformem insturum in admirationē ducerentur. Et vt Origeni placet post hanc vitam perfectam omnium rerū et causarum cognitionem deum ipsum nobis redditurum. Vt ita in hoc calamitoso orbe nos nostre cōditionis memores magis ac magis eius diuinam et ineffabilem maiestatem in omnibus quam maxime rerum omnium creatione et ordine mirando / coleremus et veneremur. Et per res visibiles inuisibilium noticiam assequeremur vt diuus ille Paulus vas electiois nos docuit ad Romanos primo / quo nobis significari voluit / si earum rerum quas sensu nostro apprehendimus / queque etiam aliquando perirent / tam admiranda est excellentia et decus / quanto excellentiora et prestantiora sunt / ea que inuisibilia et nunquam interitura certo certius credimus.

¶ Postremo dicet quis cum planetarum motus ex tabulis supputatis tuo nostro non plane motibus coelestibus respondeat. Quorsum attinet illa tam curiosa astrorum configurationum ratio / que etiam tantummodo locis Austriaco parallelo subditis admissim respondet. Responso / potest idem labor vsui magno esse / etiam his qui ad meridiem et septentrionem habitant / presertim futuris annis.

¶ Nam qui hoc anno diebus singulis aure dispositionem in suo loco / quo degit diligenter / obseruauerit / aut annis preteritis id fecisset. Vbi futuris etiam temporibus planeta idem cum stella eadem ita configuratus fuerit / et in simili differentia siue distantia extiterit / potest facile elicere / effectus quoscunque tam maiores quam minores / quod veritatem habet / si idem Dominus anni aut quarte eius / coniunctionis / item oppositionis / aut etiam quadrature / proxime precedentis fuerit / neque enim raro contingit / Dominatorem esse preualidum / siccitatemque significare / et sua fortitudine quaslibet alias configurationes ortus et occasus humiditatem vel aliam dispositionem illi contrariam significantes / impedire / ita vt nihil aut parum operentur. Rursus si dominus huiusmodi aure dispositionem promittit / stella secum eiusdem nature / licet minoris quantitatis et maioris differentie fuerit / humiditatis tamen significationem auget cum suo ortu et occasu. Atque imprimis planeta dominator / quando exortu suo et occasu stellam (sue nature significationem habentem) secum comitem fortiat / aut alicui corpori sese applicuerit / semper maiorem et diuturniorem iuxta stelle propositę magnitudinem et planetę velocitatem effectum producit. Quod si quisq; Astrologus in suo loco similes Ephemerides ederet / iustarentur huius artis amatores / non tam eam perdiscendis quā obseruandum diligentius que astra promittit et

prestant/ quod quisq; in suo loco deinceps intenti⁹ facere properat quã hacten⁹
 et preterite Ephemerides ipsis nõ multo min⁹ essent vsui quã future/ Poetis quo
 q; ad res gestas describendas/ quemadmodum in Virgilio/ Ouidio/ Lucano/ et
 plerisq; alijs patet res gratissima foret/ ad quod itaq; oēs et quẽq; Ephemeri.
 supputandis/ et Iudicij astrozũ prescribẽdis deditũ horror et ob artis hui⁹ au
 thoritatẽ et amorẽ obsecro/ vri hmõĩ exẽplo et fundamento Ephemerides et us
 ditia conscribant et edant/ quod velut thesaurũ Astronomie nobis tradidisse vi
 demus/ Aratũ Columellam/ Plinũ et Ptolomeũ artis illius principes/ qui ob ve
 nerandã vetustatẽ merito eius honorẽ obtinent/ quozũ vestigia etiã hac in re vbi
 secuti fuerimus Astrologie laus et honor vbiq; vt antea magnus habebitur/ qui
 ob astrologozũ quorundã inscitã et questui tantum deditozũ/ hactenus nõ mō
 apud vulgares verũ et apud eos qui eruditiores censentur non parum decreuit.
 Atq; hec satis sint ad intellectus harum Ephemeridũ plura atq; copiosi⁹ magis
 dicitur in nostro cõpleto olim quoq; nõ penitẽdo opere Ephemere. atq; in eo quo
 illarũ cõpositio docebitur. Accipe igitur candide lector hunc meũ laborẽ equo
 animo/ in quo magna pars fructus vsus atq; finis tabellarum astronomicarũ/
 de primo atq; secundo mobili conditarum tibi apparebit/ quarum fundamentum
 Ptol. in alma gesto/ id est magna constructione geometricis principibus stabili
 rit. Quod si fallax sit Iudicium/ rationẽ partim accipere potes ex epistola paeli
 inuari Ephemeridum anni 28 partim ex dicto Hippocratis lib. Apho. 1 qui ait
 ars longa/ vita breuis/ experientia fallax/ iudicium difficile. Vale
 igitur candide lector et laborẽ perlachj boni consule.

C. Kukyzt. benigno Lectori.

Hic ortus, obitus, medio & de uertice presos

Sub pedibus cursus lector amice legas.

Queis rerum euentus mortalia pectora cernant

Vt cœli caueant effugiatue minas.

Porro hoc loco admonẽdi sunt oēs qui hoc anno salutis sue prospectus volunt
 ne sanguinẽ mittant/ aut pharmaca sumant siue quid aliud in quo momentum
 aliquod sit/ aggrediantur Luna erisẽte in Arietis/ Libræ/ Canceri/ et Capricorni
 vitiis medietate presertim ab anni initio ad Iulij vsq; / qd effectus eclipsium tũ
 tẽporis magis sentient. Similiter quoq; propter gubernatorem eclipsium primi
 decem gradus Geminozũ/ Virginiũ Sagittarij et Piscium suspecti sunt.

Errata.

Capite de causis celestibus etc. In fine de coniunctionibus Lune cum planetis
 et oculo Tauri/ pretermissa est 22 die Martij coniunctio Lune cum oculo Tauri
 circa 8 horã post meridiẽ/ Luna essẽ satis prope altero cornu ad stellam accedet.
 Itẽ ab initio Aprilis/ Lege a principio mensis istius vel paulo an plene vires etc.
 Sunt et nonnulla errata in dictionibus sillabis literis et characteribus/ que candi
 dus lector ex antecedentibus et sequentibus ipse emendare potest.

IANVARIVS.

Circa principium mensis huius et finem precedentis. Saturnus oritur cum oculo Tauri ☉ Martis nature/hic autem ortus Saturni cum prefata stella meridionalibus, tardius/Septentrionalibus citius fiet/coincident quoque cum illo ortu oppositi per angulos ♄ et ♃. Circa finem autem et principium sequentis mensis/Saturnus occidit fere cum dextero humero Orionis ☉ ♃ et ♄ nature et Meridionalibus precipuis incidet quo etiam tempore coincident Tetragoni per angulos ♄ cum ☉/♃ et ♄/ propter tarditatem autem motus et stationem suam diu durabunt ortus et occasus illi/ob id in multis locis/preferti septentrionalibus/montanis/et in locis quibus eclipses nihil aut paruum effectuum portendunt/magnam et diuturnam frigiditatem/nivis copiam/profunditatem/hyemem asperam meridionalibus magnam inundationem aequarum minatur. Quibus vero Mars ratione dominique utriusque eclipsis anno 50 visis/dominabitur aut participationem habuerit/ quia hoc mense/et sequentibus visus res eclipsis Solaris plene sunt. Nunc admodum instabile nunc ad frigiditatem nunc ad magnam humiditatem declinantem portendit/et nisi Mars ratione eclipsium dominium sibi usurpasset/Saturnus asperitiam fecisset hyemem. Circa medium autem huius mensis Jupiter oritur cum Lyra ☉ ♃ et ♄ nature/durabit et hic ortus ad duos fere menses ut stella Jovis non multum distabit ab ortu illius astri propter retrogradationem/Meridionales autem tardius/Septentrionales citius sentient effectum ortus huius. Cum autem Jupiter sit particeps Martis in dominio quarte hyemalis/et oritur in opposito pene loco/in quo eclipsis Lune accidit. Mars vero eodem tempore in trino et quarto aspectu ad locum eclipticam voluitur. Coincidunt quoque hoc mense tetragoni per angulos ♄ cum ☉/♃ et ♄/mitigabunt Martis et Saturni intemperiam. Fiet tamen in multis locis liquefactio nivium/et humiditas magna cum ventis validis quas in plerisque locis inundationes sequentur. Argumento quoque est quod ambe eclipses facte sunt circa stellas frigidas et humiditas in filo piscium ♄ et ♄ nature. Significator autem eclipsis Solis circa stellas humiditas in fronte Tauri Hiadas appellatas quas mansionem tempestuosam esse autem. In eclipsi autem Lunari ♃ est prope Jovem et in utraque eclipsi in signo aereo ob id cum effectus eclipsis Lunaris grassabitur Martis sentia et in temperantia mitigabitur aliquantulum.

1a Sol occidit circa horam 4 post meridiem/cum corona septentrionali ☉ ♃ et ♄ nature dia. 16/ Venus. 14 autem me. 1 c cum humero pegasi ☉ ♃ et ♄ dia. 10/ Et circa 14. p. me. m c cum eadem stella dia 20. Et circa .vi. autem merid. est cum stella ♄ ♄ et ♄ in fusione ☉ differentia 36 nubilosum/alibi niviosum et frigidum.

2b .vi. autem me. ☉ ♄ m c ♄ or. dia 30. ventus/circa .viij. autem ☉ ♄ ♄. ix. autem me. ☉ ♄ ♄/ 14. post meri. ☉ ☉ 1 c Spica oritur dia. 4 frigidum.

3c Plena Luna illa in quarto eclipsis Lune/et Sol non longe a cuspide ascendetis et in facie frigida/Luna autem non longe a cuspide occidit et est cum stella ♄ in sinistro pede ♄ ♃ ♄ dia 48 Gubernatores ♄ cum ♃/et si Jupiter hyemalis quarte visus/et ♃ eclipsium distator pro remissione febris et tepeditate aure faciant/tamen Saturnus oritur prima pomeridiana cum oculo ♄ et ex eo quod Sol sit in facie frigida etc. hec testimonia autem admodum instabile reddent/partim niviosam/partim pluviosam/ Venus 6. post me. cum stella ♄ in fusione Aquarum ♄ et ♄ nature/dia 57 mi./ et tertia hora autem 1 c cum nonnullis stellis ☉ ♄ ♄ nature/tertia autem hora post meri. m c cum eisdem .ix. antemeridie ☉ ♄ ♄. f. ho.

IANVARIVS.

an ☐ ♀ oritur Dexter humerus Orionis i c drā 2. / viq. p^o u ☐ ♀ occidit / ocu-
lus 8 m c drā 17. turbidum.

- 4 d ☉ occidit 4 post meri. cū capite Herculis Δ ♀ drā 22. et hora 6. p^o me. ☐
♀ ☉ remissio frigoris cum liquefactiōe et serenitate. Ven^o .2 an me. cū stel-
la X in fusione ☉ H nature drā 15/ et tertia an me. i c / .x an mer. oritur / iij
p^o me. m c cū illa et alijs stellis ☉ aerem humectat. / vj Δ) ♀ / .x *) H
- 5 e ☉ Sol oritur / viq ho. an me. cū umbilico pegasi ☐ ♀ et ♀ nature drā 17. Et iij.
post me. occ. cum nebulosa iuxta scorpionē ♀ et ♀ nature drā 15. / rj ☐ ☉ m
c somahant oritur drā 22. / Mars .iij an oritur cuz corde M ☐ ♀ p ♀ na-
ture drā 10. / ☉ or. H occidit drā .5 intensio frigoris cuz humiditate / sed an-
tipabit / hec aure dispositio / Mercuri^o .iij cū stella Δ in arcu ♀ ♀ et ♀ na-
ture drā 1 gra / 55. mi. Et 2. p^o ☐ ♀ oc. somahāt m c drā 0. / xj an *) ♀ / v. p^o
- 6 f ☉ occidit 4. p^o me. cū capite serpēta. ☐ H p ♀ drā 11. m / Lūa (Δ) ♀
2. ho. p^o me. cū stella * / quita extra formā ☉ drā 16 / viq. p^o me. ☐ ♀ i c / ♀
occidit differentia .3 sed anticipabit / rj hora ☐) ♀ / ix. post ☉) ♀ / iij.
post ☐) H nivosum / aliubi pluviosum.
- 7 g Venus viq. p^o occidit cum lyra ☉ ♀ et ♀ nature drā 27. eadē hora ☐ H m
c ♀ occidit drā 25. / ☉ H m c ☉ i c drā .5 / ☐ ♀ i c lyra occ. drā 2. et sic Ve-
nere occidēte cuz lyra / Saturn^o occupat cardinē me et ♀ i c / magnā acri-
alterationē ad frigiditatē et nivosam humiditatē faciem. / viij anteme. ☉ H i c
♀ m c drā .16 / j. post me. ☉ H ♀ / .x. post meridiē Δ) ☉
- 8 h ☉ Sol ix. hora p^o me. cuz * sub oculo dextro ☉ drā 40 / Luna hora iij. p^o
meridiē cuz spica ♀ ☉ p ♀ drā 2 gradu 8 mi / Mercuri^o .x an me. m c
cuz lyra ☉ ♀ ♀ nature / drā 28 / et fit ☐) ♀ eadē hora / et .x. p^o me. i c
cum eadē stella drā 17. mutatqz latitudinē / aurā ventosa designat in quibus
dā locis etiā humidā / viq. p^o me. Δ) H / ix. post meridiē *) ♀
- 9 b ☉ Sol .viq an meridiē / oritur cum humero equitatoris ☐ ♀ et ♀ nature drā
7. / Et iij. post me. occidit cum somahant ☉ H p ♀ nature drā 27. Et est
cum stella . in muscida ☉ drā 45 / Et rj post meridiē ☐ ☉ i c / ♀ or. drā
6. / et ☐ ☉ i c Lyra oritur drā .19 / Sic fit vt Sole Imū celi possidente ♀
cū lyra or. Et rj. p^o ☉) ♀ drā 51 / Remissio frigoris / et dispositio ad serē-
nitatē / Lūa j. p^o cū * in corā sinistra ♀ ♀ p ♀ drā 4 / et viq. cū X
in genu sinistro ♀ ♀ p ♀ drā 54 / Venus ix. p^o me. occidit cuz cauda Ce-
ti Δ H nature differentia 2. / Et ☉ ♀ occidit hircus m c drā .5 turbat aerem
et intendit gelu / Mercurius .vj an me. oritur cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ dif-
ferentia .31 / Et h. post me. occidit cum eadem stella drā .33 / .x anteme. m c
differentia .9 / ☐ ♀ m c spica occidit drā 22. / ☉ ♀ m c Canis maior i c dif-
ferentia .37 / et ♀ i c cum predicta stella drā 37. / ☐ ♀ i c Canis maior m c
differentia 9. / Item 1. post meridiē / ♀ est cum nebulosa in oculo ♀ ☉ et ♀
differentia 33 aura ventosa / in nonnullis locis etiam nivosi.
- 10 c Quarta luna decrescentis hora 10 mi. 47 an meridiē / Ascendente 25 gra
du 21 mi. ♀ cum quo oritur stella X H prima extra X
drā 18 / Et Luna est cū X in pede sinistro ♀ ♀ p ♀ drā 45 mi. / Jupiter in
cuspide occidentis / Gubernatoris * cum H intendit frigus / Jupiter tamen
in cuspide occiduo mitigabit eo quod est dñs quarte hyemalis.
Juro oritur ☉ in ☉ hora 1 mi. 37 p^o me. ascendēte 25 gra. 44 mi. II / Guber.

IANVARIVS.

precedētis ☽ in medio celi fortitudine / sepe igitur alterabitur antea que per ☽ sig^o
nificata fuit / Sol i c cū delphino Δ H et ☽ drā .9 / Et ☽ ☉ i c presepe m c
drā .27 / Et iij. post meridiem / ☽ ☉ occidit presepe oritur drā 2. Ven^o .i
ante meridiem / oritur cum X infusione ☾ H differentia 7.

11 d Sol m c cū delphino stella Δ H et ☽ nature drā 22. / ☽ ☉ m c presepe i c drā
4. / Et ☉ ☉ m c frons M occidit drā 2. / et sic qñ ☉ cū delphino cardinē me^o
vñ celi occupat frons M / occ / et presepe i c / Mercuri^o 02. / vj añ me. cū cru^o
repegasi ☽ et ☽ drā .31 / Et est. iij añ me. cū stella X i capite T drā 1 gra
du 2 mi. ☽ p ☽ remittit frigus / Itē 1. post me. ☽ H 02. ☽ occ. drā .19 / ix. post
me. / ☽ occi. dexter. hñe. Oriōis m c drā 9. / .j añ me. *) ☽ / ix. p^o Δ) ☽

12 e Sol xi. hora añ me. / est cū * in ceruice ☽ drā 50 / Et iij. ☽ ☉ oc. canis m^o
noz 02. drā .5 / Lūa r. p^o cū * in creure sinistro serpen. H p ☽ drā 26 / M^o
curi^o circa .vj añ oritur cū cauda M Δ H p ☽ drā .25 / Et cōiungitur cū stella
X in capite T ☽ p ☽ drā 1 gradu 2 mi / Et .r añ me. ☉ ☽ m c cauda Ω occ.
drā 8. / Itē .8 añ ☉ ☽ m c cauda ☽ 02. drā .18 / 1. p^o ☽ ☽ occ. oculus 8 02.

13 f .viij añ ☽ ☉ oritur presepe oc. drā 28. / ij añ (drā .4 sed anticipat ☽
me. *) ☉ / j. post ☽) H / xi. p^o ☽ ☽) drā 4 gradu 11 mi. Mars viij. post
me. i c cū capite herculis Δ ☽ drā .12 / Et .viij añ ☉ ☽ m c cor Ω oc. drā .13
Mercuri. circa me. cōiungitur cū stella X in cōtactu septentrionali arcus T ☽ et
☽ drā 2 gradu 8 mi. remittit frigus cum ventis /

14 g Sol m c cū cauda Eigni ☽ et ☽ drā .13 et i c cū eadē stella drā 15. / *) ☽
X. post me. / ij. p^o me. ☉) ☽ / Mars .viij añ me. m c cū capite herculis Δ
☽ drā .1 / et viij. p^o ☽ ☽ i c sinister pes Oriō. m c drā .8 / Mercuri^o .vj añ
02. cū muscida pegasi Δ ☽ et ☽ drā 32. / Et ☉ ☽ 02. postrema flumis i c drā
15. / Et .xi ☉ ☽ occ. ☽ m c drā .2 / Et 3. p^o ☽ ☽ oc. dexter hñe. Oriōis 02.

15 z ☉ Sol occi. spica ♀ i c 20. / .viij añ ☽ ☽ m c sini^o (drā 6. vñ^o calid^o
ster pes Oriōis i c drā .8 / xij. p^o / Mars cōiungitur stelle X in dextro pede ser
pentarij H p ☽ drā 17 frigidum et humidum / sed anticipabit

16 b Iupiter xij. p^o oritur cū lyra ● ☽ et ☽ drā 1 Circa hunc diē et aliquot añ
et post magna aeris alteratio pro remissione frigoris et liquefactione nniū cui^o
ventis calidis et humidis / Venus circa .ix añ 02. cū stella X infusione ☾
H p ☽ drā 11. / Et iij. ☉ ☽ m c sinister pes Oriōis oritur drā 6. augebit
humiditatem / viij. post ☽) ☽ drā 5 gradu 55 mi.

17 c ☉ .iij añ cōiungitur cū X in dorso ☽ drā 0 et oc. cū delphino Δ H et ☽
drā .9 turbidū / Luna .j añ cū * in cōtactu septentrionali arcus ☽ et ☽
drā 31. Et v. cū Δ in cornu ☽ ☽ p ☽ drā 8 nubila / Mars circa me. oc.
cū nebulosa Ω) et ☽ drā 20. / Mercuri^o circa xi. post i c cū vulture vo^o
lūte ☽ ☽ et ☽ drā .42 / Et .viij añ ☉ ☽ 02. pleiades i c drā .28 / .xj ante ☽
☽ m c Canis minor i c drā 57. / iij. post ☉ ☽ occ. cauda Leonis i c drā .34

18 d Sol v. oc. cū v̄trepsc̄is me. X H drā 20. / Et .viij ☽ ☉ 02. ocul^o 8 i c drā
19. / Δ ☉ H Lūa 2. cōiungitur stelle i manu sinistra ☾ Δ ☽ et H drā 54 / Δ) H

Noua Luna Februarij hora 2 mi / 50 post me. Ascendēte 18 gradu 33 mi.
S cum quo oritur sinister pes Oriōis ● ☽ et H diffe

rentia .1 / In cuspide anguli precedentis cōiunctionem ☽ differentia 6. / In
cuspide anguli sequentis ☽ differentia 1 gradu 20 mi. Et fore hora ☽ sini^o
ster pes Oriōis occupat angulū orientis / ☽ mediū celi et ☽ occidētis cuspide /

IANVARIVS.

Gubern. h. cū q̄ alteratio aeris ad frigidiorē et humidiorē dispositionē cū ven-
tis frigidis/Mercurius. ℞ añ m c cum vulture volante φ ♂ et ♀ drā 1. Et
□ ♀ m c pleiades or. drā 5. ventum humidum concitabit/Mars circa. iij. añ
oritur cū vulture volante φ ♂ et ♀ drā 6. et sit meridionalis/ Et circa vij.
post i c cū cauda m Δ h p ♀ drā 5. ninosum sed anticipabit.

19 e Sol. vij. añ orit. cū capite Meduse φ h p ♀ drā 26. Luna. ij. añ cū dua-
ra ♀ in cauda ♂ ♀ et h nature drā 51/ et ab altera 17/. .vij. añ *) ♂/ Et ho-
ra vj. post eum stella . in musca ♂/ vij. post eum alia * drā 6/℞. p° Δ
) ♀/ Mars. vij. añ m c cum cauda scorpion. Δ h p ♀ drā 6. / Venus. ix. añ
oritur cū cruce ☾ Δ ♀ p h dif. 11/ Et iij. post □ ♀ m c ♀ occi. drā 15. / Et ix.
post □ ♀ oc. dexter. hūe. Orionis m c drā 19. Mercuri° .vij. añ oritur cū um-
bilico pegasi φ ♂ et ♀ drā. 30/ et cum umbilico andromade Δ ♀ drā 57. / ℞.
post □ ♀ i c spica oritur differentia 5.

20 f Mercuri° iij. post occidit cū corona septentrionali φ ♀ et ♀ drā 50. / □ ○ m
c h ori. drā 6. intendit frigus cū niue/ Luna . j. añ coniungitur x in amphora
☾ ♀ et h drā 45/. iij. ante cōiungitur stelle * in amphora ♀ et h drā 52/ et v.
post coniungitur x in fusione ☾ h p ♀ differentia 24

21 g Sol. ij. ante cum stella x in dorso ♂ drā 50/ Et □ ○ m c oculus 8 ori-
tur drā 5. / Et □ ○ occi. ♀ i c dif. 10/. ij. añ □ ♀ ♀ remissio frigoris cum calē
dis ventis/ Luna ℞. post cū x in ventre x drā 23/ Et. j. añ me. □) h/ vij. p°
meridiē □) ♀/ Mars. vij. añ m c cū capite herculis φ h p ♀ drā .14/ Et
vij. post i c cū eadē stella drā 7. Circa meri. □ ♂ occi. cauda ♂ M C
drā. 20/ Venus ix. post occidit cū hūero equi maioris φ ♂ et ♀ drā 17. Mer-
curius. vij. añ or. cū hūero equi maioris φ ♂ et ♀ drā. 48/ Et. ℞ añ □ ♀ m c
Somahant oritur drā 52. / Item iij. occidit cū capite herculis Δ ♀ drā 14. Cc
cidit etiam cum nebulosa iuxta m ♂ et) drā. 54/

22 A □ ○ occidit canis maior/ ori. drā 8. / vij. ♂) ♀ drā 1 gra. 18 mi. Et *) ♀
j. post * ♀ ♀/ Mars. iij. ori. cum delphino Δ h et ♂ drā. 15/ Mercuri° iij. p°
occ. cum capite serpent. arq̄ h p ♀ differentia .10

23 b □ ○ occ. postrema fluminis or. drā 3. / vj. post * ○)/. .vij. añ me. ♂ ♀ ori.
presepe occ. drā. 33/ Mercuri° ij. post i c/ cū delphino Δ h et ♂ drā. 41/ Et □
♀ i c Lyra oritur differentia 10. / .vij. ante *) h

24 c v. post □ ○ occ. arcturus i c drā 32/ Luna. vij. añ cōiungitur stelle Δ in filo
x h et ♀ drā 51/ eadem hora Δ) ♂ / vij. ♂) ♀/ Mercurius. ij. ante
m c cū delphino Δ h et ♂ drā 16. / Et iij. post ♀ occidit cū Somahant ☉ h p
♀ differentia 44. / Et ♂ ♀ occidit presepe oritur differentia .45/ ij. post ♂ ♀ i
c presepe m c differentia 55.

25 d .vij. ante □ ○ oritur h i c differentia. 1 et Sol circa caudam ♂ / v. p° oc-
cidit cum vulture volante φ ♂ et ♀ differentia. 21/ Et occidit cum cauda ♂ Δ
differentia 18. / □ ○ oritur arcturus i c differentia 29. / Et i c cū cauda ♂
differentia 6. aurea frigida humida et ventosa/. j. ante meridiem □) ♀/ Luna
ij. cum stella * in postrema cora ♀ ♂ differentia 12/ Mercurius .v. ante con-
iungitur stelle * in ceruice ♂ differentia 50

26 e Quarta lun. v. crescentis hora 3 mi. 22 ante me. Ascendente 15 gradu 1
mi. ♀/ Gubernatores ♀ cum ♀ et si guberna-
tores ad temperamentum declinant iuxta qualitatem temporis/ tamen cause a pat̄o

IANVARIVS

capio mensis deducte alterabunt ut dictū est/ ☉ circa stellas in cauda ♀. ♄ et ♀ nature turbat aerem et intendit frigus/ Luna. ij ante cum stella in cauda ♀ ♄ ♀ differentia 57/ .iij. ante ☐ ♀ i c dexter humerus Orionis occidit drā. 3 ix. post ☉ ♀ occidit arcturus oritur drā. 25/ Mercurius oritur/ .viij. aq̄ cum capite medusē ☐ ♀ ♀ differentia. 41/ .xj. ante m c cū cauda Cigni ☐ ♀ et ♀ differentia 22.

27 f Sol circa stellas in cauda ♀ et m c eisde cum stellis/ Luna iij. p^o cū ♀ in origine cornu ♀ ♄ et ♀ differentia 16/ .iij. post ☉ ♄ drā 2 gradu 18 mi. Et viij. post cum ♀ in cornu meridionali ♀ ♄ drā 17/ Mercurius viij. post meridiē cū ♀ in dorso ♄ drā 1 gradu 45 mi. Et ix. post cū alia stella * i spātula sinistra ♄ drā 1 gra. 5 mi./ .iij. post ☐ ♀ occ. spica i c drā 5. nubilosus

28 g Sol circa stellas in cauda ♀ m c et i c cū eisde stellis/ xū Δ ♄ ♀/ .iij. ante ☐ ♄ occidit ♀ i c drā 8. frigidum et humidum

29 A Saturnus sit direct^o/ et Jupiter retrogradus/ Luna ♄. post cum ♀ in clune sinistro II sequentis ♄ nature drā 30/ Mars circa mer. occidit cū sinistra palma serpentarij Δ ♄ ♀ differentia 18./ Et ☐ ♄ occidit/ Cor Leonis i c dif/. 12 Mercurius iij. occidit cū ventre ♀ meri. Δ ♄ drā 46./ Et .xj. ante ☐ ♄ orit. ♀ m c differentia 4. ventus frigidus

30 b Luna .5. ante cū stella * et est sexta extra II differentia 40/ Mars circa meri diem occidit cū arcturo ☉ ♄ et ♄ differentia 8./ Et. iij. ☐ ♄ oritur ♄ m c differentia .15/ * ♄ ♄ magna aeris alteratio ad remissionē frigoris cum vētis validis/ Mercurius .v. ante cum ♀ in dorso ☐ differentia 1 gradu. et ☐ ♄ i c ♄ ori. drā 56. ventus turbidus/ Et ix. post ☐ ♄ occ. Lyra i c drā .2

31 c Sol oritur cū cauda ♄ Δ ♄ et ♄ drā. 30/ Luna iij. post cum ♀ in chela meridio. ♄ differentia. 52/ .iij. post ☉ ♄ occidit canis maior oritur differentia 19. Et ☉ ♄ occi. postrema fluminis/ oritur drā. 47

FEBRVARIVS

In hoc mense 21 die continget Tetragonus per angulos Saturnus m c et lyra occidit/ et tetragon^o ♄ oritur presepe m c/ sed drā est maior vno gradu propter tarditatē autē atq̄ stationē ♄ et ♄/ diu durabunt hec configurationes/ ob id cum coincident alie cause cū illis planetis non parum cooperabuntur/ Venus item 10 die et 24 habet Tetragonum aspectum per angulos cum Somahant Venus enī m c Somahant occidit. et est stella ☉ ♄ ♄ Similiter Venus occidit cum nonnullis stellis in filo ♄ ♄ ♄ et propter tarditatem motus et stationē etiam diu durabunt/ hec configurationes cum alijs supra enumerate martis sic citatem qui eclipsium dñator est nonnihil ad frigiditatem et hūditatē alterabit

1 d Plena Luna Februarij hora 6 mi. 46/ Ascendente 12 gradu 41 mi. ♄ Saturno culmine celi possidente differentia 7/ Lyra vero angulū occidū differentia 27/ Sol est in fertili ad locum eclipticum Lunaris eclipsis/ Luna autē in Δ aspectu/ Gubernator ♄ cum ♄ dispositio aeris ad tepiditatē cū ventis/ sed cause ab initio mensis Januarij enumerate/ et Saturnus in culmine cum tetragono per angulos cum Lyra nonnihil alterabunt cum frigiditate et hūditate/ Sol oritur cum cauda ♄ Δ ♄ et ♄ differentia 30. Et opposit^o ☉ m c cor Leonis i c differentia .22/ Et v. ☉ ☉ occidit cor ♄ oritur differentia 1. Et opposit^o xij. ☉ i c cor ♄ m c differentia 8. vētos calidos mouet/ Luna .ix.

FEBRVARIVS

1. Luna cum X in genu sinistro pedis pteca
 dentis & differentia 19/ix. ☐ Venus occidit caelis minor in c differentia 2.
 Mercurius occi. cum cauda ☉ Δ 7 et differentia .59
2. ☉ oritur cor 2 occ. o/ Et ☐ ☉ m c Arcturus occi. 16. Sol t/c/ est
 ventre X meridional. X H 5. Luna .v cum X in palma sinistra pre. pedis
 Δ 54/ xi. cū stella ✱ quita extra Δ 12/ .h Δ) ☉/ ix. ☐) H/. iij ☉ ☉ or. ca
 nis minor occ. o/ Mercuri⁹ orit. .vij cum cauda ☉ Δ 7 et H 17./ Et occ. est
 vulture volante ☉ ☉ et 7 dñā 39. humida aura cum frigidis ventis
3. Sol or. cū ☉ .25 nubila cū ventis/ Et Sol in c cum ventre X merid. X H 28.
 Et ☐ ☉ m c somniant orit. .10/ Et ☐ ☉ occ. Aearnar in c .13/ viij. Δ ☉ ☉
 serenat/ Luna .h cū ✱ in extremitate postrema palme Δ 17/. vij ☉ ☉ or. cor 2
4. ☉ or. cū ☉ 29./ Et ☐ ☉ or. sinister pes Orionis i c .51 nubila cū ☉ oc/ 38.
 vētis/ ☉ ☉ ☉/ xi. ☉ ☉/ ☉ oc/ ix. cū vētre Ceti Δ H 19./ .vij ☐ ☉ or. sinister
 pes Orionis i c .2/ xij ☉ ☉ m c cor 2 i c .57/ xij. ☉ ☉ i c cor 2 m c o/
5. iij Δ) H/ vij.) cū spica ♀ ☉ ☉ p ☉ dñā 2 gra 16 mi. / ☉ ☉ cū ✱ in cora si
 nistra ♀ 3/ Mars j. cū Δ in arcu ☉ et ☉ i gradu 22 mi. Mercurius .ix
 cū X in ancha sinistra ☉ ☉ p H 7/ xij ☐ ☉ m c arcturus occidit 55./ iij. ☉
 ☉ occidit cor 2 oritur .11 nubila cum ventis/ in nonnullis locis pluita
6. Sol v. occi. cū cruce pegasi Δ ☉ p H 1./ Luna .h cū X in genu sinistro ♀
 ☉ p ☉ .v cum X in Simbra ♀ 48/ ☉ ☉ ☉ 52/ xi Δ) ☉/ iij. ☉ ☉
 ix. ✱) ☉/ iij ☉ ☉ oritur pleiades in c 5/. vij ☐ ☉ m c ☉ orit/ 29./ v.
 ☐ ☉ occidit postrema fluminis in c .16/ Et Δ 7 ☉ venti calidi et sereni
7. Sol ☉. cū X in ancha ☉ ☉ p H 50/ et xij. ☉ i c cum ☉ .28/ Et ☉ i c est
 somniant ☉ H p 7 .22 ventis nubilum prouocabit/ Luna .vij cū ✱ i fu
 nelācis septērio. ☉ H p 2/ viij. ☐ ☉ i c arctur⁹ or. .22/ xij. ☐ ☉ oc. Soma⁹
8. ☉ xij m c cū ☉ et somniant 8./ v. ☐ ☉ oc. pleiades in c (hāt m c 5.
 .9/ xij. ☐ ☉ i c sinister pes Ori. occidit .29 nubila cū vētis/ Ven⁹ vij. cū
 X in filo X H et 7 11/ Et occidit cū cruce pegasi ☉ ☉ et ☉ .8 pluviosam.
 Mercuri⁹ j. cum X in vertebz dextro ☉ ☉ p H 51/ Et ☐ ☉ m c ☉ occi. 48
9. Introitus Solis in X hora 4 mi/ 12 ante meridie/ Ascendente 5 gra/ 5
 mi. ☉ cū quo oritur nebulosa ☉ et ☉ .19/ ☉ quoqz
 non longe ultra cuspidem orientis dñā 4 gradu 2 mi. In culmine luminosior lā
 cis meridie. ☉ et ☉ .48/ Guber. precedentis ☉ et totius tēporis/ ☉ fortis in
 angulo sicciore auram promitteret/ nisi cause superius enunerate nō nihil alte
 rarent. et quarta immediate sequēs.
- Quarta Luna de celsētis hora 6 mi. 12 an me. Ascendente 17 gradu
 53 mi. ☉ Saturno cuspidē imi celi possidē
 te dñā 1 gradu mi/ 17/ Guber. ☉ cum H instabilem auram pollicētur/ Lun
 na. vij cum ✱ in cruce sinistro serpentarij H p ☉ 19/ viij. Δ) ☉/ ix. ☉)
 H/ Mercurius .vij oritur cum capite trianguli Δ ☉ 7./ v. ☐ ☉ occ. pleia
 des in c 24./ Et xij. ☐ ☉ i c sinister pes Orionis occidit .5
10. Sol occidit cum ☉ 28./ Et ☉ ☉ ☉ dñā 1 gradu 35/. vj ☐) ☉/ iij. ✱ ☉
 ☉/ Jupiter ☉. oritur cum Lyra ☉ ☉ et ☉ 1./ Et diu propter tarditatē mo
 tus ante et post durabit/ facit ad temperiam aeris et tēperabit parumper Mar
 tis influxum.
11. ☉ xij ☐ ☉ m c ☉ occidit .17/ ☉ ☉ ☉ differentia 4 gra/ 3 mi./ ☉. ✱ ☉

FEBRUARIUS

- 13 v.** ☐ ♀ occidit frons ♀ tē r. / ♀. * ♀ ♀
14 v. ☉ occidit frons ♀ tē .22/ Luna v. cum ♀ in contactu septentrionalis uali ♀ ♀ et ♀ 30. / ♀ * ♀ / ♀. ☐ ♀ / ♀ Mars viq. m e cum lyra ● ♀ et ♀ .10/ ♀ ☐ ♀ m e spica occidit. 7/ et tē cum eadem stella 11. / aura frigidior et humidior/ Mercurius v. occidit cū postrana fluminis ● ♀ .15
15 b Sol m e cum cruce ☾ .23 ♀ tē cum eadem stella 7. / ♀ ♀. cum ♀ infusione ☾ ♀ p ♀ 10/ Luna .vq cū ♀ in contactu septentrionalis ♀ 32/ ♀. ♀ cum Δ in cornu ♀ 9/ vj. ☐ ♀ / ♀ Mercurius xj m e cum humero pegasi ☐ ♀ et ♀ 14. similiter cum cruce eiusdem .26. / et tē cum eisdem stellis/ ♀. vq est cū ♀ infusione ☾ ♀ p ♀ 16/ j. ☐ ♀ et ♀ / v. ♀ ♀ occ. cauda ♀ oritur .33 humidum et pluuosum cum ventis frigidis.
14 c Luna viq. post meridiē cum Δ in manu sinistra ☾ ♀ et ♀ 57/ ix. Δ) ♀ / ♀. * ♀ ♀ / ♀ Mars .iij oritur cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ .5/ ♀ .v conuñgitur eidem 31/ ♀ xj occidit cum eadem. 5/ viq. ♀ ♀ tē canis maior m e .2 * ♀ ☉ p uiosum/ alibi frigidum et niosum/ Mercurius xj m e et tē cum nonnullis stellis in fusione ☾ ♀ et ♀ / ♀. conuñgitur alteri ex illis 40/ ♀ vj. ☐ ♀ occidit oculus ♀ m e 33. augebit predictam aure dispositio nem cum ventis frigidis.
15 d ☉ occidit cum postrana fluminis ● ♀ 27. / et cum muscida pegasi Δ ♀ et ♀ .24/ Luna vj. cum ♀ in cauda ♀ ♀ et ♀ 28/ ab alia autem ibidem 57/ viq ♀ ♀ m e/ canis maior tē 20. Mercurius xj ☐ ♀ m e dexter hūer^o Orionis ori. .50/ xj. tē cū stellis in fusione ☾ ♀ p ♀ ♀ .vq ☐ ♀ oritur dexter humerus Orionis tē 22.
16 e Sol v. occidit cum nonnullis stellis in fusione ☾ ♀ / ♀ Luna .viā cum ♀ in amphora ☾ 21. tē cum ♀ ibidem ♀ et ♀ / .iij Δ) ♀ / ♀ Mercuri^o .viq oritur cum ♀ in fusione ☾ ♀ 23. / ♀ vj. occidit cum lyra ● ♀ et ♀ 32. ♀ et ♀ ☐ ♀ occidit/ ♀ m e 49. humidum cum ventis frigidis/ in quibusdam locis pluuia frigida.
17 f Noua Luna Martij hora 7 mi/ 11 ante meridiē/ Ascendente 24 gra. 45 mi. ♀ / cum quo oritur Crux ☾ Δ ♀ p ♀ 8. et prope oritur ♀ 2 gradu 21 mi/ Guber. ♀ cum ♀ mitigabunt Martis/ do minoris eclipsis intemperantiam ad temperatioram auram/ Sed a principio propter ☐ ♀ / ♀ et ☐ ♀ ☐ frigidior/ .v * ♀ ♀ / ♀. ♀ ♀ ♀ 3 gra/ 6 mi. Sol m e cum humero pegasi .3/ et cruce pegasi 9. ☐ ♀ et ♀ / ♀ xj. tē cum eisdem/ sed differentia est magna/ et est ♀ ☉ occidit/ cauda ♀ ori. 17 Mars vj. cum ♀ in capite ♀ 1 gradu 15 mi. Mercurius vj. occi. cum cauda Ceti Δ ♀ 0/ ♀ et ☐ ♀ occidit hircus m e .5/ .i ☐ ♀ tē frons ♀ oritur 28. / ♀ pleiades occidit .10
18 g Sol tē cum stellis in fusione ☾ ♀ / ♀ ♀ et ☐ ☉ occidit oculus ♀ m e 11. / Luna .v cū ♀ in ventre ♀ meridional. / 33/ ♀ Mercurius .vq oritur cum 28 stella ☾ ♀ .13/ ♀ vj. ☐ ♀ occidit sinister pes Orionis m e 3. .j ☐ ♀ tē canis maior occidit .7
19 h Sol .vj conuñgitur ♀ in fusione ☾ 30/ xj ☉ m e xj. tē cum stellis in fusione ☾ ♀ / ♀. * ♀ ♀ iij. ☐ ♀ / ♀. ♀ ♀ / ♀. ♀ ♀ differentia 3/ gradu 49 mi. Mars .iij oritur cum cruce pegasi ☐ ♀ et ♀ 8. nubium/ .j ☐ ♀ tē oculus ♀ occidit .28/ j. ♀ ♀ m e cauda ♀ tē .33

FEBR VARIVS

- 20 b Sol m cet i c cum stellis in fusione ☿ × ♄ / vi. ☽ ♄ / ☽ ♄ ♄ ♄ . viij
 ☽ m c cauda ♄ occidit. / .j ☽ ♄ i cauda ♄ m c 20. / Venus fit
 retrograda
- 21 c Sol v. occidit cum Lyra ☉ ♄ et ♄ . 29 turbidū / aliubi pluuia / Luna vñ.
 cum ✱ in cora ♄ ☽ 37 / xi. Δ) ☽ / Mars . iij oritur cū cauda ♄ Δ ♄
 p ♄ . 13 / vñ . ☽ ♄ m c Lyra occidit . i / humidum ante et post / Mercuri . vñ
 oritur cum 29 ☿ × ♄ 31. / j. ☽ ♄ m c sinister pes Orionis oritur 29.
- 22 d v. ☽ ☽ occidit ♄ m c 31. / xij ☽ ☽ m c dexter humerus Orionis
 oritur 17. frigidū / Luna . vj cum ✱ in cauda ♄ ♄ 15 . iij ✱ ☽ ☽
 xij . ✱) ♄ / Mercurius . vñ oritur cū creure ☿ Δ ♄ p ♄ . 10 Et ☽ ♄ occi
 dit dexter humerus Orionis m c 18.
- 23 e . vñ ☽ ☽ oritur dexter humerus Orionis i c . i / xij . ☽ ☽ i c frons
 m oritur 24. / Et ☽ ☽ i c pleiades occidit . 14 / Luna . ☿ cum ✱ in cau
 da ♄ ♄ 55 / j. coniungitur cum oculo ♄ ☽ i gradu 20 mi. / xi. ☽)
 ♄ i gradu 34 mi. / xij . ✱) ♄ / Venus . vñ oritur cum creure ☿ Δ ♄ p ♄
 15. / Et oritur cum ♄ 56. Mercurius vñ . occidit cum humero pegasi ☽ ☽ et
 ♄ 24. / Et fit septentrionalis ventū suscitabit vehementiorum
- 24 f Quarta Luna crescentis hora 11 mi. 11 ante meridiem / Ascendente 2
 gradu 50 mi. ☽ nebulosa ☽ angulum oc
 ciduum occupante differentia 1 gradu 6 mi. hac etiam die vires eclipsis Luna
 ris incipiūt / Gubernatores ♄ cum ♄ ventosa presertim a principio alias satis
 temperata / Sol vñ . occidit cum cauda Ceti Δ ♄ 5. / Et ☽ ☽ occidit hircus
 m c / o / Luna . ix cum Δ sub oculo ♄ vna ex hiadibus ♄ p ♄ 53 / xij cum alia
 Δ supra oculum 46 / ix. cum ✱ in origine cornu meridionali 3 nebula gene
 rat / aliubi pluuia . iij ☽ ☽ or. postrema sūnt i c 12. xij ☽ ☽ occidit des
 pter humerus Orionis oritur . 9 / ij . ♄ m c somniant occidit . 7 et diu durabit
 hietet ragonus propter tarditatem motus ♄
- 25 g Sol oritur cum 27 ☿ × ♄ 26. / Et ☽ ☽ i c canis maior occidit o Luna
 . j cum ✱ in cornu ♄ meridionali 24 / Δ) ♄ . ij cum ✱ in cornu meridia
 li ☽ 8 46 / xi ☽) ♄ / Mars . iij ori. cū muscida pegasi Δ ☽ et ♄ 10. / vñ
 ☽ ☽ m c ♄ occidit 12. / vñ . ☽ ♄ occidit arcturus oritur . 45 calidum / in
 locis calidioribus tonitrua et fulmina
- 26 A vñ . ☽ ☽ occidit sinister pes Orionis m c 24. / Luna . vñ cum Δ in clune
 sinistro ☽ sequentis ♄ 30 / ij . cū ✱ sexta extra ☽ 39. / ij ☽) ☽ . xij ☽)
 ☽ xij ✱ ♄ 2 / v. Δ) ☽ / Ven . vj oritur cum 29 ☿ × ♄ p ♄ 18. Mer
 curius vñ . occidit cum mare Ceti Δ ♄ et ♄ 40.
- 27 b . xij ☽ ☽ i c oculus ♄ occidit . 8 / Luna xij . cum ✱ in chela meridio
 nali ☽ 56 / . ij ☽) ♄ / vi. Δ) ♄ . j ☽ ♄ occidit ☽ i c 14. / vñ . ☽ ♄ occidit
 Lyra i c 19. ventum frigidum et nubilosum concutabit.
- 28 c Sol . vñ oritur cū 28 ☿ × ♄ p ♄ 15 / xij . ☽ ☽ i c cauda ♄ m c . 6 / Lu
 na . vñ . cum ✱ in pede ♄ sinistro precedente 4. / ij Δ) ♄ . iij ✱) ♄ / Mercuri
 us . vñ oritur cum cornu sequente ♄ Δ ☽ et ♄ 52 / Et vñ . occidit cum ventre
 Ceti Δ ♄ . 45 / Et ☽ ♄ occidit Canis maior m c 41. ventus.

MARTIVS

In hoc mense 11 die / quo etiam fit equinoctium / Saturnus oritur cum oculo ♄

☽ faciet

MARTIVS.

● J faciet aurā aliquot diebus añ et post fri. et plu. in nõnullis locis ni uosam/ Et ex eo quod incidet in diem equinoctij/ Indiciũ est quod Saturn⁹ multũ auertet de viedine Martis dominatoris ambarũ eclipsium per totam quartam vernalem/ aliqui satis aurā imēperatam reddet/ ex qua intē/ perie fructus multi peribunt/ Argumento quoq; est quod J per locis in signifero geldũ moueatur/ Et circa finem mensis Mercurius fit retrogradus circa cornua Arietis Δ J et H/ vbi frequenter auram cum ventis septē trionalibus fri. cõmouet/ Circa finē etiā coincidunt □ ♀ m c canis ma/ 101/ ori. Et □ ♀ 1 c Canis minor occidit/ Et J ♀ oritur cauda Ω occidit propter regressionem diu durabunt. Itē ibidem etiā accidunt □ ♀ m c si nister pes Orionis oritur/ Et □ ♀ oritur lyra m c propter tarditatē mor⁹ Veneris etiam diu durabunt/ hec testimonia Ver nõ vsq; adeo calidum fore portendunt.

1 d Sol oritur cum ♀ .42/ Luna .iij. cum ♀ in genu sinistro pedis pcedentis Ω H p ♀ 25/ q. cum ♀ super palmā sinistram pedis pcece. Ω 46/ .iij. * J 4/ .j. ♀ 1 c cum ♀ .19/ j. m c cum ♀ 49.

2 e Venus .vj. oritur cum ♀ et est 28 ☾ 25. ♂ ♀ ♀ differētia 4 gra. 51 mi. rj Venus coniungitur ♀ 5 gradu 51 mi. Luna .vij. cū * 5 extra Ω 5/ □ J H/ .X. cum * in extremitate postreme palme Ω 22/ X. Δ J J/ .vij. ♂ J m c Canis minor 1 c .19/ rj □ J oc. cauda Ω 1 c .5/ rj. ♂ J 1 c canis minor m c 3. Mercurius .vij. oritur cum aſice. cornu V Δ J et H 26. /vj. cum ♀ in filo X 1 gradu 20 mi. vj. oc. cū cruce pegasi si ♀ J et ♀ 10. nubilum et ventosum.

3 f Plena luna Martij ho/ 6 mi/ .59/ Ascendente 17 gradu 35 mi. ♀ / dorso Ω cusp. id. occidit tenente differētia 2 gradu fere/ Suber. quia est p̄uentionalis ♀ sunt ♀ cū J et H/ Vter q; in angulo ♀ tñ retrogradus/ Et si J in exaltatione sua et in summo eardine onstitutus auram calidam atq; siccam prouittit/ cause tamen a p̄icipio mensis enumerare nonnihil eam temperaturam mutabit/ ita vt nõ vsq; adeo calidũ et sic. cū vernale ipsum tēpus erit/ quāquā satis cõtra tēporis rationē imēperatum/ rj. □ ○ m c sinister p s Orionis oritur 9/ .vij. * H ♀/ Et j. □ ♀ m c p̄scep̄ oritur .5/ vj. ♀ oc. cum ♀ 54.

4 g Sol oritur cū 29 stella ☾ X H p ♀ 10. / q. Δ J H/ v. ♂ J ♀ vj.

5 A vj. □ ○ oc. dexte humerus Orionis m c deā 6/ Luna .iij. cū spi ca m ♀ ♀ p J differētia 2 gradu 24 mi. / .vij. □ J / .X. J cū * in cora sinistra m ♀ p J 45/ j. cū ♀ in genu sinistro m ♀ p J 46/ iij. ♂ J ♀ differētia 1 gradu 3 mi. Mars .vij. m c cū vulture volāte φ J et ♀ .20/ et □ J m c pleiades oriūtur 16/ rj ♂ J oc. sinister pes Orio. oritur 3/ .vij. 1 c cū vulture 2. frig. cū p̄uinit/ aliubi cū plu. frigi. Venus .vij. oc. cum cruce pegasi φ J et ♀ .1/ Mercurius j c si vñ bilico Andromade Δ ♀ .17/ Et j. m c cum eadē stella 25. / Et □ ♀ m c Canis minor oritur .29/ vij. □ ♀ occidit Canis minor m c .30 vñ / tum in nonnullis locis mouebit.

6 b Sol oritur cum cruce ☾ φ ♀ p H 7. / Luna .vij. cū * in lāce septen

MARTIVS

- 7 c Sol oc. cū hūc. pegasi φ δ et ♀ drā 20. Luna iſq. cū ꝑ in lance mēra
 dionali ☿ H p δ 53/ ♀. *) δ/rq̄. □ H oc. ♀ i c. 5/ et ♀ est tar
 da motu p̄uinam aut pluuiam frig. minatur in quibusdam locis
- 8 D Luna. ſq̄ cum ꝑ in lance ſep̄tērio. ☿ H p δ 13/v. cū * in cruce ſint
 ſtro ſerpenta. H p ♀ 36/ ♀ Δ) ○/r̄q̄. □ ♀. /v. j. ○ ♀ or. dex. hūc.
 Or̄io. i c. ○/v. j. ○ ♀ oritur ſpica ꝑ occidit 15./ j. ○ ♀ m c/ ſpica i c.
 30/viſq̄. ♀ occi. cū ſecunda ꝑ extra formam ꝑ H. 10./ Et ♀ ♀ occi. ſp̄
 ca oritur. 24/ Et □ ♀ occi. δ j c 15. ventū nubilofum excitabit
- 9 8 Mars. iſq̄ oritur cū umbilico Andromade Δ ♀. 17/ ♀ δ) H/ viſq̄. □
 δ i c ſpica oritur. 5/ Mercurius viſq̄. occidit cū nodo filorū Δ δ p ♀
 14. Et. j. ○ ♀ i c ſpica m c 11./
- 10 f r̄q̄. □ ○ i c dexter humerus Or̄idis occidit 20./ iſq̄ Δ) ♀/j. *) ♀
 Venus viſq̄. occidit cū Venere Ceti Δ H. 10. Mercurius viſq̄. occi. cum
 ſidlis extra formā ꝑ ꝑ H/ Et. v. j. □ ♀ oritur cantis maior i c. 4
- 11 g Quarta lunæ decreſcentis hora 1 mi/45 añ me. Aſcendente 27 gradu
 35 mi. ♀ cū quo prope oritur) cane minore cuſp̄a
 des occidit occupante. 44/ Cūber. ꝑ cum δ diſpoſita fere vt precedens
 Introitus Solis in ♀ hora 7 mi/9 añ me. Aſcendēte 4 gradu 12 mi.
 8/ Cūber. precedentis δ ꝑ cadens et retrograd⁹/
 δ in ſummo cardine/ in exaltatiōe ſua augebit ſignificatiōē per oppoſitio
 nē antecedentē pronuſſam. ○ m c cū ♀ 37./ Et i c cū ♀ 44./ ○ occi.
 arctur⁹ oritur. 25/v. j. □) ♀ Saturn⁹. ix oritur cū oculo 8 ○ δ/ licet
 δ dñator eclipſū/ et □ ꝑ δ/ In δ et □ eclipſis lūaris aurā calidā et ſic
 cā portēdūt/ tū ille oct⁹ ſer. aurā et hu. quā tēporis ratio poſtulat aliquot
 diebus añ et poſt faciet/ In nōnullis locis calidiorib⁹ tonitrua et fulm̄
 na/ in nōnullis grandinē minatur. Mars. iſq̄ oritur cum umbilico pe
 gaſi φ δ et ♀. 13/ Mercurius. ix cū ꝑ in filo ꝑ H et ꝑ 40/ Et viſq̄.
 occi. cum tertia ꝑ extra formā ꝑ H. 2/ Et xi. cum * in filo ꝑ 5/ Et δ
 ♀ occidit ꝑ oritur. 11 turbidum cum ventis
- 12 A Sol. vj occidit cum cornu ſequente ♀ Δ δ et H. 23/ Luna. j cum ꝑ
 in contactu ſep̄tērio. ♀ ꝑ et δ 50/ viſq̄. cum * ibidē 35/ viſq̄. □) ♀/
 ix. □) ꝑ/ Venus. v oritur cū 26 ſtella ☿ ꝑ H p ꝑ 4./ r̄q̄ □ ♀ m c
 δ occidit 54./ r̄q̄. □ ♀ i c dexter humerus Or̄ionis occidit 1./ Mar
 curius viſq̄. occidit cū umbilico pegasi φ δ et ♀. 2 nubiā
- b . j. δ ○ ♀ drā 6 grad/ 52 mi. . vj ○ oritur cum cornu ꝑ ſequente 6.
 r̄q̄. □ ○ i c H occidit. 10/ Luna. viſq̄ cū Δ in cornu ꝑ ♀ p δ ii./ j
 δ) δ drā 5 grad/ 24 mi. / iſq̄. *) ♀/ δ ꝑ ꝑ/ ventus calidus/ v. *
) ○/ viſq̄ □ δ m c ſomabant oritur 20./ viſq̄. ○ ♀ occidit lyra ori/. 9
- 14 c Sol occ. cū ♀. 35/ Et □ ○ occ. lyra i c 8./ viſq̄ Δ) H/ viſq̄. □ ♀ occi
 cidit preſepe m c 8
- 15 D Sol oritur cū antecedente cornu ꝑ Δ δ et H. 21/ Et □ ○ occi. ca
 nis maior m c. 13/ Similiter i c cū cauda Ceti Δ H. 24/ Luna. i cū *
 in cauda ꝑ ꝑ et H 21/ iſq̄. cum ꝑ in amphora ♀ et H 34/ v. cū ſtel
 la * ibidem differentia 20/ viſq̄ Δ) ꝑ/ . xi *) ♀/ . j. ○ ꝑ m c ꝑ i c

MARTIVS

24. .iij. ☐ ☽ oritur frons m. mc. 21. /j. ☽ ☿ i c ☿ me 6. / vij. ☐ ☿ 02.
 ☽ i c 18. / Et ☐ ☿ occidit lyra i c 5. venti calidi.
- 26 e Jupiter .iij. cum X. in genu sinistro pp ☿ p ☽ 32/ Mercurius m c
 et i c cum ventre ceti et cum stellis extra X X H/ vij. ☐ ☽ H/
- 27 f Sol occidit cum ventre Ceti Δ H 19. / Luna xij cum X in ventre
 X meridionalis 28/ Mars .iij. oritur cum humero pegasi φ ☽ et ☿
 2. nubila/ Mercurius j. m c cum astecedente cornu Υ Δ ☽ et H 17.
- 28 g Noua luna Aprilis hora 8 mi/ 40 post meridiē/ Ascendēte 4 gra
 du 19 mi. m. Guber. ☽ cum ☿ calidior pae
 cedē/ xij ☐ ☉ m c somahant occidit 16. / vij ☐ ☽ oritur lyra m c o/ et
 diu durabit/ auram reddet temperatiorē/ Mercurius fit descendens fa
 ciet ventosam auram/ v. * ☽ ☿ .iij. * ☽ ☽/ .v. ☽ ☽ ☿ differentia
 5 grad/ 33 mi.
- 29 A Sol oritur cum vtre X meridio. X H 24. / Et oc. cū cruce pegasi φ
 ☽ et ☿ .5. / i * ☽ H/ ix. ☽ ☽ ☿ ☿ Saturnus coniungitur * et est secū
 da extra 8 35/ Mars j. coniungitur stellis in unscida pegasi * / ab al
 tera distat 6 mi. ab alijs plus vno gradu/ Et vij. ☐ ☽ i c lyra oritur. 15
 Venus vij. occidit cum nare Ceti Δ ☽ et ☿ 12.
- 20 b ☐ ☉ m c presepe oritur 7. / .vij. ☽ ☽ ☽ dīā 3 gra/ 46 mi. / xij ☐ ☽ ☽
 21 c .vij. ☐ ☉ or. lyra m c 26. / v. * ☽ H/ Luna .ij. cum * in cora po
 strema Υ ☽ 27/ ij. cum X in cauda Υ ☽ 18/ Mars .vij. m c cū del
 phino Δ H et ☽ .1. / Et ☐ ☽ m c frons m. occidit. 21. / Et ☽ ☽ m c pae
 sepe i c .19. / iij. ☽ ☽ oritur presepe occidit 15. / vij. ☽ ☽ i c presepe m
 c 5. nebulosum fortassis.
- 22 d .vij. ☽ ☽ or. spica occidit .3/ Luna ij. cū Δ sub oculo 8 H p ☿ 48/ vij.
 cū alia Δ supra oculū septentrio. 8 H p ☿ 53/ vij. cum stella ☉ in oculo
 8 differentia 1 gradu 15 mi. nubila/ X * ☽ ☽/ v. Δ ☽ ☽/ Mercu
 rius fit retrogradus ventum movebit.
- 23 e ☐ ☉ m c Canis minor oritur 4. Luna .ij. cum X in origine cor
 nu 8 H p ☿ 9. / vij. cū * in cornu 8 meri. ☽ 43/ eadem hora cū alia X in
 cornu 8 ☽ 42. / vij. ☽ ☽ H dīā 2 grad 54 mi. / X * ☽ ☽/ Mercurius
 vij. occidit cum Angetenar Δ H .4 diu durat propter regressionem.
- 24 f .vij. ☐ ☉ oritur Canis maior i c. 21. / Et vij. ☐ ☉ oc. canis minor m
 c. 26/ Luna .ij. cū * extrema in claua Ordis Υ et H 58. / j Δ ☽ ☽/ X ☐
 ☽ ☽ .ix. * ☽ ☽/ Mars ix. cum * in ceruice p c 7/ xij ☽ ☽ occid.
 canis minor oritur .2. nebulas suscitabit/ j. ☐ ☽ m c canis maior oritur
 .13/ et diu durabit propter retrogradationem/ venti sereni.
- 25 g Quarta Lunæ crescentis hora 4 mi/ 49 post meridiem/ Ascen
 dente 26 gradu 28 mi. pp cum quo
 oritur procedens vindemiatorem Δ H et ☽ dīā 1 grad/ 21 mi. cuspide oc
 ciduan possidentibus Venere dīā 1 grad/ 56 mi. Et humero pegasi ☽ et
 ☿ 19/ Gubernā. Υ cum ☿ ventosa erit et propter vindemiatorem in ascen
 dente et Venere in annulo occiduo/ qñqz ad humiditatem tendet/ Mars
 vij. i c cum cauda Cigni φ ☽ et ☿ .15/ Luna xij cum Δ in clune sint
 stro II sequentis H 10/ vij. cum alia * sexta extra II 39

APRILIS

- 2 **A** .v. ☉ oritur canda & occidit. 14/xij ☉ m c .iij. ☿ 30. /iij. ☽ ☉ ☿ 54 ml. vij. ☉ occidit cum umbilico pegasi ☽ ☿ et ☿ .4 /Et occidit cū ☿ 57./xij. ☉ i c cū ☿ 32. Venus. Venus fit directa/et oritur cum 26 stel la ☿ X H. p. ☿ 3./ et durabit per diem ante et post./vij. ☐ ☽ m c ocul? H oritur .5/xij ☐ ☽ occidit ☿ m c 17. Mercurius vj. occidit cū ter tia extra X X H 19.
- 3 **b** ☉ m c et i c cū stellis extra X X H/ Et vij. post ☉ ☉ oc. Lyra ori. .26 Luna .ij. cū stella * infune lancis meridie. H p ☽ differētia 17/ ☿. cum X iuxta lancem septentrionalē 45/et est 5 extra ☿ .vij. ☐ ☽ ☽ Mer curius ij. cum Δ in filo X H et ☿ drā 11/xij ☽ ☿ m c 7/ i c .5/ vij. oc. cum stellis extra X X H pluuosum cum ventis frigidis
- 4 **c** Sol m c et i c cum stellis extra X X H/ et m c cū ventre Ceti Δ H 16. Similiter m c cū antecedente cornu Y Δ ☽ et H. 9/ Et ☐ ☉ occi. prese peme .20/xij Δ 1 ☽/ vij. ☽ cur X in dorso ☽ drā 5 pluuia frigida/ Mercurius fit meridie. et occ. vij. cū stellis extra X X H/ et Jupiter fit descendens/ i c. ☽ ☿ et ☿ drā a diametro 48 ml. valde ventosum
- 5 **d** ☉ m c cū cornu sequē. Y Δ ☽ et H. 16/ Et i c cū eadē drā 15./ Et m c cū capite trianguli ☿ 23. Luna .i. cū * in cruce sinistro serpen. H p ☽ 41 xi. ☽ ☽ H/ et * ☽ ☽ Saturnus m c / iij. cum hirco ☉ ☽ et ☿ .2 alterabit aurā ad remissum calorem cū nub. et vētis Venus iij. occ. cum humero pegasi ☽ ☽ et ☿ 12. et durabit aliquot diebus ante et post/ In parua drā/ nebulas sepe suscitabit/ Mercurius vj. occidit cū nodo filo rim Δ ☽ et ☿ .9/ Et fit ☽ ☿ occidit ☽ oritur 6. venus.
- 6 **e** ☽ ☉ oritur ☿ occidit 25./ ☉ m c cum nodo filorum Δ ☽ p ☿ .17/ Et i c cum eadē drā 29./ Mercurius vj. occ. cū secunda extra X X H/ Et fit ☽ ☿ occidit spica oritur .22./ vij. ☐ H oritur ☽ m c .21
- 7 **f** ☐ ☉ m c canis maior oritur 6./ Et ☐ ☉ i c canis minor occidit .15/ ☽ ☽ oc. canis maior oritur 8./ Luna .i. cū * in cruce sinistro serpen. H p ☽ 41/ Et ☐ ☽ ☽/ v Δ 1 ☉
- 8 **g** Sol occidit cū Angetenar Δ H .27/ Luna .i c cū X in contactu sep tentrionali ☽ ☿ et ☽ 30/ vij. ☐ ☽ ☽ Jupiter vj. oritur cū spica ☽ ☽ ☽ p ☽ .3 auram tēperatam cū humiditate aliquali portendit./ iij. ☐ H i c canda ☽ oritur .2 turbidum/xij. ☽ ☽ occ. postrema fluminis out. .15./ iij. ☐ ☽ oritur dexter hume. Oriōis i c 4.
- 9 **A** Quarta Lunæ decrefcētis hora 8 mi/ 21 post me. Ascendēte 15 gradu 28 ml. m cum quo ori. caput serpentarij ☽ H p ☽ 16. In angulo occiduo sinistra pes Oriōis ☉ ☿ et H .14/ Et Luna est prope cornua ☽ applicat enū eis dē/ Guber. H cum ☽ disposita fere vt precedens ad intemperie declinans. Sol or. cū prima X extra X H .23 Et ☐ ☉ m c postrema fluminis oritur 27./ .i. ☐ ☽ ☽/ iij. cum * in contactu septentrionali ☽ ☿ et ☽ 55/ j. * ☽ ☽ xi. ☽ ☽ i c spica m c o

10 **b** Sol .v. oritur cum tertia extra X X H .1/ Et occidit cum cornu antec dente Y Δ ☽ et H .15

INTROITVS Solis in 8 hora 12 mi/ 8 post me. Ascen dente 0 gradu 55 ml. ☽ Guber. prese
C 3

APRILIS

cedentis ♀ non admodum fortes/ob id dominium ♀ ratione eclipsi ma-
gis incedetur et declinabit aura ad calorem et siccitatem/ix. Δ) ♀/ Mars
h̄ coniungitur stelle Δ in cauda ♀ 7 et ♀ dr̄ 1 grad/ 8 mi./Et v. *
♂ ♀/ Venus. it̄q̄ oritur cum 27 stella ☿ X ♀ p 7 differentia .13/
♂ ♀ ♀ m c spica i c. 11.

11 c ♀ ☉ m c cauda ♀ occidit .11/ ♂ ☉ m c Arcturus i c 5./ Luna
♂ cū * in cauda ♀ 7 et ♀ 25/ h̄ * ♀ ♀. it̄q̄ ♂) ♀ dr̄ 5 grad/ 6
mi.. ix Δ) ♀/ Mars ♀ occidit cū cauda ♀ 7 et ♀ 8./Et ☐ ♂ oc.
Arcturus i c 19./Et sic Marte occidente cū cauda ♀ ☉ m c arcturus i c
Imbriem cum ventis minatur/in nonnullis locis toni. et ful. cum grandis
ne/ sed anticipabit per diem/ v. ☐ ♀ occidit canis minor m c 10.

12 d Mars est circa stellas in cauda ♀ 7 et ♀ r̄q̄ occidit cum aquila ☐ ♂ et ♀
13. v̄q̄. m c cū cauda ♀ .10/ plu. cū ventis/ sed fortassis per diē anticipa.

13 e Sol occ. cū sequente cornu γ Δ ♂ et ♀ 13./ Luna ♀ cū x in ventre
X meri/ 45. v̄q̄. ☐) ♀/ Venus .X m c cum umbilico pegasi ☐ ♂ et
♀ .13/ Et X. i c cum eadem. 5

14 f .X ♂) ♀ 1 grad/ 56 mi.. ix Δ ♀ ♂/ Mercurius fit descendens ven-
tosum valde/ Venus .4 oritur cū 28 stella ☿ X ♀ p 7 .17/ r̄q̄ ☐ ♀ i c
cor 2 occidit o/ calorem Martis mitigabit aſ et post cū nub. aliubi cū plu.

15 g Mars. it̄q̄ or. cū cauda ♀ 7 et ♀ 3 plu./ h̄. *) ♀/ it̄q̄. ♂) ♀ 2 gra-
20 mi. / xi. ♂) ♀

16 A .h̄ *) ♀/ v ♂ ♀ oritur cauda ♀ occidit 15.

17 b Noua Luna Man̄ hora 7 mi/ 14 anteme. Ascendēte 21 gra/ 37 mi.
☿ cū quo fore or. cornu m c. 8 Δ ♂. 19/ Guber.

♀ cū ♀/ etsi mars vniversalis dñator est/ sit in culmine celi fere et stella sue
nature in ascendente calore multū intenderē/ tñ Venus fortis in m̄sū do et fi-
gura aliquid adimet/ Sol. v or. en̄z secunda X extra X/ ♀ .20/ Et ☐ ☉
occidit cauda ♀ i c 22. turbidum. Luna xi. cum X in cauda γ ♀ 24/ it̄q̄
♂ ♂ oritur cor ♀ occidit 5.

18 c Sol or. cum quarta X extra X ♀ p 7 .5/ Et ☐ ☉ or. canis minor i c 15.
Luna. it̄q̄ cōiūgitur oculo 8 dr̄ 1 grad/ 11 mi./ v̄q̄ ☐) ♀/ X. *) ♀/ r̄q̄.
Lūa cū Δ sub oculo 8 44/ h̄ ☐ ♀ i c ♂ or. 8./ it̄q̄ ♂ ♀ oc. ♀ oritur/ r̄q̄
♂ ♀ m c spica i c. 2/ r̄q̄. ♂ ♀ i c spica m c 11. ventus/ Venus. it̄q̄ orit.
cū 29 stella ☿ X ♀ et ♀ .2

19 d ☉ oc. cor 2 m c 13. Luna. h̄ cū Δ supra oculus septē. 8 ♀ p 7 26/
r̄q̄ cum X in origine cornu merid. ♀ p 7 12/ it̄q̄. cum X in cornu meri.
♂ 38/ ix. ♂) ♀ 3 grad/ 14 mi./ r̄q̄. *) ♀/ v̄q̄. ♂ ♂ i c cor 2 m c
.10/ v. ☐ ♀ occidit canis minor m c. 8

20 e Sol v̄q̄. oc. cum lucida transfri navis ☐ ♂ .2/ it̄q̄ Δ) ♀/ r̄q̄ Δ) ♂
r̄q̄. ☐) ♀/ Mars vj. cōiūgitur in X ancha sinistra ☿ ♀ p ♀ 27/ h̄
☐ ♂ or. sint. pes Orionis i c. 4/ v̄q̄ ☐ ♂ m c arcturus occidit. 8/ ♂ ♂ m
c cor 2 i c 14. nabilia/ Venus. it̄q̄ or. cum cruce ☿ Δ ♀ p ♀ .7/ it̄q̄. ♂
♀ occidit/ arcturus oritur .14/ ix. ☐ ♀ i c dexter humerus Orionis. 10/ 13

21 f Sol. v or. cū media pleiadus *) et ♀ .10 plu. aliubi nubila tantum.
Luna vj. cum Δ in clune sinistro ☿ sequētis ♀ 30/ it̄q̄. *) ♂/ Mars. v̄q̄

APRILIS

- m e cum ventre X mēti. X H. 15/ et vñ. i e cum eadē 6./ rñ ♂ ♀ occ. 602
 Ω oritur 7. ventos calidos mollebit/ in nonnullis locis to. et ful. cum im-
 bre/ Venus iñq. occ. cum nave Ceti Δ H. 31. rñ ♂ ♀ m e 7 i e .23/ Mer-
 curius ix. cum ix. in filo X 1 grad. 13 mi. / rñ. / vñ. i e 7 i e m e ventosum
- 22 g** Sol oritur cuz prima pleiadum * J et 7. 11. / vñ. □ ○ occi. ♂ i e .14
 Et ♂ ○ occ. oculus 8 oritur 17. / Et i e cum capite meduse ♀ H p 2 .15
 nub. vel plu. Luna .i. cum * quinta extra II 38/. iñ □) ♀. / iñ □) ♀
 j. ♂ ♀ ♀ / Et viñ. coniungitur spice m p 2 p ♂ / 4 grad/ 3 mi.
- 23 2** Quarta Lunæ crescētis hora 10 mñ/ 24 post me. Ascendēte 19 gra-
 du 3 mi. R cum quo oritur delphinus Δ H
 et ♂ 5. mi. In angulo occiduo caput meduse ♀ H p 2 10. / In culmine
 74 statuitur .12/ Imum celi ♀ possidet 2 grad/ 12 mi. Suber. 7 cū h tenu-
 peratioꝝ precedente in serenitate multum tamen ventosa/ Sol m e cuz ca-
 pite meduse ♀ H p 2 14. / vñ. □ ○ occ. ♂ i e 13. / iñ Δ) ♀ v. ♂ ♀
 oritur ♀ occidit 29. / rñ. *) H
- 24 b** Sol occi. cum umbilico Andromade Δ ♀ .26/ Luna. v cum X in
 palma sinistra pedis precedentis Ω 14/ iñ. cum alia X in genu sinistro pe-
 dis precedentis Ω 36/ vñ *) ♀. ix Δ) ♀ ix. ♂) ♂ / rñ. □ ♂
 occidit postrema fluminis m e .6/ Mercurius .iñq. oritur cum secunda
 extra X X H. 6/ ix. coniungitur X in filo X drā 1 gra/ 4 mi/ h et ♀
 i e v. occidit cum secunda extra X X H 23. nubila cum ventis.
- 25 c** ○ .i. cum X in cauda Y ♀ drā 1 grad/ 4 mi. / Et rñ m e cum pos-
 trema fluminis ● ♀ .16/ Et rñ. i e cuz eadē 13. / Luna. iñ cuz X in
 palma sinistra pedis precedē. Ω 56/ ix. cum * quinta extra Ω 8/ rñ. cum
 * in extremitate postreme palme 36/ Saturn⁹ q̄. m e cum sinistro pe-
 de Orionis ● H 1. / Et i e cum eadem drā .2 aura ante et post sepe nubi-
 losa alibi plu. / iñq. □ ♀ occidit lyra i e 3. Mercurius .iñq. cum ter-
 tia X extra X H 11. / Et occidit cuz nodo florum Δ ♂ p ♀ 8. / Et sit
 ascendens in latitudine/ nubila cum ventis.
- 26 d** Sol. v oritur cum nodo filorum X Δ ♂ p ♀ 25. / Et m e cum dextro
 latere persei Δ ♀ et H 19. / Et occidit cum sinistro pede Orionis ● ♀ et
 H .21/ □ ○ oc. Somahant i e 24. / Imber in quibusdā locis cuz to. et ful.
 .vj □) H. vñ Δ) ○ / Mercurius vñ. cum stellis quibusdam in filo
 X ab una distat 57 mi/ ab alijs plus vno gradu in septentrionē et meridiē
 declinantibus/ Et m e et i e cum illis sepe nubilosum.
- 27 e** Mercu. viñ. ē inter duas stellas in filo X X H et ♀ drā plus vno gra/
 Et m e et i e cū illis turb. / iñq. □ ♀ oc. canis maior m e .1/ vñ. ♂) ♀
- 28 f** v. ○ cū X in cauda Y ♀ 1 grad/ 50 mi / Luna. v. cum spice m p ●
 ♀ p ♂ drā 2 grad/ 39/ vñ. ● * in cora sinistra m p ♀ p ♂ 27/ rñ. cū
 alia * ibidē 33/ j. Δ) H v. ♂) ♀ drā 1 grad. 24 mi. Mars rñ
 occ. cū cruce Δ ♀ p H. 6/ Et vñ. i e cum Somahant ● H p ♀ .16/
 Venus .iñq. oritur cuz cornu Y sequēte Δ ♂ et H 28. / Et .ix m e cum
 cauda Ceti Δ H .23/ Imat quoqz celum ix. cum eadem stella differētia 2.
 Mercurius m e et i e cum stellis in filo X et ascendente et sequēte cornu
 Y / Et v. occidit cum umbilico pegasi ♀ ♂ et ♀ .35

APRILIS

- 29 ♁ .iij. ♁ ♁ ♁ in genu sint. ♁ ♁ p ♁ 27/.ix. ♁ ♁ ♁ vj. Δ ♁ ♁ Mars .vij. m c cū Soma. ♁ ♁ p ♁ 5./et coniungitur cum ♁ in ancha dextra ♁ p ♁ 55/ Jupiter .iij. cōiungitur ♁ in cora sinistra ♁ ♁ p ♁ 20/ Venus .iij. occ. cum ventre Ceti Δ ♁ 10/ Mercurius m c et i c cū no do filorum/ Et v. ♁ ♁ occidit lyra oritur .31
- 30 ♁ .vij. \square ♁ i c sinister pes Orionis occidit 8. Venus .iij. oritur cum cornu ♁ ascendente Δ ♁ et ♁ 7./ ♁ \square ♁ m c canis maior oritur 34. v. \square ♁ occidit presepe m c. 7/ ♁ \square ♁ i c canis minor occidit 20.

MAIUS

Saturnus hoc mense mediat atqz imat celsū cum sinistro humero Orionis ♁ ♁ et ♁ / Et 17 die habet Tetragonū per angulos cū cauda ♁ / ipse enim oritur et cauda m c Martis calorem mitigat cum nubibus / in quibusdam locis cum pluuia. Jupiter occidit 4 die cum cauda Ω ♁ ♁ et ♁ / Et 16 die mediat atqz imat celum cum spica ♁ ♁ ♁ p ♁ / Idem 29 die faciet cum caude vrsē maioris media ♁ ♁ et diu durabunt hec meditationes auram tēperatiōem reddent/ hoc idem portendit ♁ ♁ in longitudine et latitudine que fiet 13 huius mensis fere in loco eclipsis ♁ / Et ♁ ♁ ♁ ♁ et ♁ / que fiet 16 die huius mensis

- 1^b Plena Luna Maij hora 10 mi. 2 anteme. Ascendente 7 gradu 9 mi. Ω Ioue Iunū celi possidente drā 2 gra. 9 mi. / ♁ aspiciet Δ aspectu ascendens. Cūber. ♁ cū ♁ ad intēperie disposita. Sol oritur cum Somahant ♁ ♁ p ♁ .5 turb. vel pluuiof. Luna .v. cum ♁ in medio lancis septentrionalis ♁ ♁ p ♁ 39/ Alioqui cur su vacua. Mercurius .iij. oritur cum secunda extra ♁ ♁ .15/ .ix. \square ♁ m c Somahant occidit 8. / ♁ \square ♁ occidit pleiades m c .10
- 2^c Sol m c cum prima pleiadum ♁ ♁ et ♁ .19/ Et i c eam eadem 9./ et cū media pleiadū .10 nubilū/ alibi plu. Luna .vij. cum ♁ in cruce sinistro serpentarij 44/ ♁ ♁ ♁ / Mars .ij. oritur cū capite triaguli Δ ♁ 13/ Mercurius .j. coniungitur ♁ supra comā Ceti ♁ 48/ Et .iij. oritur cum quarta extra ♁ ♁ ♁ 7./ Et \square ♁ oritur canis minor i c 19. ♁ ♁ i c arcturus m c .2/ plu. cum ventis.
- 3^d Sol m c cum media et vltima pleiadum ♁ ♁ et ♁ 19. nub. ♁ ♁ ♁ / ♁ ♁ ♁ / Venus .iij. oritur cū ventre ♁ meridio. ♁ ♁ 11./ Et .iij. occum cruce pegasi ♁ ♁ et ♁ 10./ Mercurius v. occidit cū Angetenar Δ ♁ .9/ ♁ \square ♁ m c cauda ♁ occidit 16./ Et ♁ ♁ m c arcturus i c 32. vent.
- 4^e Sol m c cum vltima pleiadum 7./ humidū/ ♁ ♁ ♁ / ♁ ♁ ♁ / Saturnus .ij. i c cum cornu septentrionali ♁ ♁ ♁ .2/ Et .ij. m c cū eadē 2./ Et .iij. ♁ cum ♁ tertia extra ♁ 31 mitigat calorem ♁ ante et post/ Jupiter .iij. occidit cū cauda Ω ♁ et ♁ .3 tēperiem aeris faciet/ ♁ \square ♁ m c presepe oritur 21./ Mercurius v. occidit cum cornu ♁ antecedente Δ ♁ et ♁ 9
- 5^f Sol oritur cum cauda Ceti Δ ♁ 11/ Luna .vij. cū ♁ in contactu septentrionali ♁ ♁ et ♁ 30/ ♁ \square ♁ / Ven^o fit meridionalis/ Et .iij. \square ♁ oritur lyra

MAIUS

- oritur Saturnus 2 grad^o 45 mi. Guber. precedentis & satis fortis inter
 daretur calor multū propter J in celimedio et stellā sue nature in ascen-
 dente Saturn^o tñ ibidē et die sequenti S J Q in longitudine et latitudi-
 dine remittit nonnullū caloris. Sol viij. occidit cū nebulosa Orionis
 14./ Luna rñ. cum X in filo X H et 7 drā 56/ Saturnus .ix cum X
 quarta extra 8 47/ Mars .vij m c cū humero pegasi φ J et 7 14./ rñ
 occ. cum 28 stella ☿ H p 7. 4. q̄ S 7. ix S Q mc 7 ic .14/ ix.
 S Q ic 7 mc 18./ Mercurius .xj m c cum postrema fluminis ● 7
 32./ et cum latere dextro persei φ 7 et H 9./ vi. occ. cum umbilico andrō
 made Δ Q .17
- 13 g .iij S J 7. v * J H. vi S J Q 5./ q̄ S in longitudine et lati. aura ad
 humiditatem disposita cū nubibus/in nonnullis locis pluuosum valde.
 iij. * H Q/ Mars rñ occidit cum 29 ☿ X H .3/ Venus .ix cū X
 in fusione ☿ drā 1 gra/30 mi./ Mercurius .iij oritur cū Somahāt ●
 H p 7. 8./ Et coniungitur cum X in cauda γ Q 59/ Et vi. occidit cum si-
 nistro pede Orionis ● 7 et H. 20/ Et □ 7 occidit Somahant i c 25.
 pluuosum et ventosum
- 14 A Sol .iij oritur cum ventre Ceti Δ H 14./ Luna viij. cum X in medio
 postreme coxe γ 58/ X. * J S/ Mars .vij m c cum 26 stella ☿ X H
 p 7. 12/ Et viij. ic cum eadem stella drā 10. et cū 28 eiusdem. 4/. q̄ □ S
 oritur dexter humerus Orionis ic 15./ rñ S J occidit cauda Ω oritur. 4/
 Venus iij. occidit cum secunda X extra 4./ Mercurius .ij cum X i cau-
 γ Q 16 nubilosum/in nonnullis locis humidum.
- 15 b rñ. □ ○ m c cauda Ω oritur s./ ○ viij. ic cum oculo 8 .6 nubi.
 Luna .vij cum X in cauda γ 50/ iij. S J 7 differentia 1 gra/29 mi.
 Mars .vij m c cum 28 stella ☿ H p 7 17./ viij S cum X in fusione ☿
 drā 1 gra/16 mi. Et viij. ic cum 27 stella ☿ .6/ rñ. coniungitur cum X
 in fusione ☿ H p 7 7 turb. aliubi plu.
- 16 c Noua Luna lunij ho/ 5 mi/ 28 p^o/ Ascendente 17 gra/47 mi. ☿ cū
 quo oritur spica ♃ ● .3 Jove fere ascendens oc-
 cupante drā 3 gra/51 mi./ Venere cuspidem occidua tenente drā 1 gra/ 11
 mi. et fitilla S fere in loco significatoris eclipsis Solis circa hiades/ et
 ascendens est oppositus locus eclipsis Solaris/Guber. 7 cum 7 vento
 sa ficeret/etiam calida satis et sicca/nisi benefice stelle angulos tenerent/et
 Jupiter medietet celum cū spica que declinat ad temperamentū pro qua-
 litate tēporis satis tñ humida in nonnullis locis. Lūa. viij cū Δ sub o
 culo 8 H p 7 59/ j. cum oculo 8 ● S differentia 1 gra/ 6 mi/viij.
 cum Δ supra oculum septentrionalem 8 H p 7 14/ Sol rñ m c cum
 oculo 8 ● S .23/ Jupiter .ix ic cum spica ♃ ● Q p S 1./ Et ix.
 mc cum eadem stella ○ declinat ad temperamentum aeris. Mars .j
 oritur cum vigesima septima stella ☿ X H p 7 16./ viij m c cū vigesima
 septima stella ☿ X 14./ rñ occidit cum vigesima sexta stella ☿ X H p
 7 11./ ab alia ibidem 16./ viij. ic cum 29 stella ☿ ○ turbat aerem./ iij S
 Q oritur cauda Ω occidit 15. Mercurius .iij oritur cum cauda Ceti
 Δ H 24./ Et .xj mc / rñ. ic cum pleiadib^o * J et 7 nnb. cum ventis.

MAIVS.

- 17 d** Sol viij. occidit cum dextro humero Orionis ● ♃ et ♄. 20 Timber/ toni. fulmi. et venti. / Luna. scum X in origine cornu 8 me. H p ♄ 55/ Ab alia in cornu 8 X ♃ 75. / iij □ ♃. ix Δ ♃ ♄ / iij ♄ H differētia 3 gra/ 25 mi/ vj. * ♃ ♄. v □ H oritur cauda ♃ m c 2. / remittit ca lora antea et post/ Venus iij. occidit cum prima X extra X H 5. / et cum quarta 10. / Et v. cōiungitur stelle Δ infusione ☿ H p ♄ 1 gra/ 26
- 18 e** Sol. iij. oritur cum cornu septentrionali 8 ♃ ♄. 6. / vj □ ♃ m c dexte humerus Orionis oritur .9/ Venus ij. cum X H differētia 1 gra. 35 mi. prima extra X / iij. occidit cum tertia extra X X H .21/ ix. i c cum prima X extra .18/ Mercurius .xj m c cum Angetenar Δ H .21/ Et xj. i c cum eadem stella 35. / vj. □ ♄ occidit ♃ i c 3. / Et ♄ ♄ occi- frons M oritur .45 ventus calidus
- 19 f** Luna. iij. cū Δ in clune sinistro II sequentis H 50. / ♃ cū * quinta extra II 57. / vj Δ ♃. / ix □ ♃. / ix. □ ♄. Venus .ix mediat et ix. i c cū stellis extra X X H vj. cōiungitur X est secūda extra X 1 gra. 19 mi. / Mercurius vj. occidit cum prima pleiadū * ♃ et ♄ 44. / et cum media pleiadum. i/ Cum cane maiore ● ♄ et ♃ .28 magna tēpe- stas cum imbrib⁹ to. ful. et ventis/ in nonnullis locis cum grandine/ .xj ♄ m c frons M i c 7.
- 20 g** .vj * ♃ ♄. / xj. * ♃. / Mars. j. oritur cum 28 stella ☿ X H p ♄. 15/ xij occidit cū lyra ● ♄ et ♄ drā. 16/ vj. □ ♃ i c frons M ori- 15. Timber cum to. et ful. / Venus .ix m c cum stellis extra X X H/ Et ix. i c cum eisdem itidan cum ventre celi et cornu antecedente ♃ iij. occid. cū umbilico pegasti ♃ ♃ et ♄ 18. turb. Mercuri⁹ vj. occ. cū oculo 8 ● ♃ o/ ♄ oc. cor Ω m c 40. / iij □ ♄. presepe i c. 25/ Et ♄ ♄ o2/ frons M oc/ 21. / xj. □ ♄ i c presepe occidit .41 timber cū to. ful. et v⁹/
- 21 A** xij □ ♃ m c lyra occidit 10. / Luna j. cū X super palmam sinistra pedis precedentis Ω 17/ Et ♃. cum X in genu sinistro pedis precedentis Ω. 41. / vj * ♃ ♄. / ij. * ♄. Saturnus. iij. cum Δ in cornu merid. 8 ♄ drā 1 gra/ 19 mi. Et j. m c cum eadem stella. 4/ vj. □ ♃ i c pleia- des occid/ 18. / Venus .ix m c et ix. i c cum stellis extra X/ similiter capi tetrianguli/ iij. ♄ ♄ occidit lyra oritur o/ Mercurius. iij. oritur cū ventre Ceti Δ H .28. / xj □ ♄ m c postrema fluminis occidit 49/ vj. occi- dit cum nebulosa Orionis 6.
- 22 b** Saturnus. j. i c cū cornu merid. 8 Δ ♃ o/ Venus .ij. oritur cum pris- ma X extra X H. 8/ Et .ix m c cū nodo filorū Δ ♃ p ♄ .52/ et cū cor2 nu sequente Δ ♃ et H 28. / iij. □ ♄ occidit presepe m c 2. / Et ix. i c cū no do filorū .4/ Mercuri⁹ xj. i c cū ocul⁹ 8 ● ♃ .29 nubila/ vj. □ ♄ m c cauda Ω oritur .42/ iij. □ ♄
- 23 c** Quarta Lunæ crescētis hora 5 mi/ 55 añ me. Ascēdente o gra/ 56 mi. S/ Luna cū * in extremitate po- streme palme Ω drā 14. / iij cū * quinta extra Ω drā 15/ iij. ♃ ♄. / vj. □ ♄ H/ Timber. ♄ cū H non valde fortes/ tū ♄ circa hiades et circa locum sig- nificatoris eclipsis ventosam faciet aurā/ nonnūquā cū hūiditate/ vj. □ ♄ i c canis maior oc. / 4/ Ven⁹. ij. 02. cū tertia X extra formā X H 20. /

MAIUS

- Et. in e cunctis hodie filorum X 26. / Et ☐ ♀ m e canis maior oritur
 9 / Mercurius .ij m e cum oculo 8 ● ♂ 25.
- 24 d Sol .xij m e cum auriga ● ♂ et ♀ .12. / Et ☐ ☉ m e ♂ occidit .5 /
 Et ♂ oc. cū cauda Ceti Δ H 0 / rñ. i e cum auriga ● 17. / ☐ ☉ i e cau
 da ♀ oritur intēdit calore cum to. et ful. in nonnullis locis imber / ix. ☐
 ♀ i e canis minor occidit .28 / Mercurius .iij oritur cum cornu septen
 trionali 8 ☐ ♂ 2. / Et vñ. oc. cū dextro hu. Orionis ● ♂ et ♀ 41.
 augebit calorem / in quibusdā locis cū toni. ful. et imbribus.
- 25 e Sol .iij oritur cum oculo 8 ● ♂ 14. plu. cum to. et ful. / rñ. ☐ ☉
 i e cor ♀ occidit 21. auget calorem / Luna .xj. cum spica ♀ ● ♀ p
 ♂ drā 2 grad^o 47 mī. / vj Δ) ♀ / iij. Δ ♀ ☉ / vij. ♂) ♀ 1 grad^o
 22 mī. / Mars .i oritur cum 29 stella ☿ h p ♀ .i turbidum / rñ ☐ ♀
 m e / ♀ occidit .50
- 26 f Sol .xij i e cum sinistro pede Orionis ● H .i nub / Luna .ij cum *
 in cornu sinistra ♀ ♀ p ♂ 32. v cum * ibidem 28 / .vij cū X in genu
 sinistro ♀ 18 / rñ. ♂) ♀ / vj. ☐ H ♂ declinat ad aeris intēperantiā /
 vñ. ☐ ♂ i e oculus 8 occidit 1. / Venus .iij. occidit cum Angetnar
 Δ H .13 / Mercurius sit septentrionalis ventosum.
- 27 g Sol in e cum sinistro pede Orionis ● H 28. / iij. Δ ♀ ☉ / Et vij. oc.
 cum cornu meri. 8 Δ ♂ .18 / Et i e cum cornu septētrionali 8 ☐ ♂ .9 /
 Luna .ij. cum * in fime lancis septentrionalis = H p ♂ 5 / rñ ♂ ♂
 occidit sinister pes Orionis m e 11. / vij. ♂ ♂ i e cauda ♀ m e .14 au
 gebunt calorem et serenitatem / ix. ☐ ♀ m e cauda ♀ occidit .21 / ♂ ♀
 m e arcturus i e .5 / ix. ♂ ♀ i e / arcturus m e 24. / Mercurius .ix m
 e cum auriga ● ♂ et ♀ .21 / Et rñ. i e cum eadem stella 36. / ☐ ♀ i e /
 cauda ♀ oritur 21. / Et ☐ ♀ i e cor ♀ occidit .17
- 28 A Sol m e cū cornu septentrionali 8 ☐ ♂ 20. / Luna .vj cum X in me
 dio lancis septentrionalis = H p ♂ 32 / X. cum alia stella X in lāce sep
 tentrionalis = 58 / iij. Δ) ♂ / Mars .i oritur cum cruce ☿ Δ ♀ p
 H 14. / .vj ♂ ♂ m e cauda ♀ i e .5 / Venus .iij. occidit cum antecede
 te cornu Y Δ ♂ et H .7 / Mercurius .iij oritur cū oculo 8 ● ♂ 3. /
 rñ. m e cum sinistro pede Orionis ● H 42. / Et rñ. i e cum eadem stella
 15. / ventosum et nubilosum / in quibusdā locis plu. to. et ful.
- 29 b Jupiter .vij. mediat celum cum media caudēse maioris / Et. iij Δ
 ♀ ♀ et diu durabit propter tarditatē motus ad calorem et serenitātē des
 clinat cū ventis calidis ante et post / Venus .ij oritur cum secunda X ce
 tra formam X H .12 / Mercurius .xij m e cum cornu septentrionali 8
 ☐ ♂ 4. / vij. ♀ occidit cū ☉ .27 / et occidit cū H .39 / venti nubilosi
- 30 c Plena luna lunij hora 12 mī / 27 postime. Ascendente 16 grad^o 38
 mī. X / Guber. ♀ cum ♀ ventosa valde / a p rñci
 pio tamen propter ♂ H ☉ / et ♂ H ♀ satis remissa erit in calore cū hūi
 ditate tamen / timendus quoq; terremotus in nonnullis locis / pfectum ma
 ritimis / vj. *) ♀ / rñ. ♂) ♀ / Sol m e cum cornu meridionali 8 Δ
 ♂ .5 / Et m e cū ♀ .15 / Et i e cum cornu 8 23. / similiter i e cū ♀ 14. / vij.
 ☐ ☉ occidit ♀ m e 23. / ☐ ☉ occidit spica m e 1. / ♂ ♀ 19 / 30 ☐

M A I V S.

♄ in c h occidit et diu durabit ante et post. □. ♀ oritur canis minor 8
 c 29. / Mercurius in c cum cornu 8 meridionali Δ 3. 20. / et i c cum
 eadem stella 37. / i c etiam cum h. 27. / Et occidit cum capite meduse □ h
 p 45. / □ ♀ occidit spica in c 44. ventosum valde ante et post.

31 d Sol in c cū nebuloſa Orionis .23/ et ☉ in c cum h .24/ Et i c cū eadē
 5. / Et i c cum h 8. / Saturnus xij in c cū nebuloſa Orionis 1. / Et in
 c cum ♀ 19. / Et i c cum eadem .3/ Mercurius in c cum nebuloſa Ori
 onis 20. / et i c cum eadem .58/ .iij □ ♀ oritur cauda 70 in c .42/ .viij □
 3 in c ſin. ſter pes Orionis oritur .11/ xij 3 occidit cum ♀ 24. / .vi 8 h
 3 34/ .viij 8 h ☉ / deſc 1 grad⁹ 11 mi. pluuiosum cum ventis ſtigidis

I V N I V S

A principio mensis istius vsqz ad medium fere Jupiter mediat celſū fere cū
 spica ♄ cum media caude vſe maioris. ſit etiam ſtationarius prope oc
 caſum doxi Ω φ h et ♀ / ab initio quoqz ſit □ per angulos Jupiter
 oritur canis minor in c auram calidā prout tēp or. ratio poſtulat/ por
 tendit/ et propter directionē auram ſepe ventosam. Circa finem autē ſit □
 per angulos Saturnus oritur cor Ω i c .1/ mediat quoqz celum cum cui
 gulo orionis remittit calorem / oritur quoqz 5 die cum cornu merid. 8
 Δ 3/ faciet pro ſiccitate.

1 e Sol .iij oritur cum ♀ 10. / Et xij in c cum ventre Leporis Δ h et ♀ .21/
 et cum h 24. / et cum media in cingulo Orionis φ 7 et h .8/ xij. i c cum il
 lis/ .viij. occidit cum capite meduse φ h p ♀ 26. / Mercurius j. cum * nō
 na extra 8 13/ .3 Δ 10 ♀

2 f .iij Sol oritur cum h 10. / nub. in quibusdam locis plu. Luna .2 cū x
 in contactu ſeptentrionali 7 7 et 3 29/ .iij. cum * ibidem deſc 37. / .viij
 □ 1 7/ .xj. * 1 3/ xij □ h in c 3 occidit 15. / diu durat ante et poſt diſ
 ponit ad intemperiem aëris/ Venus .ij oritur cum pleiadibus * 1 et 7
 a prima .11/ a ſecunda 29. nubila/ aliubi pluuiā/ Mercurius .iij oritur
 cum cornu mer. 8 Δ 3. 15/ et oritur cum h 12. / □ ♀ 3/ xij in c cum dext
 hūero Oriōis ● 3 et ♀ .8/ .vi. eſt cū * 11 extra 8 24 turbidi venti/ in quib
 uſdam locis humidi

3 g Sol oritur cum cornu meridionali 8 Δ 3. 20/ et occidit cum cornu ſep
 tentrionali eundem φ 3. 20/ Luna .ix cum Δ in cornu mer. 3 18/
 Venus .ij oritur cum nave Ceti Δ ♀ et ♀ 25. / Mercurius .iij cum x
 1 grad⁹ 36 mi. prima extra 8/ Et .viij. occidit cum cane minore ● 3 p
 3. 37/ xij. i c cum dextro humero Orionis ● 3 et ♀ 51. nubiloſum/ ali
 ubi. imber cum toni. et fulmi.

4 2 Sol i c cū dextro humero Orionis ● 3 et ♀ .24/ Luna .iij cum
 * in cauda 70 7 et h 34. v □ 1 ♀/ .viij. Δ 1 7/ Venus v. cum * in
 medio poſtreme core 7 31. iij □ ♀ oritur cor Ω 3c 27. / Et 3 ♀
 oritur arcturus occidit 5. / .viij. □ ♀ occidit/ arcturus in c .21/ ventus.

5 b Sol in c cum dextro humero Oriōis ● 3 et ♀ 5. / Luna .viij. cum x
 in amphora 7 et h 17/ .ix. cum * ibidem 3/ .v Δ 1 7/ .i. Δ 1 ☉/
 Saturnus .iij oritur cum cornu mer. Δ 3. 3/ xij in c cum media in c

IVNIUS

- gulo Orionis ☿ et ♀ o/ et xij. post i c cū eadem stella 4.
- 6 c . iij ☐ ☉ oritur cor ♀ ic. 26/ iij. sol cū ♀ prima extra II/ 40 Mars
.j oritur cum cornu ♀ sequente Δ ♀ et ♀ 7./ calidus/ in quibusdam locis
to. et ful./ Venus. iij oritur cū nodo filorū Δ ♀ p ♀ 26./ ix cum ♀
in postrema cora ♀ ♀ 54/ ♀. * ♀ ♀. iij Δ) ♀/ xij ☐ ♀ m c/ arca
turus oritur .29
- 7 d . iij ☉ ☉ oritur arcturus occidit 9./ Luna iij. cū ♀ in ventre ♀
meri/ 57/ Et ☐) ♀ Venus. ix m c cū capite meduse ☿ ♀ p ♀ .19/
Et ix. ic cū eadē stella 11./ ☐ ♀ m c cor ♀ oritur 25./ Et iij. occ. cū lu
cida transtret navis ☿ ♀ 16./ ☐ ♀ oc. cor ♀ m c. 27/ Mercuri⁹. iij orit.
cū capite II antecedētis ☿ ♀ 52./ Et ☐ ♀ or. frons III m c. 2/ xij. ☐ ♀ i c ♀
oritur 24./ xij ☐ ♀ occidit dexter hūe. Orionis m c 18.
- 8 e **Quarta lunæ** decrepētis hora 2 mi/ 21 an me. Ascendente 25 grad/ 31
mi 8 / Guber. ♀ cum ♀/ et si propter lune applicationē
ad Martē intensio caloris promittitur et siccitas/ tamen ♀ et ♀ domina
tores nonnihil adiment./ iij ☉) ♀ dicit 3 gra/ 21 mi./ xij ☉ ♀ m c lya
ic 21./ xij. ♀ i c lya m c .55
- 9 f Sol viij. occ. cū cane minore ● ♀ p ♀ 25./ Luna .v cum ♀ in filo
X ♀ et ♀ 54./ ♀ cum alia stella ♀ in filo X 54/ j. ☉) ♀/ ♀. * ♀ ♀/ H/
Mars xij. oritur cū cornu ♀ antecedente Δ ♀ et ♀ .7/ xij occidit cū hu
mero pegasi ☿ ♀ et ♀ .9/ calidum/to. ful./ Venus ix. ic cum postre
ma fluminis ● ♀ .5/ .j ☐ ♀ ic spica occidit 39./ Et ic cū canemato
re ● ♀ p ♀ .20/ Et j. m c cū eadem stella 57.
- 10 g Jupiter viij. m c cum media caude visentatoris .1 / Venus .ix m c
cū postrema fluminis ● ♀ 24./ iij. ☐ ♀ occi. somahant i c .11./ viij ☐
♂ ☉/ xij *) ☉ intensio caloris/ in quibusdā locis cum to. et ful.
- 11 A viij. ☐ ☉ occ. arcturus m c .20/ Luna v. cū ♀ in cauda ♀ ♀ 34/
v. ☉) ♀ 54/ Venus .ij or. cum somahant ● ♀ p ♀ 21./ Et iij. occi.
cū umbilico Andromade Δ ♀ 8. vj. cōiūgitur cū ♀ in cauda ♀ ♀ 19 hūe
dū/ Mercurius .v or. cum sinistro humero Orionis ☿ ♀ et ♀ 31./ ix. ☐ ♀
occi. postrema fluminis i c 25./ .j ☐ ♀ i c ♀ occidit 10. ventus
- 12 b **Introitus Solis** in ♀ hora 6 mi/ 11 post me. Ascendente 8 gra/ 15
mi. ♀/ Guber. precedentis ☉ medio criter fortes/
Jupiter tñ in cardinem c/ et dñs ascendētis multū declinabit ad tēpera
mentū aeris secundū tēporis qualitātē/ Eadē hora luna cū ♀ sub oculo ♀
H p ♀ .35/ xij. cū oculo ♀ ● ♀ 1 gra/ 1 mi./ iij. *) ♀/ Sol .iij or.
cū cap. II antecedētis ☿ ♀ .11/ Mercuri⁹ .v or. cū capite II sequētis ☿ ♀
18./ Et cū nebulosa Orionis .48/ ix. occ. cū genu sinistro II antedē. Δ ♀
- 13 c . iij ☐ ☉ oritur somahant m c 12./ xij ☐ ☉ m c arcturus orit/ .21/
Luna .ij cū ♀ in origine cornu ♀ p ♀ 20./ ♀ cū ♀ in cornu me. 8 ♀ 55/
et cum ♀ in clava Orionis ♀ et ♀ 57/ vj. Δ) ♀/ Venus .viij cū ♀ in
cauda ♀ ♀ 22/ Et iij. occidit cum sinistro pede Orionis ● ♀ et ♀
22./ ix. ☐ ♀ i c ♀ occidit 10. nubilosum/ aliubi pluviosum. Mercuri
us .iij cum Δ in genu sinistro II antecedētis ♀ p ♀ 21./ v oritur cū dex

- tro humero Orionis ● ♀ et ♄ .50/ j. m e cū capite II antecedentis ☉
 ♄ .52/ pluuosum cum ventis/ in quibusdā locis cum to. et ful.
- 14 d **Noua Luna Iulij** hora 10 mi/20 post me. Ascendente 16 gra/ 14
 mi. ☿/ quem Jupiter respicit Δ aspectu/ Su
 ber. ♀ cum ♄ calida multum a principio ventosa valde propter □ ♄ ♄ et
 descensu ♄. iij ♄ ♄ ♄ drā 3 gra/ 37 mi./ Venus. ij oritur cū cauda ce
 ti Δ ♄. 31/ Mercurius. j i c cum capite II antecedentis ☉ ♄ 25.
- 15 e **Luna j. cū Δ in clune sinistro II sequentis ♄ 51/ ix. cum ✱ quita extra**
 36. vñ. □ ♄ ♄/ xñ. ♄ ♄ ♄ drā 6 gra/ 19 mi/ Jupiter sit ascendens/ ven
 tosum/ Mercurius. iij cū ✱ in spatula II sequentis i grad/ 8 mi. /ix.
 □ ♄ occidit pleiades i c 29. /j. m e cū cane minore ● ♄ p ♄ 29. /Et .j
 i c cum eadem stella .26
- 16 f **xiij. □ ☉ i c ♄ oritur 7. / ♄ ☉ i c lyra m e .11/ □ ♄ or. lyram e. 19/**
 Et sic Marte oriente/ ☉ i c et lyra m e intensio caloris/ in quibusdam lo
 cis cū to. et ful. / iij ✱ ♄ ♄/ xi. Δ ♄ ♄/ Venus. ix m e cū prima ple
 iadū ✱ ♄ et ♄. 5/ A media autē. 24/ ix. i c cum eisdem a prima 28. /a me
 dia 9. /Mercurius. v oritur cum media in cingulo Orionis ☉ ♄ et ♄ 52.
 □ ♄ oritur cauda Ω i c 32. /Et ix. occidit cum fundo vasis Δ ♄ et ♄
 31. /j □ ♄ i c pleiades oriuntur .43
- 17 g **xij ♄ ☉ m e lyra i c 27. / xij. □ ☉ i c spica m p occ. 15. / Luna xi.**
 cum ✱ in palma sinistro pedis precedentis Ω 22/ viñ. ✱ ♄ ♄/ Mars
 xij occ. cum nare Ceti Δ ♄ et ♄ .16/ Et ♄ ♄ occidit arctur⁹ oritur 5. vñ
 tus/ Venus. ix m e cū vltima pleiad. ✱ ♄ et ♄. 30/ Et i c cū eadē 31.
 Mercurius. v oritur cum sinistro pede Orionis ● ♄ et ♄ 22. venti nu
 bu. in quibusdam locis tonitrua fulmina.
- 18 h **Sol oritur cum angetenar Δ ♄ .26/ xij m e cum cane maiore ● ♄ p**
 ♄ .15/ Et xij. i c cum eadem stella 13. / ♄ ♄ oritur spica occidit 17. /
 Luna. viñ cum ✱ in genu sinistro pedis precedentis Ω 47/ □ ♄ ♄ / vñ
 ✱ ♄ ♄/ Mercurius j. cum ✱ n pede postremo septentrionali ♄ 27/
 □ ♄ m e spica oritur 40. / xi. ✱ ♄ ♄ temperat arem.
- 19 b **Lūa. xiij cū ✱ quinta extra Ω 26/ ij. cū alia ✱ in extrema palma Ω 49/**
 .viñ ✱ ♄ ☉. /j □ ♄ i c fomahant oritur. 51/ Et i c cū lucida trāstri na
 vis ☉ ♄ .25/ Et j. m e cum eadem stella 26. /
- 20 c **ix □ ♄ ♄/ iij. Δ ♄ ♄/ vñ. ✱ ♄ ♄/ Mars. vñ m e cum ventre Ce**
 ti Δ ♄ 8. / Venus. ix m e cum angetenar Δ ♄ .15/ Et ix. i c cum ea
 dem stella 18. / ij ♄ ♄ or. frons M occidit .9/ □ ♄ or. prespe i c .5/
 Mercurius ix. occidit cum capite II sequentis ☉ ♄ .21
- 21 d **Quarta lunæ crescentis** hora 2 mi/58 post me. Ascendente 9 gra.
 ii mi. M cum quo oritur caput Hercur
 lis ☉ ♄ p ♄ 27. / Cor Ω in culmine drā i gra/ 27 mi. Suber. ♄ cū ♄ i
 peratioz precedēte. viñ ♄ ♄ ♄/ xñ. □ ☉ i c ♄ occi. / 3 serenat/ xñ □
 ♄ occ. lyra i c 8. / xñ. □ ♄ oritur canis maior i c 2. / ix ♄ ♄ m e
 frons M i c 28. / ♄ ♄ i c frons M m e 5. / Mercuri⁹ .ix cum ✱ circa
 nebulosam ♄ 2 mi. / ix. occidit cum asino meridionali ✱ ♄ et ☉ ii. /
 □ ♄ occidit frons M m e .7/ pluuosum.

IUNIVS

- 22 e Sol oritur cum capite Π sequentis Φ J . 20/ rj \square \odot i.e. cauda Ω occidit 8./ Luna .vij. cum stella \star in cora sinistra mp F p J 40/ rj cum alia \star ibidem 20/ rj . cum alia stella \times in genu sinistro mp F p J 11/ rj Δ p drā 1 gradus 1 mi./ .vj. Luna cuspsica mp \bullet Q p J drā 2 grad^o 53 mi./ rj . Δ F rj . Φ Q occidit frons M oritur 8./ V nus rj . occidit cū prima pleiadum \star J et F . 18/ Mercurius .vj. oritur cum asino septentrionali J et \odot . 3/ Et \square F oritur J m c. 23/ Φ oritur Somahant occidit. 36/ J . \square F m c. hyra oritur 15./ rj . F occidit cū presepe J et J 25./ rj . F cōiungitur eidem 32/ Ab asino septentrionali disferentia 1 gradus 28 mi. nubilosum et ventosum atq; humidū / in locis quibusdam cum tonit. et fulmi.
- 23 f Luna .i. cum \times in umbria vestis mp F p J 55/ rj . cum \star in fune lancis septentrionalis H p J 4/ .vij. \square J F . .vj. \square J m c. Somahant occidit 7./ rj \square J occidit canismator m c. 1/ intensio caloriz/ Venus .ij. oritur cum ventre Ceti Δ F 27./ Et rj . occidit cū media pleiadum \star J et F 1. et occidit cum cane matore \bullet F p J .26 Imber cum ro. et sul/ Mercurius .vj. oritur cum presepe J et J .15/ rj . cōiungitur asino meridio. \times J et \odot drā 1 gradus 15 mi. Et m c. cum presepe drā 44. cum asino septentrionali 36./ cum asino meridio/ 13. pluuia cum vētis
- 24 g Sol oritur cum nebulosa Orionis 28./ Et occidit cum lucida hydre Φ H et Q . 18/ Luna rj . cum \times in medio lancis septentrionalis H p J 26/ rj Δ J \odot . rj \square Q m c. postrema fluminis occidit .7/ rj . \square Q i c. presepe occidit .9/ Mercurius .vj. oritur cum asino meridionali \times J et \odot 5./ et cum cane minore \bullet F p J .37/ rj . occidit cum capite Π antecedentis Φ F . 18/ Et cum asino septentrionali J et \odot . 49/ nubilosus / in quibusdam locis pluuia.
- 25 d .vij. \square \odot occidit postrema fluminis i.e. 16/ Luna .vij. cum \star in creure sinistro serpentarij H p Q 54/ vj . Φ J Q . rj \square Q ori. F i.e. 27/ Venus rj . occidit cum oculo H \bullet J 15./ Et cum sinistro humero Orionis Φ J et F . 51/ \square Q occidit cauda Ω m c. 25/ rj . \square F occidit oculus
- 26 b Sol . rj . oritur cum dextro humero Orionis \bullet J (H i c. 27 et F 25. nub. in quibusdā locis pluuia/ .v. Δ J F . rj Δ J F / Mars rj occ. cum ventre Ceti Δ H 19./ .vj. \square J m c. presepe oritur .11/ rj \square Q oritur F i c. 27./ Venus rj . cum Δ in oculo septentrionali H F p F 55 nubes/ Mercurius .vj. oritur cum ventre leporis Δ H et F 17. Et \square F oritur F i c. 6./ \square F oritur spica i c. 16. sereni venti et calidi.
- 27 c Sol rj m c. cum capite Π antecedentis Φ F .27/ Et rj . i.e. cum eadē stella 1./ J \square J rj . Φ J F . rj \square Q m c. cauda Ω oritur. 13/ rj . Q i c. cum oculo H \bullet J .20
- 28 d Sol oritur cum prima stella in cingulo Orionis Φ F et H 12./ rj \square H oritur cor Ω i.e. 7/ remissio caloriz cum humiditate ante et post/ .v. Δ J F / Venus .ix. m c. cum oculo H \bullet J 10.
- 29 e Plena Luna Julij hora 3' mi/ 13 post me. Ascendente 18 gradus 0 mi. M / Luna circa occultas stellas in F / Ciber. H cū J intēparata/ a principio tamē propter \square F \odot calida serena et tēperatioz erit/

IUNIVS

ratio erit/ Luna .vij. cū stella γ in contactu septentrionali ♄ ♃ et ♃ 28/ ♃. cū alia ✱ ibidē 35./ ♀ □ ♃ ♃/ ♃ ♃/ Mars r̄ occidit cū cru tepegasi ♀ ♃ et ♃ .16/ Mercurius ix. oc. cū spatula dextra cētanti 7. 30 ♀ .iij. □ ☉ oritur cauda ♁ i c 2./ ♃ ☉ oritur cū media in cingulo Orio. ♀ ♃ et ♃ 2./ Sol r̄ in c cū cane minore ● ♃ p ♃ .15/ ♃ r̄. i c cum eadem 15./ ♃ cū capite ♃ sequentis .17/ Luna j. cū Δ me- ridionalis in cornu ♄ ♃ p ♃ 20/nub. in quibusdā locis cum to. ful. et imbre/ Mars .vj. me cum umbilico Andromade Δ ♃ 7./ ♃ vj. i c cū eadem .ij. □ ♃ i c oculus ♃ oritur 37. .

IULIVS

Ab initio mensis illius Saturnus mediat et i c cū dextro humero Oridis ● ♃ et ♃ nature/ ♃ sit ♃ per angulos ♃ oritur arcturus occ. magnā et temp est uosum ventorum flatum cōcitabit/ In nōnullis locis cū imbris bus to. et ful. Jupiter circa finē oritur cū spica ♃ ● ♃ p ♃/ et in ♃ loco eclipsis Solis/humidū et ventosū et sans tēperatū pro tēporis qua- litate/Circa mediū vero occidit cum cauda ♁ ● ♃ et ♃ nō longe ab ♃ loco eclipsis lūaris ad hūiditatē quoq; declinabit/ et tēperabit caloriē/ Mars a 20 die vsq; ad 25 cū stellis in filo X ♃ p ♃ nature humidum quoq; ac ventosum/ Mercurius circa mediū mensis huius sit retrogra- dus et in c cum ceruce ♁ ♃ ♃ p ♃ et durabit illa mediatio a 14 die vsq; ad 20 diem/ ita vt parua sit drā/ ♃ i die □ ♃ i c arcturus occid. 16./ .13 autē die sit ♃ per angulos ♃ occi. cauda ♄ oritur sed drā q̄t fe- re gradus/ Ineīdit quoq; □ ♃ i c ♃ oritur tñ propter stationē diu du- rabunt/ ob id sepe nubila concitabit cum ventis.

♃ g Sol .iij. oritur cum vltima stella in cingulo Orionis ♀ ♃ et ♃ 27./ r̄j Δ ♃ ♃ .vj. ✱ ♃ ♃/ Venus v. occidit cum dextro hūe. oridis ● ♃ et ♃ .25 imbre cum to. ful. et ventis/ Mercurius .vj. oritur euz cane ma- iore ● ♃ p ♃ 40./ ♃ cū postrema sumans ● ♃ .26/ mediat quo- q; celum ♃. cum lucida Hydree ♀ ♃ et ♃ 6./ ♃ i c euz ea .37/ pluuia/ in nō nullis locis cum magno vento ium flatu.

♃ A Sol oritur cum sinistro pede Orionis ● ♃ et ♃ .5/ r̄j □ ☉ me ♃ oritur .18/ r̄j □ ☉ i c pleiades oriūtur ☉ plu. cum ventis/ in nonnullis cum to. et ful./ Luna .x. ✱ in cauda ♄ ♃ et ♃ 41/ r̄j. cum stella X in amphora ♃ et ♃ 12./ ♃ ♃ ♃. iij. Δ ♃ ♃ .vj. Δ ♃ ♃ ♃ Saturn. ♃. i c cū dex. hu. Orio. ● ♃ et ♃ .3/ ♃ ♃ ♃ oritur arcturus occid/3./ remisso calorē cum nubibus et ventis/ in quibusdā locis cum humiditate aliquot diebus ante post/ .v □ ♃ in c eantis minor oritur 17./ .ix □ ♃ in c lyra occidit. 27./ .vj □ ♃ oritur cauda ♁ i c .55

♃ b .vij. □ ☉ occidit pleiades i c .16/ Luna .ij. cum ✱ in amphora ♃ et ♃ 1/ ♃ et cum ✱ ibidem 59/ iij. cum ✱ prima fusionis ☉ ♃ p ♃ 39/ Saturnus in c cum dextro hu. Orionis ♀ ♃ et ♃ .1./ nubila cum vē- tis/ in quibusdā locis pluuia/ xi. ♃ ♃ occidit ♃ oritur 5./ calidū/ sed anticipabit/ Venus .ij. oritur cum oculo ♃ ● ♃ 6. / imbre cum toni. ful. et vēris. Mercuri⁹ sit meri. / .ix ✱ ♃ ♃ .vj ♃ ♃ or. cauda ♄ oc/ 41. ventosum.

IVLIVS

- 4 c .iij □) ♀/ Mars v. tē cū nare Ceti Δ ♀ et ♀. 16 Ventis .iij cū
 * secunda extra 8 2/ Ab alia * in cornu meridionali drā 1 gra/ 32 mi.
 Mercurius .vi oritur cum ceruice Ω φ H p ♀ 32./ f. coniungitur *
 in genu dextro Ω 12/ ij. ♀ ♀ me cauda 70 tē 26./ ij. ♀ ♀ tē cauda.
 70 m c. 13 nubila.
- 5 d Sol viij. occidit cū fundo vasis Δ ♀ p ♀. 14/ i Δ) ☉. v □) H/
 Saturnus. X occidit cū cornu septentrionali 8 φ ♀ o/ remissio calo-
 ris cum nubib' ante et post/ Mars .v me cū nare Ceti Δ ♀ et ♀. 0/
 ij. ♀ ♀ oritur cauda Ω occidit. 3/ Venus .ix m c cū auriga ☉ ♀ et
 ♀. 21/ ix. cū eadē stella tē 13./ □ ♀ tē cauda 70 oritur .2
- 6 e ij □ ☉ me spica oritur 15./ Luna ij. cū X in filo X H p ♀ 44/ vi.
 cum alia stella X in filo X 40/ *) ♀/ vj. ♀) ♀/ differētia 2 gra.
 19 mi./ ij. ♀) ♀/ ix. □ ♀ tē cor Ω occidit 26./ Mercu/viij. cū *
 antecedens cor Ω 2/
- 7 f Quarta luna decresetis ho/ 1 mi/ 40 p^o me. Ascendēte 6 gra/ 57 mi.
 m cū quo or. luminosior lancis me. = 44/ Mercu-
 ri^o in culmine Celi drā 2 gra/ 27 mi. Guber. ♀ cū ♀/ Et si ♀ dñis est eclip-
 sis/ aurā calidā et siccā indicat/ Tā stella in ascendēte/ et Mercurius in cul-
 mine vna cū ♀ que est particeps cū ♀ adūnet calorē ♀/ et aditēperamen-
 tā declinabūt cū vētis/ ij. Sol tē cū lucida transtrinais φ ♀. 21/ □ ☉
 tē somahant 02/ 27/ viij Δ) ♀/ i. *) H/ Venus .ix m cū sinistro
 pede Orionis ☉ ♀ et H. 19/ Et ix. tē cū eadē stella 14/ ij. * ♀ ♀/ nubit.
- 8 g Sol ij me cū lucida transtrinais φ ♀ 8./ v. ♀ ♀ tē spica me. 6/
 Venus .ix me cū cornu septē. 8 φ ♀. 17/ Et ix. tē cū eadē stella 16./ Et vj.
 cōiungitur stelle * tertia extra 8 ii humi. Mercurius .vi oritur cum
 corde Ω ☉ ♀ et ♀ 27. plu. in quibusdam locis cum ro. sul. et ventis
- 9 A Luna .iij cū X in cauda γ ♀ 45/ vj □) ♀/ ix. *) ☉. v ♀ ♀ me
 spica tē c 11./ ij □ ♀ occidit canis minor me. 8/ Ven^o .ix me cū si-
 nistro hu. Orionis φ ♀ et ♀. 17/ Et ix. tē cum eadē 16./ ij. cōiungitur stel-
 le * quarta extra 8 5/ . ij □ ♀ orit. cauda 70 me .2 humidum et nub.
 Mercuri^o j. cōiungitur corde Ω ☉ ♀ et ♀ diā 1 gra/ 14 mi. Et ij. me^o
 diat celum cum eadem stella .24
- 10 b Luna .iij cū X sub oculo 8 H p ♀ 29/ viij cum oculo 8 ☉ ♀ 58/ iij.
 cū X in origine cornu 8 H p ♀ 25/ viij. cū alia stella X in cornu 8 me.
 ♀ 29/ ij * ♀ ♀/ serenat/ Venus .ix m c cum cornu me. Δ ♀ . 22/ Et tē
 c cum eadem stella 11/ iij. coniungitur eidem stelle 35/ Mercuri^o . ij
 tē cum corde Ω ☉ ♀ et ♀ 5./ iij. coniungitur stelle X quasi in pec-
 tore Leōis 36/ nubila cum ventis
- 11 c viij. □ ☉ occidit frons m me 6./ vj. ♀ ♀ m c ♀ tē .17. v *) ♀/
 vj Δ) ♀. / ix ♀) ♀. 2 gra/ 31 mi./ vj. ♀) H/ drā 3 gra/ 37 mi.
 Venus .ij oritur cum cornu meri. 8 Δ ♀ . 29/ .ix me c cum nebuloza Ori-
 onis .30/ Et ix. tē cum eadē 2./ ij □ ♀ tē arcturus occidit 16./ v * ♀
 H/ vj □ ♀ oritur postrema summis me 6.
- 12 d Sol datur cum asino septentrionali X ♀ et ☉. 6/ Luna ij. cum Δ
 in clume sinistro sequentis H 32/ Mars ij. cū X in filo X H p ♀ 47/

- v. \odot ♃ i c ♄ m c 9./ Venus. ix m c cum media in cingulo Orionis ♄
 ♄ et ♃ .4./ Et cum ventre Leporis Δ .17/ ix. autem i c cum eisdem stellis/
 a prima 27./ a secunda 14./ Et ab vltima in cingulo .25/v. \square ♁ occ. sp^o
 c m c. 17/ Mercurius. vñ oritur cū nebuloſa Ω ♃ et ♁ 8./
- 13 e. iij \odot oritur Somahant occ/ 18./ Luna. vñ \star cū ſexta extra II 30/
 .vij \square ♄ / \square ♃ / Saturnus iij. cum \times prima extra II .ij \square ♃
 oritur ♄ i c 1./ diu durabit in parua drā ſepenubiloſus et ventofum ſequē
 tibus preſertim diebus./ ix \odot ♄ ♃ drā a diametro 1 gra/40 minu/v. \square
 ♄ m c ♁ occidit. 30/caldum/in quibuſdam locis ſul. Mercurius. vñ
 oritur cum dorſo Ω ♄ ♃ et ♁ 4./ ix. \odot ♄ occidit cauda ♁ oritur. 58/du
 rabit ante et poſt
- 14 f. Noua Luna Augusti hora 5 mi/3 ante me. Ascendente 7 gra/14 mi.
 Ω cū quo prope oritur Luna drā 4 gra/ que paulo aſ
 horam cōiunctiōis orta eſt cū cane minore/ Marte in culmine exiſtente dif
 ferentia 1 gra/17 mi. Ioue autē Imū celi occupate drā 1 gra/38 mi. et eſt ſe
 re \odot per angulos drā 55 mi. Guber. ♄ cū ♃ vterq; in angulo intente calit
 da fieret/ niſi Luna prope ortū canis minoris et in aſcendente/ et Ven^o cū
 ſtellis in pede ſiniſtro II antecedentis/ et \square ♃ oritur ♄ i c nōnihil adime
 rent/ Erunt in hoc menſe plurima ſul. et tonitrua cū grandine/ In locis
 autē occidentaliorib⁹ ſatis hūida erit/ vbi videlicet Luna cum cane mio
 re hora \odot preſe aſcendit.
- Introitus Solis in Ω hora 6 mi/47 aſ me. Ascendente 25 gra/37 mi.
 Ω cum quo oritur nebuloſa Ω ♃ et ♁ .12/ cooritur
 quoq; ♄ drā 1 grad/17 mi. in angulo imi celi luminioſior lancis ſeptētrio.
 ♄ ♄ et ♄ 38/ Guber. precedentis \odot ♃ ſatis fortis augebit ſignifi
 cationem promiſſam per coniunctionem/ Et Mercurius in heroſcopo
 valde ventofum tempus reddet/ Sol. iij oritur cū preſepe ♃ et \odot .11/
 xij \square \odot m c /lyra oritur 28./v. coniungitur preſepe 40/vij. occ. cū ca
 pite II ſequentis ♄ ♃ 26./xij. i c cū preſepe. 12/ Et \square \odot i c frons M oc.
 14/nubiloſum/ aliubi imber cū tonitruis et fulminibus/ Venus v. oc
 cidit cum capite meduſe ♄ ♃ p ♁ 27./ Et \square ♁ occidit ♃ i c .19/
 .ij \square ♁ oritur cor Ω i c .14
- 15 g. Sol xij m c cum preſepe et aſino meridionali atq; ſeptentrionali diſfe
 rentia a preſepe 17. ab aſino meridionali. 10/ ab aſino ſeptentrionali 9./
 vj. coniungitur cum aſino meridionali ♃ et \odot 10/vij. occidit cum aſi
 no meridionali 24./xij. i c cum aſino meridionali 14. nubila/ Lūa vj.
 cum \times in genu ſiniſtro pedis precedentis Lēdis ♃ p ♄ 51./ix \star ♄ /
 .xj Δ ♃ /vñ. \star ♄ /ix. \star ♄ /xij. \odot ♄ 52/ xij \odot ♄ oritur
 ♃ occidit .9/caldum/in quibuſdam locis fulmina et tonitrua/ Venus
 .ix mediat celum cum dextro humero Orionis \odot ♃ et ♄ .16/ Et ix. i c
 cum eadem 17./ .ij \odot ♁ oritur arcturus occidit 28. Mercurius .ij i c
 cū ceruice Lēdis ♄ ♃ p ♄
- 16 h. Sol or. cum cane minore \odot ♄ p ♃ .26/ cooritur quoq; aſinus meridi.
 16./ Et occidit cū preſepe ♃ et ♄ 4./ imber cum to. fulminibus et ventis.

IVLIVS

- Luna xi. cū *** quita extra Ω 29//rē. cū * in extremitate posttranepala Ω 55/ Saturnus .q oritur cum \mathcal{R} .4/ix. ic cum \mathcal{R} .16/ Et Venus ipsa v. occ. cum cornu septentrionali Φ \mathcal{F} 4/ Et rē. cum \times prima extra Π differentia i gra/ 7 mi. pluuiosum Mars vñ. cum \times in filo \times \mathcal{H} p \mathcal{F} drā i gra/ 30 mi./ Mercurius m c et ic cum ceruice Ω ventos et nubila augebit.
- 17 b** Saturnus .4 coniungitur \mathcal{R} drā i gra/ 45 mi./ ix m c cū \mathcal{R} 19./ v. occidit cum \mathcal{R} .10 rē. \square \mathcal{D} \mathcal{H} nub. et humi. cum remissione caloris/ Jupiter x. occidit cum cauda Ω \bullet \mathcal{H} et \mathcal{R} .2/ ad temperamentum aeris declinabit cum humiditate et ventis ante et post/ Mars .xj occidit cum secunda \times extra forma 13./ Mercur. fit retrograd⁹ et m c atqz ic cum ceruice Ω ventos satis vehementes añ et post istum diem commouebit.
- 18 c** Mars \mathcal{K} . oritur cum prima \times extra \times \mathcal{H} 2//xi \mathcal{D} \mathcal{F} occidit spica \mathcal{M} . oritur s. /v. * \mathcal{R} \mathcal{F} .q \square \mathcal{D} \mathcal{R} Venus viñ. coniungitur stelle \times in pede sinistro Π antecedentis \mathcal{F} p \mathcal{R} 13 pluuiosum/ Mercurius m c et ic cum ceruice Ω /v. * \mathcal{D} \odot /
- 19 d** Sol oritur cum ventre Leporis Δ \mathcal{H} et \mathcal{F} .12/ Et \square \odot oritur spica \mathcal{M} ic .23/ Luna iñ. cum spie: \mathcal{M} \bullet \mathcal{R} p \mathcal{F} 3 gra/ i mi./ v. cum * in cora sinistra \mathcal{M} \mathcal{F} p \mathcal{F} 47/ Et cōiungitur Joui 25/ viñ. cum alia * ibi/ den 12/ xi. cum alia \times in genu sinistro \mathcal{M} 2/ ix. \mathcal{D} \mathcal{D} Mars .xj occ. cum uodo filorum \times Δ \mathcal{D} p \mathcal{F} 3./ \mathcal{K} . oritur cū \times tertia extra \times \mathcal{H} 7/ Venus .q oritur cum capite Π antecedentis Φ \mathcal{F} .25/ Mercurius m c et ic cū ceruice Ω et fit \square \mathcal{F} i c \mathcal{H} oritur ventosum valde
- 20 e** Sol occid. cum capite Π antecedentis Φ \mathcal{F} 14./ Et cum asino septentrionali \mathcal{D} et \odot .17/ Luna .ix cuz \times in simbria vestis \mathcal{M} \mathcal{F} p \mathcal{D} 46/ \times Δ \mathcal{D} \mathcal{H} .viñ * \mathcal{D} \mathcal{F} /j. Δ \mathcal{D} \mathcal{R} Venus .viñ cōiungitur stelle \times in pede sinistro Π antecedentis drā 25/ v. occidit cum cane minore \bullet \mathcal{F} p \mathcal{D} .19/ .q \square \mathcal{R} oritur Somahant m c 4. pluuiosum cum toni. et ful. atque ventis.
- 21 f** Quarta luna crescentis hora 3 mi 35' ante m. Ascendente 25 gra/ 58 mi \mathcal{E} Et luna est cū * \mathcal{H} p \mathcal{D} 9/ in sinclancis septentrionalis \ominus / In angulo occiduo caput serpentarij Φ \mathcal{H} p \mathcal{R} 7. Guber. \mathcal{F} cum \mathcal{H} \mathcal{F} ortis in celi medio et propria domo calidum et sicum. v \square \odot oritur \mathcal{F} i c .7 serenat/ viñ. \square \odot occidit oculus 8 i c .23/ rē. * \mathcal{D} \mathcal{F}
- 22 g** Mars .v m c cum prima \times extra \times \mathcal{H} 7. Et .xj occidit cū quarta extra \times .4/ v. coniungitur stelle \times in filo \times \mathcal{H} p \mathcal{F} 59/ ix \square \mathcal{R} m c arcturus occidit .20 \mathcal{H} . \square \mathcal{D} \mathcal{F}
- 23 h** Luna .j cum * in creure sinistro serpentarij \mathcal{H} p \mathcal{R} 59 v. Δ \mathcal{D} \odot / Mars .xj occidit cum prima \times extra 4/ v. \square \mathcal{R} occidit arctur⁹ m c 30.
- 24 b** Jupiter .xj oritur cum spica \bullet \mathcal{R} p \mathcal{D} 2./ Quia est locus eclipticus \odot / ad humiditatem et ventos declinabit aliquot diebus ante et post rē. * \mathcal{D} \mathcal{M} / Mars v. m c cuz ventre Ceti Δ \mathcal{H} .9 cum secunda extra \times \mathcal{H} drā 11./ cum tertia extra \times .4/ Et v. ic cuz illis/ ix. \mathcal{D} \mathcal{R} ic hram c. 33/ viñ. Δ \mathcal{D} / Mercurius .q i c cum corde Ω \bullet \mathcal{F} et \mathcal{F} 2./ Et \mathcal{H} . m c

AVGVSTVS

- ma in pede sinistro Π antecedentis χ p q vigesimo die ori. cū ca-
 pite Gemini antecedentis Φ p 21 die coniungitur alteri stelle χ in
 pede sinistro Π antecedentis p q die 28 occidit cum caneminoze \bullet
 p p p Et fit \square per angulos h oritur Somniant in c/ Cūca illos dies
 añ post quia est tardus alterabit calozē p ad humidiozem et magis vento-
 sam aeris dispositionē/ presertim a 20 die ad finem et circa/ Et erunt in
 nonnullis locis magne inundationes aquarum/ Jupiter 20 die in c cū
 extrema cauda vise maioris Φ p 27 die oritur cum lya \bullet q et p reddet
 auram nõnihil tēperatiozem/ 31 die fit \square p oritur presepem c/ Mars a
 20 die ad finem mensis/ et a principio sequentis vsque ad medietatem
 eiusdem fere oritur cū pleiadibus p et p / sed propter eius motum in eozē
 etiā anticipabit/ augebit humiditatem euz premissis causis/ et magne etiā sē-
 quentur inundationes aquarū/ Mercurius fit directus prope ortum ca-
 nis maioris \bullet p p Et postreme fluminis \bullet p / sed drā a cane est fa-
 re 2 gra postreme fluminis drā 53 mi. Et illis qui sunt magis ad septen-
 trionem precisius incidet hīc ortus/ mediat quoqz celum cū lucida hydre
 h et q et durat a tertia die vsqz ad 15 diem in parua differentia/ 7 die \square p
 or. arcturus i c/ 8 autē die est \square p i c euz lucida hydre et oculus h oritur
 sed drā maior est gradu vno/ Eodem die \square p occidit oculus h i c tēpestuo-
 sus et diurnū ventozū statū hīc cause septentrionalibus locis minatur.
- 1 c h q p p p m c cauda p i c 24. / Et est cum h in genu dex. q o. iij \square
 p m c canis maior or. 4. / xi p p oc. ly. or. 6.
- 2 d Sol oritur cum p . 2 pluvia cum vētis/ Luna vij. cū χ in filo χ h p p
 57/ h . euz alia χ in filo χ 33/ Ven^o. h or. euz prima in cingulo orio-
 nis Φ p et h . 12/ Et v. occidit cum lucida hydre Φ h et q . 4. / h . i c cū
 capite Π sequentis Φ p 30/ nubes
- 3 c Luna v. euz χ quarta extra χ 57. iij \square p q / iij Δ p / h Δ p p
 i. p p Saturnus vij. cum stella χ extrema in pede sinistro Π ante-
 cedentis 18 nubilosum añ et post/ aliubi pluuia/ . xi \square p occidit presepem
 in c. 7/ iij. \square p i c canis minor occidit 8. / Venus . x m c cum capi-
 te Π sequentis Φ p 5. / v. \square p occidit postrema fluminis i c 23. / Mer-
 curius h in c cū lucida hydre Φ h et q . 7. / h . i c cū eadem stella . 10/
- 4 f Sol . vi cū h añcedens cor q 15/ . i h p / Et p p / p drā 1 grad/
 36 mi. / iij h p p serenat/ Jupiter h . cum h in cora sinistra h p p
 p drā 12/ Venus . h oritur cū media in cingulo Orionis Φ p et h /
 drā 0/ Et \square p oritur cauda q i c 0/ h . \square p i c p oritur. 23/ nubī.
 Mercu. / v or. cū ceruice q Φ h p p . 9/ Et h in c cū lucida hydre. 23/
 hora 10 mi. 23 post meridiem/ Ascens
- 5 g Quarta Lunæ decrescētis dente 24 gra/ 37 mi. h cum quo or.
 cauda drā Ceti 1 gra/ 11 mi. / Et Luna est sub horoscopo 5 gradibus fe-
 re/ Et est in eo gradu secundum longitudinem in quo pletades sunt/ sed in
 latitudine multum distat ab eis/ Guber. q cum h calozem Martis mitti
 gabunt et ad humiditatem declinabunt/ presertim Luna in exaltatiōe sua
 in ascendente. vij. p p occidit cauda p oritur 16. / Luna . xi cū χ
 in cauda p q 20. / vij \square p / h p / Mars h . oritur cum se-

- eſſida X extra X H .2/ .iij □ J m c poſtrana fluminis 02/ .4/ xij * J
 H/ Venus .ij oritur cum vltimis in cingulo Orionis φ 4 et H .15/ .ix
 m c cum cane minore ● ♀ p J .17/ Et ix. ic cum eadem ſtella 21/ et
 cum capite II ſequentis φ J .5/ nubes/ ſu quibusdam locis pluita.
 Mercurius xij m c cum lucida hydre .52/ In ic maior vno gradu
6 a ○ me cū corde Ω ● J et 4 .24/ Et xij . ic cum eadē ſtella 5/ □
 ○ ic arcturus occidit .17/ ix. Sol coniungitur cum corde Ω 10/ ſim
 ber cum tonitruis/ fulminibus et ventis/ Luna j. cum Δ ſub oculo 8
 H p ♀ 31/ v. coniungunt oculo 8 ● J 53/ Venus .ij oritur cū ſi
 niſtro pede Orionis ● 4 et H 14./ Et X. m c cum capite II ſequentis
 φ J 27./ iij. coniungitur ſtelle * et eſt quarta extra II imber in locis
 quibusdam cum toni. et ful./ Mercurius m c et ic cum lucida hydre.
7 b Sol oritur cum corde Ω ● J et 4 differentia 25./ Et occidit cū ea
 dem ſtella 25./ nubila/ aliubi imber cum toni. et fulmi./ Luna .j cum X
 in originē cornu meridid. 27/ .vi cū X in cornu meridionali 8 J .6/
 X * J ♀/ xi. Δ J 4/ X. □ ♀ ic pleiades 02/ .33/ .iij □ ♀ ori
 tur arcturus ic .4/
8 c .iij * J ○ . ix ♂ J H/ differentia 3 gra/ 47 mi./ X * J J/ xij
 □ 4 ♀/ ſerenum et temperatum/ Mars viij. cum X ſupra comam Ceſ
 ti H 42/ Mercurius .xj m c cum lucida hydre/ vj. □ ♀ occ. oculus
 8 inat celum .4/
9 d Sol xij m c cum ceruice Ω φ H p ♀ .11/ Et xij. ic cum eadē ſtel
 la 19/ .v □ ○ orit. poſtrana fluminis m c 8/ .vi □ ○ occid. ſiniſter
 pes Orionis ic .11/ Luna .viij cū Δ in chune ſiniſtro II ſequentis H/
 iij. cum * ſexta extra II 4/ xij. □ J 4/ v. □ ♀ occ. pleiades ic 8./
 Mercurius m c cū lucida hydre et ſit directus/ ventofum.
10 e Sol oritur cū nebuloſa Ω et dorſo eius dē φ H et ♀ drā a nebuloſa 23./
 a dorſo .25/ .iij □ J m c/ ♀ oritur .6/ .xi □ J ♂ . ij ♂ J ♀ drā 3 gra
 53 mi./ X □ ♀ m c ſpica m oritur 24./ Venus v. occidit cum ſun
 do Δ vaſis ♀ p ♀ .31/ Mercurius m c cum lucida hydre.
11 f vj. * H ○/ xij. □ H 02. ○ ic .13 remiſſio calorū cū nubibus et plu.
 Luna vj. cum X in palma ſiniſtra pedis preced. Ω 32/ Venus X m c
 cum lucida tranſtri nauis φ J .26/ Et X. ic cū eadem 19/ □ ♀ ic
 ſomahant oritur 4/ xij ♂ J ♀ 5 gra/ 25 mi.
12 g Noua Luna Septēb. hora 0 mi/ 43/ Aſcendēte 21 gra/ 53 mi. M/ Gub
 ber. J cū ♀ ſatis calida/ nōnihil etiā vētoſa/ Lūa .iij
 cū X in genu ſiniſtro pedis preced. Ω 58/ .j * J 4/ .xi * J H
13 a xij ♂ ○ m c ſomahant ic .12/ vj. Sol cum X in aſcella ſiniſtra Ω
 10/ xij. ♂ ○ ic ſomahant m c/ Luna .vj cum * quinta extra Ω 54/
 .x □ 4 oritur ♀ m c .13 ſeren/. iij ♂ J m c/ arcturus ic .3/ iij. ♂ J
 ic/ arcturus m c .12/ iij. Δ ○ J/ Mercurius .xj m c cum lucida hy
 dre φ H et ♀ .27/ xi. ic cum ea .9
14 b Introitus Solis in m̄p hora 1 mi/ 57 poſt meridiem/ Aſcendente 5
 gra/ 19 mi. A/ Guber. preced. ♂ debiles/ v □ ○
 02. pleiades m c 0/ xij □ ○ m c ſiniſter pes Orionis oc. 21/ iij. □ J H/

AVGVSTVS

14. * J ♃. Jupiter vj. cum X in genu sinistro ♄ drā 17 serenum et ca-
lidum ante et post. iij □ ♃ m c cauda ♄ occidit .4/ Venus .ij oritur cū
asino septentrionali X ♃ et ♄. 13/vij. coniungitur stelle X / et est meridior-
nalis circa nebulosam drā 31/ Mercurius .xj m c cū lucida hydre ♄
H et ♃ drā 8. / Et xj. i c cum eadem stella drā 29.
- 15 c ♃. ♃ oritur somniant occidit 22. / eadē hora * J ♃
- 16 d Sol oritur cum lucida hydre ♄ H et ♃. 5/ Luna .i coniungitur spli-
ce ♄ ♃ ♃ p ♃ drā 7 gra/ 8 mi. iij cum * in cora sinistra ♄ ♃ p
♃ 54. vij cū alia stella * ibidē 5/ ♃ cū X in genu sinistro ♄ ♃ p
♃ 7/ vij. cum X in umbra vestis ♄ ♃ p ♃ 22. / ♃ ♃ J ♄ drā 13 mi.
Et luna fere attinget Iouem/ sed non apparebit cū sit tēpore diurno et fere
re in orizonte orientali/ix. Δ J H/ Venus .ij oritur cum presepe ♃ et J
4. / ♃ □ ♃ m c lyra oritur 8. / vj. coniungitur presepe drā 1 gra/ 16
mi. /ix. □ ♃ ♃ / ♃. i c cū eadem stella. 25/ Et □ ♃ i c frons M occidit.
27 imber/ in quibusdam locis cum to. et ful.
- 17 e Luna ij. cum * in funelancis septentrionalis ♄ H p ♃ 18. / i ♃ J ♃
. iij □ J ♃ / .vj * J ○/ Venus .ij oritur cū asino meri. X ♃ et ○
22. / ix. coniungitur asino me. X ♃ et ○ 24. / ♃ m c cū presepe ♃ et J
11. / cum asino meridionali .20/ cum septentrionali 8. / Et occidit v. cū ca-
pite Isequenti ♃ 18. / ♃. i c cum asino meridionali 15.
- 18 f v □ ○ oritur frons M i c .25/ Luna .ix cum X in medio lēcis sep-
tentrionalis ♄ H p ♃ 17/ eadem hora □ J / vij. cum alia stella X
ibidam 40/ Venus .ij oritur cū caneminoze ♃ ♃ p ♃ 13. / Et v. occi-
sum asino meridionali ♃ et ○ 14. pluvia/ Mercurius ♃. cum * in
genu dextro ♄ 14. / xj ♃ ♃ m c cauda ♄ i c. 5/ xj. ♃ ♃ i c cauda ♄ m c
27. ventus.
- 19 g Quarta lunæ crescentis hora 6 mi/ 52 post me. Ascendens 6 gra.
43 mi. X/ Subter. ♄ cum ♃ calida vent-
losa et satis temperata fiet/ sed cause ab initio mensis ostense alterabunt
ad humidiorē aure dispositionē/ Mars .x occidit cum Angotenar Δ
H 1. / Venus v. occidit cum presepe ♃ et J 35. / eadē hora Δ J ♃/ nu-
bila. in quibusdam locis imber cū to. et ful. / Mercurius sit septentrio-
nalis ventosum.
- 20 A Sol xij. i c cum fundo vasis Δ ♃ p ♃ 24 / x. Δ J ♃/ Saturnus
xij. oritur cū capite II ascendentis ♄ ♃ 1. / ventosum aū et post aliquot
diebus / in quibusdam etiā locis humidum/ Jupiter iij. m c cū exte-
ma caude vise maioris ♄ ♃ 2. / iij i c cum ea .5/ temperatiorē reddet
auram/ Mars ix. oritur cū media pleiad. * J et ♄ 4. / humiditatem
augebit aū et post/ Venus .ij oritur cū ventre leporis Δ H et ♃ .7/
- 21 b Sol xij m c cum fundo vasis 5. / v ♃ ○ oritur postrema flumina
occidit 21. / iij. ♃ J H / vij. Δ J ♃. Saturnus xij. coniungitur
stelle X in pede dextro II antecedentis ♃ p ♃ 1/ ventosum atq; humidū
aliquot diebus ante et post/ Mars oritur cum media pleiadū 11. / apri-
ma .28/ Venus v. occidit cum capite II antecedentis ♃ .55. / ij □ ♃
oritur spica i c. 8/ Mercurius iij. cum * antecedens cor ♄ i mi.
vj. ♃ ♃

AVGVSTVS

- vj. ☿ occidit cauda ♀ oritur .37/nubila augebit
- 22 c Sol .i. conūgitur ✱ quarta extra Ω 30/. r Δ) ☉/ Mars ix. oritur cum media pleiadū 18./a prima. 21/ Venus v. occidit cuz asino scipione
- 23 d Sol .v. oritur cū cauda Ω ● H et ♀. 17 (trionali ✱ ☿ et ☉ 10. nubila cum vētis/ Luna .vij. cum ✱ in contactu septentrionali ✱ ♀ et ☿ 26/. ix. cum alia stella ✱ ibidē 42/vj. □ ♃/ Mars ix. oritur cum media pleiad/ 22./a prima. 17/v. □ ♀ oc. oculus 8 i c 25./ Mercurius .x. m c cum corde Ω ● ☿ et ♀. 18/vj. occ. cum eadē stella. 39/ viij. cōiungitur eidē drā 5/ r. i c cuz eadē 20./ Et □ ♃ i c/ arcturus occidit .2/ magna tēpestas cuz imbribus to. ful. et vētis in quibusdā locis grādo timēda
- 24 e Sol rē m c cum dorso Ω ☉ H et ♀. 21/. v □ ☉ or. oculus 8 m c 9./ rē. i c cum dorso Ω 8./ Luna .ij. cum stella Δ meridionalis in cornu ♀ ♀ et ☿ 26/. ix □) ☿/ Mars ix. oritur cum media pleia. 27./a prima. 12/ Mercurius .iij. oritur cuz corde Ω ● ☿ et ♀ 15/. q. ✱ ♃ ♃/ vj. □ ♃ occ. sinister pes Orionis i c .24/plu. cū ventis
- 25 f Luna ix. cū ✱ in cauda ♀ ♀ et ♃ 52/. v ☿) ♃/ Mars or. cū prima pleiadu. 7 /a media 32/. r. □ ♃ i c oculus 8 or. 10./ Mercurius .x. m c cū ceruice Ω ☉ H ♃ ♃ .53/ Et r. i c cum eadē stella 8.
- 26 g Sol iij. cū stella ✱ quasi in brachio Ω 50/ Luna rē cū ✱ in amphora ☿ et h o/ q. cū alia stella ✱ ibidē 14/ Et ab alia stella ibidem 46/vj. cum stella ✱ prima fusionis ☿ ♃ ♃ 39/. vñ Δ) ♃ rē ☿) ♃/ iij. Δ) H/ Mars oritur cum prima pleiadus .2/ et a media 57./ Venus .iij. oritur cū cane maiore ● ♃ p ☿ .27/v. oc. cū spatula dextra centauri Δ ♃ et ☿ .34 nubila/alubi plu./ Mercurius .iij. or. cū nābulosa Lēdis .18/ Et □ ♃ or. postrema fluminis m c 25.
- 27 A Plena luna Septēbris hora 9 mi/1 post me. Ascendente 22 grā. 37 mi. 8. Suber. ♃ cū h/ r. rabunt casu lozem ☿ et ad humiditatē declinabunt/ rē. □ ☉ i c dexter. hu. Orionis oritur o/ Jupiter .ix. oritur cū lyza ● ♃ et ♃ 4./ reddet tēperatioz m auram/ Mars viij. oritur cū prima pleiadus ✱) et ♃ o humiditatē aff et post augebit/ Venus .iij. oritur cū postrema fluminis ● ♃ 38./ .x. m c cum lucida hydre ☉ H p ♃ .32/ Et. i c cum eadē stella drā 1./ Mercurius .iij. oritur cum dorso Lēdis ☉ H et ♃ 11.
- 28 b .vj. ☿ ☉ or. lyza occidit 12./ vj. □ ☉ oc. dex. hu. Orionis i c .21/ Saturnus .iij. oc. cum cane minore ● ♃ p ☿ 1/ i. □ H or. ♃ i c 27./ Et □ h or. somabant m c .2/ diu durabunt hec cause pluuosus ac valde ven ojum aliquot diebus aff et post/ Mars or. cū prima pleiadum 2./ Mercurius viij. cum ✱ in ascella sinistra Ω i grā/ 1 mi. / .3 ✱ ♃ H. rē ☿ ♃ m c somabant i c .18 rē. ☿ ♃ i c somabant/ m c 27./
- 29 c rē □ ☉ m c frons ij. oritur 5./ iij □) H/ Mars oritur cū prima pleiad. 4. / . iij □ ♃ or. arcturus i c 24./ ☿ ♃ oritur cauda ♀ oc. 13. .iij. □ ♃ or. pleiadus m c .35/ rē □ ♃ m c sinister pes orionis oc. i. / 2.
- 30 d .vj. ☿ ☉ or. hircus m c .21/ iij □ ☉ m c pleiadus occ/ 25. Luna .i. cū ✱ in filo ✱ H et ♃ 25/ vj cum alia stella ✱ ibidē 27/q. Δ) ♃/ vj ✱ ♃ ♃ Mars oritur cum prima pleiad. / 6./ Venus .iij. or. cum ceruice Leonis

AVGVSTVS

☿ H p ♀. 13/ . ♀ ♀ m c cauda ♀ 1c. 19/ ♀. cōiungitur * in genti dextro
tro ♀ 7/ Et ♀ ♀ i c cauda ♀ m c 17. nubila.

31 e rē ☉ m c canis maior occidit. 21/. iij ♀ ♀ 7/ xi * ♀ H/ iij. ♀ ♀
♂ ora i gra/ 24 mi/ viij. Δ ♀. ix ☐ ♀ oritur presepe m c. 4/ Mars
02. cū prima pleiad/ 8./ Mercuri⁹. iij. 02. cū lucida hydre ☿ h et ♀ 11.

SEPTEMBER

Saturnus hoc mense occidit prope occasus canis minoris ● ♀ p ♀ Et a
principio mēsis drā ē 16 mi. In medio mēsis 45 mi. In fine autē drā est
1 gradus/ propter tarditatem autē motus precipue cōiungit cause coincidēt
faciet alterationē aeris ad frīg. et humiditatē euz vētus/ magis tñ a princē
pio propter minorē drām/ Meridionales autē hanc aure dispositionē ma
gis sentiant. Illis enī occasus ille sub minorē drā/ et precisus accidet/ Co
incident quoqz tetragonū per angulos Saturni cū 4/ ☉/ ♀/ et ♀ erūt sepe
tēpestuosi vent/ Jupiter circa finē mēsis mediat celū cum arcturo stella
● ♀ et ♀ et coincidet tetragonus per angulos ♀ i c cauda ♀ occ. / habe
bit preterea altos tetragonos per angulos hoc mense/ Prima die ☐ ♀ ori
tur presepe m c/ 7 die ☐ ♀ i c canis ma. 02/ 10 die/ ☐ ♀ m c canis mino
02/ 15 die ☐ ♀ i c postrima fluminis oritur sepe vētosum/ Mars a
principio ad medietatē vsqz. mēsis 02. euz pleiadib/ ♀ et ♀/ sed propter ex
traconsumū motus et retrogradationē suā tardius orietur/ augebit quoqz
humiditatē/ et in illis locis vbi precise orietur cū illis stellis euz sit tardus/
erunt sepe pluuię/ quam inundationes sequentur

1 f rē ☐ ☉ m c ocul⁹ ♀ occidit. 31/ Luna v. euz ♀ in cauda ♀ ♀ 54/ ix.
Δ ♀ ☉/ Mars sit retrograd⁹/ Et viij. 02/ euz prima pleiad. * ♀ et ♀ 11.

2 g Sol. iij. cū. ♀ in ala meridiana m ♀ p ♀ 10/ vi. 02/ cū ceruce ♀ ☿ H p ♀
22/ Luna vi. euz ♀ sub oculo ♀ H p ♀ 21/ i. ☐ ♀ ♀. cōiungitur ocul⁹
lo ♀ ● ♀ 50/ Mars viij. 02/ euz pleiad. prima 6./ Ven⁹. iij. cū *
ascēdēs cor ♀ 13/ Mercuri⁹. iij. cū ♀ tertia extra ♀ 5 vētos. in quibus dā lo

3 A Sol rē. i c cū cauda ♀ ● H et ♀ . i / vētos serenos Cis cū pluuia.
mouet/ Luna vi euz ♀ in origine cornu ♀ meridi. H p ♀ 52/ eadē hora
☐ ♀ ♀ rē euz ♀ in cornu meri. ♀ 22/ Mars viij. oritur cum prima
pleiadum i. / Venus 10. i c cum corde ♀ ● ♀ et ♀ . 25/ v. ♀ ♀ occi
cauda ♀ oritur 22/. iij. ♀ oritur postrima fluminis occidit 14.

4 b Quarta luna decreſcentis hora 5/ mi. 21 aſi me. Ascendente 16 grad/ ♀
mi/ m ♀/ Guber. ♀ ventosa/ Sol rē m c euz cauda ♀ ●
H et ♀ 28/. ♀ * ♀ ♀ iij. Δ ♀ ♀ viij. ♀ ♀ H drā 5 gra/ 44 mi. / rē. *
♀ ♀/ Mars viij. 02/ euz prima pleiadū . 6/ Ven⁹. iij. 02/ cū corde ♀
● ♀ et ♀ 10. / v cōiungitur eadē stelle 7/ ♀ m c euz eadē stella 12. / v. oc
cidit cum ea 9. / ♀. ☐ ♀ i c arcturns oc/ 27. magna pluuia/ in quibus dā
locis cum to. et ful. / Mercuri⁹. iij. 02/ cum cauda ♀ ● H et ♀ . 45/ xi m c
cum dorſo ♀ ☿ H et ♀ . 31/ xi. i c cum eadem stella 17.

5 c rē. ☐ ☉ i c sinister pes Orionis oritur . 18/ Luna v. cum ♀ in clune si
nistro ☐ sequentis H 54/ eadem hora * ♀ ♀/ Mars viij. oritur cum
prima pleiadum . 13 a media 26. / iij ☐ ♀ oritur oculus ♀ m c 18. / vi.

SEPTEMBER

- 6 d** ☽ occidit dexter humerus Orionis i c. 28/ Et sit descendens ventosum
 Luna .i cum * in brachio ♄ sequentis 31/. xi * ☽ ☉/v. ☽ ☿
 Jupiter .iij i c cum spatula dextra Centauri Δ ♄ et ☽ 1./ ij. me cum ca-
 dem stella .5/ Mars viij. oritur cum prima pleiadum .22 a media au-
 tem 17./ Venus .iij oritur cum nebuloſa Ω .55/. Et me cum ceruice Ω
 Φ H p ☽ .11/ Et i c cum eadem stella 36./ v. ☽ ☿ occidit ſiniſter pes
 Orionis i c 17./ Mercurius .v cum * quaſi brachio Leonis 24/ Ab
 alia autem que eſt * in ventre core Ω H p ☽ drā 1 mi. pluuiosum et vent
7 e .ij ☽ i c canis maior oritur .3/ Mars viij. oritur (toſum
 cum prima pleiadum .31/ a media earum 7./ ij ☽ ☿ Venus .iij or.
 cum dorſo Ω Φ H et ♄ .11/ ix. * ♄ ♄ ſerenum et temperatum/ Mer-
 curius vij. occidit cū ceruice .Ω Φ H et ☽ .31/ .v ☽ ☽ oritur ſupra occi.
 .19/. xi ☽ ☽ i c pleiades occidunt .47/ Et ☽ ☽ m c frons m oritur .9
8 f .vi ☽ ☽ oritur dexter humerus Orionis m c .25/ Luna .iij cum * in
 palma pedis ſiniſtri precedentis Ω 38/vij. * ☽ ☿/ix. ☽ ☽ ♄ 2 grad/
 34 mi. xi. * ☽ H/ Mars viij. oritur cum prima pleiadum .5
9 g Sol oritur cum precedente vindemiatorem Δ H et ☽ .6/nub. Luna
 iij. cum * quinta extra Ω 3/. ij Δ ☽ ☿ Mars viij. oritur cū prima
 pleiadū .17/ Venus v. cōiungitur * ſuper aſcellam ſiniſtrā Ω 24/. Et
 ☽ ♄ m c ſomahant i c .14/ iij. * H ♄/ Et. ☽ ♄ i c ſomahant m c
 25./ Et ☽ H oritur ♄ i c .18 Et ſic Venere Jmū celi tenente H oritur ſo-
 mahant m c humidum et frigidum
10 a Noua Luna Octobris hora 10 mi/25 poſt me. Aſcendente 1 gra/40
 mi ſ/ quem humidiffimum gradum dicunt/ cum quo ſe-
 re oritur Saturnus .38/ Venus autem cuſpide Jmū celi occupat drā .6
 q̄ ſere ☽ per angulos/ Suber. ☽ cum H et ♄ ventoſa et valde frigida
 atq; humida erit/ Tñ Mars qui aſpicit aſcendens ſextili et Venerem trino/
 adinet nonnihil humi. et frig. Erunt ſepe pruine et pluie frigide .vij ☽
 ☽ ☽ differentia 2 gra/ 24 mi./ ij. ☽ ☽ m c canis minor occidit .5
 ventum mouebit/ iij ☽ ♄ oritur pleiades m c .2/ .Et ☽ ♄ m c ſini-
 ſter pes Orionis occidit .6/ ij. Δ ♄ ☽/ Mercurius v. cōiungitur
 ſtelle Δ in ala meridiana m H p ☽ 58/. v ☽ ☽ or. ſiniſter pes Orio-
 nis m c 25/. iij ☽ m c cū cauda Ω H et ♄ .48/ Et ☽ ☽ m c oculus H
 occidit 9/. iij. i c cum cauda Ω 2./ ventus
11 b .iij ☽ ☽ H iij ☽ ☽ i c ſiniſter pes Orionis oritur .31
12 c Sol .vi oritur cū fundo vaſis Δ ♄ p ☽ 25. /vi. ☽ ☽ occ. H i c 17.
 nub. alibi pluuia/ Luna .vij cōiungitur ſpice m ☽ ♄ p ☽/ 8 gra/
 17 mi./ iij. cum * in cora ſiniſtra m ☽ p ☽ 5/ vi. cū alia * in genu
 ſiniſtro m ☽ p ☽ 12/ Venus .iij oritur cum lucida hydre Φ H et
 ♄ differentia 22.
13 d iij ☽ ☽ m c dexter humerus Orionis occidit .9/ i. ☽ ☽ H/ nubiloſum
 frigidum alibi pluuia aut pruina/ Luna .iij cum * in ſimbria veſtis
 m ☽ p ☽ 31/ xi. cum * in ſunelancis ſeptentrionalis Δ H p ☽ 22/. v
 ☽ ☽ drā 1 gra 2 mi./ ix Δ H/ et ☽ ☽ ☽/ vi. * ☽ ♄/ Jupiter i. cō-
 iungitur ſtelle * in ſimbria veſtis m ☽ p ☽ drā 1 gra/ 33 mi/

SEPTEMBER

- 14 e **Introitus Solis** in Δ hora 7 mi 50 Ascend. 20 gra/ 8 mi. Δ **Su**
ber. precedit δ fortis augebit ζ v δ os id en δ por
tendit/ Jupiter in ascendente et δ per angulos ζ et δ adimet nonnihil/ ζ
et humi per δ significatam sed anticipabit/ Luna vi. cu χ in medio
lancie septentrionalis Δ . h p δ 9/ η . \square h occidit ζ m c. 9/ vj. \square h i
e ζ occidit 7. / . iij \square δ oritur frons m i c 30. / Mercurius v or
cum precedente vandenato ζ Δ h et ζ . 28 ζ . \square ζ or. dexter hu. Ω 10/ δ
nis m c 14. / temp δ uosora vento cum inditia
- 15 f **Sol** .vj oritur cum arcuro \odot δ et ζ . 4. t δ pestuosus ventus cum plu.
In quibusd δ locis cum to. et sul. Luna. v cum χ in lance septentrionalis
h p δ 37/ i. * δ ζ / e. * δ \odot / η . \square h occidit ζ m c 1. / iij. * h δ /
. η \square ζ i c postrema fluminis or / 5. ζ . \square δ m e canda δ occi / 3. v. n
ti humid/ Venus .x m e cum fundo v. iij. Δ δ p ζ . 6/ e. i c cum ead δ
18. / . iij δ δ oritur postrema fluminis occidit. 29/ vj. δ iungitur stelle χ
tertia extra δ 4/
- 16 g .viij δ ζ oritur δ occ. 7. / . η δ δ m e arcutus i c. 6/ η . δ δ i c arc
turus m c 1. / ventus calidus/ Venus .vij cum χ quarta extra δ dr δ
1 gra/ 1 mi. . 4. \square δ δ Mercurius . η coniungitur stelle Δ in ala au
strali iij δ p δ 28. / vj oritur cum lucida transtruauis ϕ δ . 44 m \square ζ
m e dexter humerus Ω 10 δ occidit. 12/ vj. \square h ζ ventosum in nonnullis
locis cum humiditate.
- 17 A .vj \odot \odot oritur lyra i c 21. / Venus r. i c cum dorso δ ϕ h et δ
. 37/ Mercur δ .vj oritur cum arcuro \odot δ et ζ . 58/ ζ . \square ζ or. h m c
24. venti valde t δ pestuosi in quibusd δ locis frigi. atq; humi.
- 18 b **Quarta lunæ crescentis** ho. 1 mi/ Δ Ascend. 21 gra/ 10 mi. δ et n δ
longe post scilicet cum 27 gra oritur/
Luna et h occ/ **Su**ber. h cum ζ ad frigiditatem et hu. declinabit sed δ
 ζ et δ qui affricunt lun δ et h adiment nonnihil/ **Sol** vi. occ. cum ζ . 4/
. η * δ ζ / Δ δ / . iij δ δ h . ix \square δ ζ viij. δ ζ δ d δ a dia
metro 2 gra/ 17 mi. venti calidi/ Venus . iij oritur cum cauda δ h et δ
. 27 \square δ oritur oculus δ m c 1. / . x m e cu dorso δ δ ϕ h et δ 6. nub.
- 19 c .vj \square \odot oritur canis maior m c 17. / Luna . iij cum χ in contactu
septentrionali arcus δ 24/ vj. en δ alia * ibidem 45/ i \square δ / **Mars**
viij. oritur cum quarta extra χ χ h 7. / Venus vj. coniungitur stelle χ
quasi in brachio δ dr δ 10/ **A**lalia in ventre coxe δ 35 pluuiosum/ vj \square
 ζ oritur lyra i c 10.
- 20 d **Sol** xij m e cum ζ dr δ . 7/ xij. \square \odot i c somahant occidit . 28 **L**u
na. ix cum Δ meridionalis in cornu δ 30/ . xj \square δ / η . \square δ ζ / i.
 δ ζ m c δ i c. 3/ viij. \square δ oritur canis minor i c. 6/ vi. \square δ i c dexter
humerus Ω 10 δ or / 7. / vj \square ζ oritur canis maior m c 36. / e. δ \odot ζ
d δ 22 mi. nubilosus v δ rus/ alubi pluuia/ vi. \square ζ oc. dex. hu. Ω 11. i c 32.
21 e **Sol** .vj oritur cum ζ 7. / ventus h δ idus Luna . iij cum χ in cauda
 δ ζ et h 56/ . iij Δ δ \odot . v Δ δ / ζ . **Mars** . iij cum χ supra cornu
Ceti h 52/ viij. oritur cu secunda χ extra forma 10. / . j δ ζ i c / δ m e
22 ventum humidum augebit/ . iij δ δ oritur lyra occidit. 15/ **Mars**

SEPTEMBER

- 22 f. **Sol** xij. i e cum precedente vindicatorē. 22/ i e (mahant occ./ i
 quoz; cū ☿. 5/ ventus/ Et fit ☉ i e presēpe 02/. 21/ Luna vij. cum X
 in amphora ☿ Et H 8/ i r. cū ✕ ibidē 16/ eadē hora cum alia ✕ 44/ r.
 ✕ ☿. xj ☉ ✕ m e frons M oritur 54/ Et ☉ ✕ m e pleiades oc.
 .2/ Mercurius. vj 02. cum lucida corone septentrio. ☿ et ☿ 16./ vj. ☉
 ☿ occ. lyra m e 44./ xij. ☉ ☿ i e presēpe 02/ 26
- 23 g **Sol**. vj 02/ cū iu. rdo. corone ☿ ☿ et ☿ 20./ xij m e cūz precedēte vīnō
 demitatorē Δ H et ☿ 8./ vj. ☉ ☉ occidit lyra m e 1./ Luna .ij cum
 X infusio. ☿ .9/ .ij Δ J 1/ Δ J 4/ xij Δ H 4/ Venus v. oc. cū
 ceruice Ω. ☿ 17 p ☿ 18./ iij ☉ ✕ oritur hircus m e. 20/ .xj ☉ ✕ m e
 canis maior occ./ 35/ Mercuri' vj. oc. cū spica m ☉ ☿ p ☿ 39/ Et sit
 merid. venam nubilosum mouebit/ alibi pluuosum
- 24 a **Sol** vj. occidit cū spica m ☉ ☿ p ☿ 28/ j. ☉ H occ. ☿ i e. 5/ j ☉
 ☿ m e postrens. flumis 02/ .7/ turbidū cū frigiditate/ sed anticipabit/ vi. ☉
 ☿ occidit canis maior i e. 12/ xij. ☉ ☿ i e canis minor oritur. 15/ j. ☿ ☿
 25 b **Sol**. vj oritur cum ala dextra corui Δ ☿ et H 17./ xij ☉ JH/ Jupiter
 j. m e cum arcuro ☉ ☿ et ☿. 2 vētosum./ Venus xj. est cū Δ in ala me.
 m ☿ p ☿ 40/ Et eadē hora i e cū cauda Ω ☿ et ☿. 32/ iij ☉ ☿ 02/ sit
 nūter pes Orionis m e 20./ .xj ☉ ☿ m e oculus Ω occidit. 12/ vj ☉ ☿ 02.
 canis minor i e 28.
- 26 c **Plena Luna** Octobris hora ii mē/ 22 aū me. Ascendēte 7/ gra/ 29 mē.
 ☿ cū quo 02. cor M ☿ p ☿ 54./ Suber. ☿ cū ☿ licz de
 biles sint tñ stella Martialis in ascendente aurā ad temperiem aeris pro
 qualitate tēporis declinabit/ xij. ☉ ☉ i e canis minor oritur 29./ Lū 9
 .vñ cū X in filo X H et ☿ 22/ xij cū alia ibidē X 19/ vñ. ☿ J ☿/ Jupit
 ter. j i e cū spica m ☉ ☿ p ☿ 5./ ventus humidus. i r Jupiter iungitur stelle
 X in pede iustro m ☿ p ☿ 35 Ven'. xj m e cauda Ω ☿ H et ☿. 5/
 nebulas fiserabit/ Mercuri' xij m e cū spica m ☉ ☿ p ☿ 6./ i r. conū
 gatur eadē stelle dēā i gra/ 18 mē./ xij. i e cū eadē stella dēā 44 ventosum et
- 27 d **vj.** ☉ occidit canis maior i e 16./ Luna. iij cū (humidum.
 X prima extra X 58/ v cū X quarta extra X 42/ j. ☿ J ☿ 54/ vñ. ✕ J
 H/ viij. ☿ J 4/ j ☉ ☿ i e cauda ☿ occidit 2./ vñ ☉ ☿ occ. presēpem
 e 9/ j. ☉ ☿ i e canis minor occidit 6./ xj. ☉ ☿ i e simitar pes Orionis
 oritur .17/ Mercuri' vñ oritur cū spica m ☉ ☿ p ☿ 3/ magna plu. cū
- 28 e **vj** ☉ ☉ 02. canis minor m e 8./ Luna xj. cū X (ventis
 in cauda Y ☿ 30/ vj. ☿ ☿ oc. ☿ oritur. 8/ vñ ☉ ☿ oc. presēpem e 9./
 Mercurius vñ. occidit cum dorso Ω ☿ H et ☿. 38
- 29 f **xij.** Sol i e cū spica m ☉ ☿ p ☿ 24/ j ☉ ☿ m e canis maior oritur
 .1/ ij. Δ J ☿
- 30 g **Sol** xij m e cū spica m ☉ ☿ p ☿ 6/ j Luna. j cū Δ sub oculo Ω H p
 ☿ 18/ . iij cōiungitur oculo Ω ☿ 49/ xij cū alia X in origine cornu me/ 38
 vi. cū alia X in cornu mari. ☿ 20/ vñ ☿ ☿ occ. lyra oritur. 8/ Mercur
 rius. vñ oritur cū lyra ☉ ☿ et ☿. 25/ Et ☿ ☿ oritur ☿ occidit. 33/ vñ. oc
 cidit cum cauda Ω ☿ H et ☿. tempestuosum ventum excitabit.

OCTOBER

Saturnus circa finē mensis occ. cū caneminoze ● ♄ p ♄ Meridionalis
 bus autē feretoto mense isto occ. in parua drā cum predicta stella ob id plus
 uias frigidās illis minatur et locis montantis niuē copiosas/ Mars cir
 ca 8 diem cōiungitur stelle ♃ h/ et est quarta extra X niuosam auram in
 natur in locis calidioribus pluuiosam/ sed anticipabit

- 1 a .v Sol coniungitur spice ♄ ● drā 2 gra. /j. coniungitur stelle ● in
 cora sinistra ♄ p ♄ drā 20 turbidū et frig. alubi pluuiā/vj. *) ♄
 vñ. Δ) ♄ /ix. □) ♄ Saturnus sit retrogradus/ Mars. j m c cum
 nodo filozā X ♄ p ♄ drā 1. / Et j. i e cū eadem stella drā .11/. xj ♄ ♄
 ♄ drā a diametro 3 gra/ 46 mt. nubila/ Venus .iij oritur cū precedē
 te vindemiatore h et ♄ .7/v. □ ♄ occidit h i e drā 5./augebit nubilo
 sam aurā et frigidā./vñ □ ♄ oritur p̄sepe m c 23./
- 2 b Sol .vj oritur cū spice ♄ ● ♄ p ♄ drā 4./pluuiā/j. coniungitur *
 in cora sinistra ♄ p ♄ drā 20/ Luna ꝥ. cū Δ in clune sinistro II ser
 quentis 36/. ij ♄) h/drā 3 gra/40 mt./v Δ) ♄ /j ♄ m c ♄ i e .22
 3 c Quarta lunæ decrefcentis hora 11 mt/26 ante me. Discēdente 13 gra
 15 mt. ♄/ Guber. ♄ cū h/dispositio
 aeris pro uatura tēporis. Circa finē tñ Mars frigidiorē et humidiorē red
 det/ Sol v. occidit cū dorso Ω ♄ h et ♄ 13./ Luna .vj cū * sexta te
 tra II 30/ Mars j. i e cum sequente cornu Δ ♄ et h. 6/ Et ♄ ♄ i e ♄
 m c 11./ Venus .v oritur cū fundo uasis X ♄ p ♄ .6/ Et .ix cōiungit
 tur cū stella Δ in ala australi ♄ p ♄ ♄ 7/ serenū./ j □ ♄ i e canis mas
 ior 02/19./j. □ ♄ m c canis minor occidit 18.
- 4 d .v □ h ♄ / eadē hora *) ♄ / Et ♄) ♄ /ix □) ♄ / ꝥ Δ h ♄ /
 hum. et nubilosum/ in quibusdā locis frig. niuosum/alubi plu./ Mars
 .j m c cū cornu sequente γ Δ ♄ et h 7./ Et m c cū quarta extra X X
 h 12./ j. i e cū quarta extra X drā 5./ Venus .v oritur cū lucida trā
 stri nautis ♄ ♄ drā .11/ j. □ h occ. ♄ m c 48./ uentus/ in quibusdam locis
 5 e Sol v. occidit cū cauda Ω ● h et ♄ .25/ Luna .xj (frigid
 cū X in palma sinistra pedis precedentis Ω 42/ vj. *) ○ /ix. Δ) ♄
 .v □ h m c ♄ oritur 13. turbidum/ .vñ Jupiter oritur cum ♄ 19./ ual
 de uentosum/ Mars .j m c cum capite trianguli Δ ♄ .6/ et a quarta
 extra X 10./ j. i e cū capite trianguli .5./ xj □ ♄ m c dexter humerus
 Orionis occidit 38./ Mercurius j. m c cum arcturo ● ♄ et ♄ 30./
 Et j i e cum eadem stella .20/ □ ♄ i e cauda ♄ occidit .36 augebit
 uentos et nubila.
- 6 f .v. ♄ ○ or. ♄ oc/ 4./ serenū et calidum/ Luna xj. cum * quinta extra
 Ω 48. vij *) h/ij *) ♄ / ij. *) ♄ / Jupiter j. m c cum ♄ /
 rñ: ♄ ♄ ♄ 33 calidi uenti/ Mars j. i e cum ventre Ceti Δ h .8/vj.
 ♄ oritur ♄ oc/ .38/ Venus .v or. cū arcturo ● ♄ et ♄ 16. plu.
 7 g Sol rñ m c cum extrema cauda visematoris .13/ Et ♄ ○ m c ♄ i e
 .33/ rñ ♄ ○ i e ♄ m c 10./ .vj ♄ ○ ♄ differētia a diametro 2 gra
 27 mt. auram calidā promittit/ sed anticipabit hec aue dispositio pro
 pter Martis motum incertum. Mars rñ m c cum antecedente cornu
 γ Δ ♄ et h 8./v. oritur cū tertia X extra .11/ Mercurius j. m c cū

OCTOBER

- pedeposteriore lupi Δ h p δ .14/
- 8 21 Sol. vij oritur cum lyra \bullet \times et φ 25./ Et \square \odot oritur presepe me
 .30 nebulosum/. xj \square Δ h/ix. δ Δ \times 44/ Ma. s. iij coniungitur stel
 le \times h quarta extra \times 5./ vt occidit cum tertia extra \times o/rj ic cum
 eadem 9./ Et cum secunda extra \times .6./ v \square \times oritur lyra ic 21./ Mer
 curius .j ic cum pede posteriore lupi Δ h p δ 32./ vij oritur cum lu
 minosiore lancis septentrionalis \bullet Φ φ et φ .4/ a meridionali .58/ Et
 \square φ oritur cauda δ i c 50. pluvia
- 9 b .vij \square \odot oritur presepe me .50/ Luna v. coniungitur spice η \bullet
 \times p δ dra 3 gra/23 mi./ xj. cum \times in cora sinistra η φ p δ 10/
 Mars v. oritur cum prima \times extra formam 15./ v \square \times oritur canis
 minor me 15./ v. \square \times occidit lyra me 8./ xj. \square \times i c Somahant oc
 cidit 1. Mercurius .vij oritur cū capite herculis Δ φ 51
- 10 c Noua Luna Nouēb. hora 10 mi/46 añ me. Ascēdēte 10 gra/26 mi/ \times
 venere cuspidē me occupāte dra 1 gra/26 mi. Guber. \times
 cū φ tēperata vt tēpori cōgruit declinās nō nunquā ad hūditatē Sol rj
 me cū spatula dextra Centauri Δ \times et δ .26/ Et rj. ic cū eadē stella 4./
 Et \odot i c canis ma. 02/ 01/ Lūa .ij cū \times in genu sinistro η φ p δ
 17 δ δ / j. cum \times in sūbria vestis η φ p δ 4/ v. Δ Δ h/ix. δ
 Δ φ dra 1 gra/ 39 mi./ Venus .xj me cū principio caude vese ma
 foris Φ δ .25/ Et v. o. c. cū spica η \bullet \times p δ .5 pluvia Mercur
 rius .j i c cū luminosiore lancis meri. \bullet Φ φ et φ .9/ Et me cum eadē
 stella 59./ vij \square φ oritur cor Ω me 18./
- 11 d rj \square \odot me canis minor occ. 20/ v. δ \odot occ. δ oritur .10/ Lūa. vij
 cū \times in fume lācis septētrio. \bullet h p δ 28/ iij. δ Δ φ 1 gra/18 mi./ Jup
 ter vj. occidit cū φ .8/ Et fit \square φ occi. canis minor i c .39/ Mars. vj
 coniungitur stelle \times prima extra \times 25/ nebulosum/ sed anticipabit/ Ven
 us .xj me cū precedente vindicatorē Δ h et φ .12/ xj. i c cū eadē 24.
- 12 e rj. \square \odot i c postrema flumis 02/25./ Lūa. ij cū \times in medio lācis sep.
 \bullet h p δ 6/ j. cū alia \times ibidē 54/ alioquē est cursu vacua/ Mars. vj oc.
 cū prima \times extra formā \times h 8./ Et cū quarta \times extra .6/ neb. sepe suscita
 bit/ Ven^o. v oc. cū corona septē. \times et φ 4. neb. v. \square \times oc. ca. ma. i c 12.
- 13 f \times . Δ h \odot / Jupiter rj me cum posteriore pede lupi Δ h p δ .6/
 Ven^o ix. cū \times in ala australi η φ p δ 27/ nub. / xj \square \times i c canis minor
 02 .14/ Mercur. vij 02. cū capite serpē. Φ h p \times .15/ \square φ oritur soma
 hant ic 36./ j. \square φ me postrema fluminis i c .38
- 14 g Introitus Solis in m hora 0 mi/8 post me. Ascendente 0 grad/
 51 mi. δ quē frig. siccū atqz valde ventosus nostri
 antecessores esse obseruarūt/ Sol in cardiem c dra 1 gra/59 mi./ Jup
 ter quoqz dra 3 gra/ 31 mi. Guber. prece. δ satis fortes augebūt signifi
 cationē per prece. δ significatā/ aura satis tēperata et plus quā tēpori cōgru
 it./ Sol rj me cū arcuro \bullet δ et φ .25/ j. \odot cū \times i pe. sim. η φ p δ 30/
 rj. i c cū arcuro 7./ Et \square \odot i c cauda δ oc. 9./ vērō. in quib^o dā lo. nubt.
 .j \times Δ / vj. Δ δ φ / Ven^o. v 02. cū ala der. corū Δ δ et h .30/ Mer
 cur^o. j i c cū luminosiore lācis septent. \bullet Φ φ et φ .31/ δ φ i c postres

OCTOBER

- ma fluminis m e 8. / j. m e cū eadē stella 15. / j. occidit cū luminosoze lā
 cis meri. — Υ et Υ 25. / \S \S oc. pleiades oriūtur. 26 augebit ventum
- 15 a j. \odot \S \S / uq. * \S \odot / rj. * \S Υ / Mercuri⁹ vj. occidit cū cauda \mathbb{M}
 Δ h p Υ 24.
- 16 b Luna. ij. cum χ in cōtactu septētrio. arcus Υ Υ et \S 25 / viq. \square \S Υ
 Ven⁹ v. occ. cū dorso Ω \S h et \S 17. / v \square \S 02. canis minor m e .9/
 rj. i e cū spica Υ \bullet \S p \S .22 / Mercuri⁹ .ix 02. cuz nebuloza iuxta \mathbb{M}
 13. / vi. occidit cū meridio. in fronte \mathbb{M} Δ \S .8
- 17 c Luna .iiij. cur * in cōtactu septētrionali arcus Υ Υ et \S 46 / viq. cū Δ
 meri. in cornu \S \S p \S 53. / v \square \S .vi * \S Υ / rj. \square \S Υ / Ves
 nus .xj m e cuz spica Υ \bullet \S p \S 17. / nubula / Mercurius vj. occ. cuz
 precedente vindemiatozem Δ h et Υ .2 /
- 18 d Quarta lunæ crescentis hora 8 mi / 44 añ me / Ascendēte 25 grad /
 2 mi. \mathbb{M} / Suber. h cū \S recedet parū per
 a tēperamēto preced. quarte / Sol rj m e cū pede posteriore lupi Δ h p \S
 .20. / Et rj. i e cuz eadē stella 10. / Et i e cuz Υ 5. / serenū / Mars. vj oc
 cidit cum nodo filozū χ Δ \S p Υ 2. / Venus .vj coniungitur spice Υ
 \S p \S 3 gra / 16 mi. / v. occ. cuz cauda Ω \bullet h et \S 8. nubilozum / in qui
 busdā locis pluuia / Mercuri⁹ j. m e cuz lucida corone Φ \S et Υ .29 /
 \S Υ m e pleiades i e .2
- 19 e Sol .vñ 02. cū Υ 20. / iij. \S \odot Υ drā i gra / 5 mi. serenū / Luna rj cū
 * in cauda \S Υ et h 59 / Δ \S j. * \S Υ . \square \S Υ / rj. \S \S 02
 a diametro \odot gra / 53 mi. Et \S m e \S i e .19 / plu. sed postponet / Ves
 nus .iiij 02. cū spica Υ \bullet \S p \S drā 32 / nubilozus / alubi pluuia / Mer
 curi⁹ .j i e cuz lucida corone Φ \S et Υ 14. / \S Υ i e pleiades m e 41. / ix
 oriūtur cū spatula dextra centauri Δ \S et \S 37. / Et cuz fronte \mathbb{M} Δ \S .28 /
 in quibusdā locis nubilosi venti
- 20 f .vñ \square \odot 02. cauda \S i e .21 / rj \odot m e cum Υ 20 / serenū / v. \square \odot
 occidit canis minor i e .29 / Luna .iiij. cuz χ in amphora \mathbb{M} Υ et h /
 52. / v cum * ibidē 55. Υ cuz χ prima fusidīs \mathbb{M} 30. / ix Δ \S h / Υ . Δ \S
 Υ / rj. Δ \S \odot / iij. \S \S oriūtur \S occidit 11. / v \S occ. \S 02. / 21. / rj
 \S \S i e \S m e 44. / sed antcipabunt / Venus xi. cuz * in cora sinistra
 Υ 13 / Mercuri⁹ .ix oriūtur cū media frontis \mathbb{M} Δ \S .40. / Et \S Υ oriū
 pleiades occidūt 38. / i. m e cuz meridionali in fronte \mathbb{M} \S .58 /
- 21 g Sol .vñ oriūtur cum luminosoze lanci septētrio. — Υ et Υ .15 / nubt.
 cū ventis / Mercuri⁹ .j i e cuz meridio. in fronte \mathbb{M} Δ \S 5. / ix \S Υ
 oriūtur oculus \S occidit .36 / i. m e cum media frontis \mathbb{M} Δ \S .5 / et cōiung
 gitur Δ in fronte \mathbb{M} i gra / 4 mi.
- 22 a Sol oriūtur cū luminosoze lanci meri. — Φ Υ et Υ 11. / Et 02. cū Υ
 .20 / serenū et vñ. / rj cōiungitur eidē stelle 40 / Et m e cū ea .14 / nub. cū vñ
 tis / iij. Δ \S Υ / vñ. \square \S h / .v \S \S occidit spica oriūtur 5. / Ven⁹ .vñ
 cum χ in genu sinistro Υ Υ p \S 12 / Mercurius .i / i e cum media frō
 tis \mathbb{M} Δ \S 35. / ix oriūtur cum postrema in fronte \mathbb{M} ad meridiē .40. / Et
 \square Υ oriūtur cauda Leōis m e 10. / i. m e cum fronte \mathbb{M} .12 /
- 23 b Luna iij. cum χ in filo χ h et Υ 14 / viq. cum alia χ ibidem 13 / Ves
 nus .x m e

OCTOBER

51 g v. ☐ ☽ ♀ xi. Δ ☽ ♀ xij ☐ ☽ ♀ / Jupiter .vi. oritur cum luminoso
 fiore lancis septentrionalis = ♀ et ♀ / ☽ 5. / xi m c cum luminoso fiore la
 cis meridionalis = ☽ ♀ et ♀ .5. / Et i c cum eadem 2. / ventosum in
 quibusdam locis pluuia / Venus xi. i c cum posteriore pedelupi Δ ♀
 p ♀ .6. / iij. ☐ ♀ occidit canis minor i c 5. /

NOVEMBER

Sol 9 et 10 diebus mensis est cum stellis in fronte m ♀ nature / Et
 a 26 diebusque ad 30 circa stellas in dextro pede serpentarij ♀ p ♀ natus
 renubilosum et humidum / Saturnus a principio mensis occidit cum
 cane minore ● ♀ p ♀ paulo post contingitur X in pede sinistro II an
 tecedentis ♀ et ♀ / Circa finem autem contingitur X. et est extrema pe
 dis sinistri II antecedentis valde nivosum aliquot diebus ante et post
 magnūq; frigus portenderet / sed coniunctio Jouis et m luminoso lan
 cis meridionalis = ♀ et ♀ / adimit aliquid / Erit aura admodum in
 stabilis in frigiditate et multum humida Circa medium autem oritur Sa
 turnus cum capite II antecedentis ☽ ♀ valde ventosum et frigidum / In
 quibusdam locis etiam humidum aliquod diebus ante et post / id etiam m
 natur ☐ per angulos ♀ oritur Somniant me Que configuratio in 7
 diem incidit / minuet vero nō nihil / ☽ ♀ occidit pleiades oritur 6. / Et ☐
 per angulos ♀ oritur cor ♀ m c 14 die / 28 die ☽ ♀ i c postrema flumis
 m c istis diebus per ventos calidos faciet liquefactionem nivium / Mercu
 rius 11 die facit ☐ per angulos ♀ m c cauda ♀ oritur / et durabit aliquot
 diebus ante et post / sit etiam ☽ ♀ occidit oculis 8 oritur / sed drā est plus
 vno gradu 12 mi. / ☽ ♀ i c hircus m c 16 ☐ ♀ m c cor ♀ occidit drā 3
 gra / 7 mi. / At propter retrogradationem aliquot diebus continuis dura
 bunt ante et post / quare sepe ventosam faciet aurā / qñq; etiam humidam.
 Die aut 30 contingit ☐ ♀ oritur cauda ♀ m c 50 propter directionem
 quoq; durabit per aliquot dies añ et post.

10 Quarta lunæ decrefcentis hora 6 mi. 26 post me. Ascendente 21
 gra / 44 mi. II cum quo oritur cor
 nu merid. 8 Δ ♀ drā 30. / Luna in cardine tmi celi drā fere gradus /
 Guber. ♀ cus ♀ / Et si Mars in propria domo in signo igneo in loco eclip
 tico Solis stella sine nature in ascendente / et coniunctio Jouis cum lumi
 nosiore lancis meridionalis = ad remissionem frigoris inclinet / Tamē
 Saturni occasus cum cane minore Tetragnus item lunc per angulos
 fere cum stella in ascendente constituta multuz alterabunt aurā ad frigidit
 atē et hu. et erit in multis locis aura multum instabilis in frigiditate / pre
 sertim a principio / v. ☽ ☽ occidit Somniant oritur .7 / Luna usq.
 cum X in sinistra palma pedis precedentis ♀ 49 / iij. Δ ♀ /
 20 xj * ♀ ♀ / Jupiter .vi. oritur cum luminoso fiore lancis meridionalis
 = ☽ ♀ et ♀ .3 / Venus usq. occidit cuz luminoso fiore lancis meridionalis

NOVEMBER

nalis ☉ ☿ et ♀ .35

3 f Sol .vij oritur cum nebulosa ♀ .4/ rē. ☉ ☉ i c pleiades m c .18/
·j *) ♀ .v *) ♀ .vi ☉) ♀/ Jupiter iū. occidit cum cauda
♂ Δ h p ♀ .1/ Venus rj. i c cum luminosoze lancis meridionalis
= ☉ ☿ et ♀ .16

4 g Sol rē m c cum lucida corone ☉ ♀ et ♀ .14/ Et ☉ ☉ m c pleiades i c 17./ rē. ☉ i c cum lucida corone 16./ ·h *) ☉/ iū. ☉) h/ Jupiter .xj m c cum ♀ .25/ iū. occidit cum ♀ 16./ ix. ☉ ☿ ♀ differētia 10 mi./ rj. i c cum ♀ 6./ serenum et temperatum/ Venus .vi oritur cum vtroq; luminosoze lancis = a septentrio./7. a meridionali .27/ .vij coniungitur lancis meridionalis = ☉ ☿ et ♀ 56/ .xj m c cum luminosoze lancis meridionalis = 22./ nubilosum aliubi pluuia/ iū. occidit cum cauda ♀ Δ h p ♀ 28.

5 A Luna rē. coniungitur spice ♀ differentia 3 gradus 70 mi. eadem hora ☉) ☿/ ·j *) ♀/ Jupiter vij oritur cum ♀ 14./ serenum/ Venus iū. occidit cum meridionali in fronte ♀ Δ ☿ .13/ rj. ☉ ♀ i c corde ☉ oritur .53

6 b Sol v. occidit cum corde ♀ ☿ p ♀ 9. nubila/ Luna .vi cum * in cora sinistra ♀ ♀ p ☿ .27/ .ix cum alia stella x in genu sinistro ♀ ♀ p ☿ 24./ vij. cum x in simba vestis ♀ ♀ p ☿ 19/ x. Δ) h/ Venus .vi oritur cum capite herculis Δ ♀ 7./ ☉ ♀ oritur cor ♀ m c .28/ iū. occidit cum precedente vindicatorum Δ h et ♀ .14/ xi. ♀ coniungitur vltima stelle lancis meridionalis = x h p ☿ drā 1 mi./ pluuosum in quibusdam locis nnuosum

7 c Sol .vij oritur cum spatula dexa centauri Δ ♀ et ☿ .12/ Et rē m c cum meridionali in fronte ♀ Δ ☿ .11/ rē. i c cum eadem stella 19. turbidum/ Luna j. cum * in fune lancis septentrionalis = h p ☿ 34/ vi. ☉) ♀ differentia 2 gra/ 1 mi./ vij. ☉ h oritur somniantis c 1./ frigidum et nnuosum

8 d Sol .vij oritur cum fronte ♀ Δ ☿ .16/ Et rē m c cum media frontis ♀ Δ ☿ .2/ rē. i c eū eadem 28./ turbidū/ Luna .ix cum x in medio lancis septentrionalis = h p ☿ drā 1 mi./ vij. cum alia x in lance septentrionali h p ☿ 27/ ·j ☉) ♀ drā 2 gra/ 15 mi./ Saturnus cōiungitur x in pede sinistro ☐ antecedentis ♀ et ♀ 10/ humiditas nnuosa aliquot diebus ante et post/ In quibusdam locis meridionaliōrib; pluuosum valde quam inundationes aquarum sequuntur/ Venus xi. i c cum luminosoze lancis septentrionalis = ☉ ☿ et ♀ .35/ Et ☉ ☿ i c postrema fluminis m c 31./ rj. ☉ ♀ m c postrema fluminis i c 34./

9 e Noua Luna Decembris hora 2 mi/ 1 aū me. Ascendente 25 gra. 29 mi. ♀ cū quo oritur precedens vindicatorum dexter humerus Orionis occupat cardinam mediū celi drā 1 gra. 17 mi./ hūer; aū equi maioris cuspidem occidentum drā 40./ Gaiber. ☿ cum ♀/ hec coniunctio contingit circa stellas in fronte ♀ Δ nas sure faciet auram multā hu./ in quibusdam locis cū magna nnuis copia.

NOVEMBER

- Sol rñ m c cum fronte M Δ ♂ .26/ Et ic cum eadem stella 4./ vñ ♂
 ☉ oritur pleiades occidit 19./ Venus .ñ coniungitur medietate lancis me
 ridionalis = X H p ♂ 28./ vi oritur cum sinistra palma serpentarij Δ
 H p ♀ 14./ rñ m c cum luminosiore lancis septentrío. = 5.
- 10 f Sol .viñ oritur cum media frontis M Δ ♂ 2./ ☉ oritur canis ma
 ior occidit 9./ Et est circa stellas frontis M Δ ♂ turbidum/ in quib⁹ da
 locis humidum et plu./ ix. ♂ ♀ differētia 4 grad/ 29 mi./ vñ. Δ ♀
 ♂ .vi ☉ oritur Somahant i c. 5/ Mercurius fit retrogradus ven
 11 g .viñ ☉ oritur oculus 8 occidit. 19/ v. ☉ ♀/ (tosum.
 Venus .vi oritur cum capite serpentarij ☉ H p ♀ Et ☉ ♀ oritur sini
 ster pes Orionis occidit 25./ iññ. ♀ occidit Somahant oritur 26./ j ☉ ♀
 ic hircus m c 16./ i. ☉ ♀ m c cauda ♀ oritur 29/ ☉ ♀ m c cor Ω occi
 dit dr̄ 1 gra/ 7 minu.
- 12 A Sol iññ. occidit cum fronte M Δ ♂ 17./ ☉ ☉ occidit presepe i c 20.
 turbidum/. viñ ☉ ☉ oritur cauda Ω m c 2./ rñ. ☉ ☉ ic postrema
 fluminis occi/ 14./ Luna X. cum X in contactu septentrionali arcus
 ♀ ♀ et ♂ 22 vi. * ♀ ♀/ Joviter .vi oritur cum capite Herculis Δ
 ♀ 5./ venus/. vi ☉ ♀ oritur spica m c .26
- 13 b Introitus Solis in A hora 3 mi 39 ante merid/ Ascendente 16 gra.
 29 mi. = cum quo oritur spica ♀ differētia 1 gra.
 15 mi. Marte cardinem occiduū occupante 35./ Guber. precedētis ♂ for
 tis augebit significatiōem precedentis coniunctionis/ Sol iññ. occidit
 cum luminosoire lancis septentrionalis = ☉ ♀ et ♀ 4./ rñ ☉ ☉ m c
 presepe occidit 9./ ix. coniungitur X in concavitate pedis sinistri serpen
 tarij H p ♀ 45 humidum/ Luna rñ cum * in contactu septentrionali
 arcus ♀ ♀ et ♂ 48/ .viñ ☉ ♀/ j. * ♀ ♀/ xi. ☉ ♀ ic cor Ω oritur
 .2 liquefactio/ Venus iññ. occidit cum media frontis M Δ ♂ 31./
 rñ. ☉ ♀ ic pleiades m c .28 turbidum
- 14 c Sol rñ m c cum corde M ♂ ♂ p ♀ .30/ rñ. ic cum eadem stella dif
 ferētia 0/ Luna .iññ cuz Δ meridionalis in cornu ♀ 35/ i. * ♀ ☉/
 .vi ☉ ♀ oritur cor Ω m c .5/ liquefactio/ Mars .iññ occidit cum
 secunda X extra X H .3/ Venus .iññ cuz X quinta extra = 53/ vñ oritur
 cum nebulosa iuxta m .18 .xi m c cum lucida corone ☉ ♀ et ♀ .17/
 ☉ ♀ m c pleiades i c 10./ iññ. occidit cum corde M ♂ ♂ p ♀ .3/ xi. ic
 cum lucida corone 20. nubilosum/ in quibusdam locis niviosum/ Mer
 curius fit septentrionalis/ ventos.
- 15 d Sol viñ. cum * in calcaneo sinistri pedis serpentarij H p ♀ 40/
 rñ. ☉ ☉ ic cauda Ω oritur .4./ viñ ☉ ♀/ * ♀/ viñ. * ♀/ .ix
 ☉ ♀ occidit oculus 8 oritur differētia 1 grad/ 12 mi. sed diu durabit
 propter retrogradationem ad 5 dies ante/ et 5 post
- 16 e rñ ☉ ☉ m c oculus 8 ic .15/ Et rñ. ☉ ic oculus 8 m c .4/
 Luna j. cum X in amphora ♀ ♀ et H 21/ iññ. cum alia * ibidem 35/
 .viñ ☉ ♀/ iññ. Δ ♀/ Saturnus oritur cum capite II anteceden
 tis ♂ ♀ . i valde ventosum ante et post/ Venus rñ. ic cñ meridionaliori

NOVEMBER

- in fronte M Δ ♂ differentia .10/
 17 f Quarta Lunæ crescentis hora 4 minu/52 ante meridiem/Ascendente 3 gra/5 mi. M/Guber. ♀ cum ♀ temperat: pro temporis qualitate/iq. □ ♀/♂/vi. Δ ♀ ♀ Jupi- ter. iij cum ♀ et est ultima lancis meridionalis = ♀ p ♂ 11/ vñt sep- tentrionales antec post/ Venus .xj me cum meridionali in fronte M Δ ♂ 27./ a media frontis .25/ ♀j. ic cum media frontis M 13.
 18 g .viij ♂ ☉ oritur dexter humerus Orionis occidit. 23/ xi. Δ ♀ ♀ .iij ♂ ♂ occidit spica oritur .2/ Jupiter iij. occ. cū precedente vindemia- torem Δ ♀ et ♀ .2/venti sep./ Venus .vij oritur cū spatula dextra cen- tauri Δ ♀ et ♂ .28/a fronte M Δ ♂ .31/.xj m e cū fronte M Δ ♂ .35/ xj. ic cū eadem stella 3./ tr. coniungitur fronti M 17 hum. et nubilo. in quibusdam locis niuosum.
 19 A Sol .viij oritur cum corde M ☉ ♂ p ♀ .16/.j □ ♀ ♀/vi. Δ ♀ ☉/ ix. Δ ♀ ♀/ Venus .ix est cuz ♀ in fronte M ♂ 32/ iij. cum alia ibidem ♀ et est septentrionalior in fronte M 38/ □ ♀ occidit presepe ic 21./ Et occidit cum fronte M Δ ♂ 18./ .viij ♂ ♀ oritur pleiades oc- cidit 17./ ♂ ♀ oritur canis maior occ/ 15./ xij. □ ♀ ic lyra occ./ 16/
 20 b .iij ♂ ☉ ♀ deā 1 gra/32 mi./ .viij Sol oritur cū ♀ 54./ xij m e cum ♀ .29/xij. ic cum ♀ .19 ventus/ Luna .j cum ♀ in filo ♀ ♀ et ♀ 8/ .v cum ♀ ibidem 3/xij cum ♀ ibidem 17/ viij. cum ♀ prima ex- tra ♀ 43/ ♀. cum ♀ quarta extra ♀ 28/ iij. ♂ ♀ ♂ differentia 1 grad/47 mi./ Venus .vij oritur cum media M Δ ♂ 15./ iij. occidit cum luminoso lancis septentrionalis = 17./ xj. □ ♀ ic postrema summis occidit .21/humidum in quibusdam locis niuosum/ Mercu- rius .vij oritur cum corde M ☉ ♂ et ♀ .9/ augebit humiditatem.
 21 c xij. □ ☉ ic lyra occidit 22./ .viij ♀ ♀ ♀/ Venus xij cuz ♀ in pede sinistro serpentarij ♀ p ♀ 41/ □ ♀ m e presepe occidit .19/.viij □ ♀ ori- tur cauda ♀ me .32/ ♂ ♀ oritur oculus ♀ occidit 8./ .viij ♂ ♀ ori- tur dexter humerus Orionis occidit 1.
 22 d Sol iij. occidit cuz ♀ 10./ .xj ♂ ♀ ♀/ Mars .iij occidit cū nodo filorum X ♂ p ♀ 0 Venus .vij oritur cum meridionali in fronte M Δ ♂ .7 Et coniungitur ♀ in concavitate pedis sinistri serpentarij ♀ p ♀ 12/ xj. ic cum corde M ☉ ♂ p ♀ 7./ valde humidum in quibusdam locis niuosum.
 23 e Luna .v. cum Δ sub oculo ♀ ♀ p ♀ 10/ ix. coniungitur oculo ♀ ☉ 39 eadem hora ♂ ♀ ♀ nubila aut nix/ Venus .xj me cum corde M ☉ ♂ p ♀ 30./ ix. coniungitur ♀ in calcaneo sinistro pedis serpentarij ♀ p ♀ 15/ xj. □ ♀ ic cauda ♀ oritur 3./ augebit nubila.
 24 f Plena Luna Decembris hora 0 mi/49/ Ascendente 13 grad/ 55 mi/ X/ in angulo sequente qui in unum ce- li est/dexter humerus Orionis ☉ ♂ et ♀ 6./ Guber. ♀ cum ♀ ventosa et satis temperata pro temporis qualitate fieret/ Sed Saturnus cū ♀ in pede sinistro II antecedentis alterabit ad humiditatem niuosam/iij.

NOVEMBER

- ☉ occidit oculus 8 oritur. 30/rq. ☉ ☉ se hircus m c 13. Luna .iij. cum X in origine cornu 8 H p ♀ 20. ☿ cum X in cornu meridionali 8 ♀ 15. q ☉ ☉ ♀. rj ☉ ♀ m c oculus 8 i c .2/rj. ☉ ♀ i c oculus 8 m c 36.
- 25 g Sol rj. i c cum capite Herculis Δ ♀ .9/rq ☐ ☉ m c cauda 70 oritur 29. / ☐ ☉ m c cor 8 occidit. 9/rq. ☉ ☉ H 3 gra/ 55 mi. / vq ☉ ♀ ♀/ differentia 1 Grad/mi./13
- 26 A Sol rj m c cum capite Herculis Δ ♀ 22. / Et ☉ ☉ m c sinister pes Orionis i c .27/rq. ☉ ☉ i c sinister pes Orionis m c 5. / est etiam cetera stellas in pede dextro serpentarij/ Luna q. cum Δ in clune sinistro II sequentis H 39/v. Δ ☉ ♀/rj. cum X sexta extra II 25/vq ☉ ♀ oritur dexter humerus Orionis occidit .37
- 27 b iij. Sol occidit cum nebulosa 8 ☉ et ♀. 20/ ☿. coniungitur X in pede dextro serpentarij differentia 20/ sunt illic plures stelle in maiori tamen differentia. / iij ☐ ☉ ♀/rj. Δ ☉ ♀/ Saturnus fit ascendens/ Venus .vij. oritur cum corde M ☉ ♀ p ♀ .17/rj. ☐ ♀ i c lyra occ. .37/rj ☉ ♀ m c oculus 8 i c .2
- 28 c Sol v. coniungitur X in pede dextro serpentarij differentia 45/ rj. i c cum cauda M Δ H p ♀ .29/.ix Δ ☉ ♀/vj. ☐ ☉ ♀/ix. Δ ☉ ☉/ ☿. ☉ ♀ i c/ postrema fluminis m c .4/ Mars .iij. occidit cum quarta X extra X H 1. / rj. ☉ ♀ i c cauda 8 oritur .6
- 29 d Sol circa stellas in pede dextro serpentarij/ Et .vij. oritur cū aquila ☉ ☉ et ♀ 28. / Et m c cum cauda M Δ H p ♀ 2. / iij Δ ☉ ♀/ rj. Δ ☉ ♀/ Jupiter .iij. oritur cum sinistra palma serpentarij H p ♀ .3/ Mars .iij. occidit cum prima X extra .2/ iij. ☉ ♀ occidit oculus 8 oritur .31/ Mercurius fit descendens ventosum. / rj. ☉ ♀ i c / oculus 8 mediat celum .5/
- 30 e Sol rj. i c cum capite serpentarij ☉ H p ♀ .16. / vij ☐ ☉ oritur spica m c .9/ iij. ☐ ☉ ♀/ vij. * ☉ ♀/ Saturnus rj coniungitur X extrema in pede II antecedentis ♀ et ♀ 5 magna humiditas et quidē nivosi aliquot diebus ante et post/ Jupiter .ij. cum X et est media lanycis meridionalis ☉ H p ♀ 34/ rj. ☉ ♀ i c hircus m c .4/ Mercurius .vj. oritur cum meridionali in fronte M Δ ♀ auget humiditatem.

DECEMBER

Jupiter in isto mense habet Tetragonos et oppositos per angulos/ 6 die ☉ ♀ oritur sinister pes Orionis occidit/ 8 die ☐ ♀ oritur Soma hant i c. / 15 die ☉ ♀ occidit Soma hant oritur/ 31 die ☉ ♀ i c pleiades m c/ Et extra ♀ m c et pleiades i c/ Mars p 4 die ad 8 circa stellas in filo X H et ♀/ Mediat atqz inat celū cū stellis extra X H et cum antecedente cornu Y et sequente sed anticipabit/ Venus a principio ad 4. diem circa stellas in dextro pede serpentarij H p ♀/ et a 21 die

DECEMBER

ad 24/circa stellas calidas in capite ♄/ Mercurius fit directus circa
 ♄ in cruce sinistro serpentarij sed differentia in longitudine est maior vob
 no gradu/ In latitudine 27 minu. fit quoq; stationarius/ A principio ad
 6 diem circa ortum postreme stelle ad meri. in fronte M Δ ☿/ Et cir
 ca mediationem celi cordis M aura sepe nubilosa.

1 f Quarta Lunæ decrefcentis hora 3 minu/52 ante meridiē/ Ascen
 dente 29 gra/36 mi/±/ Guber. ☿
 cum ☿ dispositio quarte huius erit pro qualitate temporis a principio
 tñ propter Saturnū et Martē cū stellis fixis niuosa/erit/ūq;. ☐☉ occi.
 cauda ☿ m c 18./vj. ☐☿ ☿/ Jupiter ☿. ic cū luminoso lance
 septentrionalis ± ☿ et ☿.5/ Mars q. cuz Δ in filo X H et ☿/7 ni
 uosum sed anticipabit/ Venus rñ. i c cuz capite herculis Δ ☿.11/rñ
 ☐☿ m c cauda ☿ ortum 19./Et ☐☿ m c cor Ω occidit. 19

2 g Sol. vij oritur cuz delphino Δ h et ☿ 30./Et rñ. ic cuz nebulosa in
 rta M ☿ et ☿.22./iñ * ☿/ Jupiter ☿. m c cum luminoso lance
 cis septentrionalis ± ☿ et ☿ 0/ disponit ad serenitatem/ Venus rñ
 m c cum capite herculis Δ ☿ 28./☿☿ m c sinister pes Orionis ic. 23
 Et occidit iñ. cum nebulosa Ω ☿ et ☿ 2./rñ. ☿☿ i c sinister pes Ori
 onis m c 15./ Mercurius fit directus Et rñ. ic cum corde M ☿ ☿ p
 ☿ 25./ventosum.

3 n Sol rñ m c cuz nebulosa iuxta M ☿ et ☿ 9./ Luna .vj est cum spica
 ♄ ☿ p ☿ differentia 3 gra 37 minu./rñ cum * in cora sinistra ♄
 ☿ p ☿ 22./iñ. cum X in genu sinistro ♄ ☿ p ☿ 32./q * ☿/ i. *
 ☿☿ ☿ ☿/ rñ. Δ ☿/ iñ. Δ ☿☿/ Mars. iñ occidit cum tertia
 extra X X H.6/ Venus .j cum X in pede dextro serpentarij H p ☿
 50./q. cum alia stella ibidem X 20 humidum et niuosum/ Mercurius
 m c cum corde M ☿ ☿ p ☿ 24.

4 b .vij ☐☿ oritur ☿ i c l./liquefactio/ Luna .j cuz X in sinitria vob
 stis ♄ 10/ Venus cum duabus stellis * in pede dextro serpentarij
 6/ ab altera 52/ rñ m c cum cauda M Δ H p ☿ .26/rñ. i c eū eadē 10./

5 c rñ ☿☿ m c dexter hūerus Orionis t c. 10/rñ. ☿☿ ic dexter hu
 merus Orionis m c 20./ Luna iñ. cum X in medio lance septērio.
 ± H p ☿ 5./rñ ☿ ☿ differentia 2 grad/ 37 minu./ Venus .vij oritur
 cum aquila ☿ ☿ et ☿ 28./iñ. ☐☿ occidit cauda ☿ m c 10./rñ. i c cuz
 capite serpentarij ☿ H p ☿ .24/nubila/aliubi m/ Mercurius .vi ori
 tur cum postrema ad merid. in fronte M Δ ☿ 3.

6 d iñ. Sol occidit cuz arcuro ☿☿ et ☿ .29/ et cum sinistra palma serpe
 tarij Δ H p ☿ differentia 25./☐☿ occidit cor Ω ic .7/ valde nubilosum
 aliubi niuosum/ et valde ventosum/ Luna. iñ cum X in lance septērio.
 ± H p ☿ 20/ vñ. cum * in cruce sinistro serpentarij H p ☿ 50./ix. ☿☿
 deā 2 grad 17 minu. / iñ ☿ ☿ oritur sinister pes Orionis occidit 3./
 Venus rñ m c cum capite serpentarij ☿ H p ☿ 16. .vij ☐☿ oritur spica
 m c 8./rñ. ☐☿ i c cauda Ω oritur 9.

7 e .vij ☿☿ oritur ☿ occidit 30./ Mars .ñ occidit cum vmbilico pegasi
 ☿ 4

DECEMBER

♄ ♃ et ♄ 6. / mē / Venus. viij oritur cum delphino Δ H et ♃ 2. / rē mē cum nebuloſa iuxta M ♃ et ♃ .58 / rē. i c cum eadem .2 / rē. ♃ ♄ i c oculus 8 mē .10

8 f **Noua Luna Ianuarij** hora 7 min / 47 poſt meridiem / Ascendente 10 grad / 47 minu. ♁ cornu ſequens γ / in cardine mediꝝ celi 28. / Mars ibidem differentia 2 gra 7 mi. Guber. ♄ cum H et ♃ / ♄ debilis / ♃ H ⊙ / ♃ H / ♃ in culmine prope ſtellas in filo X erin loco eclipſis ♄ facient auram ſatis humidam atqz niuoſam. / rē ♃ H ⊙ differentia a diametro 1 gra / 24 mi. / rē ♃ ⊙ mē H i c .3 / rē. ⊙ i c H mē 31. / rē ♃ ♄ ♃ differentia 4. grad / 27 minu. / rē Δ ♄ ♃. uij ⊙ ♄ oritur ſomabant i c 4. / Mars viij. mē cum pri^o ma X extra X H 1. / viij i c cum eadem .7 / rē ♃ ♄ mē c oculus 8 i c differentia 6. /

9 g .viij ♃ ⊙ oritur canis minor occidit .4 / rē ♃ ♃ mē dexter humer^o Orionis i c .29 / uij. occidit cum ſiniſtra pelma ſerpentarij Δ h p ♃ .4 / ⊙ ♃ occidit cor ♁ i c .34 / v. Δ ♃ ♃ / rē. ♃ ♃ i c dexter humerus Orionis mē 5.

10 A uij. ⊙ occidit H oritur 29. / Luna. uij cum X in contactu ſeptentrionali X ♄ p ♃ 20 / vj. cum X / ibidē 52 / rē X ♄ / Mars viij. mē cum ſecunda extra X X H .9 / viij ⊙ ♃ i c ♃ oritur .1 niſed an ſcipabit. / ♃ ♃ occidit lyra oritur. 8 / Venus uij. occidit cum arc^o turo ♁ ♃ et ♄ 16. / niuoſum

11 b xi. Sol cum Δ in arcu ♃ differentia 1 gra / 30 mi. .ij ⊙ ♄. viij ♃ H cidit ♃ oritur 25. / rē ♃ H i c ♃ mē .40 / rē. ♃ H mē ♃ i c 0. / rē. ♃ H ♃ drā a diametro 59 / niuoſo. / Mars. viij i c uij quarta X extra X H 5. / i ♃ ♃ oritur. cauda ♁ occidit .7 / viij mē cum tertia extra X X H .4 / et cum ventre Ceti Δ h .9

12 c **Introitus Solis** in ♃ hora 11 mi / 54 ante meridiem / Ascendente 21 gra / 29 minut. X / In cuspide mediꝝ celi ♃ drā 1 grad / 15 mi. In cuspide imi celi H differentia 55 mi. Et ſic hora introitus ⊙ in ♃ ſit ♃ H i c ♃ mē differentia 34 / et ſit in loco ♃ precedentis Sol diſtata cardine mediꝝ celi 3 gra / 41 minu. Guber. precedentis ♃ ſoltes excepto ♄ ob id ſignificatio ♃ multum augebitur / artem enim hyems ſatis frigida et humida atqz multum niuoſa. / viij ⊙ oritur arctur^o mē 23. / uij. ⊙ occidit ſomabant mē 1. / uij X ♄ uij. / ♃ H oritur ♃ occidit .17. niuoſum / Jupiter. uij oritur cū capite ſerpentarij ♃ H p ♃ drā 0 augebit humiditatem. / Mars. viij i c cū ventre Ceti Δ h 1. / et cum tertia extra X X H 6.

13 d xij ⊙ i c arcturus 02 / 30. / Luna ix. cū X in amphora ♁ ♄ et H 26 / rē. cū X ibidem 20. / ij ⊙ ♄ / v. X ♄ ♃ viij. Δ C H / Mars. viij i c cū cornu antecedente γ ♃ et H .4 / Et ⊙ ♃ i c H occidit 9 / ſed an ſcipabit. / viij. mē cum antecedente cornu γ ♃ et H 6. / ij ⊙ ♃ occidit preſepemē .1. / viij ♃ ♃ oritur canis minor occidit 4. / vj ♃ ♄ oritur dexter humerus Orionis occidit .12 /

DECEMBER

- 14 e Luna .v cum X prima fusionis ☉ H p 21/ .ij *) ♀/ .ix *)
 ☉/ ♀. ☐) ♀/ Mars vñ. m e cum capite trianguli Δ ♀ .4/ Ven
 nus iñ. cum Δ in arcu ♀ 27 et ♀ differentia 1 gra/ 49 minu/ iñ. ☐
 ♀ occidit Fornahant m e .33/ Mercurius .vj oritur cum corde M ☐
 ♀ p 21 .i/ ♀. ☐ ♀ i c lyra oritur 10./
- 15 f Sol xij. i c cum lyra ● ♀ et ♀ .27/ iñ. Δ) 27/ ij. ♀ 27 occidit For
 nahant oritur 5. Mars .vñ i c cum triangulo Δ ♀ 6./ a quarta ex
 tra X X H .10/ vñ. m e cum quarta X extra X H 0/. vij ☐ ♀ orit
 tur arcturus m e 3./ xij. ☐ ♀ i c arcturus oritur .18/
- 16 g Quarta lunæ crescentis hora 11 mi/ 45 post meridiem. Ascendens
 te 0 gra/ 58 mi. ☉ cum quo oritur arc
 turus ● ♀ et 27. 6/ Luna in cuspide occiduo differentia 4 gra/ Ven
 nus in cardine imi celi 50/ Sol vero distat ab imo celi 3 gra/ 27 mi./
 Suber. ♀ cum 27 remissa in frigore cum ventis calidis/ Sol xij m e
 cum lyra ● ♀ et ♀ 4. .vi ☐) H/ vi. ☐) ♀/ Mars .vñ i c cum
 cornu sequē. γ Δ ♀ et H/ .9/ a quarta extra X X H 10./ vñ. m e cuz
 cornu sequente γ Δ ♀ et H 1./ iñ. ♀ ♀ occ. oculus 8 oritur 5./
- 17 A Sol ij. cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ 45/ iñ. occidit eum eadem 24./
 xij ☐ ☉ m e spica occidit 26./ xij. ♀ ☉ i c canis maior m e .3/ hu
 midum in quibusdam locis nix/ Luna .x cum X in filo X H et ♀
 differentia 0/ iñ. cum X ibidem differentia 3/ ix. cum X ibidem 40/
 xij Δ) ♀/ vi. * H ♀/ .ix. ♀ ♀ i c hircus m e 10.
- 18 b Sol .vij oritur cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ 22./ xij. ♀ ☉ m e canis
 maior i c 28./ humidum/ Luna .vj cum X prima extra X 37/ .vñ cū
 X extra X H 23/ i. *) H/ ij. ♀) ♀ differentia 3 grad/ 11 minu.
 vñ. ☐ ♀ m e cor Ω occidit 9./ Venus xij m e cum lyra ● ♀ et ♀
 .9/ xij. i c eum eadem 29/ iñ. occ. cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ .28/ nu
 bila/ in quibusdam locis nix/ Mercurius ix. cum X in dextro pede
 serpentarij H p ♀ differentia 1 gra. 30 mi./ .ix ☐ ♀ m e cauda ♀ or/ 29.
 ♀. i c cum capite Herculis Δ ♀ .1
- 19 c .vij Δ) ♀/ .xj Δ) ☉/ Mars vñ. m e cum nodo filorum X Δ
 ♀ p ♀ 1./ Venus xij cum nebulosa in oculo ♀ ☉ et ♀ 56/ iñ ☐ ♀
 m e spica occi/ 27./ ♀ ♀ m e canis maior i c .32/ xij. ♀ ♀ i c canis ma
 ior m e nubila/ Mercurius .ix m e cum capite Herculis Δ ♀ 32. ♀ ♀ m
 e sinister pes Orionis i c .17/ ij. occidit cum nebulosa Ω 11./ ♀. ♀ ♀ i c
 sinister pes Orionis m e 22.
- 20 d .v ♀) 27/ Mars .vñ i c cum nodo filorum X Δ ♀ p ♀ 11. Venus
 .vij oritur cum nebulosa ♀ ☉ et ♀ 22./ humidum/ in quibusdam lo
 lis nix/ Mercurius .xj coniungitur X in pede dextro serpentarij H p
 ♀ 2/ niuosum.
- 21 e Sol .vij oritur cum creure pegasi ♀ ♀ et ♀ 0/ xij ☐ ☉ m e cauda Ω
 occidit .20/ Luna .iñ cum Δ sub oculo 8 H p ♀ 7/ .vi coniungitur
 oculo 8 ● ♀ 36 eclipsabit) ♀ subita aure mutatio cum nubibus/ in
 quibusdam locis calidioribus tonitrus fulmina cum pluuijs/iñ. cum X
 ☉ 5

DECEMBER

Orionis oritur .52/ Mercurius vñ. cum Δ in arcu 7 1/2 et 48/. vñ □
 ☿ oritur arcturus m c .17/

30 g **Quarta luna decrefcentis** hora 5 mi/40 post meridiem/Ascenden
 te 12 gra/ 11 minu. S/ cum quo oritur
 dexter humerus Orionis ● ☿ et ♀ 9./ Guber. ♀ cum h frigidā/humē
 da et valde niofa/vñ. ☿ ☿ m c arcturus i c .7/ Venus xñ m c cum
 aquila ☿ ☿ et ♀ .2/ □ ♀ m c pleiades oriuntur 2./nubila/xñ. □ ♀ i
 c/arcturus oritur .8/Sol xñ. i c cum aquila ☿ ☿ et ♀ .21/ iññ. ☿ ☉ oc.
 finifter pes Orionis ori/ 6./ Luna xñ cū spica ♄ ● ♀ p ☿ differē
 tia 3 gra/ 45 minu./ v. □ ☽ ♀/

31 2 Sol xñ m c cum aquila ☿ ☿ et ♀ 10./ □ ☉ m c pleiades ori. /14./
 vj Δ ☽ h q. ☿ ☽ ☽ differentia 1 grad/53 mi./ iññ. * ☽ ♀/

Jupiter j. occidit cū corde M ☿ ☿ p ♀ .14/. viñ □

♄ m c ♀ oritur .23/ ☿ ♀ m c pleiades i c 1./ viñ. ☿

♄ i c pleiades m c 6./ vñ ☿ ☿ i c arcturus m c

6./ Ven⁹ xñ. i c cū aquila ☿ ☿ et ♀ 54./

.viñ □ ♀ or. pleiades i c 25./ iññ. □ ♀

occ. Jomahāt m c 35./ Et sic Ve

nare oriente ♄ m c

pleiades i c.

nubila

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Primo
atq; Illustrissimo Principi ac Domino. D. M.
Mattheo H. S. Angeli s. s. R. ecclia Cardinali
Archiepo Salisburgen. aplice sedis Legato
ac Dno suo clementissimo. Andreas
Perlachius D. D.

Tab. de Vindis Stampato in Cattedra per Sires

[Faint, illegible handwritten text]

Curus est ventus... aquiloni oppositus.

^{lat} Zephyrus, Solutus, Sublatu.

Zephyrus et ventus, id est, et seorsum ab ortu boreali, tum
substantius ventus, et spiritus, ab ortu Equatoriali duentur.

Favonius.

Favonius ventus, et ab ortu Equatoriali spirans.

Auster ventus, et meridionalis.

Aquilo est ventus, qui ab ortu boreali, et ortu illudiam.

Septentrio, est ventus, hinc borealis.

Nitens.

Quotales ventorum, ut in Afflicto de usu Astrologij (an. vij.)

Claudio Stolomei merita Stellam
fig. 

Insuperioribus Tabularum Menzura
magis sunt probabiliora.
experientia
teste

Atque supradictas plus verificantur
verum intelligendi modum
obscurum - habebitur, vero
diligentia, facillime



36

1. Sol eleuat. incipit longiuscul. fieri dies, Aq. et Coror
 occidunt, tempestatem efficiunt
 2. Sol magis ascendit Canceri mediu occidit, uentisq. ponua
 3. Reliqui Cancer occidit, et uicus uenis fit flatus
 4. Hyems dimidiata Aq. nes contrui. Delphinus cu. Can
 oriuntur matutinis
 5. Fidicula exoritur, Aq. occidit Delphinus totus emerg
 uentorumq. fit concursus
 6. Aq. uesper. occidit, flaps. Auster
 7. Septentriones et Aquilo uel Semestor flantes concurre
 8. Maris domiciliu, Auster et Favonius simul flant.
 Capricornus emergere incipit, pluuie sinus et
 caligo uespertina
 9. Auster flat cu. pluuia
 10. Pluuia flat, Auster uolentior
 11. Septentrio malis imbre et aspa tempestate flat
 12. Auster spirat
 13. Austru. obscuru, prima mali pass. occidit, nocte et am
 pluit

Astru' oscuru, uari' Aglonis et Septentris in Constante
Les occultra: incipit pluuie fiunt
¹⁵ Septentris et Aglo uehementer flant
¹⁶ Sol in Aquaris Vulturpus cu' pluuia
¹⁷ Fidicul. occidere incipit matutino, uentor; concursus
¹⁸ Leo et Delfinus matutino, occidunt, Aglo, Septentris
et Auster concurrunt, pluuie fiunt
Conuersi et Hyemis mediu
3. Aglo flat et Auster, mediu' Canori occidit Aquaris
emergere incipit,
Aquaris istus emergit, Affricus spirat et pluuia
Fidicul cu' Canori occidit, et uesper: pluit
Aglo flat cu' pluuia.
Hyemat dies uehementer flant Aglo, et Vulturpus.
Tempestas turbidior, idem flant uenti.
Hyemat dies idem flant uenti; fidicul. occidere incipit
Astru' claru in pectore leonis occidere incipit, Fidicul
6. uesper: occidit, flat et Aglo, et interdum pluit
Ventor; concursus cu' uisibus
Delfinus occidere incipit:
Fidicul. circa prima facem partem sui occidere incipit
uehementer flant Aglo cu' umbra

Pr. Imbres cum nivibus permixti cadunt

XXXI Februarius

Kal. Obscurum astrum apparet, Auster et Vasturnus flant, Fidiacula occidere incipit.

7. Aer crassus est et Favonius flare incipit

3. MEDIUM Leonis cum Fidiacula occidit, Septentriones et Aquilo flant.

Pr. Delphinus occidit, Auster vesperi uidentior fit et pluit.

Non Zona Orionis ^{emergeit, turbidus est Aer Favonii flatu} occidit, ~~Auster vesperi uidentior fit~~
et pluit

8. Fidiacula occidit, et Favonius ab occasu flat.

7. Venus initium, Favonius spirat.

6. Favonius et Aquilo spirant.

5. Obscurum astrum emergeit Aquarius

4. Septentrio cum Favonio flat, interdiu etiam pluit.

3. Subsolanus spirat, et Arcturus exoritur.

Pr. Ventorum concursus, et pugna

Id. Sagittarius vesperi occidit, tempestas aspera

Ab. Crater vesperi oritur, et comitatus ventis imperat
Auster.

15. Sol in piscibus hiemat ~~et~~ aer

14. Septentrio flat cum Austro, sol novus

13. Virgo occidit uestra geminos Auster flat cū Favonio
et Aquilone.
12. Malus uesper occidit, fauonius spirat et uirg. occidit
incipit
11. Septentrio et Auster flant, malus occultatur
10. Agl. pluuosus spirat, Leo occidit, Aquilones Che-
sidonis appellati incipiunt et p̄ quadriduum
flant, Hirundines apparent.
9. Arcturus circa primā uigiliam occidere incipit
Fauonius spirat, ~~noxy~~ nubila existit
8. Halcyonei appellati dies.
7. Corus et Agl. simul flant
6. Aquarius oritur incipit, hyemat matutino.
5. Arcturus emergit et pluit.
4. Arcturus oritur matutino.
3. Malus uesper occidit.
2. Fauonius laespirat uernus est dies

XXVIII. Martius.

- al. Auster et Africus simul spirant.
6. Vindex oritur apparere incipit Agl. gelidus flat, Arcturus
occidit matutino

5. Aer nubosus, et pluit, Arcturus emergit elevat sole
et flat Agl. Mag. 28. martij.

7. Arcturus similiter emergit.

3. Arcturus interdiu emergit

Pr. Aquilo flat, nubilosu celū

Hon. Equus occidit matutino, et flat Agl, Corona matutino
ocultat, aquas, de celo pluvies

8. Marine aves apparere incipiunt, Aglo et Septentriones
flant, principium Veris est, Sol piscium dimidiatū
obtinēt, Equus occidit.

7. Milvus apparere incipit, flat Auster, Piscis in
tergore matutino occultari incipit.

6. Equus occidit matutino, Milvus a sublimi deorsum
vergit, Vindex mitior occidit, Arcturus autem emergit
et gelidus flat Aquilo. Mag. Martij.

5. Hyemis abscessis et Aglonis ad septentriones, commutans

4. Venit Piscis a tergore elevare, septentrion, vel Auster flat

3. Arg. navis emergit vesperi, Favonius, et Auster flant,
et in Leonis cauda hyemat dies.

Pr. Aquilo per totum flat diem.

16. Equus occidit, et Aglo flat gelidus
- 17 Sol in ariete, Favonius late spirat, Cicoria apparet
 et mare trāsmittit.
16. Incōstantes venti; Aquilo spirat
- 15 Auster flat. Miluus diluculo apparet
- 14 Aglo serenus spirat.
13. Equus occidit matutino, Aglo vel Septentris flat.
12. Ariet in latus emergit pluit, aut nixit
- 11 Cancer tempore oritur Auster flat.
- 10 Aegnoctium, pluit interdum tonat
9. Septentriones et Aglo flant, Equus occidit matutino
8. Pisces tempore emergunt, nix umbra muta cadit, Ariet
 matutino emergit in mari, turbatio aeris.
- 7 Aegnoctium Vernū, pluit, interdū et tonat.
6. Hox et dies equales existunt
- 5 Scorpius occidit, uehimens flat ventus pluuiaz cum
 tonitribus conuocat.
4. Scorpius occidit, Septentris flat pluuia.
3. Auster flat, et pluit.
2. Vento; procelle, et tere pluit.

Kal. Scorpius occidit, si diei partem unam addit, Aglonis
flatu nebulosum est celum, uergilice oriri, et presym-
ficare incipiunt

14. Nebulosus aer p omnes terras.

3. Vergilice occidunt uesperentis.

Pr. Flat Affricus.

Hon. Fauonius spirat

8. Sucule emergunt, pluuies ab Austro seculantur.

7. Auster flat, et Vergiliae, reliqua occidit.

6. Fauonius flare incipit matutino, Vergilic occidunt

5. Australes procelle

4. Aglo uehemens flat, uesper est pluuosus

3. Fregid flat uenti, et pluit.

Pr. Sucule occultantur

10. Aglo flat, parui Jcepe exoritur

18. Obscura astru, et uenti, et imbres.

17. Sucule occidunt, fregid spirant uenti, Penens oritur

16. Sucule occidunt, spirat Fauonius

15. Sol in Tauro Sucule occultantur

14. Affricus flat.

13. Sucule rexitus occidunt. Africus flat uehem.

12. Faunus sperat.
11. Tauri caput occidit, et pluit,
10. Vergili exorientur, Faunus sperat.
9. Fidicula circa primam facem apparet
8. Fidicula cernitur, et pluit.
7. Presepe emergit, desinit. Ver.
6. Sucle peritus occidit, et Veris conuocari.
5. Auster flat.
4. Austrina dies, et pluit.
3. Haedi oriuntur, Auster flat matutino
2. Canis occultatur vesperi, et aer conturbatur ab Austro, et Aquilo simul permisset.

XXX Maius

11. Canis occultatur, rores descendunt
10. Sucle cum sole oriuntur
9. Centaurus apparet totus. Faunus sperat.
8. Scorpius sursum emergit, Agl. flat et rores cadunt
7. Fidicula oritur matutino.
6. Simidru Serpentes occidit.
5. Vergili oriuntur matutino cernit Faunus
4. Principiu Estatis, Faunus puenat.
3. Eodem flat modo Faunus
2. Fidicula oritur, Sucle occidit, Tauri caput apparet

5. Vergilii apparent
4. Vergilii ornatur Auster flat
3. Succule occidunt Auster, sunt flatibus
- Pr. Scorpius occidit, Fideculi oritur matutino
18. Cancer exoritur, et flat Auster.
17. Initium Estatis
16. Procyon quā quidā Caniculi vocant occidit
15. Sol in geminis
14. Auster flat Vesperi
13. Succule oriuntur, et flat Aglō
12. Arturius occidit, aeq. conturbatur
11. Sagittarius occidit, et flat Auster
10. Gemini exoritur et Aglō
9. Succule oriuntur, et flat
8. Capelli oritur matutino et flat Aglō
7. Taurus occidit Auster et Aglō flat
6. Auster spirit
5. Fideculi oritur matutino, et Auster flat
4. Auster Vesperi flat
3. Vergilii exoritur, ombres ~~et~~ tonitruus
fiunt

Tempesta apleta, hyemot aer, ingenti vesper-
tonitru commentur

XXXI Ianuus

- Jan. 1. Sucule tose emergunt, Auster flat
2. Aquila exoritur, aer tempestas et flat Favonius
3. 3. Australes puelle cū tonitruis
4. Auster flat et pluit
5. Aquila exoritur, flat Auster et pluit
6. 6. Agls flat, et pluit
7. 7. Arturus occidit matutinis Favonius spirat
8. 8. Delphinus emergere incipit, Arturus occidit
9. 9. Agls flat, et modice pluit
10. 10. Pluu. sūs aer cū tonitruis et australis dies
11. 11. Turbulentū cetū cū tonitruis
12. 12. Favonius vel Eurus flat, et tonat
13. 13. Delphinus emergit, Auster flat
14. 14. Orionis humer. eleuatur et paracipi effat
15. 15. Obscurā astrā, Favonius et Auster flant
16. 16. Aoris tempestas et Agloris flatus
17. 17. Favonius cū Austr. spirat orionis numer. apparent

17. Sol in Capro Orion exortur matutino
13. Auspex et Favourus flat pluit et tonat
 in dies serpentarius occidit matutino
11. Auspex in Aglore spirat et
 v. Exortus Orionis
9. Obscuri Astra exortus et calor, intensio
8. Festinus card. et momentaneus aeris perturbatio
7. Auspex et Favourus simul spirant
6. Brevis nix, Orion exortus
5. Pluit vesper. Canis apparere incipit
4. Ventorum conflictus
3. Canis exortus matutino, Orion
 apparet
- Pr. 30. Arturo occidit matutino et aeris
 intemperies

XXX Julius

- Kal. Aer ab Aglore conturbatur
6. Obscuri Astra, Auspex flat vel Favourus
5. Austrius dies et conturbatio aeris
4. Orion exortus, canis occidit et Favourus
 spirat.

7. Mercurius exoritur
6. Etesie flant, et cum Austeris Aglonis
4. Corona occidit matutino, flat Auster
3. Capseus exoritur et austina ceris spatatis
2. Orion totus emergit Auster flat
6. Etesie; pro domi flatus spirant
5. Ambrosi cintonibus flat Agls
4. Orion totus oritur matutino et pro domi in-
ualescant flatus
3. Afficus flat turbulenter
2. Agls flat
10. Canicula exoritur ^{Etesie} ~~Etesie~~ inualescant
17. Orion exoritur, et uio lentus flat Agls
16. Aestatis humidum et dies Aglonis flatu algetur
15. Fauonius et in meridie Auster spirant. Canis
oritur matutino, et Etesie amplius inualescant
7. Orion exoritur, Corus flat, totusq; apparet orion
13. Sol in Leone Corus spirat, et Canis exoritur
12. Etesie cum alijs ventis furu et rigidi flant ^{dies}
11. Prodomi flatus late spirant
10. Cancer totus cum Leone exoritur, et Agls occidit

- 9 Leo cū Sole exoritur et Canes Cancendescunt
 8 Gemini occidere incipiunt, Canis emergit aur
 trini sunt flatus
 7. Caligo arena, Aquila occidit Leo exoritur
 flat Auster
 6. Canicularis estus
 5. Velimenter calores, et esse ualentes spirant
 4. Lucida stellæ in Leonis pectore exoritur
 Hylæ egelibus proper estam
 3. Autumnales fructus apparere incipiunt, Aq
 occidit matutina, Aer turbidus fit.
 Pr. Auster cū Affric. simulificant

XXXI Augustus

- Kal. Aqla occidit matutina flat affricus,
 aurentes sunt ~~estus~~ estus
 7. Aqla occidit, Aer austrius
 3. Austrius dies
 Pr. Leonis mediu exoritur arbor in hoc die apparet,
 Auster nimbus uelociter flat
 Non Corona occidit, Leonis mediu exoritur
 uelociter flat Auster, et grues Apparent

1. Fideicula contractus, austrius dies estuosa
2. Orionis medium occultatur, et dies ab austri caliginosus
et estuosa

3. Ses. ex. ritur, eipus ins. Merabilis, nebulosus aen,
orionis ex. ritur medium

4. Obscurum austrum Septentri. lenis spirat et aestus
mediocris

5. Lunares defectus in Sane diem incurvare solet,
auster et Agls spirant, et calores sunt
ingentes

6. Fideicula occidit matutino. Autumnus incoat,
ventor; concursus fit.

7. Ventor; conflictus et pugna

8. Delphinus in Lepore occidit

9. Aestuari et squales calores

10. Obscurum austrum et Fausmus in Austrum spirat

11. Delphinus occidit matutino

12. Autumni initium

13. Fideicula occidit, et flat Agls

14. Delphinus occultatur, mediocris estus

15. Fideicula occidit matutino. Sol in Virgine,
auster flat, pluit et tonat

16. Sol in tota Virgine

- ii Vergo exoritur
- io Septentrio lenis spirat, tota exoritur vergo,
aeris est serenitas.
- 9 Vergo exoritur, Aglo flat
- 8 Etere ponuat, Aglo frigidior flare incipit
- 7 Delphinus exoritur et flat Auster
- 6 Vendemiator emergit, Auster et Favonius simul
flant
- 5 Vergo apparere incipit.
- 4 Favonius lenis spirat
- 3 Vergo exoritur, Favonius mollior flat
- Pr. Andromeda exoritur

XXXI september

- 6 Australis pueri non amplius occultatur
- 5 Tonat, et pluit
- 4 Arturus in Vendemiatore exoritur, malus
occultatur
- 3 Mercurij Domercium Favonius spirat et ex
uentor; incruentati imbres cadunt.
- Pr. Equus exoritur
- Hon Capell. emergit, Africus flat vesper et plu

- 8^o Arcturus apparet, flat Aquilo, et undecim tonat
 7^o Virginis meridie exoritur, Favonius spirat in Africa
 6^o Item aeris status
 5^o Idem aeris status
 4^o Arcturus exoritur
 3^o Arcturus exoriente, umbres cadunt
 2^o Vergilii cum equis exoritur
 1^o Hirundines non videntur, capella exoritur et pluit
 16^o Iudaea temeraria, id est p. 12. portio Autumnus incipit
 15^o Favonius late spirat cum Africa
 14^o Piscis exoritur, et Septentri. ponit
 13^o Sol in libra, Crater apparet, Arcturi meridie cernitur
 12^o matutinis
 11^o Arcturus exoriente umbres copiose cadunt
 10^o Aegre nocturni autumnales et pisces occidunt
 9^o Argo descendat, pluviosus aeris conturbatio
 8^o Pisces occidunt, austere fiunt pluvie, aeris rancorosa
 7^o conturbatio et maris tempestates
 6^o Lunaris defectus in hanc incurret diem centaurus
 5^o exoritur
 4^o Hebulus aer et turbulenter exoritur
 3^o Hoed. exoritur, et Ausp. velenens flat.
 2^o Cinz. densiter emergere, vergilii matutinis et vesper.
 1^o apparet Hoed. cum Jole exoritur vitor, et maris
 procelle valide fiunt
 Ausp. velenens flat tempestas occidit
 Vergilii matutinis cernuntur et pluvius flat Ausp.

1r. Capella emergit ubi ab Iphigenia uigilant; acuta

XXX October.

1. Vergilię in oriente apparere incipiunt, aurora flat

2. ^{matutina} Sibiria austrum; flatus et uigilant; exortus

3. Heriostus, id est Aurora occidit, et ab Aglone sonat

4. Hoed exorientur et pluit.

5. Corona emergit, et conuorsis est estatis

6. Arietis mediū occidit cū scorpione.

7. Eade que prior significatio

8. Corona cū hoedis exortur, aer conturbatur

9. Hoed cū Vergilię emergunt, et flat, Aflicus

10. Sibra oriri incipit, et Fauonius spirat.

11. Corona exortur matutina, uenti commutatur,
ascendit in maris hiversi

12. Vergilię exorientur, et flat Auspice

13. Corona emergit, aeris commutatis et tumultu fit

14. Agl in mensis flat

15. Aurora media et Auspice flat

16. Orion emergit et rosculentus est aer

17. Eade que prior significatio

18. Tristis et nubilis dies

19. Sol in scorpione et Fauonius spirat

20. Vergilię occidunt aeris et conturbati

- 12 Eademque primum, significatis, sed etiam pluit
 11 Taurus cauda occidit, et Auster flat, pluviosus
 10 Scorpius occidit, Aq. flat, et in mari tempestas horrida
 9 Vergilius occidit
 8 Centaurus occidit matutino
 7 Scorpij demidi cauda occidit
 6 Juculi occidunt gelidus flat, Aq. et ass. mar.
 5 Vergilius ^{hyems} et Orion perennis occidunt
 4 Arturo occultatur et uolentes flat venti
 3 Cassiope inapert occultatur
 Orion et Aq. perennis occidunt uespi et fidicul
 exortitur

XXXI November

- 12 Vergilius occidit, primum leudit matutino
 Arturo occultatur uespi ad frigora fit
 conuersio
 9 Venti spirant frigidus et pluit
 8 Fidicul exortitur matutino et Aq. flat
 Per Auster et Faurus flat, fiuntq. imbes
 Non Fidicul sole ex omne apparet, Aq. flat.
 5 Arturo occidit matutino et risutus est aer
 7 Vergilius et Orion occultatur, Aq. flat
 6 Turbidus et uolens est Aer

- 5. Clarū Scorpionis astrū et hyematis cardo
- 4. Hyemis initū
- 3. Vergili occaltantur.
- 2r. Media Scorpionis Stella emergit
- 1d. Vergili et Orion occidūt matutini.
- 18. Scorpūs matutino occidit
- 17. Fidicula ortur matutino Vulturū, Aussen et Boreas simul flant
- 16. Eadem que prior significatis
- 15. Tempestuosus dies Austera superuenit
- 14. Sol in Sagitariū Orion cū fidicula exortitur Aerisq; tempestas exortit
- 13. Ianus cornū cū Sole occidit et flat Agl
- 12. Auidi tempestas
- 11. Sucle cū lepore occidūt matutino
- 10. Belid cadit pluuia
- 9. Ianus uanū occidunt
- 8. Initū Hyemis figura incipiunt gehdig cadunt ~~ad~~ et roses
- 7. Sol in primū Sagitarij portione
- 6. Eadē que prior significatis
- 5. Canis occidit austriam dies et pluit
- 4. Canis occultar. incipit et rebus est aer
- 3. Canis occidit matutino et Agric. flante pluit

r. Orion occidit Faustus sporat et Auster flat flat
 XXX December
 al. Perturbatis Aeris flat Septentrio et totus Orion
 occidit matutinis
 4 Canis occidit vesp. Septentrio flat
 3 Tempestuosus cum nubibus dies
 Sr. Sagittarius occidit et Aghs flat
 Hon. Per totam diem pluit et flat Aghs
 8 Medium scorpii emergit
 7 Aghs excitatur et Auster flat
 6 Scorpius totus emergit
 5 Canis excitatur matutinis et Auster flat
 4 Velenosus Aghs flat caliginis et tempestatis
 celum existit
 3 Obscura astra Septentrio et cecias perflat
 Sr. Aghs flat prior graui et pluuus subleuat
 auster
 2 Totus scorpius excitatur Auster et Aghs flat et pluit
 19 Capella occidit
 18 Auster et Aghs perflat et aeris perturbatio
 existit
 17 Eadem, que prior, significatio
 16 Sol in Capricornum
 15 Obscura astra et ventorum concursus et pugna

- 14 Capella exsistit
- 13 Agl. in capra cornu exsistit
- 12 Incipit flare Agl. superiens Austen
totū optinet diem
- 11 Agl. exsistit vespere
- 10 Capella matutino emergit

Saus Des

