

Iz šole za šolo.

Obrazec šolske razrednice:

Razrednica šole v I.

Meseci šolskega leta	nedelja	ponedeljek	torek	sreda	četrtek	petek	sobota	Število šolskih dni	Opombe. Šolski prazniki. Splošni zadržki šolskega obiskovanja. Zaznamnajo se nekatere v začetku za celo leto, nekatere med letom.
November									
December									
Januar									
Februar									
Marc									
April									
Maj									
Junij									
Julij									
Avgust									
September									

Znamenje za zamude: dopoldne opravičenih
 » neopravičenih
 popoldne opravičenih
 » neopravičenih
 dopoldne in popoldne opravičenih
 » » » neopravičenih

⊖
 —
 ⊙
 —
 ⊕
 +

Številka	Imena učencev	Stano- vanje	Hišna št. št.	Ime in stan staršev	Z a-	
					November. April.	December. Maj.
				I. polletje		
				II. polletje		

Ta načrt zadostuje sledečim zahtevam:

1. ima natančnej pregled vseh šolskih dnevo in praznikov,
2. ima tudi tiste predale, kakor »izpisek šolskih zamud«, ktere, mislim, da mora imeti,
3. se po njem prav lahko preštejejo vse šolske zamude celega leta,
4. ni treba po tem načrtu vsaki mesec nove razrednice pisati.

Gospodarski nauk.

Reja govede.

Živalski trup je blizo iz šterih petin vode in iz ene same pe-
tine terdih obstojnih del. Znanе štiri kemijske pervine: ogljec, vodenec,
kislec in tróhnelec, so podlaga vsemu grudu. — Apno, žeplo, železo, klor,
fosforová kislina so manj imenitni, na pervine navezani deli. Kot pri
rastlinah so iz teh različnih pervin zložene snove, v kterih prevlada
ogljec, vodenec in kislec. Zraven teh se pa nahajajo še druge tvarine,
v kterih je pa tróhnelec poglavitni del. Poslednjih je v živalskem trupu
naj več, in sicer 86 na 100 del. Pri rastlinah je pa ravno narobe. V
njih nahajamo naj več snove brez tróhnelca.

V živalskem trupu so:

A. Tróhnelcaprosti deli: 1. mast, 2. mlečni sladkor.

B. tróhnelcapolni deli: 1. beljak, 2. sirec, 3. lim, 4. vlaknec,
5. mesnatec.

Kosti so iz 60 % fosfornokislega ($8. \text{CaO} + 3 \text{PO}_5 = \text{basisch}$), in
ogljenokislega apna ($\text{CaO}, \text{CO}_2 = \text{neutral}$). = 30% lima ($\text{C}_{13} \text{H}_{10} \text{N}_2, \text{O}_5$)
zraven nekaj žepila in 10 % masti.

Meso ima v sebi: 1. beljak, 2. vlaknec, 3. mesnatec.

V kervi je zlasti: 1. poseben sirec, 2. beljak, 3. vlaknec, 4. kervo-
barvanec.