

T. velebiticum var. *gackae* ("Gačkae"), to pa na "zelo bujnih travnikih med Spodnjim Švičkim jezerom in vasjo Ponor" (DEGEN 1911 114). Po opisu in ekologiji sodeč spadajo primerki s Cerkniškega jezera k *T. velebiticum* var. *gackae*. V obeh primerih gre za pojavljanje na kraškem polju in je novo nahajališče po tej strani dobro razložljivo. Na ekskurziji 13. 7. 1993 velebitske detelje na navedenem nahajališču nismo našli, verjetno, ker smo bili prezgodnji. Določitve nismo mogli potrditi s primerjavo s herbarijskimi primerki, ker velebitske detelje v W in WU ni. Do potrditve najdbe v naravi naj napisano velja kot predhodna objava.

Literatura:

DEGEN, A., 1911: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. Mag. Bot. Lap. 10: 108-115.

Tone Wraber


23. *Vicia loiseleurii* (M. B.) D. Litvinov

Novo (tretje) nahajališče redke vrste v Sloveniji.

A new (3rd) locality of the rare species in Slovenia.

0549/1 Slovenija, Istra: In silvis lucidis (*Ostryo-Quercetum pubescentis*) collis Brgot dicti prope vicum Gračišče. Solo calc. 320 m s. m. 10. 5. 1994. Leg. & det. T. WRABER, LJU

Nahajališče je tretje znano v Sloveniji. Doslej znani nahajališči (Stena v dolini Dragonje, Kubeč) je, obenem s prikazom njene taksonomije, nomen-



Sl. 1: Razširjenost Loiseleurove grašice v Sloveniji

Fig. 1. Distribution of *Vicia loiseleurii* in Slovenia

klature, razširjenosti in fitogeografske problematike v evropskem okviru, objavil T. WRABER (1981). Novo nahajališče je vredno pozornosti tudi zato, ker se na njem *V. loiseleurii* pojavlja precej obilno, medtem ko je bila na Steni in pri Kubedu najdena v le nekaj primerkih. Bolj kot v sklenjenih sestojih združbe črnega gabra in puhavca (det. M. ZUPANČIČ) je razširjena na njenih robovih in jasih. V drevesno-grmovni plasti sestoja združbe z *Loiseleurovo* grašico rastejo *Acer monspessulanum*, *Carpinus orientalis*, *Cornus mas*, *Cotinus coggygria*, *Crataegus laevigata*, *Frangula rupestris*, *Fraxinus ornus*, *Juniperus communis*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Quercus pubescens* in *Rosa canina*, v zeliščni pa *Aristolochia lutea*, *Asparagus acutifolius*, *Bromus erectus*, *Dictamnus albus*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca spec.*, *Galium corrudifolium*, *Helleborus multifidus* subsp. *istriacus*, *Hippocrepis comosa*, *Inula conyza*, *Lathyrus niger*, *Limodorum abortivum*, *Ranunculus bulbosus*, *Sesleria autumnalis*, *Tecium chamaedrys*, *Vicia grandiflora* in *V. loiseleurii*.

Literatura:

- WRABER, T., 1981: *Vicia loiseleurii* (M. B.) Litvinov, a hitherto neglected species from the *V. hirsuta* group. Biol. vestn. 29(2): 181-191.

Tone Wraber