

IZ ORNITOLOŠKE BELEŽNICE

From the ornithological notebook

SLOVENIJA / SLOVENIA

V'RANJEK *Phalacrocorax aristotelis*

Shag – highest numbers so far from Strunjan Bay (UTM UL94, SW Slovenia): (1) 44 individuals on 16 Sep 2001, (2) 110 individuals on 13 Sep 2002

Plavajoče boje na morju v Strunjani so ornitologom poznano mesto, saj je tam vselej videti kaj zanimivega. Na njih lahko pogosto opazimo tudi vranjek. Največ, 110, sem jih našel 13.9.2002. Leto prej, 16.9.2001, jih je bilo tam 44. Tako visoke številke v jesenskem času so zagotovo posledica selitve vrste. Vranjek sicer prezimuje na naši obali maloštevilno. Od leta 1998 do 2002 jih je v posameznem letu po podatkih IWC prezimovalo največ 6, in sicer leta 1999 [ŠTUMBERGER, B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 20 (92): 6–22]. Ker sem največ vranjekov preštel med vračanjem z izleta v Sečoveljske soline, za ta dan omenjam še dva zanimiva podatka za soline. Tam sem 13.9.2002 opazoval enega (1) progastorepega kljunača *Limosa lapponica* in 5000 rumenonogih galebov *Larus cachinnans*.

Damijan Denac, Gorkičeva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: damijan.denac@dopps-drustvo.si

BOBNARICA *Botaurus stellaris*

Bittern – 1 individual observed at Sinja Gorica fish ponds, Ljubljansko barje (UTM VL49, central Slovenia) on 12 Dec 2003

Popoldne 12.12.2003 sem se odpravil na krajski izlet k ribnikom pri Sinji Gorici na Ljubljanskem barju. Ko je že kazalo, da se bom moral zadovoljiti le s čopastim ponirkom *Podiceps cristatus*, ki je počival na večjem ribniku, sem z 10 m oddaljenega kupa smeti splašil veliko čapijo rjave barve. Preletela je manjši ribnik ter pristala med trstičjem in vrbovjem. Bila je bobnarica!

Jernej Figelj, Pavšičeve naselje 29, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija

BELA ŠTORKLJA *Ciconia ciconia*

White Stork – the first confirmed breeding at Lake Cerknica (central Slovenia) after 40 years. At the end of May 2004, 19 individuals were observed at the lake, and eventually a single nest with incubating female and later with three young was found in the

village of Martinjak (UTM VL56). In the 1960s, 2 nest were known around Lake Cerknica, i.e. in the villages of Lipsenj, and Otok.

V ornitološkem atlasu Slovenije je bela štorklja navedena kot verjetna gnezdlka Cerkniškega jezera [GEISTER, I. (1995): Ornitološki atlas Slovenije. – DZS, Ljubljana]. Opisana so tudi gnezditveno obetavna pojavljanja v okoliških vaseh. V vseslovenskem popisu leta 1999 v okolici Cerkniškega jezera bela štorklja ni bila zabeležena [DENAC, D. (2001): Gnezditvena biologija, fenologija in razširjenost bele štorklje *Ciconia ciconia* v Sloveniji. – *Acrocephalus* 22 (106–107): 89–103]. Leta 2004 se je konec maja na območju Cerkniškega jezera zadrževala jata 19 belih štorkelj. Tudi to bi lahko šteli za gnezditveno obetavno pojavljanje. En par si je v tem času namreč zgradil gnezdo na dimniku večje hiše v vasi Martinjak. Starša sta se pridno izmenjevala pri valjenju na gnezdu. Mladiči do sredine junija še niso bili izvaljeni, v nasprotju s štorkljami v severovzhodni Sloveniji, ki so ob tem času mladiče že imele. Ko sem kasneje, v juliju, gnezdo zopet obiskal, so bili v njem trije mladiči. Opisano je prvo znano gnezdo bele štorklje na območju Cerkniškega jezera po štirideset letih. Gregori [GREGORI, J. (1979): Prispevek k poznavanju ptičev Cerkniškega jezera in bližnje okolice. – *Acta carsologica* 8: 301–329] navaja, da sta bili v zgodnjih šestdesetih znani vsaj dve gnezdi, in sicer v vasi Lipsenj in na drevesu v vasi Otok.

Leon Kebe, Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, e-mail: leon.kebe@guest.arnes.si

BELOČELA GOS *Anser albifrons*

White-fronted Goose – several observations of a single juvenile between 27 Dec 2003 and 17 Jan 2004 at Strunjan saltpans (UTM UL94, SW Slovenia), and in Škocjan Bay on 27 Dec 2003 (UTM VL04)

Dne 30.12.2003 smo s Petrom Sacklom, Jakobom Smoletom in Luko Božičem v Strunjanskih solinah opazovali mladostno beločelo gos. Šlo je za soimensko podvrsto *Anser a. albifrons*, ki prezimuje v zahodni, srednji in južni Evropi [CRAMP, S., ed. (1985): *The Birds of the Western Palearctic*, Vol.3. – Oxford University Press, Oxford]. Gos je bila precej neplašna in se je prehranjevala tudi tedaj, ko smo se ji približali na okoli 20 m. Pred našim opazovanjem, dne 27.12.2003, sta mladostno beločelo gos, verjetno isti osebek, v Strunjani opazovala Al Vrezec in Primož Kmecl. Istega dne pa se je še en mladostni osebek te vrste zadrževal v Škocjanskem zatoku (A. VREZEC pisno). Med zimskim štetjem vodnih ptic se je dne 17.1.2004