

Drugače je po zimi, ko se polaga le suha krma, pa tedaj, kedar rabi skvarjena klaja. V teh slučajih moramo živini drugače skrbeti, da dobode potrebne soli.

Užita sol dela, da vsa žival veseleje živi; zlasti vpliva na prebavila. Vsaki dan podana sol povzroča, da se nareja obilo za prebavljanje potrebnih tekočin, vsled česar, se klaja temeljiteje ukoristi. Kaže torej težko prebav-

nej klaji dodajati soli.

Žival dobi prijetno zunanjo podobo, svetlo dlako, koža bolje poti; sploh vse življenje postane veseleje. Sol je živalim kar človeku dišave. Razvimo to naj-

bolje, kedar smo prisiljeni, slabo spravljeno krmo polagati. Živina po dobljeni soli rada in veliko pije in se zdravo čisti, kar je pri suhej krmi važno.

Dokazano je torej dovolj, da sol na konje, goveda in ovce dobro vpliva. Vendar preveč soli ne smemo dajati. Živina preveč zažaja in preobilo pije, kar zopet škoduje. Koliko pa se naj soli vselej položi, to ni lahko naprej določiti, ker je zavisno od raznih okoliščin. Navadno uže sam nagon živali namigne, kedaj da je dosta soli. Zato je umestno kupiti živinske soli za lizanje. Ta se položi ali obesi v jasli, da morejo živali do nje. Paziti je, da večjih kosov ne odgrizavajo, ampak sol samo ližejo.

Ozirali smo se pa v tem sestavku na konje, goveda in ovce, ne pa na svinje. Tem dohaja navadno zadosti soli po krmi, katero dobivajo. Če se uže soli svinjam polaga, stori se naj to v mogoče majhnih podatkih, zlasti kedar nečejo jesti, hujšajo in slabijo.

Slednje kaže včasih tudi na strup, in tedaj bi to značilo, da se je preveč soli dajalo. Sploh pri svinjah je treba velike previdnosti, in se naj prej premalo soli daje, nego preveč.

Nekoliko o režnji drevja.

Kdor hoče od sadnega drevja imeti v resnici kaj dobička, ta ga mora ne le pravilno saditi, ampak tudi

pravilno obdelovati. Glavno sredstvo, sadno drevje zdravo in plodno ohraniti, je obrezovanje. Obrezovanje mora biti pa ob pravem času in pravilno izvršeno. Ako ne gledamo na pravi čas in pravilnost režnje, moremo drevju več škoditi, kot pa koristiti. S pričujočimi vrstami hočemo naše sadjarje poučiti, kako je odrezovati in obrezovati mladike ter veje.

Ako hočemo mladiko prikrajšati, odrežemo je to-


liko, da ostane le še del, ki nam rabi.

Ostali del mladike ima pópe, ki naj še to pomlad zaženejo. Naj višji póp ostale mladike je navadno za nas najvažnejši, zato moramo mladiko tako rezati, da


najvišji pop ne ostane le živ, ampak da tudi naredi lep poganek. Ako odrežemo mladiko tako visoko nad popom, kakor kaže pod. 21., potem se kos nad popom prične sušiti, ker ni listja na njem, ki bi sok nase vleklo. Vsled tega sušenja trpi tudi pop, oziroma poganek in more se celo sam posušiti. Mladiko odrezati preveč blizu popa, ka-

kor je videti v podobi 22. tudi ni dobro, ker je nevarnost velika, da se pop posuši; na vsak način pa raste poganek pri taki režnji slabo. Pravilno režnjo poganka kaže podoba 22. Rezati je poševno in rano zamazati s cepilno smolo.


Dostokrat smo prisiljeni drevesu vso vejo odrezati. V tem slučaju odreže se veja tikoma pri deblu, kakor kaže podoba 24, in rana se zamaže s kakim drevesnim mazilom ali pa s cepilno smolo. Vejo tako odrezati kakor je videti v podobi 25, da ostane še štor, je zelo škodljivo, kajti ta štor se posuši in strhleni, trhlenoba rije v deblo in naredi se rak. Podoba 26. kaže deblo predelano z rakom, ki se je naredil vsled take slabo odrezane veje.




Pod. 21. Pod. 22. Pod. 23.




Pod. 24.



Pod. 25.



Pod. 26.



Pod. 27.

Zdravljenje sadnega drevja od bledice.

Bledica na drevju je bolezen, ki nastane vsled pomanjkanja rastlinske hrane v zemlji ali pa vsled