


Q254.4.46-6

卷之三

卷之三



IOANNIS ANTONII SCOPOLI


S. C. R. ET APOST. MAIEST. IN MONTANISTICIS ET MONETARIIS
CONSILIARII, SVPREMI HVNGARIAE INFER. CAMERGRAFIATVS OFFICI
ASSESSORIS, MINERALOGIAE PROFESSORIS, CAES. REG. AGRARIAE
SOCIET. STYRIAECARNIOLIAE GORIZIAE ET GRATISCAE, OECONO-
MICAEBERNENSIS, ET APIARIAE LYSATIAE SVPER. SOCHI.

FLORA
CARNIOLICA

EXHIBENS

PLANTAS
CARNIOLIAE INDIGENAS

ET DISTRIBVTAS
IN CLASSES, GENERA, SPECIES,
VARIETATES,
ORDINE LINNAEANO.



TOM. I.

EDITIO SECUNDA AVCTA ET REFORMATA.

IMPENSIS IOANNIS PAVLI KRAVSS,
BIBLIOPOLAE VINDOBONENSIS.

1772.

ЛІТОГРАФІЯ
ДОЛГОВА
САД

А. М. А. Д.
ДОЛГОВА
САД

IN=030000358

V I R O

ILLVSTRI ET CELEBERRIMO

D. D.

ALBERTO VON HALLER,

DOMINO IN GOVOMENS LE IVX
ET ECLAGENS

SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARVM GÖTTINGENSIS
ET OECONOMICAE BERNENSIS PRAESIDI,

ACADEMIAE REGIAE SCIENTIARVM PARISINAE
ET CHIRVRGICAE,

SVEC. BEROLIN. ACADEM. IMPERIALIS,
BAVARIAE, ARCADIAE;

SOCIETATIS REG. BRITANNICAE, BELGICAE,
VPSALIENSIS, HELVETICAE, FLORENTI-
NAE, EDINBURGENSIS, ALTISI-
DIOCENSIS, CELLENSIS
SODALIS;

IN SENATV SUPREMO REIPUBLICAE BERNENSIS
DVCENTVMVIRO. etc. etc.

FLORAE SVAE CARNIOLICAE
EDITIONEM ALTERAM

D. D.

IOANNES SCOPOLI.

PIRETTA ET CINQUINO

D. D.

AFFERTO LAFFER

DOMINA MATER PAX

CONSERVATOR

SOCIAZIONE SOCIALE SCIENTIFICA GOTTWIL

RAFFERTO LAFFER

CONSERVATOR

PIRETTA ET CINQUINO

CONSERVATOR

SOCIAZIONE SOCIALE SCIENTIFICA GOTTWIL

PIRETTA ET CINQUINO

CONSERVATOR

SOCIAZIONE SOCIALE SCIENTIFICA GOTTWIL

PIRETTA ET CINQUINO

CONSERVATOR

PIRETTA ET CINQUINO

CONSERVATOR

PIRETTA ET CINQUINO

CONSERVATOR

PIRETTA ET CINQUINO



PRAEFATIO.



CARNIOLIAE DUCATUM, partem
veteris *Illyrici*, et antiquae *Pan-*
noniae, ambiunt ad Occidentem
Forum Iulii, et pars aliqua *Maris Adria-*
tici, ad Septentrionem *Carinthia* et *Styria*,
ad Occidentem *Croatia*, ad Meridiem autem
Istria et *Sinus Flanaticus*. Differentia Me-
ridianorum inter *Ferri Insulam* et *Labacum*.

In tempore. *In partibus Aequat.*

H. M. S. V. I. II.

2. 9. 20. 32. 20. 0.

Latitudo vero, seu elevatio Poli, novissi-
mis observationibus D. FLORIANT-
SCHITSCH. post editam Mappam Chro-
nographicam *Carnioliae* suscepitis, firmata.

V. I. II.

46. I. 50.

PRAEFATIO.

Regionis huius Incola factus Ao. 1754.
Eandem percurrere eo fine decrevi, ut Res
Naturales, cimmeriis tenebris ante hac se-
pultae, in lucem educantur.

Peragravi itaque

Anno 1755. Montes et *Sylvas Districtus Idriensis.*

1756. Paludes et *Agrum Labacensem.*

1757. Montem *Nanas.*

1758. Agrum *Lokopolitanum. Cramburgensem,* Montem *Storschetz* et totam eam Montium cate-
nam, quae usque ad *Kanker*, continua serie protenditur.

1759. Partem illam *Carnioliae*, quae
Gottschedio et *Labaco* interia-
cet, nec non asperrimum, in-
ter mille vitae pericula, Mon-
tem *Grindovitz*, cum adiacen-
tibus *Kotschna* et *Greben.*

1760. *Planinae* prata, et *Zirchizensem*
Lacum, cum finitimiis locis.

1761. Denuo M. *Nanas*, *Schenosche-
tzii* montes, et *Kartschia*
asper-

PRAEFATIO.

asperrimos colles una cum
Agro Tergestino.

Anno 1762. *Carnioliam superiorem et Alpes*
Vochinenses.

1764. *Goriziensem Agrum, Duinum,*
eique vicinos Montes, ac *Litora Maris.*

Sic una cum Animalibus et Lapidibus,
collegi Plantas, easque evulgavi Ao. 1759,
sub titulo **FLORAE CARNIOLICAE.** Cum
vero multa Species Plantarum postea dete-
xerim, eaque **Editio Correctoris** incuria plu-
rimis erroribus foeda prodierit, novam dare
volui, simulque **Ordine Naturali** relicto, am-
pletei Methodum **ILL. et CELEB. EQUITIS**
CAROLI LINNAEI. Nam 1. Florista quae-
siturus Classes Naturales, enormes saltus fa-
ciat necesse est. 2. Unicum Genus integrum
Familiam constituere quandoque deberet.
3. Pleraque Herbaria Ordine Linnaeano di-
posita sunt. 4. Floristae cura praecipua non
est eligere Classes, sed Plantas suas bene de-
scribere, et probe determinatas referre ad
Genera propria. Genera Plantarum, quae
magnus **TOURNEFORTIUS** primus

PRAEFATIO.

stabilivit, quaeque naturalia sunt, ubique re-
tinui. Nomina a PATRIBUS imposita,
et aevi huius arbitrio male relicta revocavi;
characteres vero Generum, passim reforma-
vi, cum in his potissimum dubios saepe vide-
rim iuniores Botanicos, imo etiam in erro-
rem inductos circa Genera. Difficultates
hasce genuit negligens examen Floris et Fru-
ctus; in qualibet Planta, unde Species diver-
sae ad unum Genus reductae, contra datum
characterem, ex quo lites hoc aevo pluri-
mae natae sunt, in perniciem studii Botanici.
Neque minus Botanicen intricarunt Differen-
tiae specificae, fallacibus notis saepenumero
inaedificatae et hinc toties mutatae, ut iam
memoria nulla tantum Chaos capere aut re-
tinere possit. *Cognitio Specierum est finis*
Primarius scientiae Naturalis et studii Bota-
nici; convenient ergo in unum Genus omnia
illa individua, quae numero, situ et propor-
tione partium floris et fructus, inter se simili-
lia sunt; hoc facto adsignetur cuilibet Speciei
discrimen certum, facile, constans, sive de-
mum a structura floris et fructus, sive a fo-
liis, caule, radice, habitu, vita desumatur,
dum-

PRAEFATIO.

dummodo tale sit, quod datum Individuum certo ac facile ostendat; Labore hoc, in qualibet Regione, per annos aliquot patienter suscep-to, parabitur Posteris via ad Regnum Ve-ritatis et veram cognitionem Naturae creatae.

Nomina Trivialia ill. LINNAEI in hoc opere retinui, etsi plurima arbitraria, multa obscura, pauca vero instructiva sint. Nihil ta-men hic innovare volui, etsi facile potuifsem, ut demonstravi in *Dubiis Botanicis*.

Plantas novas, aut obscuras delineavi minus ecquidem pictoria, sed fida manu; cum vero icones omnes naturalem stirpium magnitudinem exprimerent, ne Operis editio pre-tiosior, absque necessitate, reddatur, primae formam retinere, eique figuras, quae ean-dem excederent, accommodare volui, in quo Opere auxiliatricem manum praestitit egregius Iuvenis *Maximil. Zugsbratl.*

Plantarum Carnioliae vix aliqua mentio fit a Scriptoribus Botanicis. MATTHIO-LUS in suis ad DIOSCORIDEM Com-mentariis, habet loca natalia plantarum fere triginta, quas in *Agro Gorizienfi*, aut circa *Tergeustum* se vidisse testatur. Sed, ut erat

PRAEFATIO.

Vir ille commodae vitae addictus, ita non mirum, quod adeo paucas in amoeno illo Paradiso viderit Plantas, vulgatissimas autem ab Amicis petierit; exemplo LYSIMACHIAE, POEONIAE, DIANTHI, aliarumque. AGE-RIUS Bernensis, magno GESNERO coaetaneus, ex Itinere Italico redux, an *Carnioliam* attigerit, dubito; quidquid SATUREIAE sua*e* Gorizien*s* ramulum AGE-RII dono datum proferat I. BAUHINUS, et eodem tempore DAMASONII *alpini* Specimen ex his terris, in *Helvetiam* transiisse, idem affirmet.

Eximia in Floram nostram merita sunt R. P. Francisci Xaverii WULFEN. e S. I. qui indefessa industria collectas circa *Goriziam* plurimas plantas benevole communicavit.

Ridiculus Catalogus octo Plantarum existat apud VALVASORIUM, in descriptione *Thermarum Rudolphsbergensium*, a BURCHARDO Medico datus, in quo mentio fit LUNARIAE, PETASITIDIS, NAPPELLI, CARYOPHYLLATAE, ARCHANGELICAE, VALERIANAE, GENTIANAE, quas forte

PRAEFATIO.

forte Author ipse non novit, cum ARCHANGELICA circa *Goriziam* unice, GEUM vero montanum rarissime occurrat.

De CLUSIO etiam credibile est, *Carnioliam* nunquam attigisse, qui *Austriae* et *Styriae* Plantas sibi elegerat illustrandas et *Illyricae Linguae* ignarus erat, *et si aliarum esset peritissimus*. TOURNEFORT. *Isag.*

Sed neque mihi licuit omnes *Carnioliae* latebras perlustrare; Restat adhuc *Istria* fere tota *Aquileiae* solum insalubre, *Carnioliae* inferioris aliqua pars. Tunc Medici officium, infirma saepe valetudo, frequentes in *Istria* *Austriaca* latronum insidiae, ac millenae calamitates quas *Idriae* tuli, non concefferunt ut totam hanc Provinciam peragrarem. Posterior itaque incepsum opus augeant, emendent.

Synonyma suppeditarunt LINNAEUS incomparabilis. HALLERUS iudiciosissimus, IACQUINIUS indefessus, MICHELIUS oculatus, CLUSIUS diligentissimus, DILLENIUS nitidissimus, SCHEUCHZERUS verissimus, VAILLANTIUS perspicacissimus, BAUHNI immortales, nec non TOURNEFORTIUS,

PRAEFATIO.

TIUS, PONTEDERA, KRAMERUS, MORISONIUS, GLEDITSCHIUS, BOEHMERUS, ZANNICHELLIUS, TILLIUS et alii. In primis vero LINNAEUM et HALLERUM (cuius novam Floram iam ab solo hoc Opere Ill. Viri dono demum obtinui,) ubique citavi Principes in hoc Studio Viros, quibus addidi MATTHIOLUM ob primicias Florae nostrae ab eo datas, nec non I. BAUHINUM, qui post CLUSIUM, optimas Plantarum descriptiones nobis consignavit.

Reliqua praeloquio non indigent, veritas observationum ipsa loquitur, nec velari queunt errores in Scientia Naturae.



PLAN-

PLANTARUM
CARNIOLIAE
CLASSES, GENERA, SPECIES.

SPECIES PLANTARUM in SYST. NAT. III. LINNAEI
non numeratae, Asterisco (*) notantur Fungis exceptis.

CLASSIS I.
MONANDRIA.
MONOGYNIA.

- | | | |
|----------------|--------|---------------------|
| 1. SALICORNIA. | TOURN. | 1. <i>Europaea.</i> |
| 2. LIMNOPEUCE. | CORD. | 2. <i>Vulgaris.</i> |

DIGYNIA.

- | | | |
|----------------|------|----------------------|
| 3. MOROCARPUS. | RUP. | 3. <i>Capitatus.</i> |
|----------------|------|----------------------|

CLASSIS II.
DIANDRIA.
MONOGYNIA.

- | | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| 4. LIGUSTRUM. | BOTAN. | 4. <i>Vulgare.</i> |
| 5. OLEA. | THEOPH. | 5. <i>Europaea.</i> |
| 6. CIRCAEA. | TOURN. | 6. <i>Lutetiana.</i> |
| 7. VERONICA. | TOURN. | 7. <i>Alpina.</i> |
| | | 8. <i>Aphylla.</i> |
| | * | 9. <i>Saxatilis.</i> |
| | | 10. <i>Serpillifolia.</i> |
| | | 11. <i>Beccabunga.</i> |
| | | 12. <i>Anagallis.</i> |
| | | 13. <i>Latifolia.</i> |
| | | 14. <i>Chamaedris.</i> |
| | | 15. <i>Multifida.</i> |
| | | 16. <i>Spicata.</i> |

PLANT. CARNIOL. CLASSES.

7. VERONICA.		17. <i>Romana.</i>
		18. <i>Arvensis.</i>
		19. <i>Alpina.</i>
	*	20. <i>Frutescens.</i>
		21. <i>Officinalis.</i>
		22. <i>Scutellata.</i>
		23. <i>Agrestis.</i>
		24. <i>Hederifolia.</i>
		25. <i>Triphyllus.</i>
8. BONAROTA.	MICH.	26. <i>Chamaedrifolia.</i>
9. GRATIOLA.	RAI.	27. <i>Officinalis.</i>
10. PINGUICULA.	GESN.	28. <i>Alpina.</i>
11. LYCOPUS.	FUCHS.	29. <i>Europaeus.</i>
12. ROSMARINUS.	BRUNF.	30. <i>Officinalis.</i>
13. SALVIA.	TOURN.	31. <i>Officinalis.</i>
		32. <i>Sylvestris.</i>
		33. <i>Glutinosa.</i>
		34. <i>Verticillata.</i>
		35. <i>Hispanica.</i>
		36. <i>Haematodes.</i>
		37. <i>Pratensis.</i>

DIGYNIA.

14. ANTHOXANTHUM. DALECH. 38. *Odoratum.* 4

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

15. VALERIANA.	LINN.	39. <i>Officinalis.</i>
		40. <i>Dioica.</i>
		41. <i>Tripterus.</i>
		42. <i>Montana.</i>
		43. <i>Saxatilis.</i>
		44. <i>Elongata.</i>
		45. <i>Celtica.</i>
		46. <i>Locusta.</i>

4 16. CROCUS. THEOPH. 47. *Sativus.* 4
17. GLA-

GENERA, SPECIES.

17. GLADIOCUS.	PLIN.	48. <i>Communis.</i>
18. IRIS.	LINN.	49. <i>Pseudacorus.</i>
19. SCHOENUS.	LINN.	50. <i>Graminea.</i>
20. CYPERUS.	PLIN.	51. <i>Germanica.</i>
21. SCIRPUS.	LINN.	52. <i>Albus.</i>
22. LINAGROSTIS.	TOURN.	53. <i>Flavescens.</i>
23. NARDUS.	LINN.	54. <i>Fuscus.</i>
		55. <i>Longus.</i>
		56. <i>Palustris.</i>
		57. <i>Maritimus.</i>
		58. <i>Sylvaticus.</i>
		59. <i>Lacustris.</i>
		60. <i>Mucronatus.</i>
		61. <i>Holoschoenus.</i>
		62. <i>Setaceus.</i>
		* 63. <i>Glomeratus.</i>
		64. <i>Vaginata.</i>
		65. <i>Algina.</i>
		66. <i>Polyftachia.</i>
		67. <i>Sriilla.</i>
<i>DIGYNIA.</i>		
24. PANICUM.	PLIN.	68. <i>Cynosuroides.</i>
25. DIGITARIA.	HEIST.	69. <i>Vagum.</i>
26. PHLEUM.		70. <i>Crus Galli.</i>
		71. <i>Crus Corvi.</i>
		72. <i>Sanguinalis.</i>
		73. <i>Dattylon.</i>
		74. <i>Pratense.</i>
		75. <i>Alpinum.</i>
		76. <i>Nodosum.</i>
		* 77. <i>Flavum.</i>
		78. <i>Aegylops.</i>
		* 79. <i>Capitatum.</i>
		* 80. <i>Autumnale.</i>
		81. <i>Cristatum.</i>
27. ALOPECURUS.	LINN.	82. <i>Geniculatus.</i>
28. MILIUM.	TOURN.	83. <i>Paradoxum.</i>
29. AGROSTIS.		84. <i>Spica venti.</i>

29. AGRO-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

29. AGROSTIS.

85. *Interrupta.*

* 86. *Alpina.*

87. *Capillaris.*

88. *Incurva.*

89. *Aculeata.*

90. *Coerulea.*

91. *Caerulea.*

92. *Cristata.*

93. *Cespitosa.*

94. *Aquatica.*

95. *Nutans.*

96. *Ciliata.*

97. *Echinatus.*

98. *Decumbens.*

99. *Trivialis.*

100. *Pratensis.*

101. *Dura.*

102. *Annua.*

103. *Bulbosa.*

104. *Compressa.*

105. *Aquatica.*

106. *Fluitans.*

* 107. *Phoenix.*

108. *Nemoralis.*

109. *Media.*

110. *Eragrostis.*

111. *Glomeratus.*

112. *Ovinus.*

113. *Sterilis.*

* 114. *Strictus.*

115. *Polymorphus.*

116. *Giganteus.*

* 117. *Montanus.*

118. *Pinnatus.*

119. *Vilosus.*

120. *Glaber.*

* 121. *Truncatus.*

122. *Pennata.*

123. *Iancea.*

30. SESLERIA.

31. AIRA.

32. MELICA.

LINN.

33. CYNOSURUS.

LINN.

34. POA.

35. BRIZA.

LINN.

36. BROMUS.

37. STIPA.

LINN.

38. AVE-

GENERA, SPECIES.

38. AVENA.	LINN.	124. <i>Pilosa.</i>
39. ARUNDO.	SCHEUCHZ.	125. <i>Epigeios.</i>
		126. <i>Agrostis.</i>
		127. <i>Donax.</i>
40. LOLIUM.	LINN.	128. <i>Phragmites.</i>
		129. <i>Perenne.</i>
		130. <i>Temulentum.</i>

TRIGYNIA.

41. POLYCARPUM.	LINN.	131. <i>Tetraphyllum.</i>
-----------------	-------	---------------------------

CLASSIS IV.

T E T R A N D R I A.

MONOGYNIA.

42. GLOBULARIA.	TOURN.	132. <i>Vulgaris.</i>
		133. <i>Cordifolia.</i>
43. SCABIOSA.	TOURN.	134. <i>Nudicaulis.</i>
		135. <i>Arvensis.</i>
		136. <i>Sylvatica.</i>
		137. <i>Leucantha.</i>
		138. <i>Succisa.</i>
		139. <i>Graminifolia.</i>
		140. <i>Columbaria.</i>
44. DIPSACUS.	TOURN.	141. <i>Fullonum.</i>
		142. <i>Laciatus.</i>
45. SHERARDIA.	LINN.	143. <i>Arvensis.</i>
46. GALLIUM.		* 144. <i>Vernum.</i>
		145. <i>Cruciata.</i>
		146. <i>Rubioides.</i>
		147. <i>Cynanchicum.</i>
		148. <i>Taurinum.</i>
		149. <i>Tinctorium.</i>
		150. <i>Rotundifolium.</i>
		151. <i>Boreale.</i>
		152. <i>Glaucum.</i>
		153. <i>Verum.</i>
		154. <i>Rubrum.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

46. GALLIUM.		155. <i>Mollugo.</i>
		156. <i>Sylvestre.</i>
		157. <i>Aparine.</i>
		158. <i>Odoratum.</i>
		159. <i>Arvensis.</i>
47. ASPERULA.	TOURN.	160. <i>Tindorum.</i>
48. RUBIA.	TOURN.	161. <i>Maior.</i>
49. PLANTAGO.		162. <i>Media.</i>
		163. <i>Lanceolata.</i>
		164. <i>Holocephalum.</i>
		165. <i>Psylium.</i>
50. SANGUISORBA.	LUDW.	166. <i>Officinalis.</i>
		* 167. <i>Auriculata.</i>
		168. <i>Minor.</i>
51. EPIMEDIUM.	DODON.	169. <i>Alpinum.</i>
52. CORNUS.	PLIN.	170. <i>Mascula.</i>
53. THESIUM.	LINN.	171. <i>Sanguinea.</i>
54. ALCHEMILLA.	TOURN.	172. <i>Linophyllum.</i>
		173. <i>Alpinum.</i>
		174. <i>Vulgaris.</i>
		175. <i>Arvensis.</i>

DIGYNIA.

55. CUSCUTA.	TOURN.	176. <i>Europaea.</i>
--------------	--------	-----------------------

TETRAGYNIA.

56. AQUIFOLIUM.	PLIN.	177. <i>Ilex.</i>
57. POTAMOGETON.	TOURN.	178. <i>Serratum.</i>
		179. <i>Perfoliatum.</i>
		180. <i>Setaceum.</i>
		181. <i>Crispum.</i>
		182. <i>Pusillum.</i>
58. SAGINA.	LINN.	183. <i>Procumbens.</i>

CLAS-

GENERALIA, SPECIES.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

59. HELIOTROPIUM.	DIOSC.	184. <i>Europaeum.</i>
60. MYOSOTIS.	DILLEN.	185. <i>Scorpioides.</i>
61. LITHOSPERMUM.	LINN.	186. <i>Officinale.</i>
		187. <i>Arvense.</i>
62. ANCHUSA.	LINN.	188. <i>Purpur.-Caerulea.</i>
63. CYNOGLOSSUM.	TOURN.	189. <i>Officinalis.</i>
		190. <i>Omphalodes.</i>
		191. <i>Officinale.</i>
		192. <i>Lappula.</i>
		193. <i>Cheirifolium.</i>
64. PULMONARIA.	TOURN.	194. <i>Officinalis.</i>
65. SYMPHYTUM.	TOURN.	195. <i>Officinale.</i>
66. CERINTHE.	TOURN.	196. <i>Tuberosum.</i>
		197. <i>Echinoides.</i>
67. ASPERUGO.	TOURN.	198. <i>Glabra.</i>
68. ECHIUM.	TOURM.	199. <i>Procumbens.</i>
69. ANDROSACE.	LINN.	200. <i>Vulgare.</i>
		201. <i>Maxima.</i>
		202. <i>Villosa.</i>
		203. <i>Lactea.</i>
70. PRIMULA.	LINN. *	204. <i>Sylvestris.</i>
		205. <i>Officinalis.</i>
		206. <i>Farinosa.</i>
		207. <i>Auricula.</i>
		208. <i>Integrifolia.</i>
		209. <i>Minima.</i>
71. SOLDANELLA.	GESN.	210. <i>Alpina.</i>
72. CYCLAMINUS.	DIOSC.	211. <i>Europaeum.</i>
73. MENYANTHES.	TOURN.	212. <i>Trifoliata.</i>
74. HOTTONIA.	BOERH.	213. <i>Palustris.</i>
75. LYSIMACHIA.	TOURN.	214. <i>Vulgaris.</i>
		215. <i>Pundata.</i>
		216. <i>Numularia.</i>
76. ANAGALLIS.	TOURN.	217. <i>Phoenicea.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

77. AZALEA.	LINN.	218. <i>Procumbens.</i>
78. CONVOLVULUS.	TOURN.	219. <i>Arvensis.</i>
		220. <i>Sepium.</i>
		221. <i>Cantabrica.</i>
		222. <i>Soldanella.</i>
79. CAMPANULA.	TOURN.	223. <i>Pulla.</i>
		224. <i>Rotundifolia.</i>
		* 225. <i>Cespitosa.</i>
		* 226. <i>Linifolia.</i>
		227. <i>Patula.</i>
		228. <i>Perficiifolia.</i>
		229. <i>Pyramidalis.</i>
		230. <i>Rhomboidalis.</i>
		231. <i>Rapunculus.</i>
		232. <i>Boneniensis.</i>
		233. <i>Thyrsoidea.</i>
		234. <i>Trachelium.</i>
		235. <i>Glomerata.</i>
		236. <i>Medium.</i>
		237. <i>Speculum.</i>
80. RAPUNCULUS.	TOURN.	238. <i>Spicatus.</i>
		239. <i>Orbicularis.</i>
		240. <i>Coniosus.</i>
		241. <i>Pauciflorus.</i>
		242. <i>Caprifolium.</i>
		243. <i>Periclymenum.</i>
		244. <i>Xylosteum.</i>
		245. <i>Alpigena.</i>
		246. <i>Caerulea.</i>
		247. <i>Thapsus.</i>
		248. <i>Lychnitis.</i>
		249. <i>Nigrum.</i>
		250. <i>Phoeniceum.</i>
		251. <i>Blattaria.</i>
82. VERBASCUM.	LINN.	252. <i>Foetidum.</i>
		253. <i>Niger.</i>
		254. <i>Scopolia.</i>
83. STRAMONIUM.	TOURN.	255. <i>Trichotoma.</i>
84. HYOSCIAMUS.	TOURN.	256. <i>Halicacabum.</i>
85. BELLADONNA.	CLUS.	
86. PHYSALIS.	DIOSC.	

GENERAL SPECIES.

87. SOLANUM.	TOURN.	257. <i>Dulcamara.</i>
88. RHAMNUS.	LINN.	258. <i>Nigrum.</i>
		259. <i>Catharticus.</i>
	*	260. <i>Lycium.</i>
		261. <i>Alpinus.</i>
	*	262. <i>Rupestris.</i>
		263. <i>Frangula.</i>
		264. <i>Paliurus.</i>
		265. <i>Ziziphus.</i>
89. EVONYMUS.	THEOPH.*	266. <i>Latifolius.</i>
		267. <i>Vulgaris.</i>
	*	268. <i>Verrucosus.</i>
90. GROSSULARIA.	TOURN.	269. <i>Rubra.</i>
91. HEDERA.	TOURN.	270. <i>Uva.</i>
92. VITIS.	TOURN.	271. <i>Helix.</i>
93. PERVINCA.	TOURN.	272. <i>Labrusca.</i>
		273. <i>Minor.</i>
		274. <i>Maior.</i>

DIGYNIA.

94. ASCLEPIAS.	LINN.	275. <i>Vincetoxicum.</i>
95. HERNIARA.	TOURN.	276. <i>Glabra.</i>
96. CHENOPODIUM.	TOURN.	277. <i>Hirsuta.</i>
		278. <i>Bonus Henr.</i>
		279. <i>Polyspermum.</i>
		280. <i>Viride.</i>
		281. <i>Vulvaria.</i>
		282. <i>Scoparia.</i>
		283. <i>Maritimum.</i>
97. KALI.	TOURN.	284. <i>Tragus.</i>
I 98. ULMUS.	TOURN.	285. <i>Soda.</i>
99. GENTIANA.	LINN.	286. <i>Campestris.</i>
		287. <i>Ciliata.</i>
		288. <i>Cruciata.</i>
		289. <i>Campestris.</i>
		290. <i>Pumila.</i>
		291. <i>Verna.</i>
		292. <i>Utriculosa.</i>
		293. <i>Centaurium.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

99. GENTIANA.

- 294. *Acaulis.*
- 295. *Pneumonanthe.*
- 296. *Asclepiadea.*
- * 297. *Pannonica.*
- 298. *Lutea.*
- 299. *Perfoliata.*

100. ERYNGIUM.

TOURN.

- 300. *Alpinum.*
- 301. *Campestre.*
- 302. *Maritimum.*
- 303. *Epipactis.*
- 304. *Diapensia.*
- 305. *Minor.*
- 306. *Nigra.*

101. ASTRANTIA.

102. DAUCUS.

TOURN.

- 307. *Carota.*
- 308. *Grandiflorus.*
- 309. *Leptophyllum.*
- 310. *Platicarpos.*

103. CAUCALIS.

RIVIN.

- 311. *Anthriscus.*
- 312. *Scandix.*
- 313. *Nodosa.*
- 314. *Cretensis.*

104. LIBANOTIS.

RIVIN.

- * 315. *Rupestris.*
- 316. *Riviniana.*
- * 317. *Daucoides.*

105. TORDYLIUM.

TOURN.*

- 318. *Siifolium.*
- 319. *Maximum.*
- 320. *Latifolium.*

106. LASERPITIUM.

TOURN.

- 321. *Gallicum.*
- 322. *Siler.*
- 323. *Angustifolium.*
- 324. *Chironium.*
- 325. *Selinoides.*

107. ANGELICA.

LINN.

- 326. *Archangelica.*
- 327. *Sylvestris.*
- 328. *Ostruthium.*
- 329. *Austriacum.*
- 330. *Oreoselinum.*
- 331. *Cervaria.*
- 332. *Palustre.*

108. IMPERATORIA.

LINN.

109. SELINUM.

GENERALIA, SPECIES.

110. PASTINACA.	TOURN.	333. <i>Sativa</i> .
111. SPHONDYLIUM.	TOURN.	334. <i>Glaucia</i> .
112. FERULA.	TOURN.	335. <i>Branca</i> .
113. LIGUSTICUM.	TOURN.	336. <i>Austriacum</i> .
114. AETHUSA.	LINN.	337. <i>Nodiflora</i> .
115. CONIUM.	THEOPH.	338. <i>Peloponesiacum</i> .
116. MYRHIS.	TOURN.	339. <i>Cynapium</i> .
117. AMMI.	TOURN.*	340. <i>Maculatum</i> .
118. PIMPINELLA.	MATTH.	341. <i>Odorata</i> .
119. BUPLEURUM.	TOURN.	342. <i>Daucifolium</i> .
120. SCANDIX.	TOURN.	343. <i>Maius</i> .
121. SESELI.		344. <i>Rotundifolia</i> .
122. PHELLANDRIUM.	TOURN.	345. <i>Saxifraga</i> .
123. OENANTHE.	TOURN.	346. <i>Rotundifolium</i> .
124. SILER.	MORIS.	347. <i>Falcatum</i> .
125. CHAEROPHYLLUM.		348. <i>Odontites</i> .
126. CRITHMUM.	TOURN.	349. <i>Petren</i> .
		350. <i>Hirsuta</i> .
		* 351. <i>Tinctoria</i> .
		352. <i>Meum</i> .
		353. <i>Nodiflorum</i> .
		354. <i>Falcaria</i> .
		355. <i>Amomum</i> .
		356. <i>Annum</i> .
		357. <i>Glaucum</i> .
		358. <i>Hippomarathrum</i> .
		359. <i>Aegopodium</i> .
		360. <i>Graveolens</i> .
		361. <i>Carum</i> .
		362. <i>Mutellina</i> .
		363. <i>Aquaticum</i> .
		364. <i>Pimpinelloides</i> .
		365. <i>Trilobum</i> .
		366. <i>Sylvestre</i> .
		367. <i>Maritimum</i> .

TRIGYNIA.

127. COTINUS.	TOURN.	368. <i>Coggygria</i> .
128. VIBURNUM.	LINN.	369. <i>Lantana</i> .

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

128. VIBURNUM.		370. <i>Opulus</i> .
129. SAMBUCUS.	TOURN.	371. <i>Ebulus</i> .
		372. <i>Nigra</i> .
		373. <i>Racemosa</i> .
130. STAPHYLLODENDRON. PLIN.		374. <i>Pinnatum</i> .
131. TAMARISCUS.	TOURN.	375. <i>Germanicus</i> .
132. ALSINE.	LINN.	376. <i>Media</i> .
133. DRYPIS.	MICH.	377. <i>Spinoza</i> .

TETRAGYNIA.

134. PARNASSIA.	TOURN.	378. <i>Palustris</i> .
-----------------	--------	-------------------------

PENTAGYNIA.

135. STATICE.	LINN.	379. <i>Armeria</i> .
136. LINUM.	TOURN.	380. <i>Limonium</i> .
		381. <i>Ustafissimum</i>
		382. <i>Hirsutum</i> .
	*	383. <i>Sylvestre</i> .
		384. <i>Flavum</i> .
	*	385. <i>Liburnicum</i> .
		386. <i>Tenuifolium</i> .
	*	387. <i>Laeve</i> .
		388. <i>Austriacum</i> .
		389. <i>Catharticum</i> .
137. ROSSOLIS.	DODON.	390. <i>Septentrionalis</i> .

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

138. GALANTHUS.	LINN.	391. <i>Nivalis</i> .
139. LEUCOIUM.	LINN.	392. <i>Vernum</i> .
		393. <i>Aestivum</i> .
140. NARCISSUS.	TOURN.	394. <i>Poeticus</i> .
		395. <i>Pseudo-Narcissus</i> .
141. ALLIUM.	HALL.	396. <i>Scorodoprasum</i> .
		397. <i>Carinatum</i> .
		398. <i>Paniculatum</i> .

141. AL-

GENERAL SPECIES.

4 141. ALLIUM.	TOURN.	399. <i>Paniculatum.</i> 400. <i>Narcissifolium.</i> 401. <i>Ursinum.</i> 402. <i>Martagon.</i> 403. <i>Chalcedonicum.</i> 404. <i>Bulbiferum.</i> 405. <i>Meleagris.</i> 406. <i>Dens canis.</i> 407. <i>Sylvestris.</i> 408. <i>Umbellatum.</i> 409. <i>Pyrenaicum.</i> 410. <i>Luteum.</i> 411. <i>Liburnicus.</i> 412. <i>Ramosus.</i> 413. <i>Ramosum.</i> 414. <i>Bifolium.</i> 415. <i>Autumnale.</i> 416. <i>Officinalis.</i> 417. <i>Corruda.</i> 418. <i>Maialis.</i> 419. <i>Verticillata.</i> 420. <i>Polygonatum.</i> 421. <i>Multiflora.</i> 422. <i>Bifolia.</i> 423. <i>Comosus.</i> 424. <i>Botryoides.</i> 425. <i>Lilio-Aphodel.</i> 426. <i>Calamus.</i> 427. <i>Conglomeratus.</i> 428. <i>Effusus.</i> 429. <i>Inflexus.</i> 430. <i>Acutus.</i> 431. <i>Articulatus.</i> 432. <i>Trifidus.</i> 433. <i>Bufonius.</i> 434. <i>Campestris.</i> 435. <i>Pilosus.</i> 436. <i>Niveus.</i> 437. <i>Vulgaris.</i>
4 142. LILIUM.	TOURN.	
4 143. FRITILLARIA.	LOBEL.	
4 144. ERYTHRONIUM.	LINN.	
4 145. TULIPA.	GESN.	
4 146. ORNITHOGALUM.	DIOSC.	
4 147. ASPHODELUS.	DIOSC. *	
4 148. ANTERICUM.	LINN.	
4 149. ASPARAGUS.	TOURN.	
4 150. CONVALLARIA.	LINN.	
4 151. HYACINTHUS.	LINN.	
4 152. HEMEROCALLIS.	THEOPH.	
153. ACORUS.	DIOSC.	
154. JUNCUS.	PLIN.	
2 155. BERBERIS.	BRUNF.	

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

TRIGYNTIA.

156. LAPATHUM.	HIPP.	438. <i>Acetosa.</i>
		439. <i>Acetosella.</i>
	*	440. <i>Alpestrum.</i>
		441. <i>Crispum.</i>
	*	442. <i>Hydrolapathum.</i>
		443. <i>Acutum.</i>
		444. <i>Aquaticum.</i>
157. SCHEUCHZERIA.	LINN.	445. <i>Pseudo Asph.</i>
158. TRIGLOCHIN.	C. BAUH.	446. <i>Palustre.</i>
159. COLCHICUM.	PLIN.	447. <i>Maritimum.</i>
		448. <i>Autumnale.</i>

POLYGYNTIA.

160. ALISMA.	DIOSC.	449. <i>Plantago.</i>
--------------	--------	-----------------------

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

MONOGYNTIA.

161. AESCULUS.	LINN.	450. <i>Hippocastanum.</i>
----------------	-------	----------------------------

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNTIA.

162. ONAGRA.	DIOSC.	451. <i>Biennis.</i>
163. CHAMAENERION.	GESN.	452. <i>Hirsutum.</i>
		453. <i>Montanum.</i>
		454. <i>Tetragonum.</i>
		455. <i>Angustifolium.</i>
		456. <i>Palustre.</i>
164. VACCINIUM.	GAL.	457. <i>Oxycoccus.</i>
165. ERICA.	PLIN.	458. <i>Myrtillus.</i>
		459. <i>Vidis idea.</i>
		460. <i>Vulgaris.</i>
		461. <i>Carnea.</i>

166. THY-

GENERA, SPECIES.

- 2 166. THYMELAEA. MESU. 462. *Mexereum.*
463. *Laureola.*
464. *Cneorum.*
* 465. *Candida.*

DIGYNIA.

167. MOEHRINGIA. LINN. 466. *Muscosa*.

TRIGYNTIA.

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| 168. POLYGONUM. | LINN. | 467. <i>Hydropiper.</i> |
| | | 468. <i>Persicaria.</i> |
| | | 469. <i>Convolvulus.</i> |
| | | 470. <i>Viviparum.</i> |
| | | 471. <i>Aviculare.</i> |

TETRAGYNNIA.

- | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|
| 169. PARIS. | LON. | 472. <i>Quadrifolia</i> . |
| 170. MOSCHATELLA. | CORD. | 473. <i>Adoxa</i> . |

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNYA.

- I 171. LAURUS. GAL. 474. *Nobilis*.

HEXAGYNTIA.

- 4 172. BUTOMUS. LINN. 475. Umbellatus. 4

CLASSIS X.

D E C A N D R I A.

MONOGYNYA.

- | | | |
|--------------------|----------|--------------------------|
| 173. DICTAMNUS. | BRUNF. | 476. <i>Albus.</i> |
| 174. RUTA. | PLIN. | 477. <i>Graveolens.</i> |
| 175. HYPOPITHYS. | C. BAUH. | 478. <i>Multiflora.</i> |
| 176. RHODODENDRON. | | 479. <i>Ferrugineum.</i> |
| | | 480. <i>Hirsutum.</i> |
| | | 176. RHO |

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

176.	RHODODENDRON.	481.	<i>Chamaecistus.</i>
		482.	<i>Polifolium.</i>
177.	ARBUTUS.	LINN.	483. <i>Uva ursi.</i>
178.	PYROLA.	ERUNF.	484. <i>Minor.</i>
			485. <i>Secunda.</i>
			486. <i>Uniflora.</i>

DIGYNIA.

179.	CHRYSOSPLENIUM.	TOURN.	487. <i>Alternifolium.</i>
180.	SAXIFRAGA.	BOERH.	488. <i>Rotundifolia.</i>
			489. <i>Cotyledon.</i>
			490. <i>Cuneifolia.</i>
			491. <i>Geum.</i>
			492. <i>Stellaris.</i>
			493. <i>Autumnalis.</i>
			494. <i>Cespitosa.</i>
			495. <i>Caesia.</i>
*			496. <i>Trichodes.</i>
			497. <i>Bryoides.</i>
			498. <i>Pyrenaica.</i>
			499. <i>Hypnoides.</i>
			500. <i>Tridactylites.</i>
181.	KNAVEL.	RAI.	501. <i>Annuum.</i>
182.	TUNICA.	LONIC.	502. <i>Barbata.</i>
			503. <i>Prolifera.</i>
			504. <i>Cartesianorum.</i>
			505. <i>Plumaria.</i>
			506. <i>Saxifraga.</i>
			507. <i>Caryophyllus.</i>
			508. <i>Arenaria.</i>
			509. <i>Virginea.</i>
			510. <i>Officinalis.</i>
			511. <i>Vaccaria.</i>
			512. <i>Orientalis.</i>
			513. <i>Pumilio.</i>
			514. <i>Behen.</i>
			515. <i>Otites.</i>
			516. <i>Acaulis.</i>
			517. <i>Baccifera.</i>

GENERA, SPECIES.

183. LYCHNIS.

- 518. *Viscosa*.
- 519. *Quadrifida*.
- 520. *Saxifraga*.
- 521. *Conica*.
- 522. *Cerastrodes*.
- 523. *Inaperta*.
- 524. *Vulnerata*.
- 525. *Nutans*.
- * 526. *Armoraria*.
- 527. *Githago*.
- 528. *Flos Cuculi*.
- 529. *Viscaria*.
- 530. *Dioica*.
- 531. *Sedoides*.
- 532. *Nemorum*.
- 533. *Dichotoma*.
- 534. *Holostea*.
- 535. *Graminea*.
- * 536. *Ciliata*.
- 537. *Aculeata*.
- 538. *Rubra*.
- 539. *Saxatilis*.
- * 540. *Rupestris*.
- 541. *Laricifolia*.
- 542. *Arvensis*.
- 543. *Pentandra*.
- 544. *Serpillifolia*.
- 545. *Nodosa*.
- 546. *Aquatica*.
- 547. *Repens*.

184. CHERLERIA. HALL.
185. STELLARIA.

PENTAGYNYA.

186. CENTUNCULUS. PLIN.

- 548. *Arvensis*.
- 549. *Semidecander*.
- 550. *Alpinus*.
- * 551. *Angustifolius*.
- * 552. *Rigidus*.
- 553. *Telephium*.
- * 554. *Haematodes*.

187. SEDUM.

HALL.

187. SE-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

187. SEDUM.

555. *Dasiphillum.*
556. *Album.*
557. *Rupestre.*
558. *Sexangulare.*
559. *Tectorum.*
560. *Roseum.*
561. *Acetosella.*
562. *Corniculata.*

188. OXYS.

PLIN.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

189. ASARUM.

- LINN. 563. *Europaeum.*
TOURN. 564. *Oleracea.*
LINN. 565. *Salicaria.*
566. *Hyssopifolia.*

190. PORTULACA.

191. LYTHRUM.

DIGYNIA.

192. AGRIMONIA.

- BRUNF. 567. *Eupatoria.*
568. *Agrimonooides.*

TRIGYNIA.

193. RESEDA.

- LINN. 569. *Lutea.*

194. TITHYMALUS.

- DIOSC. 570. *Phyteuma.*
571. *Lathyris.*
572. *Sylvaticus.*
573. *Dulcis.*
574. *Seguierii.*
575. *Pithyusa.*
576. *Pilosus.*
577. *Verrucosus.*
578. *Platypyllos.*
579. *Helioscopius.*
580. *Ejula.*
581. *Paralias.*
582. *Cyparissias.*
583. *Peplis.*

CLAS-

GENERALIA, SPECIES.

CLASSIS XII. ICOSANDRIA. MONOGYNIA.

2	195. MYRTUS.	LATIN.	584. <i>Communis.</i>
2	196. PUNICA.	PLIN.	585. <i>Granatum.</i>
3	197. PRUNUS.	LINN.	586. <i>Spinosa.</i> 587. <i>Cerasus.</i> 588. <i>Mahalep.</i> 589. <i>Padus.</i>

DI- et PENTAGYNIA.

1-2	198. MESPILUS.		590. <i>Oxyacantha.</i> 591. <i>Aria.</i> 592. <i>Chamaemespilus.</i> 593. <i>Aucuparia.</i> 594. <i>Cotoneaster.</i> 595. <i>Amalanchier.</i> 596. <i>Pyracantha.</i>
1	199. PYRUS.	LINN.	597. <i>Azarolus.</i> 598. <i>Communis.</i> 599. <i>Malus.</i>
2-3	200. SPIRAEA.	LINN.	600. <i>Ulmifolia.</i> 601. <i>Aruncus.</i> 602. <i>Filipendula.</i> 603. <i>Ulmaria.</i>

POLYGYNIA.

2	201. ROSA.	THEOPH.	604. <i>Canina.</i> 605. <i>Simplex.</i> 606. <i>Spinosissima.</i> 607. <i>Pumila.</i> 608. <i>Odoratissima.</i> 609. <i>Candida.</i> 610. <i>Repens.</i>
2-3	202. RUBUS.	PLIN.	611. <i>Idaeus.</i> 612. <i>Caesius.</i> 613. <i>Fruticosus.</i>

202. RU-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

202. RUBUS.	LUDW.	614. <i>Saxatilis.</i>
203. POTENTILLA.		615. <i>Anserina.</i>
		616. <i>Rupestris.</i>
		617. <i>Palustris.</i>
		618. <i>Recta.</i>
		619. <i>Argentea.</i>
		620. <i>Tomentilla.</i>
		621. <i>Verna.</i>
		622. <i>Reptans.</i>
		623. <i>Caulescens.</i>
		624. <i>Nitida.</i>
		625. <i>Vesca.</i>
		* 626. <i>Grandiflora.</i>
		627. <i>Subacaulis.</i>
204. CARYOPHILLATA.	FUCHS.	628. <i>Urbana.</i>
		629. <i>Rivalis.</i>
		630. <i>Montana.</i>
205. DRYAS.	LINN.	631. <i>Ottopetala.</i>

**CLASSIS XIII.
POLYANDRIA.
MONOGYNIA.**

206. CAPPARIS.	DIOSC.	632. <i>Spinosa.</i>
207. ACTAEA.	PLIN.	633. <i>Spicata.</i>
208. CHELIDONIUM.	DIOSC.	634. <i>Maius.</i>
209. GLAUCIUM.	TOURN.	635. <i>Luteum.</i>
210. PAPAVER.	LATIN.	636. <i>Argemone.</i>
		637. <i>Alpinum.</i>
		638. <i>Rhaeas.</i>
211. NYMPHAEA.	LINN.	639. <i>Lutea.</i>
		640. <i>Alba.</i>
212. TILIA.	PLIN.	641. <i>Platiphyllos.</i>
		642. <i>Ulmifolia.</i>
213. CISTUS.	LINN.	643. <i>Salvifolia.</i>
		644. <i>Fumana.</i>
		* 645. <i>Alpestris.</i>
		* 646. <i>Tomentosus.</i>

GENERALIA, SPECIES.

213. CISTUS.

647. *Canus.*

* 648. *Grandiflorus.*

649. *Helianthemum.*

DIGYNIA.

214. POEONIA.

PLIN. 650. *Officinalis.*

TRIGYNIA.

215. DELPHINIUM.

DIOSC. 651. *Consolida.*

216. ACONITUM.

DIOSC. 652. *Staphisagria.*

653. *Lycotonum.*

654. *Napellus.*

655. *Anthora.*

PENTAGYNIA.

217. AQUILEGIA.

TRAG. 656. *Vulgaris.*

218. NIGELLA.

PLIN. 657. *Arvensis.*

POLYGYNIA.

219. ANEMONE.

LINN. 658. *Hepatica.*

659. *Trifolia.*

660. *Nemorosa.*

661. *Ranunculoides.*

* 662. *Alpina.*

* 663. *Apifolia.*

664. *Burseriana.*

665. *Pulsatilla.*

666. *Austriaca.*

667. *Recta.*

668. *Inclinata.*

669. *Vitalba.*

670. *Viticella.*

* 671. *Cespitosa.*

672. *Aquilegifolium.*

673. *Flavum.*

674. *Minus.*

* 675. *Nigricans.*

676. *Angustifolium.*

220. ATRAGENE.

LINN. 668. *Inclinata.*

221. CLEMATIS.

DIOSC. 669. *Vitalba.*

222. THALICTRUM.

DIOSC. 670. *Viticella.*

Scopoli Flora Carn.

c

223. ADO-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

223. ADONIS.	MATTH.	677. <i>Autumnalis.</i>
		678. <i>Vernalis.</i>
224. RANUNCULUS.	LINN.	679. <i>Alpestris.</i>
		680. <i>Aconitifolius.</i>
		681. <i>Aquatalis.</i>
		682. <i>Flammula.</i>
		683. <i>Lingua.</i>
		684. <i>Ficaria.</i>
		685. <i>Thora.</i>
		686. <i>Nivalis.</i>
		687. <i>Auricomus.</i>
		688. <i>Sceleratus.</i>
		689. <i>Repens.</i>
		690. <i>Aeris.</i>
		691. <i>Lanuginosus.</i>
		692. <i>Bulbosus.</i>
		693. <i>Arvensis.</i>
225. TROLLIUS.	GESN.	694. <i>Europaeus.</i>
226. ISOPYRUM.	LINN.	695. <i>Thalictroides.</i>
227. HELLEBORUS.	TOURN.	696. <i>Niger.</i>
		697. <i>Viridis.</i>
228. POPULAGO.	TABERN.	698. <i>Palustris.</i>

CLASSIS XIV.
D I D Y N A M I A.
G Y M N O S P E R M I A.

229. LAMMIUM.	TOURN.	699. <i>Pannonicum.</i>
		700. <i>Album.</i>
		701. <i>Purpureum.</i>
		702. <i>Amplexicaule.</i>
230. LEONURUS.		703. <i>Cardiaca.</i>
		704. <i>Marrubiastrum.</i>
		705. <i>Galeobdolon.</i>
231. STACHYS.	LINN.	706. <i>Sylvatica.</i>
		707. <i>Palustris.</i>
		708. <i>Betonica.</i>
		709. <i>Alpina.</i>

231. STA-

GENERA, SPECIES.

231. STACHYS.		710. <i>Germanica.</i>
232. SIDERITIS.	LINN.	711. <i>Alopecuros.</i>
333. MARRUBIUM.	TOURN.	712. <i>Vulgare.</i>
		713. <i>Supinum.</i>
234. BALLOTE.	MATTH.	714. <i>Nigra.</i>
235. BRUNELLA.	BRUNF.	715. <i>Vulgaris.</i>
236. BUGULA.	DODON.	716. <i>Reptans.</i>
		717. <i>Genevensis.</i>
237. TEUCRIUM.	LINN.	718. <i>Chamaepitys.</i>
		719. <i>Scordium.</i>
		720. <i>Chamaedrys.</i>
		721. <i>Scorodonia.</i>
		722. <i>Flavum.</i>
		723. <i>Montanum.</i>
		724. <i>Polium.</i>
		725. <i>Botrys.</i>
238. MELLITIS.	LINN.	726. <i>Melissophyllum.</i>
239. GALEOPSIS.	LINN.	727. <i>Ladanum.</i>
		728. <i>Tetrahit.</i>
240. BETONICA.	LINN.	729. <i>Officinalis.</i>
241. CALAMINTHA.	TOURN.	730. <i>Hederacea.</i>
242. CLINOPODIUM.	TOURN.	731. <i>Vulgare.</i>
243. THYMUS.	LINN.	732. <i>Grandiflorus.</i>
		733. <i>Calamintha.</i>
		734. <i>Alpinus.</i>
		735. <i>Acinos.</i>
		736. <i>Serpillum.</i>
244. SATUREIA.	LINN. *	737. <i>Thymifolia.</i>
		738. <i>Montana.</i>
245. MELISSA.	PLIN.	739. <i>Officinalis.</i>
246. ORIGANUM.	TOURN.	740. <i>Vulgare.</i>
247. CASSIDA.	COLUM.	741. <i>Galericulata.</i>
		742. <i>Hastifolia.</i>
248. NEPETA.	TRAG.	743. <i>Cataria.</i>
		744. <i>Violacea.</i>
249. MENTHA.	TOURN.	745. <i>Spicata.</i>
		746. <i>Arvensis.</i>
		747. <i>Pulegium.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES.

249. MENTHA.		748. <i>Aquatica.</i>
250. VERBENA.	PLIN.	749. <i>Officinalis.</i>
		<i>ANGIOSPERMIA.</i>
251. BARTSIA.	LINN.	750. <i>Alpina.</i>
252. MIMULUS.	PLIN.	751. <i>Crista Galli.</i>
		* 752. <i>Alechorolophus.</i>
253. EUPHRASIA.	COLUM.	753. <i>Officinalis.</i>
		754. <i>Odontites.</i>
		755. <i>Lutea.</i>
254. MELAMPYRUM.	DIOSC.	756. <i>Nemorosum.</i>
		757. <i>Cristatum.</i>
		758. <i>Pratense.</i>
		759. <i>Sylvaticum.</i>
255. SQUAMARIA.	TONIC.	760. <i>Orobanche.</i>
256. PEDICULARIS.	TOURN.*	761. <i>Acaulis.</i>
		762. <i>Palustris.</i>
		763. <i>Tuberosa.</i>
		764. <i>Rostrata.</i>
		765. <i>Comosa.</i>
		766. <i>Verticillata.</i>
257. ANTIRRHINUM.	LINN.	767. <i>Alpinum.</i>
		768. <i>Linaria.</i>
		769. <i>Minus.</i>
		770. <i>Cymbalaria.</i>
		771. <i>Spurium.</i>
		772. <i>Elatine.</i>
		773. <i>Maius.</i>
		774. <i>Orontium.</i>
258. SCROPHULARIA.	BRUNF.	775. <i>Nodosa.</i>
		776. <i>Aquatica.</i>
		777. <i>Auriculata.</i>
		778. <i>Canina.</i>
259. DIGITALIS.	GESN.	779. <i>Lutea.</i>
		780. <i>Purpurea.</i>
		781. <i>Ferruginea.</i>
260. OROBANCHE.	DIOSC.	782. <i>Maior.</i>
261. VITEX.	TRAG.	783. <i>A. castus.</i>

CLAS-

GENERA, SPECIES.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSAE.

262. PELTARIA.	IACQU.	784. <i>Alliacea.</i>
263. LUNARIA.	GESN.	785. <i>Rediviva.</i>
264. DRABA.	DILLEN.	786. <i>Alpina.</i>
	*	787. <i>Ciliata.</i>
	*	788. <i>Carnica.</i>
	*	789. <i>Mollis.</i>
		790. <i>Pyrenaica.</i>
		791. <i>Nasturtiolum.</i>
		792. <i>Verna.</i>
265. ALYSSUM.	HALL.	793. <i>Alpinum.</i>
266. MYAGRUM.	DIOSC.	794. <i>Sativum.</i>
		795. <i>Perenne.</i>
	*	796. <i>Rugosum.</i>
	*	797. <i>Rostratum.</i>
	*	798. <i>Paniculatum.</i>
	*	799. <i>Littorale.</i>
267. COCHLEARIA.	MATTH.	800. <i>Coronopus.</i>
268. NASTURTIUM.	TOURN.	801. <i>Ruderale.</i>
269. ADYSETON.	ADANS.	802. <i>Calycinum.</i>
		803. <i>Montanum.</i>
270. BISCUTELLA.	LINN.	804. <i>Didyma.</i>
271. IBERIS.	LINN.	805. <i>Rotundifolia.</i>
		806. <i>Amara.</i>
272. THLASPI.	LINN.	807. <i>Campestre.</i>
		808. <i>Bursa. Pastor.</i>
		809. <i>Peregrinum.</i>
		810. <i>Arvense.</i>
		811. <i>Montanum.</i>

SILIQUOSAE.

273. DENTARIA.	CLUS.	812. <i>Enneaphyllos.</i>
		813. <i>Bulbifera.</i>
		814. <i>Pentaphyllos.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

274. CARDAMINE.	LINN.	815. <i>Trifolia.</i> 816. <i>Impatiens.</i> 817. <i>Hirsuta.</i> * 818. <i>Stolonifera.</i> 819. <i>Pratensis.</i>
275. SISYMBRIUM.	LINN.	820. <i>Nasturtium.</i> 821. <i>Sophia.</i> 822. <i>Sylvestre.</i> 823. <i>Roripa.</i> 824. <i>Officinale.</i> 825. <i>Alliaria.</i> 826. <i>Barbarea.</i>
276. ERYSIMUM.	LINN.	827. <i>Campestre.</i> 828. <i>Erucastrum.</i> 829. <i>Hesperis.</i> * 830. <i>Sylvestre.</i> 831. <i>Cheiranthoides.</i>
277. HESPERIS.	PLIN.	832. <i>Matronalis.</i>
278. ARABIS.	LINN.	833. <i>Alpina.</i> 834. <i>Turrita.</i> 835. <i>Hirsuta.</i> 836. <i>Bellidifolia.</i> 837. <i>Arenosa.</i> * 838. <i>Sylvestris.</i>
279. TURRITIS.	TOURN.	839. <i>Glabra.</i>
280. BRASSICA.	LINN.	840. <i>Oleracea.</i> 841. <i>Rapa.</i>
281. SINAPIS.	TOURN.	842. <i>Arvensis.</i> 843. <i>Alba.</i>
282. CAKILE.	SERAP.	844. <i>Maritima.</i>

CLASSIS XVI. MONADELPHIA. DECANDRIA.

283. GERANIUM.	DIOSC.	845. <i>Robertianum.</i> 846. <i>Rotundifolium.</i>
		283. GE-

GENERALIA, SPECIES.

283. GERANIUM.

- * 847. *Malvaefolium.*
- 848. *Diseatum.*
- 849. *Columbinum.*
- 850. *Molle.*
- 851. *Sylvaticum.*
- 852. *Pratense.*
- 853. *Cicutarium.*
- 854. *Moschatum.*

POLYANDRIA.

284. ALTHAEA.

LINN.

- 855. *Officinalis.*
- 856. *Cannabina.*
- 857. *Hirsuta.*

285. MALVA.

PREST.

- 858. *Rotundifolia.*
- 859. *Sylvestris.*
- 860. *Alcea.*
- 861. *Moschata.*
- 862. *Trionum.*
- 863. *Syriaca.*

2 286. KETMIA.

TOURN.

CLASSIS XVII.

D I A D E L P H I A.

HEXANDRIA.

287. FUMARIA.

LINN.

- 864. *Bulbosa.*
- 865. *Capnoides.*
- 866. *Officinalis.*

2 - 3 288. POLYGALA.

LINN.

- 867. *Vulgaris.*
- 868. *Amara.*
- 869. *Chamaebuxus.*

DECANDRIA.

289. GENISTA.

TOURN.

870. *Iuncea.*

- 871. *Radiata.*
- 872. *Sagittalis.*
- 873. *Tindoria.*
- 874. *Pilosa.*

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

289. GENISTA.		* 875. <i>Sylvestris.</i>
290. ANONIS.	TOURN.	876. <i>Germanica.</i>
291. VULNERARIA.	GESN.	877. <i>Spinoza.</i>
		878. <i>Natrix.</i>
292. COLUTEA.	THEOPH.	879. <i>Anthyllis.</i>
293. OROBUS.	HIPP.	880. <i>Montana.</i>
		881. <i>Arborescens.</i>
294. LATHYRUS.	LINN.	882. <i>Vernus.</i>
		883. <i>Tuberosus.</i>
		884. <i>Niger.</i>
		885. <i>Pyrenaicus.</i>
		* 886. <i>Montanus.</i>
295. VICIA.	PLIN.	887. <i>Aphaca.</i>
		888. <i>Nissolia.</i>
		889. <i>Sativus.</i>
296. ERVUM.	LINN.	890. <i>Angulatus.</i>
		891. <i>Cicera.</i>
		892. <i>Sylvestris.</i>
297. CYTISUS.	DIOSC.	893. <i>Pratinus.</i>
		* 894. <i>Sepium.</i>
		895. <i>Sativa.</i>
		896. <i>Grandiflora.</i>
		897. <i>Sepium.</i>
		898. <i>Sylvatica.</i>
		899. <i>Cracca.</i>
		900. <i>Lens.</i>
		901. <i>Hirsutum.</i>
		902. <i>Tetraspermum.</i>
298. CORONILLA.	LINN.	903. <i>Laburnum.</i>
		904. <i>Nigricans.</i>
		* 905. <i>Purpureus.</i>
		906. <i>Capitatus.</i>
		907. <i>Hirsutus.</i>
		908. <i>Prostratus.</i>
		909. <i>Supinus.</i>
		910. <i>Argenteus.</i>
		911. <i>Emerus.</i>
		912. <i>Montana.</i>
		913. <i>Varia.</i>
		299. OR-

GENERAL, SPECIES.

299. ORNITHOPODIUM.	GESN.	914. <i>Scorpioides.</i>
300. HIPPOCREPIS.	LINN.	915. <i>Comosa.</i>
301. SCORPIURUS.	LINN.	916. <i>Vermiculata.</i>
		917. <i>Muricata.</i>
302. ONOBRYCHIS.	TOURN.	918. <i>Viciae folia.</i>
303. ASTRAGALUS.	TOURN.	919. <i>Glyciphyllus.</i>
		920. <i>Onobrychis.</i>
304. TRIFOLIUM.	LINN.	921. <i>Monspeffulanus.</i>
		922. <i>Montanus.</i>
		923. <i>Pratense.</i>
		* 924. <i>Alpestre.</i>
		925. <i>Rubens.</i>
		926. <i>Stellatum.</i>
		927. <i>Scabrum.</i>
		928. <i>Striatum.</i>
		929. <i>Angustifolium.</i>
		930. <i>Arvense.</i>
		931. <i>Agrarium.</i>
		932. <i>Montanum.</i>
		933. <i>Fragiferum.</i>
		934. <i>Repens.</i>
		935. <i>Officinale.</i>
305. LOTUS.	TOURN.	936. <i>Maior.</i>
		937. <i>Corniculatus.</i>
306. TETRAGONOLOBUS.	CAMER.	938. <i>Scandalida.</i>
307. DORYCNIUM.	TOURN.	939. <i>Pentaphyllum.</i>
308. MEDICA.	DIOSC.	940. <i>Lupulina.</i>
		941. <i>Falcata.</i>
		942. <i>Polymorpha.</i>

CLASSIS XVIII. POLYADELPHIA. POLYANDRIA.

309. HYPERICUM.	DIOSC.	943. <i>Quadrangulum.</i>
		944. <i>Perforatum.</i>
		945. <i>Hirsutum.</i>

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA.

310. TRAGOPOGON.	DIOSC.	946. <i>Pratense</i> .
		* 947. <i>Dubium</i> .
311. SCORZONERA.	MATTH.	948. <i>Humilis</i> .
		949. <i>Purpurea</i> .
		950. <i>Angustifolia</i> .
		951. <i>Hispanica</i> .
		* 952. <i>Villosa</i> .
312. PICRIS.	LINN.	953. <i>Hieracioides</i> .
313. CREPIS.	LINN.	954. <i>Tectorum</i> .
		955. <i>Pulchra</i> .
		* 956. <i>Striata</i> .
314. HEDYPNOIS.		957. <i>Taraxacum</i> .
		* 958. <i>Paludosa</i> .
315. LACTUCA.	PLIN.	959. <i>Prenanthoides</i> .
		960. <i>Virosa</i> .
		961. <i>Saligna</i> .
		962. <i>Perennis</i> .
316. PRENANTHES.	VAILL.	963. <i>Purpurea</i> .
317. HIERACIUM.	ADANS.	964. <i>Muralis</i> .
		965. <i>Aureum</i> .
		966. <i>Pilosella</i> .
		967. <i>Alpinum</i> .
		* 968. <i>Montanum</i> .
		969. <i>Porrifolium</i> .
		970. <i>Murorum</i> .
		971. <i>Cerinthoides</i> .
		972. <i>Sabaudum</i> .
		973. <i>Paludosum</i> .
		974. <i>Arvense</i> .
		975. <i>Oleraceum</i> .
		976. <i>Coeruleum</i> .
		977. <i>Hispidum</i> .
318. LEONTODON.		978. <i>Hirtum</i> .

GENERA. SPECIES.

318. LEONTODON.		* 979 <i>Chondrillaefolium.</i> * 980. <i>Ciliatum.</i> 981. <i>Autumnale.</i>
319. APARGIA.		982. <i>Incana.</i> 983. <i>Danubialis.</i> * 984. <i>Hirta.</i>
320. ANDRYALA.	LINN.	* 985. <i>Chondrilloides.</i>
321. ACHYROPHORUS.	VAILL.	986. <i>Maculatus.</i> 987. <i>Radicatus.</i>
322. LAMPSANA.	DIOSC.	988. <i>Communis.</i> 989. <i>Foetida.</i> 990. <i>Rhagadiolus.</i>
323. CICHLORIUM.	THEOPH.	991. <i>Intybus.</i>
324. SCOLYMUS.	DIOSC.	992. <i>Maculatus.</i>
325. ECHINOPUS.	GESN.	993. <i>Sphaerocephalus.</i> 994. <i>Ritro.</i>
326. ARCTIUM.	DIOSC.	995. <i>Lappa.</i>
327. CIRSIUM.	VAILL.*	996. <i>Pigmacium.</i> 997. <i>Arctioides.</i> 998. <i>Oleraceum.</i> * 999. <i>Erisithales.</i> 1000. <i>Molle.</i> 1001. <i>Arvense.</i> 1002. <i>Serratuloides.</i> 1003. <i>Defloratum.</i> 1004. <i>Palustre.</i> * 1005. <i>Carniolicum.</i> 1006. <i>Spinosissimum.</i> 1007. <i>Lanceolatum.</i> 1008. <i>Eriophorum.</i> 1009. <i>Maculatum.</i> 1010. <i>Acaulos.</i>
328. CARDUUS.	VAILL.	1011. <i>Nutans.</i> 1012. <i>Tinctorius.</i>
329. ACANOS.	THEOPH.	1013. <i>Spina.</i>
330. CARLINA.	CLUS.	1014. <i>Acaulis.</i>
331. ATRACTYLIS.	THEOPH.	1015. <i>Corymbosa.</i> 1016. <i>Lanata.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

332. RHAPONTICUM.	VAILL.	1017. <i>Iacea.</i> * 1018. <i>Eriophorum.</i> 1019. <i>Calcitrapa.</i> * 1020. <i>Paniculatum.</i>
333. CENTAUREA.	LINN.	1021. <i>Phrygia.</i> 1022. <i>Montana.</i> 1023. <i>Cyanus.</i> 1024. <i>Paniculata.</i> 1025. <i>Argentea.</i> 1026. <i>Scabiosa.</i> * 1027. <i>Kartschiana.</i> 1028. <i>Solstitialis.</i> 1029. <i>Collina.</i>
334. CARPESIUM.	ALP.	1030. <i>Cernuum.</i>
335. TANACETUM.	PLIN.	1031. <i>Vulgare.</i>
2 - 3 336. ARTEMISIA.	LINN.	1032. <i>Dracunculus.</i> 1033. <i>Vulgaris.</i> 1034. <i>Abrotanum.</i> 1035. <i>Absynthium.</i> 1036. <i>Caeruleascens.</i> 1037. <i>Campestris.</i> 1038. <i>Rupestris.</i> 1039. <i>Perennis.</i> 1040. <i>Officinalis.</i> 1041. <i>Leucanthemum.</i> 1042. <i>Chamomilla.</i> 1043. <i>Corymbosum.</i> 1044. <i>Dioicum.</i> 1045. <i>Leontopodium.</i> 1046. <i>Sylvaticum.</i> 1047. <i>Alpinum.</i> * 1048. <i>Fuscum.</i> 1049. <i>Uliginosum.</i> 1050. <i>Germanicum.</i> 1051. <i>Arvense.</i> 1052. <i>Stoechas.</i>
2 - 3 337. BELLIS.	PLIN.	1053. <i>Squarrosa.</i>
338. CALTHA.	PLIN.	1054. <i>Cannabinum.</i>
339. MATRICARIA.	HALL.	1055. <i>Cacalia.</i>
340. PYRETHRUM.	HALL.	
341. GNAPHALIUM.	LUDW.	
342. CONYZA.	PLIN.	
343. EUPATORIUM.	TOURN.	
344. TUSSILAGO.	LINN.	
		344. <i>Tus</i>

GENERA, SPECIES.

344. TUSSILACO.		* 1056. <i>Alpina</i> .
		1057. <i>Sylvestris</i> .
		1058. <i>Petasites</i> .
		1059. <i>Farfara</i> .
345. ERIGERON.	LINN.	1060. <i>Canadense</i> .
		1061. <i>Alpinum</i> .
		1062. <i>Polymorphum</i> .
346. SENECIO.	LINN.	1063. <i>Vulgaris</i> .
		* 1064. <i>Littoralis</i> .
		1065. <i>Paludosus</i> .
		1066. <i>Crithmifolius</i> .
		1067. <i>Doronicum</i> .
		1068. <i>Alpinus</i> .
347. ASTER.	TOURN.	* 1069. <i>Lanatus</i> .
		1070. <i>Sarracenicus</i> .
		1071. <i>Incanus</i> .
		1072. <i>Iacobaea</i> .
		1073. <i>Abrotanifolius</i> .
		1074. <i>Bellidastrum</i> .
		1075. <i>Scorpioides</i> .
		1076. <i>Tripolium</i> .
		1077. <i>Amellus</i> .
		1078. <i>Helenium</i> .
		1079. <i>Dysentericus</i> .
		1080. <i>Pulicarius</i> .
		1081. <i>Salicinus</i> .
		1082. <i>Hirtus</i> .
		* 1083. <i>Bubonium</i> .
		1084. <i>Ensifolius</i> .
348. DORONICUM.	HALL.	1085. <i>Pardelianches</i> .
349. ARNICA.	FEHR.	1086. <i>Montana</i> .
350. DORIA.	RAL.	1087. <i>Virgaurea</i> .
351. BUPHTHALMUM.	LINN.	1088. <i>Salicifolium</i> .
352. BIDENS.	CAESAL.	1089. <i>Cernua</i> .
		1090. <i>Tripartita</i> .
353. ANTHEMIS.	LINN.	1091. <i>Arvensis</i> .
354. ACHILLEA.	DIOSC.	1092. <i>Cotula</i> .
		1093. <i>Clavennae</i> .
		1094. <i>Atrata</i> .

354. ACHIL-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

354. *ACHILLEA.*

1095. *Millefolium.*

355. *XERANTHEMUM. HERM.*

1096. *Annuum.*

MONOGAMIA.

356. *VIOLA.*

PLIN.

1097. *Odorata.*

1098. *Canina.*

1099. *Biflora.*

1100. *Tricolor.*

357. *BALSAMINA.*

GALEN.

1101. *Noli tangere.*

CLASSIS XX.

G Y N A N D R I A.

DIANDRIA.

4 358. *ORCHIS.*

HALL.

1102. *Bifolia.*

1103. *Papilionacea.*

1104. *Lingua.*

1105. *Pyramidalis.*

1106. *Globosa.*

1107. *Coriophora.*

1108. *Ustulata.*

* 1109. *Tridentata.*

1110. *Morio.*

1111. *Mascula.*

1112. *Militaris.*

1113. *Hircina.*

1114. *Muscaria.*

1115. *Arachnites.*

1116. *Monorchis.*

1117. *Alpina.*

1118. *Latisolia.*

1119. *Maculata.*

* 1120. *Comosa.*

1121. *Conopsea.*

1122. *Virens.*

1123. *Nigra.*

1124. *Albida.*

GENERAL SPECIES.

4 359. SERAPIAS.

1125. *Spiralis*.
1126. *Longifolia*.
1127. *Grandiflora*.
1128. *Latifolia*.
1129. *Palustris*.
1130. *Abortiva*.
1131. *Nidus avis*.
1132. *Ovata*.
1133. *Cordata*.
1134. *Corallorrhiza*.

4 360. OPHRYS.

4 361. NEOTIA.

HEXANDRIA.

- 2 362. ARISTOLOCHIA. DIOSC. 1135. *Rotunda*. 2
1136. *Eonga*. 2
1137. *Clematitis*. 2

POLYANDRIA.

363. ARUM. DIOSC. 1138. *Maculatum*.
1139. *Dracunculus*.
364. ZOSTERA. LINN. 1140. *Marina*.

CLASSIS XXI.

MONOECIA. MONANDRIA.

365. ZANNICHELLIA. MICH. 1141. *Palustris*.

DIANDRIA.

366. LENTICULA. BRUNF. 1142. *Minor*.
1143. *Trisulcalia*.

TRIANDRIA.

367. TYPHA. DIOSC. 1144. *Latifolia*.
1145. *Angustifolia*.
368. SPARGANIUM. DIOSC. 1146. *Erellum*.

369. CA-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

369. CAREX.

TRAG.

- * 1147. *Pulicaris.*
- * 1148. *Alba.*
- 1149. *Digitata.*
- 1150. *Distans.*
- 1151. *Montana.*
- 1152. *Capillaris.*
- 1153. *Pallescens.*
- * 1154. *Saxatilis.*
- 1155. *Atrata.*
- 1156. *Limosæ.*
- 1157. *Glaucæ.*
- 1158. *Acuta.*
- * 1159. *Ferruginea.*
- * 1160. *Patula.*
- 1161. *Flava.*
- * 1162. *Pilosa.*
- 1163. *Iuncea.*
- 1164. *Vesicaria.*
- 1165. *Remota.*
- * 1166. *Maxima.*
- 1167. *Arenaria.*
- 1168. *Muricata.*
- 1169. *Vulpina.*
- * 1170. *Pulchella.*

370. BETULA.

TRAG.

1171. *Alba.*

1172. *Alnus.*

371. BUXUS.

BRUNF.

1173. *Sempervirens.*

372. URTICA.

PLIN.

1174. *Urens.*

1175. *Dioica.*

373. MORUS.

BRUNF.

1176. *Alba.*

374. XANTHIUM.

LINN.

1177. *Strumarium.*

375. BLITUM.

DIOSC.

1178. *Maius.*

POLYANDRIA.

376. CERATOPHYLLUM. LINN. 1179. *Demersum.*

377. MYRIOPHYLLUM. VAILL. 1180. *Spicatum.*

378. SAGITTA. PLIN. 1181. *Maior.*

379. QUER-

GENERALIA, SPECIES.

I 379. QUERCUS.	LINN.	1182. <i>Ilex.</i> 1183. <i>Coccifera.</i> 1184. <i>Robur.</i> 1185. <i>Aegilops.</i>
I 380. JUGLANS.	FUCHS.	1186. <i>Regia.</i>
I 381. CASTANEA.	GRAEC.	1187. <i>Sativa.</i>
I 382. CARPINUS.	RUEL.	1188. <i>Fagus.</i> 1189. <i>Betulus.</i>
I 383. OSTRYIA.	MICH.	* 1190. <i>Duinensis.</i>
2 384. CORYLUS.	GALEN.	1191. <i>Carpinifolia.</i> 1192. <i>Avellana.</i>

MONADELPHIA.

I 385. PINUS.	LINN.	1193. <i>Picea.</i> 1194. <i>Abies.</i> * 1195. <i>Mughus.</i> 1196. <i>Sylvestris.</i> 1197. <i>Pinea.</i> 1198. <i>Larix.</i>
I 386. CUPRESSUS.	PLIN.	1199. <i>Sempervirens.</i>

SYNGENESIA.

387. BRYONIA.	THEOPH.	1200. <i>Alba.</i>
---------------	---------	--------------------

CLASSIS XXII. D I O E C I A. MONANDRIA.

388. CALLITRICHE.	PLIN.	1201. <i>Fontana.</i> 1202. <i>Stagnalis.</i>
-------------------	-------	--

DIANDRIA.

389. SALIX.	PLIN.	1203. <i>Pratensis.</i> 1204. <i>Hybrida.</i> 1205. <i>Caprea.</i> 1206. <i>Glabra.</i> * 1207. <i>Serpillifolia.</i> 1208. <i>Alpina.</i>
-------------	-------	---

Scopoli Flora Carn.

d

389. SA-

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

1-2 389. SALIX.

1209. *Purpurea.*
1210. *Eleagnos.*
1211. *Viminalis.*
1212. *Alba.*
1213. *Repens.*
1214. *Triandra.*

TRIANDRIA.

2 390. OSYRIS.

PLIN. 1215. *Alba.*
1216. *Rhamnoides.*

TETRANDRIA.

2 391. VISCUM.

PLIN. 1217. *Album.*

PENTANDRIA.

1 392. PISTAICA.

LINN. 1218. *Terebinthus.*

393. CANNABIS.

ADANS. 1219. *Lupulus.*

HEXANDRIA.

394. TAMUS.

GESN. 1220. *Communis.*

395. SMILAX.

DIOSC. 1221. *Aspera.*

OCTANDRIA.

1 396. POPULUS.

PLIN. 1222. *Alba.*

1223. *Nigra.*

1224. *Tremula.*

ENNEANDRIA.

397. MERCURIALIS.

PLIN. 1225. *Cynocrambe.*

1226. *Annua.*

MONADELPHIA.

1 398. JUNIPERUS.

PLIN. 1227. *Oxycedrus.*

1228. *Sabina.*

1229. *Communis.*

STN-

GENERALA, SPECIES.

SYNGENESIA.

399. RUSCUS.	PLIN.	1230. <i>Aculeatus.</i> 1231. <i>Hypoglossum.</i>
--------------	-------	--

CLASSIS XXIII.

POLYGYMIA.

MONOECIA.

400. CELTIS.	PLIN.	1232. <i>Australis.</i>
401. VERATRUM.	DODON.	1233. <i>Album.</i> 1234. <i>Nigrum.</i>
402. ANDROPOGON.	LINN.	1235. <i>Gryllus.</i> * 1236. <i>Arundinaceum.</i> 1237. <i>Ischoemum.</i>
403. HOLCUS.	LINN.	1238. <i>Lanatus.</i> 1239. <i>Avenaceus.</i> * 1240. <i>Liburnicus.</i>
404. HORDEUM.	LINN.	1241. <i>Murinum.</i>
405. PARIETARIA.	PLIN.	1242. <i>Officinalis.</i>
406. ATRIPLEX.	PLIN.	1243. <i>Portulacoides.</i> 1244. <i>Laciñata.</i>
407. ACER.	PLIN.	1245. <i>Patula.</i> 1246. <i>Monspeßulanum.</i> 1247. <i>Campestre.</i> 1248. <i>Platanoides.</i>

DIOECIA.

408. FRAXINUS.	PLIN.	1249. <i>Ornus.</i> 1250. <i>Florifera.</i>
----------------	-------	--

POLYOECIA.

409. FIGUS.	LINN.	1251. <i>Carica.</i>
-------------	-------	----------------------

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

CLASSIS XXIV.

C R Y P T O G A M I A.

I. FILICES.

410. EQUISETUM.	TOURN.	1252. <i>Sylvaticum.</i> 1253. <i>Arvense.</i> 1254. <i>Palustre.</i> 1255. <i>Fluviale.</i>
411. OPHIOGLOSSUM.	DIOSC.	1256. <i>Vulgatum.</i>
412. OSMUNDA.	HALL.	1257. <i>Lunaria.</i>
413. SRUTHIOPTERIS.	CORD.	1258. <i>Spicant.</i>
414. ACROSTICHUM.	LINN.	1259. <i>Septentrionale.</i>
415. PTERIS.	LINN.	1260. <i>Aquilina.</i>
416. ASPLENIUM.	LINN.	1261. <i>Scolopendrium.</i> 1262. <i>Ceterach.</i> 1263. <i>Trichomanes.</i>
417. POLYPODIUM.	LINN.	1264. <i>Adiant. nigrum.</i> 1265. <i>Ruta muraria.</i> 1266. <i>Vulgare.</i> 1267. <i>Lonchitis.</i> 1268. <i>F. foemina.</i>
418. ADIANTHUM.	LINN.	1269. <i>Aculeatum.</i> 1270. <i>F. Mas.</i> 1271. <i>Cristatum.</i> 1272. <i>Rhaeticum.</i> 1273. <i>Fragile.</i> 1274. <i>Regium.</i> * 1275. <i>Asplenoides.</i> 1276. <i>Dryopteris.</i> 1277. <i>Capill. V.</i>

II. MUSCI.

A. ACALYPTRATI.

419. LYCOPODIUM.	LINN.	1278. <i>Clavatum.</i> 1279. <i>Selaginoides.</i> 1280. <i>Selago.</i>
------------------	-------	--

419. LY-

GENERALIA, SPECIES.

419. LYCOPODIUM,		1281. <i>Complanatum.</i>
		1282. <i>Annotinum.</i>
		1283. <i>Helveticum.</i>
420. SPHAGNUM,	LINN.	1284. <i>Palustre.</i>
		1285. <i>Nemoreum.</i>
<i>B. CALYPTRATI.</i>		
421. FONTINALIS.	LINN.	1286. <i>Antipyretica.</i>
422. SPHLACHNUM.	LINN.	1287. <i>Capillacea.</i>
423. POLYTRICHUM.	DILLEN.	1288. <i>Ampullaceum.</i>
		1289. <i>Commune.</i>
		1290. <i>Aloesolum.</i>
		1291. <i>Dubium.</i>
		1292. <i>Apocarpum.</i>
424. MNIUM.	DILLEN.	1293. <i>Pellucidum.</i>
		1294. <i>Fontanum.</i>
		1295. <i>Palustre.</i>
		1296. <i>Serpillifolium.</i>
425. BRYUM.	LINN.	1297. <i>Viridulum.</i>
		1298. <i>Truncatulum.</i>
		1299. <i>Murale.</i>
		1300. <i>Pyriforme.</i>
		1301. <i>Undulatum.</i>
		1302. <i>Heteromallum.</i>
		1303. <i>Hygometricum.</i>
		1304. <i>Subulatum.</i>
		1305. <i>Flavescens.</i>
		1306. <i>Apocarpum.</i>
		1307. <i>Pomiforme.</i>
		1308. <i>Rurale.</i>
		1309. <i>Glaucum.</i>
		1310. <i>Argenteum.</i>
		1311. <i>Capillare.</i>
		1312. <i>Pulvinatum.</i>
426. HYPNUM.	LINN.	1313. <i>Bryoides.</i>
		1314. <i>Taxifolium.</i>
		1315. <i>Adianthoides.</i>
		1316. <i>Ornithopodioides.</i>

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

426. HYPNUM.

- 1317. *Crispum.*
- 1318. *Undulatum.*
- 1319. *Lucens.*
- 1320. *Crista castr.*
- 1321. *Filicinum.*
- 1322. *Cupressiforme.*
- 1323. *Squarrosum.*
- 1324. *Scoparium.*
- 1325. *Aciculare.*
- 1326. *Purum.*
- * 1327. *Cassubicum.*
- 1328. *Rutabulum.*
- 1329. *Triquetrum.*
- 1330. *Serpens.*
- 1331. *Abietinum.*
- 1332. *Proliferum.*
- 1333. *Rotundifolium.*
- 1334. *Sciurooides.*
- 1335. *Sericeum.*
- 1336. *Dendroides.*
- 1337. *Carinatum.*

PLANTAE DUBIAE.

III. ALGAE.

427. JUNGERMANNIA. MICHEL.
- 1338. *Asplenioides.*
 - 1339. *Nemorea.*
 - 1340. *Complanata.*
 - 1341. *Dilatata.*
 - 1342. *Albicans.*
 - 1343. *Purpurea.*
 - 1344. *Trichomannes.*
 - 1345. *Fissa.*
 - 1346. *Bidentata.*
 - 1347. *Tridentata.*
 - * 1348. *Convexa.*
 - * 1349. *Minima.*
 - * 1350. *Serpillifolia.*

GENERAL SPECIES.

427. JUNGERMANNIA.

1351. *Epyphylla*.

1352. *Pinguis*.

1353. *Furcata*.

1354. *Stellata*.

1355. *Umbellata*.

* 1356. *Triandra*.

* 1357. *Quadrata*.

1358. *Conica*.

428. MARCHANTIA. LINN.

* MICH.

429. LICHEN.

1359. *Floridus*.

1360. *Divaricatus*.

1361. *Articulatus*.

1362. *Iubatus*.

1363. *Ericetorum*.

* 1364. *Fungiformis*.

* 1365. *Mucoriformis*.

* 1366. *Viridulus*.

1367. *Scriptus*.

* 1368. *Aeruginosus*.

1369. *Rugosus*.

* 1370. *Limitatus*.

1371. *Fagineus*.

* 1372. *Rupestris*.

* 1373. *Byssinus*.

* 1374. *Punctatus*.

* 1375. *Muscorum*.

* 1376. *Scaber*.

1377. *Subfuscus*.

1378. *Candellarius*.

* 1379. *Marmoreus*.

* 1380. *Alveolatus*.

1381. *Squamofus*.

1382. *Rostratus*.

1383. *Fraxineus*.

1384. *Prunastri*.

1385. *Islandicus*.

1386. *Nivalvis*.

* 1387. *Pinastris*.

1388. *Ciliaris*.

1389. *Caninus*.

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

429. LICHEN.

- 1390. *Aphtosus.*
- 1391. *Scrobiculatus.*
- 1392. *Pulmonarius.*
- * 1393. *Amplissimus.*
- 1394. *Caperatus.*
- 1395. *Glaucus.*
- 1396. *Saxatilis.*
- 1397. *Cylindricus.*
- * 1398. *Pulverulentus.*
- 1399. *Olivaceus.*
- 1400. *Parietinus.*
- 1401. *Stellaris.*
- * 1402. *Fragilis.*
- * 1403. *Spongiosus.*
- 1404. *Saccatus.*
- 1405. *Physodes.*
- 1406. *Teneitus.*
- 1407. *Miniatus.*
- * 1408. *Sedifolius.*
- * 1409. *Multifidus.*
- * 1410. *Cristatus.*
- 1411. *Granosus.*
- 1412. *Crispus.*

430. VALSA.

- ADANS.
- * 1413. *Digitata.*
 - * 1414. *Clavata.*
 - * 1415. *Tuberosa.*
 - * 1416. *Corticalis.*
 - * 1417. *Fragiformis.*
 - 1418. *Miniata.*

431. CHARA.

- VAILL.
- 1419. *Vulgaris.*
 - 1420. *Noftoc.*
 - 1421. *Iuniperina.*
 - * 1422. *Pififormis.*
 - * 1423. *Alveolata.*
 - * 1424. *Coralloides.*
 - * 1425. *Coccinea.*

432. TREMELLA.

- LINN.
- 1426. *Vesiculosus.*
 - 1427. *Ceranoides.*
 - 1428. *Muscoides.*

433. FUCUS.

GENERALIA, SPECIES.

433. FUCUS.		1429. <i>Cartilagineus.</i> 1430. <i>Rubens.</i> 1431. —
434. ULVA.	LINN.	1432. <i>Latiflora.</i> 1433. <i>Lactuca.</i> 1434. <i>Compressa.</i> 1435. <i>Rivularis.</i> 1436. <i>Filiformis.</i> 1437. <i>Bullosa.</i> 1438. <i>Corallinoides.</i> * 1439. <i>Ramosissima.</i> 1440. <i>Nodosa.</i> 1441. <i>Aeruginosa.</i> * 1442. <i>Usnea.</i>
435. CONFerva.	PLIN.	1443. <i>Incana.</i> 1444. <i>Lactea.</i> 1445. <i>Saxatilis.</i> 1446. <i>Candellaris.</i> 1447. <i>Flos Aquae.</i> 1448. <i>Velutina.</i> 1449. <i>Aurea.</i> * 1450. <i>Cellaris.</i> * 1451. <i>Subterranea.</i> * 1452. <i>Coccinea.</i> 1453. <i>Miniatia.</i> 1454. <i>Officinalis.</i> * 1455. <i>Vermicularis.</i> * 1456. <i>Coralloides.</i> 1457. —
436. BYSSUS.	DILLEN.	1458. —
437. SPONGIA.	TOURN.	

IV. FUNGI.

438. AGARICUS.	LINN.	1459. <i>Muscarius.</i> 1460. <i>Rubens.</i> 1461. <i>Pustulatus.</i> 1462. <i>Albellus.</i> 1463. <i>Scandicinus.</i> 1464. <i>Stramineus.</i>
----------------	-------	--

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

438. AGARICUS.

LINN.

1465. *Procerus.*
1466. *Caesareus.*
1467. *Pratensis.*
1468. *Putridus.*
1469. *Dryadeus.*
1470. *Violaceus.*
1471. *Limacinus.*
1472. *Macrourus.*
1473. *Ferrugineus.*
1474. *Leucophaeus.*
1475. *Inclusus.*
1476. *Elytroides.*
1477. *Purpurascens.*
1478. *Campestris.*
1479. *Ovatus.*
1480. *Truncorum.*
1481. *Quisquiliarum.*
1482. *Lignorum.*
1483. *Stercorarius.*
1484. *Fimetarius.*
1485. *Cocolla.*
1486. *Mugnaius.*
1487. *Valens.*
1488. *Niveus.*
1489. *Iozzolus.*
1490. *Umbilicatus.*
1491. *Aromaticus.*
1492. *Collinus.*
1493. *Trichopus.*
1494. *Gallinacius.*
1495. *Pyramidalis.*
1496. *Roridus.*
1497. *Grumatus.*
1498. *Leccinus.*
1499. *Variegatus.*
1500. *Amianthinus.*
1501. *Pulverulentus.*
1502. *Russula.*
1503. *Coccineus.*

GENERAL, SPECIES.

438. AGARICUS.

LINN.

- 1504. *Ianthinus*.
- 1505. *Roseus*.
- 1506. *Amethystinus*,
- 1507. *Virens*.
- 1508. *Prunulus*.
- 1509. *Caprinus*.
- 1510. *Elegans*.
- 1511. *Iacobinus*.
- 1512. *Tristis*.
- 1513. *Laceratus*.
- 1514. *Italicus*.
- 1515. *Mutabilis*.
- 1516. *Villosus*.
- 1517. *Tirignus*.
- 1518. *Soderellus*.
- 1519. *Inanis*.
- 1520. *Filamentosus*,
- 1521. *Viscidus*.
- 1522. *Albipes*.
- 1523. *Crassus*.
- 1524. *Miniatus*.
- 1525. *Conicus*.
- 1526. *Spadiceus*.
- 1527. *Flammeus*.
- 1528. *Santalinus*.
- 1529. *Vinaceus*.
- 1530. *Laccatus*.
- 1531. *Hispidus*.
- 1532. *Rubellus*.
- 1533. *Betulinus*.
- 1534. *Inversus*.
- 1535. *Squamosus*.
- 1536. *Coriaceus*.
- 1537. *Tabescens*.
- 1538. *Longipes*.
- 1539. *Quadricolor*.
- 1540. *Crustosus*.
- 1541. *Lubricus*.
- 1542. *Acuminatus*.

PLANT. CARNIOL. CLASSES,

438. AGARICUS.

LINN.

1543. *Extenuatus.*
1544. *Maculatus.*
1545. *Speciosus.*
1546. *Hemisphaericus.*
1547. *Carpatus.*
1548. *Cristatus.*
1549. *Concavus.*
1550. *Piperatus.*
1551. *Scorbiculatus.*
1552. *Deliciosus.*
1553. *Rufus.*
1554. *Rusticanus.*
1555. *Pudibundus.*
1556. *Tithymalinus.*
1557. *Hybridus.*
1558. *Testaceus.*
1559. *Ermineus.*
1560. *Oedematopus.*
1561. *Alliaceus.*
1562. *Sulphureus.*
1563. *Zinziberatus.*
1564. *Galericulatus.*
1565. *Epipterygius.*
1566. *Tener.*
1567. *Fasciatus.*
1568. *Rigidus.*
1569. *Rotula.*
1570. *Androsaceus.*
1571. *Umbelliferus.*
1572. *Pubescens.*
1573. *Compressus.*
1574. *Lacteus.*
1575. *Parietinus.*
1576. *Membranaceus.*
1577. *Brumalis.*
1578. *Quercinus.*
1579. *Flabelliformis.*
1580. *Alneus.*
1581. *Chantarellus.*

439. MERULIUS.

HALL.

439. ME-

GENERALIA, SPECIES.

439. MERULIUS.

1582. *Hispidulus*.
1583 *Infundibuliformis*.

1584. *Ramosus*.

1585. *Elveloides*.

1586. *Bovinus*.

1587. *Luteus*.

1588. *Coriaceus*.

1589. *Umbilicatus*.

1590. *Flabelliformis*.

1591. *Imbricatus*.

1592. *Versicolor*.

1593. *Hirsutus*.

1594. *Igniarius*.

1595. *Fulvus*.

1596. *Candidinus*.

1597. *Fuliginosus*.

1598. *Romosissimus*.

1599. *Repandum*.

1600. *Suaveolens*.

1601. *Gelatinosum*.

1602. *Coralloides*.

1603. *Crispum*.

1604. *Esculentus*.

1605. *Impudicus*.

1606. *Crispus*.

1607. *Monacella*.

1608. *Cornucopioides*.

1609. *Lubrica*.

1610. *Laciniata*.

1611. *Coralloides*.

1612. *Sambuccina*.

1613. *Flammea*.

1614. *Truncata*.

1615. *Coccinea*.

1616 *Infundibuliformis*.

1617. *Campanulata*.

1618. *Lycoperdoides*.

1619. *Lutea*.

1620. *Ciliata*.

440. BOLETUS.

LINN.

441. HYDNUM.

LINN.

442. PHALLUS.

LINN.

443. ELVELA.

GLEDITSCH.

PLANT. CARNIOL. CLASSES, etc.

443. ELVELA.		1621. <i>Lontiformis.</i>
444. CLAVARIA,	LINN.	1622. <i>Pijillaris.</i>
		1623. <i>Vermiculata.</i>
		1624. <i>Palmata.</i>
		1625. <i>Coralloides.</i>
		1626. <i>Arbuscula.</i>
		1627. <i>Digitata.</i>
445. CLATRUS.	MICH.	1628. <i>Cancellatus.</i>
446. PEZIZA.	GLEDITSCH.	1629. <i>Cyathiformis.</i>
447. LYCOPERDON.	LINN.	1630. <i>Crucibuliformis.</i>
		1631. <i>Polymorphum.</i>
		1632. <i>Pedunculatum.</i>
		1633. <i>Stellatum.</i>
		1634. <i>Caronatum.</i>
		1635. <i>Gulloforum.</i>
448. MUCOR.	LINN.	1636. <i>Sphaerocephalus.</i>
		1637. <i>Pyriformis.</i>
		1638. <i>Mucilago.</i>
		1639. <i>Serpula.</i>
		1640. <i>Clathroides.</i>
		1641. <i>Stemonitis.</i>
		1642. <i>Aspergillus.</i>
		1643. <i>Obliquus.</i>
		1644. <i>Mucedo.</i>
		1645. <i>Lycogala.</i>



PLAN-

PLANTAE LINNAEANAЕ.

Ad alia Genera in hoc Opere relatae.

S Y S T . N A T .	F L . C A R N I O L .
<i>Aegylops</i> Ovata.	<i>Phleum.</i>
— Incurva.	<i>Agrostis.</i>
<i>Aegopodium</i>	<i>Seseli.</i>
<i>Agaricus</i> Chantar.	<i>Merulius.</i>
<i>Agrostema</i> . <i>Githago.</i>	<i>Lychnis.</i>
<i>Agrostis</i> Arund.	<i>Arundo.</i>
<i>Andromeda</i> Polyfolia.	<i>Rhododendron.</i>
<i>Anthericum</i> Caulicul.	<i>Scheuchzeria.</i>
<i>Aphanes</i> Arvensis	<i>Alchemille.</i>
<i>Apium</i> Graveolens.	<i>Seseli.</i>
<i>Arctium</i> Carduelis.	<i>Cirsium.</i>
<i>Arenaria</i> Laricifolia.	<i>Stellaria.</i>
— Saxatilis.	—
— Rubra.	—
<i>Arnica</i> Scorpioides.	<i>Aster.</i>
<i>Aperula</i> Cynanchica.	<i>Gallium.</i>
— Taurina.	—
— Tinctoria.	—
— Odorata.	—
<i>Athamanta</i> Cretensis.	<i>Libanotis.</i>
— Cervaria.	<i>Selinum.</i>
— Meum.	<i>Seseli.</i>
— Libanotis.	<i>Libanotis.</i>
— Oreoselinum.	<i>Selinum.</i>
<i>Avena</i> Elatior.	<i>Holcus.</i>
<i>Betonica</i> Alopecuros.	<i>Sideritis.</i>
<i>Brassica</i> Campestris.	<i>Erysimum.</i>
— Erucastrum.	—
<i>Bryum</i> Scoparium.	<i>Hypnum.</i>
<i>Cacalia</i> Alpina.	<i>Tussilago.</i>
<i>Carum</i> Carvi.	<i>Seseli.</i>
<i>Carduus</i> Acaulos.	<i>Cirsium.</i>
— Defloratus.	—
— Eriophorus.	—
— Lanceolat.	—
— Mollis.	—
— Marianus.	—

Carduus

PLANTAE LINNAEANAE.

S Y S T . N A T .	F L . C A R N I O L .
<i>Carduus</i> Palustris.	<i>Cirsium.</i>
— Serratuloides.	—
<i>Caucalis</i> Grandiflora.	<i>Daucus.</i>
— Leptophylla.	—
— Platicarpos.	—
<i>Centaurea</i> Iacea.	<i>Rhaponticum.</i>
— Calcitrapa.	—
<i>Cerastium</i> Aquaticum.	<i>Stellaria.</i>
— Repens.	
<i>Chaerophyllum</i> Hirsutum.	<i>Scandix.</i>
<i>Cheiranthus</i> Erysimoides.	<i>Erysimum.</i>
<i>Chelidonium</i> Glaucum.	<i>Glaucium.</i>
<i>Chlora</i> Perfoliata.	<i>Gentiana.</i>
<i>Chrysanthemum</i> Leucanth.	<i>Matricaria.</i>
— Corymbosum.	<i>Pyrethrum.</i>
<i>Cnicus</i> Oleraceus.	<i>Cirsium.</i>
— Spinofissimus.	—
<i>Comarum</i> Palustre.	<i>Potentilla.</i>
<i>Crataegus</i> Aria.	<i>Mespilus.</i>
— Azarolus.	<i>Pyrus.</i>
— Oxyacantha.	<i>Mespilus.</i>
<i>Cucubalus</i> Behen.	<i>Lychnis.</i>
— Baccifer.	—
— Otites.	—
— Pumilio.	—
— Viscosus.	—
<i>Cynoglossus</i> Coeruleus.	<i>Sesleria.</i>
— Cristatus.	<i>Phleum.</i>
— Durus.	<i>Poa.</i>
— Indicus.	—
— Paniceus.	<i>Panicum.</i>
<i>Dactylis</i> Glomerata.	<i>Bromus.</i>
<i>Doronicum</i> Bellidiastrum.	<i>Aster.</i>
<i>Erysimum</i> Barbarea.	<i>Sisymbrium.</i>
— Alliaria.	—
— Officinale.	—
<i>Festuca</i> Decumbens.	<i>Poa.</i>
— Fluitans.	—
— Ovina.	<i>Bromus.</i>
<i>Filago</i> Arvensis.	<i>Gnaphalium.</i>
— Germanica.	—

Galeo-

PLANTAE LINNAEANAE.

SYST. NAT.		F.L. CARNIOL.
<i>Galeopsis</i> , Galeobdolon.	- -	<i>Leonurus</i> .
<i>Gypsofila</i> Saxifraga.	- -	<i>Tunica</i> .
<i>Hieracium</i> Incanum.	- -	<i>Apargia</i> .
<i>Hippophae</i> Rhamnoides.	- -	<i>Osyris</i> .
<i>Holcus</i> Halepensis.	- -	<i>Andropogon</i> .
<i>Hyoseris</i> Foetida.	- -	<i>Lapsana</i> .
<i>Inula</i> Chritmifolia.	- -	<i>Senecio</i> .
— Dysenterica.	- -	<i>Aster</i> .
— Ensifolia.	- -	—
— Hirta.	- -	—
— Pulicaris.	- -	—
— Salicina.	- -	—
— Helenium.	- -	—
<i>Laserpitium</i> Trilobum.	- -	<i>Siler</i> :
<i>Leontodon</i> Aureum.	- -	<i>Hieracium</i> .
— Taraxacum.	- -	<i>Hedypnus</i> .
<i>Lepidium</i> Alpinum.	- -	<i>Draba</i> .
— Ruderale.	- -	<i>Nasturtium</i> .
<i>Lotus</i> Dorycnium.	- -	<i>Dorycnium</i> .
<i>Melissa</i> Calamintha.	- -	<i>Thymus</i> .
— Grandiflora.	- -	—
<i>Mnium</i> Polytrichoides.	- -	<i>Polytrichum</i> .
<i>Myagrum</i> Alpinum.	- -	<i>Alyssum</i> .
— Sativum.	- -	
<i>Myosotis</i> Lappula.	- -	<i>Cynoglossum</i> .
<i>Onosma</i> Echioides.	- -	<i>Cerinthe</i> .
<i>Ophrys</i> Spiralis.	- -	<i>Serapias</i> .
— Corallorrhiza.	- -	<i>Neotia</i> .
<i>Orchis</i> Abortiva.	- -	<i>Serapias</i> .
<i>Osmunda</i> Spicant.	- -	<i>Struthiopteris</i> .
<i>Peziza</i> Cornucopioides.	- -	<i>Elvela</i> .
<i>Pimpinella</i> Glauca.	- -	<i>Pastinaca</i> .
<i>Poterium</i> Sanguisorba.	- -	<i>Sanguisorba</i> .
<i>Sanicula</i> Officinal.	- -	<i>Astrantia</i> .
<i>Saponaria</i> Officin.	- -	<i>Lychnis</i> .
— Oriental.	- -	—
— Vaccaria.	- -	—
<i>Satyrium</i> Albidum.	- -	<i>Orchis</i> .
— Nigrum.	- -	—
— Virens.	- -	—
<i>Scopoli Flora Carn.</i>	e	<i>Scilla</i>

PLANTAE LINNAEANAE.

S.Y.S.T. N.A.T.	F.L. CARNIOL.
<i>Scilla</i> Bisolia.	<i>Anthericum.</i>
— Autumnalis.	—
<i>Serapiss</i> Lingua.	<i>Orchis.</i>
<i>Scandix</i> Anthriscus.	<i>Caucalis.</i>
— Odorata.	<i>Myrrhis.</i>
<i>Schoenus</i> Aculeatus.	<i>Agrostis.</i>
<i>Serratula</i> Arvensis.	<i>Cirsium.</i>
— Tinctoria.	<i>Carduus.</i>
<i>Silene</i> Acaulis.	<i>Lychnis.</i>
— Cerastoides.	—
— Conica.	—
— Inaperta.	—
— Quadrifolia.	—
— 5-vulnera.	—
— Nutans.	—
— Saxifraga.	—
<i>Sison</i> Amomum.	<i>Seseli.</i>
<i>Sisymbrium</i> Arenosum.	<i>Arabis.</i>
<i>Sium</i> Falcaria.	<i>Seseli.</i>
— Nodiflorum.	—
<i>Sonchus</i> Arvensis.	<i>Hieracium.</i>
— Oleraceus.	—
— Alpinus.	—
<i>Sorbus</i> Aucuparia.	<i>Mespilus.</i>
<i>Spartium</i> Iuncinum.	<i>Genista.</i>
— Radiatum.	—
<i>Spergula</i> Arvensis.	<i>Stellaria.</i>
— Pentandra.	—
— Nodosa.	—
<i>Teucrium</i> Chamaepitys.	<i>Bugula.</i>
<i>Thlaspi</i> Campestre.	<i>Lepidium.</i>
<i>Tordylium</i> Anthriscus.	<i>Caucalis.</i>
— Nodosum.	—
<i>Tomentilla</i> Erecta.	<i>Potentilla.</i>
<i>Tremella</i> Auricula.	<i>Evela.</i>
— Purpurea.	<i>Valsa.</i>
<i>Triticum</i> Repens.	<i>Bromus.</i>
<i>Turritis</i> Hirsuta.	<i>Arabis.</i>
<i>Vallantia</i> Cruciatia.	<i>Galium.</i>

CALEN-

CALENDARIUM FLORAE CARNIOLICAE.

ANNI MDCCCLXII.

FLORESCENTIA.

M. Februar. 9. *Primula Acaulis.* *Galanthus Nivalis.*

15. *Helleborus Roseus.*

24. *Corylus Avellana.*

Mart. 1. *Tussilago Farfara.*

4. — *Petasites.*

8. *Iuncus Campestris.*

15. *Veronica Agrestis.* *Pulmonaria Officinalis.* *Viola Odorata.* *Anemone Sylvvestris.*

18. *Astrantia Epipactis.*

19. *Salix Purpurea.* *Cardamine Hirsuta.*

20. *Cornus Mascula.* *Fumaria Bulbosa.*

21. *Cynoglossum Omphalodes.*

22. *Authericum Bifolium.*

26. *Polygala Chamaebuxus.*

28. *Vinca Minor.*

April. 1. *Mercurialis Cynocrambe.* *Chrysoplenium Alternifolium.*

2. *Orobus Vernus.* *Isopyrum Thalictroides.* *Potentilla Verna.*

3. *Carex Alba.* *Tithymalus Sylvatica.* *Viola Canina.*

4. *Carex Digitata.*

7. *Globularia Vulgaris.*

8. *Lamium Purpureum.*

10. *Gentiana Verna.*

12. *Potentilla Vesca.* *Sesleria Caerulea.* *Hiosciamus Scopolia.* *Oxys Acetosella.*
Populago Palustris.

13. *Pinguicula Alpina.*

CALENDAR. FLOR. CARNIOL.

FLORESCENTIA.

- M. April. 14. *Chelidonium Maius.* *Bugula Reptans.*
 Cardamine Pratensis.
15. *Anthoxanthum Odoratum.* *Prunus Cer-*
 rasus. *Lamium Pannonicum.*
16. *Carex Pilosa.*
17. *Linagrostis Vaginata.* *Vaccinium Myr-*
 tillus. *Grossularia Rubra.*
21. *Veronica Chamaedris.* *Hedypnois Ta-*
 raxacum. *Prunus Spinosa.*
24. *Primula Integrifolia.* *Galium Crucia-*
 ta. *Cerinthe Glabra.*
25. *Biscutella Didyma.*
27. *Tithymalus Cyparissias.*
28. *Paris Quadrifolia.* *Tithymalus Dulcis.*
 Dentaria Enneaphyllos. *Viola Bi-*
 flora.
29. *Acer Campestre.* *Aster Bellidastrum.*
 Lampsana Foetida. *Anemone Ra-*
 nunculus. *Dentaria Bulbifera.*
- Maius.* 1. *Iuniperus Communis.* *Asparagus Offi-*
 cin. *Lychnis Dioica.*
2. *Orchis Latifolia.* *Ostrya Carpinifolia.*
 Rumex Acetosa. *Cytisus Hirsutus.*
 Aquilegia Vulgaris.
4. *Viburnum Lantana.* *Plantago Lanceo-*
 lata. *Veronica Serpillifolia.* *Lotus*
 Corniculatus.
6. *Pimpinella Carvi.*
7. *Minulus Crista galli.* *Orchis Mascula.*
 Trifolium Montanum. *Erysimum*
 Officinale.
8. *Melica Nutans.*
10. *Galium Odoratum.* *Lunaria Rediviva.*
 Dittamnus Albus.
11. *Callitrichie utraque.*
12. *Lonicera Xylosteum.* *Astaea Spicata.* *Va-*
 leriana Dioica. *Salvia Pratensis.*
 Leonurus Galeobdolon.

M. Ma-

ANNI MDCCCLXII.

FLORESCENTIA.

- M. Maius. 14. *Berberis Vulgaris. Thalictrum Aquilegafolium. Veratrum Album.*
15. *Lithospermum Officinale.*
16. *Allium Ursinum.*
17. *Tusilago Sylvestris.*
18. *Scabiosa Columbaria. Pedicularis Palustris.*
20. *Iris Pseudacorus.*
24. *Rapunculus Spicatus.*
25. *Veronica Latifolia. Vulneraria Anthyllis. Genista Sagittalis.*
26. *Solanum Dulcamara. Doronicum Par-delianches.*
28. *Gentiana Utriculosa. Nymphaea Alba. Astrantia Nigra. Caryophyllata Urbana.*
29. *Orchis Bifolia.*
30. *Mellitis Melissophyllum.*

- Iunius. 1. *Tipha Latifolia. Scrophularia Nodosa.*
2. *Cytisus Laburnum. Spiraea Aruncus. Salvia verticillata.*
3. *Lapsana Communis.*
4. *Arnica Montana.*
5. *Sideritis Alopecuros.*
7. *Rhamnus Catharticus.*
8. *Aira Cristata. Briza Media. Lilium Chalcedonicum. Iris Graminea.*
10. *Cirsium Serratuloides.*
13. *Orchis Pyramidalis.*
15. *Rapunculus Orbicul. Cichorium Intybus. Prenanthes Muralis. Achyrophorus Maculatus.*
16. *Betonica Officinalis.*
20. *Andropogon Gryllus.*
21. *Rhododendron Ferrugin.*
26. *Lilium Bulbiferum.*
28. *Lysimachia Vulgaris.*
30. *Stachis Palustris.*

CALENDAR. FLOR. CARN. etc.

FLORESCENTIA.

- M. Iulius. 1. *Anthericum* Ramosum. *Hypericum Hir-*
 futum. *Malva Alcea.*
 2. *Digitalis lutea.* *Thalictrum Angusti-*
 folium.
 6. *Gentiana Lutea.*
15. *Teucrium Scordium.*
26. *Cassida Galericulata.*

Augustus. 26. *Scabiosa Succisa.*

September. 1. } *Colchicum Autumn.*
 3. }
15. *Gentiana Autumn.*

Plantae biferae, in Carniolia in primis sequentes.

- Cornus Sanguin.*
Primula Acaulis.
Veronica Hederifolia.
Lamium Purpureum.
Pyrus Comm.
 Malus.

Inter Adventum primae *Hirundinis*, et florescentiam
Colchici. Dies (153).

Tilia in Regno Sueciae non floret ante *Caniculam.*
LINN. Apud nos autem, circa *Corniol* secun-
da Iunii; Ergo Aestas hic locorum tribus fere
Mensibus longior quam *Upsaliae.* In Sylvis au-
tem Carnioliae frigidioris; et circa *Labacum* die
decima Iunii; hinc differentia climatis *Terge-*
stum inter et *Labacum.*

Vigiliae Florum in Carniolia longiores sunt, quam
in Suecia.

PLANTAE

Delineatae in Statura Naturali.

<i>Galium</i> vernum.	-	Tab. 2.
<i>Cynoglossum</i> Omphalodes.	-	Tab. 3.
<i>Rhamnus</i> Rupestris.	-	Tab. 4.
<i>Astrantia</i> Epipactis.	-	Tab. 6.
<i>Saxifraga</i> Cuneifolia.	-	Tab. 13.
	Stellaris.	—
	Autumnalis.	Tab. 14.
	Cespitosa.	—
	Caesia.	Tab. 15.
	Trichodes.	—
	Bryoidea.	—
	Pyrenaica.	Tab. 16.
	Hypnoides.	—
<i>Stellaria</i> Ciliata.	-	Tab. 17.
	Aculeata.	—
	Rubra.	—
	Rupestris.	Tab. 18.
	Laricifolia.	—
<i>Centunculus</i> Angustifolius.	-	Tab. 19.
	Rigidus.	—
<i>Cistus</i> Alpestris.	-	Tab. 23.
	Tomentosus.	Tab. 24.
	Grandiflorus.	Tab. 25.
<i>Anemone</i> Alpina.	-	Tab. 26.
<i>Lamium</i> Pannonicum.	-	Tab. 27.
<i>Satureia</i> Thymifolia.	-	Tab. 29.
	Montana.	Tab. 30.
<i>Pedicularis</i> Acaulis.	-	Tab. 31.
<i>Draba</i> Ciliata.	-	Tab. 33.
	Carnica.	—
	Mollis.	Tab. 34.
<i>Myagrum</i> Rostratum.	-	Tab. 35.
<i>Iberis</i> Rotundifolia.	-	Tab. 37.

Carda-

PLANTAE DEL. IN STAT. NATUR.

<i>Cardamine Hirsuta.</i>	-	Tab. 38.
<i>Arabis Arenosa.</i>	- -	Tab. 40.
<i>Orobus Montanus.</i>	- -	Tab. 41.
<i>Cytisus Purpureus.</i>	- -	Tab. 43.
<i>Astragalus Monspessulanus.</i>	Tab. 45.	
	Montanns.	—
<i>Hieracium Montanum.</i>	-	Tab. 50.
<i>Centaurea Kartiana.</i>	- -	Tab. 55.
<i>Gnaphalium Fuscum.</i>	-	Tab. 57.
<i>Carex Capilaris.</i>	- -	Tab. 59.
	Patula.	—
<i>Salix Serpillifolia.</i>	- -	Tab. 61.
	Alpina.	—
<i>Polypodium Asplenoides.</i>	Tab. 62.	
<i>Bryum Flavescentia.</i>		—
<i>Hypnum Rotundifolium.</i>		—
<i>Iungermannia Asplenoides.</i>		—
<i>Marchantia Quadrata.</i>	-	Tab. 63.
	Triandra.	—
<i>Spongia Vermicularis.</i>	-	Tab. 64.
	Coralloides.	—
<i>Mucor Serpula.</i>	-	Tab. 65.



FLORA
CARNIOLICA

EXHIBENS

PLANTAS
CARNIOLIAE INDIGENAS
ET DISTRIBUTAS

IN

CLASSES, GENERA, SPECIES,
VARIETATES,
ORDINE LINNAEANO.

TOMUS I.

ЛОСОВИ
АОРДИКЯ
СЕРГИУ
ЧІСЛА
СІМІСІ
ДІСІЧ
АДЫІ



PLANTARUM CARNIOLIAE

CLASSIS I. MONANDRIA MONOGYNIA.

I. SALICORNIA.

TOURNEFORT. *I. R. H. Cor. p. 51. Tab. 485.*

Rlos calyce et corolla carens, TOURN. calyce integro. LINN. ADANS. calyce et corolla carens, vel corolla 5 — 2 petala. GLEDITSCH. Stamen unicum TOUR. in iconi 1. 2. 5. GLEDITSCH. duo, MOEHRING, AYMEN. ADANS. sex SAUVAGES. Stigma bifidum. LINN. LUDWIG. bina ADANS. Embryo abeuns in capsulam, seu vesiculam monospermam. TOUR. Calyx cylindricus, fovens semen unicum, lenticulare, erectum. ADANS. Habitus aphyllus, succulentus ex squamis tetragonis, cauli circumpositis. LUDWIG. Poffet itaque cum DONDIA ADANS. in unum Genus naturale conjungi.

I. SALICORNIA *herbacea.*

Salicornia herbacea patula; articulis apice compres-
sis, emarginato bifidis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 51. *Spec. Plant.* p. 3.
n. 1. *Fl. Suec.* 2. n. 1. VANDELL.
Therm. Patav. p. 118. MILLER *Di-
ction.* n. 1. JACQUIN. *Austr.* p. 1.
GRONOV. *Virgin.* 1.

Cali geniculatum, f. Salicornia. I. BAUHIN.
Hist. 3. p. 705. n. 1. 2. 3.

Kalli. I. ALPIN. *Aegypt.* Cap. 42. Tab. 58.

DIAGN. *Planta succulenta, constans articulis
apice crassioribus obtusis et leniter emarginatis.*

Habitat in *Austriaco littorali*, circa mare.

Combusta dat cineres alcalino et copioso sale foetos,
quibus cum arena purissima fusis fiunt vitra praestan-
tissima PLUCH. *Speciac. de la Natur.* VI. Dialog. 2.
IUNCKER. *Chym.* Tab. IX. p. 432. quod in plan-
ta prius tale non erat, sed ab igne natum fuit.
BOERH. *Chym.* II. P. I. Proc. VII. & cum oleo in
saponem coquitur. ALPIN. l. c. I. BAUHIN.
l. c. Plantae adfinitas cum **SALSOLA** & **BETA**,
hinc in Ordine naturali inter oleraceas recensenda.
Herba recens foeno mixta pecoribus salubris.

2. LIMNOPEUCE.

CORDI *Hist.* 150. VAILLANT. *Act. Paris.* A. 1719.

p. 19. fig. 3. nec non HALL. et ADANSON.

HIPPURIS. LINN. LUDWIG. GLEBITSCH &c.

Flos sine Calyce & Corolla. LINN. GLE-
DITSCH. Calyce bidentato ADANS. Sta-
men unicum, receptaculo insidens LINN.
ex apice ovarii una cum stylo, HALL. Ger-
men tenui margine coronatum. LUDWIG.
Semen nudum LINN. Capsula monosper-
ma VAILLANT. ADANS. Stylus, qui ex
api-

apice germinis vere nascitur, removet plantam ab ELAEAGNIS et familiae ZINZIBERUM adsociat prope RAVENALAM: solus hic fere situs staminis separat eandem a CALLITRICHE.

2. HIPPURIS vulgaris.

Hippuris LINN. *Syst. Nat.* p. 52. *Spec. Plant.* p. 4. *Fl. Suec.* 2. 2. *Flor. Carniol.* p. 175. JACQUIN. *Austr.* p. 1. DALIBARD *Paris* p. 1. Equiseti facie planta SEGUIER *Veron.* I. p. 102. *Tab. 2.*
Limnopeuce HALL. *Hist.* n. 1572. SEGUIER *Suppl.* p. 64.

DIAGN. EQUISETI *sylvatici facies.* *Folia linearia, in uno verticillo ad (13).*

Habitat ad littora fluviorum *Labaci, Savae* etc. et circa fossas *paludum Labacensium*. Verum caractarem primus stabilivit egregius VAILLANTIUS, licet ab EQUISETIS iam pridem separaverit RUPPIUS, et demum DILLENIUS. LINNAEUS semen unicum, nudum subrotundum, pro fructu posuit, sed VAILLANTIUS recte monuit: *L'embryon devient un fruit ovale, contenant une semence de la même figure* — Anthera iuvenis vere sessilis, locula obscure rubra possidet, neque flores omnes semper hermaphroditi, sed in eodem verticillo interdum etiam foeminei.

DIGYNIA.

3. MOROCARPUS.

RUP. LUDWIG. *Defin. Gen.* 761.

Calyx trifidus HALL. trifolius LINN.
plus minus succulentus LUDWIG. Blitum

TOURN. non debet confundi cum CHENOPDIO-MORIS BOERH. nec placet mutatio nominum genericorum non necessaria. BLITUM Tourn. maneat BLITUM, nec MOROCARPI nomen efficax deleatur.

3. *MOROCARPUS capitatus.*

Blitum capitellis spicatis, terminalibus. LINN.

Syst. Nat. p. 52. *Spec. Plant.* p. 4. n. 1. H.

Upsal. p. 3. n. 1.

Blitum foliis triangularibus, dentatis. LINN. H.

Cliff. 28

DIAGN. *Folia hastata, dentata. Globuli florales sessiles, laterales et terminales.*

Habitat *Tergesti et Gorrixiae* in aridis.

Capitella non sunt mere terminalia. Styli calyci concolores. Semen rubrum, denique nigrum.





CLASSIS II.
D I A N D R I A.
MONOGYNIA.

4. LIGUSTRUM.

OMNIUM BOTANICORUM.

Calyx quadridentatus TOURN. Tab. 367.
D. Corolla quadrifida LINN. HALL.
etc. Stamina tubo adfixa HALL ADANS.
Bacca unilocularis, fovea feminina quatuor
LINN. DU HAMEL. HALL. Ego
facculos binos video, eosque monospermous;
nec non filamenta inter receptaculum et co-
rollam prodeuntia, et si eius tubo fere adglu-
tinata sint. Quam exiguum discriminem inter
LIGUSTRUM & PHYLLIREAM ADANS.

4. LIGUSTRUM *vulgare*.

Ligustrum LINN. Syst. Nat. p. 53. Spec. Plant.
p. 7. Fl. Suec. 2. 5. Fl. Carniol. p. 308. HALL.
Hist. n. 350. DU HAMEL. Arb. p. 360.

DIAGN. Frutex floribus racemosis, terminalibus,
albis; baccis ovatis, nigris, hyeme persistentibus.

Habitat ad sepes et olles aridos.

Corolla vere infundibuliformis non est, nec stigma tri-
fidum, quale pinxit TOURNEFORTIUS. Bac-
cam replet sicca, spongiosa, violacea pulpa, ex qua
laccia rosea parari potest. LIGUSTRI cum VERONI-
CA adfinitatem indicat proportio arithmeticæ et
harmonica partium floris et fructus.

MELOIS Vesicatorii copiam insignem vidi in hac plan-
ta Vindobonae in Horto Botanico.

5. OLEA.

THEOPHR. DIOSC. TOURN. I. R. H. p. 598.
Tab. 370.

Calyx quadridentatus LUDWIG. Quinquedentatus TOURN. Icon. C. C. Corolla quadrifida. A. A. Drupa unilocularis; nuce ovato-oblonga, rugosa TOURN. LINN. pulpa liquore pingui scatente RAI Folia perennia IDEM.

5. OLEA europaea.

Olea foliis lanceolatis. LINN. Syst. Nat. p. 56.
Spec. Plant. p. 8. n. 1. GRONO V. Orient.
n. 6.

Olea DU HAMEL. Arbor. II. p. 57.

DIAGN. Arbor semper virens, oleum vulgare supeditans.

Habitat in Agro Gorizieni, Tergestino. Amat regiones maritimas, colles et margaceam humosamque terram.

Arbori infensus Curculio in baccis habitans.

6. CIRCAEA.

TOURN. I. R. H. p. 301. Tab. 155.

Calycis folia bina TOURN. C. Petala duo.
A. Fructus lappaceus, bilocularis; loculis monospermis RAI inferus LINN. Semen oblongum TOURN. F. sphaericum ADANS. uno aliquando abortiente HALL. Valvae binae LINN.

6. CIRCAEA Lutetiana.

Circaeа foliis oppositis, ellipticis, subvillosis, integris. Fl. Carniol. p. 258. n. 1.

Circaeа caule erecto; racemis pluribus; foliis ova-
tis. LINN. Syst. Nat. p. 56. Spec Plant. p. 9.
n. 1.

n. 1. *Fl. Suec.* 2. 6. IACQUIN. *Austr.*
p. 6.

Circaeae foliis subcordatis, subserratis. HALL.
Hist. n. 813.

Circaeae Lutetiana. TOURN. *I. R. H.* p. 301. Tab. 155.
Solanifolia, Circaeae dicta, maior. C. BAUHIN.
Pin. p. 168.

DIAGN. *Folia elliptica, villosula.*

Habitat in ruderatis & circa hortos.

Caulis cubitalis et altior, villosus, stamina calyce longiora. Pedunculi fructiferi deflexi, fructus uncinatis villis hirtus, ovatus, obtusus, bilocularis; loculis monospermis.

7. CIRCAEA *alpina.*

Circaeae foliis alternis, cordatis, dentatis, glabris.
Fl. Carniol. p. 258. n. 2.

Circaeae caule prostrato; racemo unico; foliis cordatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 56. *Spec. Plant.* p. 9. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 7.

Circaeae foliis cordatis, acute dentatis. HALL.
Hist. n. 814.

Circaeae parva, minima, TITA *It. Alpin.*

Circaeae Alpina, minor. HERMANN. *Lugdb.* p. 150. SEGUIER. *Veron. I.* p. 326.

DIAGN. *Folia cordata, dentata, glabra.*

Habitat in *sylvis subalpinis*, umbram et humum amans. Inveni etiam in Alpibus nostris, in cavis arborum putridarum.

Quod sit species distincta, nullum est dubium; sed character specificus non consistit in caule adscendente, non in uno racemo, neque in calyce colorato, sed in figura, glabritie, & dentato ambitu foliorum. Plures quoque racemos in eadem planta vident GRIMMIUS, et notavit in *Fl. Isenac.* inserta *Act. Acad. Nat. Cur. Leopold.* Tom. 3. Append. p. 256.

7. VERONICA.

TOURN. I. R. H. p. 143. Tab. 6o.

Calyx prfounde quadrifidus. HALL.
 LUDWIG. quadrifolius ADANS. persi-
 stens TOUR. RAI. Corolla monopetala,
 qradrifida TOUR. segmentis inaequalibus
 HALL. Capsula bilocularis, TOURN. F
 bivalvis IDEM H. quadrivalvis ADANS.
 Semina modo bina, modo plura. HALL. Ex
 inflorescentia in plura Genera diviserunt
 RUPP. et HEISTERUS, contra natu-
 ram, Corolla a Calyce demum extruditur.
 Filamenta basi et apice attenuata sunt.

* *Obtusifoliae.*8. VERONICA *aphylla*.

Veronica corymbo terminali; scapo nudo. LINN.

Syst. Nat. p. 57. *Spec. Plant.* p. II. n. 9. IAC-
 QUIN. *Austr.* p. 2. sed pedunculi duo tresve
 ex apice caulis prodeentes, corymbi nomen non
 merentur.

Veronica foliis ovatis, radicalibus; caule nudo.
 ROYEN. *Lugdb.* 302. n. II. Si vero plantula
 diligentius consideratur, folia non omnia radica-
 lia videbuntur.

Veronica caule nudo; foliis ovatis serratis; racemo
 paucifloro. HALL. *Hist.* n. 541.

Veronica alpina, pumila: caule aphylo. BOCCONI.
Mus. Tab. II. fig. 17. Specimen fructi-
 ferum cum caule bifloro, quem et ego saepe vi-
 di Iconem BOCCONII reprobavit SE-
 GUIERIUS, et aliam dedit non multo melio-
 rem, quae crenas foliorum et caules basi repen-
 tes non demonstrat.

Veronica parva, saxatilis, caulinis nudis. RAI
Hist. I. p. 846. PLUKENET *Phyt.* Tab. 144.
 fig. 3. 9. foliis nimium dentatis, qualia etiam
 posuit

posuit RAIUS, SEGUIER Veron. I. p. 241.
Tab. 3. fig. 2. foliis integris, contra communio-
rem Botanicorum observationem.

Teucrium minimum. CLUS. Hist. p. 350. in summo
iugo M. Schneeberg. primus invenit et tam be-
ne descripsit, ut C. BAUHINUS dubitare nun-
quam debuisset, an sit idem cum CHAMAEDRI
sua alpina, minima, hirsuta, ut huius descri-
ptionem in *Prodromo* datam cum Clusiana con-
ferenti, clare innotescat.

DIAGN. *Cauliculus tenuis, villosulus, aphyllus,*
pauciflorus. Folia ovata, villosula. Semina
in singulo loculo (ad 10.) lutea, compressa, ro-
tundata.

Habitat in M. Grindovitz, et in *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis apud nos digito non longior. Folia ad basin
cauliculi (4—5) mollia, subcrenata. Corolla ineleg-
anti caeruleo colore tincta.

9. VERONICA saxatilis.

Veronica racemo terminali; foliis ovatis, crenatis,
glabris, pedunculo brevioribus. *Flor. Carniol.*
p. 302. n. 2.

Veronica corymbo terminali, foliis oppositis; caly-
cibus glabriusculis; pedunculis folia floralia su-
perantibus. LACQUIN. *Austr. Obs.* I. p. 200.
cum bona descriptione, quae hanc plantam ab-
unde separat a *VERONICA frutescente*, inferius
recensenda.

Veronica caulibus fruticosis, declinatis; foliis gla-
bris, ellipticis, dentatis; floribus in vertice con-
fertis, petiolatis. HALL. *Hist.* n. 545.

Veronica saxatilis. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 284.
omnino.

Veronica fruticans. CLUS. *Hist.* 3. p. 347. cuius
bonam iconem et coeruleum floris colorem, quo-
ties considero, toties mirari debedo, LINNAEUM
minime distinxisse inter *Veronicam saxati-*
lem

lem I. BAUHINI, et fruticantem tertiam CLUSII.

Veronica alpina fruticans; serpylli folio longiore.

PLUKENET *Phyt.* Tab. 232. icon non bona, ob caules erectos, folia oblonga et corollas aequaliter quadrifidas.

Veronica alpina frutescens. C. BAUH. SCHEUCHZ.

It. Alp. Tom. I. p. 51. iuxta Synon. BOCCON.

DIAGN. *Gemmae caulinae. Folia subovata, plana sessilia. Corollae magnae coeruleae.*

Habitat in *Alpibus Vochinensisibus.*

Haec est VERONICA fruticulosa LINN. *Syst. Nat.*

Folia integerrima, serpyllacea; Corollae in hac specie maximae; Styli in foliola facile degenerantes.

IO. VERONICA serpyllifolia.

Veronica racemo terminali, subspicato; foliis ovatis, glabris, crenatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 57. *Spec. Plant.* p. 12. n. 13. *Fl. Suec.* 2. 16. *Fl. Carniol.* p. 302. n. 1. IACQUIN. *Austr.* p. 3.

Veronica caule erecto; foliis ovatis, glabris, crenatis; petiolis ex alis unifloris, brevissimis. HALL. *Hist.* n. 546.

DIAGN. *Foliorum glabrorum paria raro ultra quatuor, caetera folia alterna. Flores racemosi. Corollae albae, coeruleis lineis pictae; sed imum segmentum immaculatum.*

Habitat ad sepes, circa hortos, et secus vias initio M. Maii florens.

Folia elliptica, obiter crenata, pedunculi subiecto folio aut bractea breviores, capitatis villis pubescentes. Calyx minus villosus est, ac pedunculus. Corollae diameter vix trium linearum, faux tubusque virore aliquo tincti. Filamenta alba. Antherae coeruleae. Stylus rubens. Stigma album, orbiculatum, planum.

II. VERONICA *Beccabunga.*

Veronica racemis lateralibus, oppositis, laxis; foliis planis, glabris. *Fl. Carniol.* p. 305. n. 8.

Veronica racemis lateralibus; foliis ovatis, planis; caule repente. LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 12. n. 14. *Fl. Suec.* 2. 14. IACQUIN. *Austr.* p. 3. BOEHM. *Lips.* 85. GRONOV. *Virgin.* p. 2.

Veronica foliis ovatis, ferratis, glabris ex alis racemosa. HALL. *Hist.* n. 534.

Veronica aquatica, folio subrotundo. TOURN. J. R. H. p. 145.

DIAGN. *Aquatica, glabra, succulenta; caule tereti; foliis subovatis, breviter dentatis: denticulis segmentisque corollae glandula terminatis.*

Habitat ad fontium scaturigines, et in rivulis inde nativis. Racemi florales prodeunt ex utraque ala, corollae segmentum quodlibet ad basin binis lineolis albis signatum est. Ingenium plantae aquosum et suboleraceum.

** *Acutifoliae.*† *ERECTAE.*12. VERONICA *Anagallis.*

Veronica racemis lateralibus; foliis lanceolatis, ferratis; caule erecto LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 12. n. 15. *Fl. Suec.* 2. 13. IACQUIN. *Austr.* p. 3. BOEHM. *Lips.* 84.

Veronica foliis lanceolatis, ferratis, glabris, ex alis racemosa. HALL. *Hist.* n. 533.

DIAGN. *Folia longa, circumferrata.*

Habitat in fossis, circa Tergestum et alibi non rara. Racemi multi. Semina exigua.

13. VERONICA *latifolia.*

Veronica racemis lateralibus; foliis cordatis, rugosis dentatis; caule stricto. LINN. *Syst. Nat.* p. 58.

p. 58. *Spec. Plant.* p. 13. n. 10. *Flor. Carniol.*
p. 364. n. 6.

Veronica foliis hirsutis, nervosis, sessilibus, cordatis, lanceolatis, ferratis, floribus racemosis, longe petiolatis. HALL. *Hist.* n. 535. folia apud nos pleraque ovalia sunt.

DIAGN. *Folia dentata, sessilia, pedunculi fructiferi ita denique inflectuntur, ut emarginatura capsulae scapum respiciat.*

Habitat in umbrosis, frigidis et saxosis sylvestrium locorum.

Caulis simplex. Calyx parvus, linea paulo longior. Colla rosea et alba, villosula, saturatoribus lineolis variegata; fauce radiata, lineis kermesinis. Antherae flavo polline plenae. Capsula villis ciliata, compressa.

14. VERONICA Chamaedrys

DIAGN. *Folia rugosa, quarum latitudo est plus quam dimidia pars totius longitudinis, ambitus inaequaliter dentatus, superficies vero villosa.*

Ex numerosis speciei huius, quas possideo, varietibus nulla vera discrimina eruere potui, quae V E R O N I C A M Chamaedrym LINNAEI ab eius montana distinguant, habitu excepto, qui modo mollior, modo rigidior, ad distinguendas varietates, non autem species constituendas, sufficere visus est.

I. V. CHAMAEDRYS tenerioris texturæ.

I. Foliis petiolatis.

Veronica (montana) racemis lateralibus, paucifloris; calycibus hirsutis, rugosis, crenatis, petiolatis; caule debili. LINN. *Syst. Nat.* p. 58.

Veronica vulgatior; folio rotundiore. I. BAVHIN. *Hist.* III. p. 284. ob folia, et si breviter, in iconē petiolata.

Specimina Gorizienia, missa a P. WULFEN, folia omnia cordata habent, nec elliptica, ut in figura I. BAUINI, et unicum alam floriferam. Hirsuties quoque in calyce eadem, quae in foliis, vix notatu digna, hinc vix attentanda, exemplo VERONICAE *saxatilis*, quae calycem, iuxta LINNAEUM pariter hirsutum possidet, apud nos autem fere omnino glabrum, imo et glaberrimum. IACQUIN. Austr. Obs. I.

2. *Foliis sessilibus.*

(a) *Imis ovalibus, superioribus cordatis.*

Veronica racemis oppositis, erectis, ex summis aliis; foliis subovatis, patulis, dentatis, rugosis. Fl. Carniol.. p. 304. n. 5.

Veronica (*Chamaedrys*) racemis lateralibus; foliis ovatis, rugosis, dentatis; caule debili. LINN. Syst. Nat. p. 58. Spec. Plant. p. 13. n. 18. Fl. Suec. 2. 18 IACQUIN. Austr. p. 3.

Veronica foliis cordatis, subrotundis, hirsutis, nervosis, ex aliis racemosa, HALL. Hist. n. 536. BOEHM. Lips. 87.

Circa hortos et sepes vulgaris plantae folia nervosa, rugosa, inciso-dentata, racemi ex utraque ala. Corollae coeruleae diameter quatuor linearum. Filamenta basi et apice, una cum fauce corollae, alba. Antherae albo polline plenae. Stylus ad basin albidus. Stigma rubellum. Germen villosum.

(b) *Imis subovatis, superioribus ellipticis.*

Veronica foliis cordatis, retusis, nervosis, serratis; racemis longissimis. HALL. Hist. n. 537. BOEHM. Lips. 88.

Chamaedrys spuria, angustifolia. I. BAUIN. Hist. III. p. 285.

Teucrium alterum. MATTHIOL. Diosc. p. 544.

Habitat in pratis siccioribns, et calidioribus.

II. V. CHAMAEDRYS durioris texturae.

His folia sessilia, caulis firmior et simplex, racemi longiores densioresque.

1. Foliorum dentibus obtusis.

Iterum varians 1. racemis duobus, terminalibus.

2. racemis quatuor ex summis alis. 3. foliis cordatis, subcordatis, subovatis, variis, in eadem planta plus minus incisis.

2. Foliorum dentibus acutioribus.

Pariter varians, ut prior.

Huc pertinere videntur TEUCRIA CLUSIANA. I—V. CHAMAEDRES spuriae BAUHINORUM, VERONICA maiorecta. TOURNEFORTII, VERONICA angustifolia minor RIVINI et VERONICA Teucrium LINN. iuxta specimen missum a CL. SCHREBERO.

15. VERONICA multifida.

DIAGN. Folia laciniata, caeterum habitus idem, qui VERONICAE CHAMAEDR. durioris texturae.

Habitat in Austriaco littorali, et circa Goriziam.

VARIET. 1. Foliorum segmentis obtusis.

Veronica racemis lateralibus; foliis multipartitis, laciniatis, caulis erectis. LINN. Syst. Nat. p. 58. Spec. Plant. p. 13. n. 17.

Chamaedrys laciniata. I. BAUHIN. Hist. III. p. 287. in Agro Goriziensi ab AGERIO lecta.

2. Foliorum segmentis acuminatis.

Veronica racemis lateralibus; foliis linearis lanceolatis, pinnato-dentatis. LINN. Syst. Nat. p. 58. b. IACQUIN. Austr. p. 3.

Ex speciminibus Austriacis, quae vidi in herbariis Cl. Virorum MYGINDI et IACQUINII, nullam veram differentiam detegere potui, quae ex VERONICA multifida et Austriaca duas species diversas constitutat.

16. VERONICA *spicata*.

DIAGN. *Folia lanceolata, dentata, in petiolum de-currentia. Flores in una aut plures spicas dense congesti.*

Planta haec etiam varie larvata, characterem suum adeo occultare potuit, ut primarios quoque Botanicos in errorem induixerit, quod ex speciminum meorum enumeratione patebit.

VARIET. a) *Foliis petiolatis*.1. *Caule monostachio.*

Veronica recta minor. TABERNAEM. sed male integrifolia.

Haec caulem habet digito non longiore; sequentia vero synonyma maiorem plantam indicant.

Veronica racemo terminali, subspicato; foliis ellipticis, subhirsutis, obtusis, crenatis. Fl. Carniol. p. 203. n. 3.

Veronica (spicata) spica terminali; foliis oppositis, crenatis, obtusis; caule adscendente, simplicissimo. LINN. Syst. Nat. p. 57. Spec. Plant. p. 10. n. 6. Flor. Suec. 2. 10.

Veronica spicata minor. C. BAUH. Pin. p. 247. VAILLANT. Paris. Tab. 33. fig. 4. ZANCHIEL. Ven. p. 273. Tab. 73.

2. *Caule distachyo.*

Veronica spicata, recta, maior I. BAUHIN. Hist. III. p. 284.

Spica terminalis altera et subiecta maior. Folia imma elliptica, superiora angustiora.

3. *Caule polystachyo.*a) *Foliis petiolatis.*

Veronica maior, angustifolia. I. BAUHIN. Hist. III. p. 284.

Veronica recta. I. TABERNAEM. p. 773.

Spicas gerit (7—8) alternas et oppositas.

Foliis ternis ab hac diversa est. VERONICA *spuria et maritima* LINN.

Fl. Carn. T.I.

B

b) *Foliis*

b) *Foliis sessilibus.*

*Veronica spicis terminalibus; foliis oppositis,
lanceolatis, ferratis, acuminatis.* LINN. *Syst.
Nat.* p. 848. *Spec. Plant.* p. 10. n. 4.

Caulis cubitalis, spicae crassae.

17. *VERONICA romana.*

*Veronica floribus solitariis, subsessilibus; foliis ob-
longis, subdentatis; caule erecto.* LINN. *Syst.
Nat.* p. 59. *Spec. Plant.* p. 14. n. 25. HALL.
Hist. n. 547.

*Veronica minima; Clinopodii minoris folio glabro,
romana.* BOCCON. VAILLANT. *Paris.*
p. 201. Tab. 23. fig. 3.

DIAGN. *Folia inferiora ovata, obtuse dentata; su-
prema lanceolata, educunt ex alis flores brevissime
pedicellatos.*

Habitat Vipacci, Goriziae, Tergesti in cultis.

*Caules villoso, rubore suffuso. Folia inferiora opposita
et breviter petiolata; superiora sessilia, alterna et ad
basin dentata. Flores per aetatem pedicellos acqui-
runt. Calycina segmenta lanceolata, villosa.*

18. *VERONICA arvensis.*

*Veronica floribus solitariis; foliis cordatis incisis,
pedunculo longioribus.* LINN. *Syst. Nat.* p. 58.
Spec. Plant. p. 13. n. 21. *Fl. Suec.* 2. 19. *Fl. Carniol.*
p. 307. n. 11. LACQUIN. *Austr.* p. 4.

*Veronica caule erecto; foliis ovatis, subhirsutis,
dentatis; petiolis brevissimis.* HALL. *Hist.*
n. 548.

DIAGN. *Corollae pallide caeruleae, calycibus bre-
viores. Calyces pedunculis longiores,*

Habitat in herbis, non in arvis.

19. *VERONICA alpina*

*Veronica corymbo terminali, foliis oppositis; caly-
cibus hispidis.* LINN. *Syst. Nat.* p. 57. *Spec.
Plant.* p. 11. n. 12. *Fl. Suec.* 2. 15.

Ve.

Veronica caule simplici; foliis ovatis, glabris, subferratis; spica pauciflora. HALL. Hist. n. 544. Tab. XV. fig. 2. sed folia omnia opposita gerit, quae in nostris, ut et in iconē *Fl. Lap.* supra medium alterna sunt.

DIAGN. *Simplicicaulis, squallida, per siccitatem fere nigricans plantula, tota villosa est, et paucis breviter pedicellatis floribus terminata.*

Habitat in *Alpibus Vochinensibus*, non rara.

Caulis ab unciis binis ad quinque longus, erectus, rigidulus. Nulla supra radiculam rosacee expansa folia; sed omnia caulina et opposita, ovata, integra. Calyces pedunculis vix longiores. Corollae paucae, obscurae-coeruleae. Capsula compressa, tres lineas longa, duas fere lata, emarginata. Semina ovalia, rufa, compressa, in uno loculo (ad 22).

Definitio LINNAEI bona est, non autem Synonyma, quae *Saxatilem* indicant.

20. VERONICA frutescens.

Veronica frutescens. ANN. II. Hist. Nat. p. 42.

Veronica foliis ovatis, crenatis, fructu ovali; floribus in summo caule purpurascenscentibus. HALL. Hist. T. I. Tab. 16. bene.

Veronica alpina frutescens. MORISON. Hist. II. p. 318. cum figura tolerabili, et si dicat tetrapetalam et coeruleis floribus instructam.

DIAGN. *Erecta semper et frutescens; foliis ovato-lanceolatis, concavis, acuminatis; Capsula ovata, obtusa, minime emarginata...*

Habitat in *Voechein* et *Gariutsche*.

Manifeste itaque diversa a **VERONICA SAXATILI** et **alpina**; Nam caules huic simplices et erecti, *saxatili* vero ramosi et diffusi; huic folia cava, oblonga, obiter dentata, acuta; illi ovata, plana integrerrima; huic corollae carneae, non magnae; illi caeruleae et

maximae; huic calycina segmenta acuminata, illi obtusa; Dein simul non crescunt, sed *saxatilis* in Alpibus, haec vero in humilioribus locis et subalpinis. Habitus denique omnino alias, ut absque omni dubio, a *saxatili* I. BAUHINI separari queat.

b) PROCUMBENTES.

21. VERONICA officinalis.

Veronica racemis lateralibus, subspicatis, solitariis; foliis oppositis, villosis, ficcis; caule repente. *Fl. Carniol.* p. 306. n. 9.

Veronica spicis lateralibus, pedunculatis; foliis oppositis; caule procumbente. LINN. *Syst. Nat.* p. 57. *Spec. Plant.* p. 11. n. 8. *Fl. Suec.* 212. IACQUIN *Austr.* p. 2.

Veronica caule decumbente, foliis scabris, petiolatis. ovatis, ex alis racemosa. HALL. *Hist.* n. 540.

DIAGN. *Caules per terram sparfi ex imis geniculis radicantur. Folia adscendunt dentata, elliptica. Unica saepius eaque superior, foliorum coniugatio florifera est.*

Habitat in sylvis.

Tota planta dura est et sicca. Corollae sunt totidem latae campanulae. Floret Maio, parit Septembri M.

22. VERONICA scutellata.

Veronica racemis lateribus; pedicellis pendulis; foliis linearibus, integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 12. n. 16. *Fl. Suec.* 2. 17. *Fl. Carniol.* p. 305. n. 7. IACQUIN. *Austr.* p. 3. cum nota foliorum semper denticulorum.

DIAGN. *Caules angulati. Pedunculi ramosi.*

Habitat in uidis circa *Labacum*.

Pedunculi folio breviores. Calyx parvus. Capsulae locula saepius pentasperma.

23. VERONICA *agrestis*.

Veronica floribus solitariis; foliis cordatis, incisis, pedunculo brevioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 13. n. 20. *Fl. Suec.* 2. 20. *Fl. Carniol.* p. 306. n. 10.

Veronica caule procumbente; foliis petiolatis, ovatis, crenatis. HALL. *Hist.* n. 549.

DIAGN. *Primiflora; foliis ovato-cordatis, crenatis, pedunculo brevioribus,*

Habitat in cultis.

LINNAEUS in *Fl. Suec.* numerat semina in uno capsulae loculo (4) ega vero (8—10).

24. VERONICA *hederifolia*.

Veronica floribus solitariis; foliis quinquelobis; corollis calyce brevioribus. *Fl. Carniol.* p. 307. N. 12.

Veronica floribus solitariis; foliis cordatis, planis, quinquelobis. LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 13. N. 22. *Fl. Suec.* 2. 21. BOEHM. *Lips.* 92.

Veronica caule procumbente; foliis lobatis, petiolis paucifloris. HALL. *Hist.* n. 550.

DIAGN. *Folia quinqueloba et triloba, Segmenta calycina cordato-oblonga. Capsulae locula disperma.*

Habitat in cultis.

Calycis segmenta superant longitudinem corollae. Corollae cum deciderunt tetragonae sunt. Gestatio plantae est dierum (18.) Semina flavescentia, rugosa, adhaerent receptaculo tetragono.

25. VERONICA *triphyllus*.

Veronica floribus solitariis; foliis digitato-partitis, pedunculo brevioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 58. *Spec. Plant.* p. 14. n. 23. *Fl. Suec.* 2. 22. *Fl. Carniol.* p. 308. n. 12.

Veronica foliis ovatis 3—5 partitis; floribus longe petiolatis. HALL. Hist. n. 551.

DIAGN. *Folia digitato-diffusa, subtus rubella, pendunculis breviora.*

Habitat in Agris frequens.

8. BONAROTA.

MICHEL. Gen. Plant. p. 19. Tab. 15.

Planta a VERONICA diversa Calyce profunde quinquefido; segmento uno longiore Corolla personata et labiata $\frac{1}{2}$. MICH. C. D. Capsula quadrivalvi; feminibus ovatis. Cur PAEDEROTAE nomen *Bonarotae* anteponendum sit, nullam video rationem, AGERIAM in notis dixeram, ab Inventore, sed AGERIO aliam plantam nunc dicavit ADANSON.

26. BONAROTA *chamaedrifolia*.

Veronica racemo terminali; Calycibus quinquefidis, tubo postice dilatato brevioribus. Fl. Carniol. p. 303. n. 4.

Veronica corymbo terminali; foliis oppositis, serrato-dentatis; calycibus linearibus. LINN. Syst. Nat. p. 848. Spec. Plant. p. II. n. II.

Paederota foliis ferratis. LINN. Syst. Nat. edit. 12. p. 59.

Bonarota montana, Italica; chamaedryos folio; flore luteo. MICHEL. Gen. Plant. p. 19. Tab. 15.

Chamaedrys montis Sumanii. I. BAUHIN. Hist. III. p. 289.

DIAGN. *Folia simplicia, dentata, superne non lucida.*

Habitat circa Idriam in rupibus. In M. Storschetz; Grindovitz; in alpibus Carnioliae superioris; in lateribus Lisonii non procul ab Gorizia; In Comitatu Tolmiensti.

Radix multicaulis, fibrosa, perennis. Caules teretes, simplices, villosuli, erecti. Folia opposita, sicca, acutae

te ferrata. Racemus terminalis, oblongus. Calyx in quinque lacinias lineares divisus. Bractea calyce longior, linearis, corollae adposita. Corolla lutea, quatuor lineas longa; labio aequaliter trifido. Filamenta albida. Antherae luteae, polline flavo. Stylus quinque lineas longus, apice leniter dilatatus et truncatus, incumbens labio inferiori. Capsulae locula ita invicem demum fecidunt, ut duo distinctae censerit possint, nisi receptaculum unicum esset. Semina rufa in uno loculo (ad 25.) Gestatio bimestris, a primo Maii ad finem Iunii M. Capsulae denique heteromallae.

Variet. 1. *Caule triunciali; foliis subrotundis rarius dentatis; racemo ovali, erecto.*

In summis Alpibus.

— 2. *Caule spithameo; foliis subsessilibus; imis cordatis; racemo deflexo.*

In rupibus humidis.

— 3. *Caule semipedali; foliis oblongis, eordatis, amplexicaulibus.*

In Alpibus.

— 4. *Caule vix semipedali; foliis ellipticis, sessilibus; racemo oblongo.*

In rupium fissuris.

— 5. *Caule spithameo; foliis lanceolatis, sessilibus; racemo nutante.*

In Alpibus.

— 6. *Crollae labio utroque trifido.*

— 7. — — — superiore emarginato eoque naturali.

— 8. — — — inferiore bifido.

Paucos scriptores invenio, qui hanc plantam ipsi viderint. De AGERIO inventore non dubito, cum figura CHAMAEDRIOS M. Sumani a I. BAUHINO data, omnino bona sit, ut neque de MICHELIO, ut ex laudabili EIUSDEM figura patet. De PONAE VERONICA semper virente securos non esse monuit SEGVIERIUS, eam ipsam esse plantam, quae a MICHELIO Bonarota dicta fuit. Incertum

vero omnino est, an nostra planta sit eadem, quae CHAMAEDRIS *alpina saxatilis*. C. BAUHINI. *Teucrium III.* CLUSII, et an viderint TOURNEFORTIUS, SCHEUCHZERUS, TILIUS et alii, qui ex PONA nomen excitarunt. Contra vero certum est, stirpem hanc nunquam visam fuisse a PLUKENETIO, et MORISONIO, cum ei florem rotatum et ramosum caulem tribuant. Praeterea monendum Botanicos nonnullos a PONA seductos, cum VERONICAM *suam semper virentem* dixerit habere flores pluribus petalis instructos, id eoque PONAE VERONICAM diversam esse putaverint a VERONICA *M. Sumanus*, quos inter I. BAUHINUS, PLUKNETIUS, PONTE DERA, et cum aliquo dubio MICHELIUS.

9. GRATIOLA.

RAI *Meth.* p. 93.

Calyx pentaphyllus ADANS. quinquefidus LINN. Corolla personata, labiata, quadrifida, ADANS. quinquefida LUDWIG. Stamina quinque: binis fertilibus. LUDW. ADANS. quatuor: binis castratis. HALL. WILLICH. quatuor: omnibus antheriferis in GRATIOLA *Monieria* IACQUIN. Capsula bilocularis, bivalvis. Semina plurima sphaerica. ADANS. Flores ex alis solitarii RAI.

27. GRATIOLA *Officinalis*.

Gratiola floribus pedunculatis; foliis lanceolatis, serratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 61. *Spec. Plant.* p. 17. n. 1. *Fl. Carniol.* p. 479. GRONOVI. *Orient.* n. 7. IACQUIN. *Austr.* p. 4.

Gratiola. MATTHIOL. *Diosc.* p. 471. HALL. *Hist.* n. 329.

DIAGN. *Folia oblonga, serrata, sessilia. Alae superiores uniflorae.*

Habitat in pratis paludosis, ubique.

10. PIN-

IO. PINGUICULA.

GESN. TOUR. I. R. H. p. 167. Tab. 74.

Calyx quinquefidus. TOUR. D. ringens.
LINN. Corolla bilabiata, tubo calcarato
ADANS. HALL. Stamina bina, bifida;
ramo unico antherifero HALL. Stigma bila-
biatum LINN. orbiculatum TOUR. E. bi-
lamellosum ADANS. Capsula unilocularis
TOUR. G. bivalvis RAI. Folia humistra-
ta, humore pingui madentia. RAI. Ger-
men gerit umbraculum, basi sua stylum am-
plectens, pileo vero stamina protegens.

28. PINGUICULA alpina.

Pinguicula nectario conico, petalo breviore. LINN.

Syst. Nat. p. 61. *Spec. Plant.* p. 17. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 26. *Fl. Carniol.* p. 474.

Pinguicula calcare lato, conico, flore albo. HALL.

Enum. p. 612. n. 2. *Hist.* n. 293.

DIAGN. *Corolla alba; gula citrinis villis pubescen-*
te; calcare convergente et obtuso.

Habitat super rupes humidas, Aprili M. florens cum
CALTHA et OROBO verno, circa Idriam. Stami-
na basi incurva, ante germen sepe contingunt. An-
therae subrotundae, compresiae, flavescentes. Ca-
psula ad apicem anceps, capitatis villis pubescens.
Semina ad (180.) oblonga fusca, apice striata, adfixa
receptaculo stipitato et subrotundo.

PINGUICULA indicat in vicina latentem *Tophum*, s.
porum aqueum solidum WALLER. 310.

VERBENA nostra *Tetrandra* est, hinc a DIANDRII
removenda, quam vide in DIDYNAMIIS.

II. LYCOPUS.

FUCHS. TOURN. I. R. H. p. 190. Tab. 89.

Planta labiata, verticillata. Calyx quin-
quefidus TOUR. D. dente supremo minimo.

HALL. omnibus spinosis ADANS. Corolla subaequaliter quadrifida TOUR. B. LUDWIG. Stamina quatuor: binis sterilibus ADANS. Sem. subrotunda LINN. Ovalia TOUR. E. ADANS. retusa LINN.

29. LYCOPUS europaeus.

Lycopus foliis sinuato-ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 63. *Spec. Plant.* p. 21 n. 1. *Fl. Suec.* 231.

Lycopus foliis acute ferratis et appendiculatis. HALL. *Hist.* n. 220.

Pseudo-marrubiastrum palustre. RIVIN. *Moss.* Tab. 21.

Lycopus palustris, glaber; foliis in profundas lacinias divisis. TOUR. *I. R. H.* p. 191. SEGUIER. *Veron.* I. p. 297.

DIAGN. *Folia ampliter dentata, aut laciniata.*

Habitat in uidis et ruderatis.

Planta modo glabra, modo villosa. Flores parvi. Cum MENTHA evidens adfinitas.

12. ROSMARINUS.

BRUNFELS. TOURN. *I. R. H.* p. 195. *Tab. 92.*

Planta labiata, verticillata. Cal. bifidus et trifidus TOUR. F. G. Coralla ringens. TOUR. A. A. A. Folia angusta, prona parte cinerea. RAI. Indoles fructicosa LUDWIG. Ad SALVIAS proxime accedit, distinguendus staminibus minime bifurcatis. LINN.

30. ROSMARINUS Officinalis.

Rosmarinus. LINN. *Syst. Nat.* p. 64. *Spec. Plant.* p. 23. *Fl. Carniol.* p. 453. HALL. *Hist.* n. 250.

DIAGN. *Fruticat; foliis Lanceolato-linearibus.*

Habitat in Istriae montanis.

Ex floribus cum Vino et eius spiritus destillatis, fit Aqua Regiae. DU HAMEL. *Arbor.* II. p. 250.

13. SAL-

13. SALVIA.

TOURN. I. R. H. p. 180. Tab. 83.

Planta labiata, verticillata, diversa a REMARINO filamentis furcatis TOUR. Tab. 83. G. seu transverse pedicello adfixis LINN. horum ramorum unus antheram gerit, alter modo nullam, modo eius vestigium, modo veram antheram HALL. In hac bifurcatione singulari consistit SALVIAE caracter essentialis. LINN.

31. SALVIA officinalis.

Salvia foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis; floribus spicatis; calycibus acutis. LINN. Syft. Nat. p. 65. Spec. Plant. p. 23.

DIAGN. Frutescens, aromatica; foliis lanceolatis, rugosulis, crenulatis.

Vidi in montibus mari proximis, prope pagum Nerbina, una horula procul Duino, media inter saxa laetissime florentem.

Calyces rubri, quinquefidi; segmentis acutissimis. Flores racemosi, rubri; odoratissimi. Species haec omnino Tetrandra est; fulcrum enim sustinet filamentum utroque extremo gerens antheram fertilem.

Eo minor copia mellis in KARTSCHIA, quo minus SALVIA floret.

32. SALVIA sylvestris.

Salvia foliis cordato-lanceolatis, undulatis, biserratis, maculatis, acutis; bracteis coloratis, flore brevioribus. LINN. l. c. n. 9.

DIAGN. Bracteae ovatae, triflorae. Galea compressa, sub apice adspersa glandulis sessilibus.

Habitat in Carniola calidiore.

Folia oblonga, basi subcordata, crenata, subtus villosa. Flores longe spicati, Calyces bilabiati $\frac{1}{2}$, breviter

viter pedicellati. Faux corollae clausa squamis, quae alterum apicem staminis terminant. Fulcrum squamis hisce brevius. Stamen sub contactu fulcri denticulo notatum. Squamae per aetatem colorem exuunt.

33. *SALVIA glutinosa.*

Salvia foliis cordato - sagittatis, serratis, acutis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 66. *Spec. Plant.* p. 26. n. 19. *Fl. Carniol.* p. 452. n. 3. IACQUIN. *Auftr.* p. 5. HALL. *Hist.* n. 252.

DIAGN. *Corollae faux patula. Filamentum longitudine proprii fulcri, cuius inferior extremitas gerit lamellam cum socia cohaerentem; unionis locum signante tuberculo.*

Habitat in Sylvis, et circa vias.

Viscum in calyce retinet Insecta minora, ut a Curiosis examinari possint. Verticilli sexflori sunt. Corollae pallide luteae. Antherarum pollen albidus. Semina ovalia fusca, laevia, immaculata, modice compressa.

Gemmae quandoque tam ex radice, quam ex aridis prioris anni stipidibus exeunt.

34. *SALVIA verticillata.*

Salvia foliis, cordatis, crenato-dentatis; Verticillis subnudis; stylo corollae labio inferiori incumbente. LINN. *Syst. Nat.* p. 66. *Spec. Plant.* p. 26. n. 18.

Gallitricho affinis etc. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 314.

DIAGN. *Corollae faux patula. Fulcrum longitudine antherae. Filamenti extremitas altera lamellam nullam sustinet.*

Habitat passim in collibus herbidis.

Verticillus imus flores habet ultra (40.) Calix labiatus $\frac{3}{4}$ pedunculo rubro canicolor. Corollae galea ovalis, bifida,

bifida, clausa, basi coarctata. Stylus incumbens labio. Obliqua corona villorum ad initium tubi corollae, Semina ovata, glabra.

35. SALVIA hispanica.

Salvia foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis; spicis imbricatis, calycibus trifidis. LINN.

Syst. Nat. p. 66. *Spec. Plant.* p. 25. n. 16.

Sclarea Hispanica. TABERNEAM. p. 764.

DIAGN. *Corollae faux patula. Filamenta supra medium fulcrata. Stigma retro galeam flexum.*

Spotaneam non inveni, sed nata ex seminibus *Gorizia* adlatis.

Radix annua. Caulis etiam tripedalis, ramosus, villosulus, obtuse tetragonus. Folia ovata, rugosa, acuminata, utrinque villosa, patula aut deflexa; petiolo basi semicylindraceo, subtus ad exortum binis nodis instructo. Spicae florales primariae octangulares, rameae vero etiam tetragonae. Series alterna florum bracteas trifloras gerit, easque ovatas et subcaudatas. Pedunculi linearis, divergentes, villosi. Calyces trifidi, segmento superiore longiore. Corollae caerulecentes, galea ovata, concava, villosa, ex apice stylum emitteat, qui retrorsum flectitur. Maculae duae oblongae et albidae, corollae pectus occupant. Semina oblonga, fusco-cinera, utrinque obtusa, punctis rivulisque nigris variegata.

36. SALVIA haematodes.

Salvia foliis cordato-ovatis, rugosis, tomentosis; calycibus hispidis; radice tuberosa. LINN.
Syst. Nat. p. 65. *Spec. Plant.* p. 24. n. 10.

DIAGN. *Corollae faux clausa lamellis binis. Tota planta hispida. Fulcra antherarum longitudine.*

Habitat in *Istria*.

Petiolum diametro folii brevior. Verticilli 20—24 florae, aridis bracteis instructi. Pedunculi inaequales. Calyces quinquefidi, sublabiat $\frac{3}{2}$. Corollae caeruleae galeae

galea ovata, pone coarctata, villosa; labium inferius trifidum; segmentis lateralibus subovatis: medio concavo et obtuso; tubus ferrugineus, subitus tumorem gerens. Filamenta ferruginea. Antherae caeruleae. Stylus longus, ferrugineus.

37. SALVIA pratensis.

Salvia foliis cordato-oblongis, crenatis; summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 65. *Spec. Plant.* p. 25. n. 11. *Fl. Suec.* 2. 32. *Fl. Carniol.* p. 451. n. 2. KRAM. ~~Aust.~~ p. 8. n. 3. IACQUIN. *Aust.* p. 5.

Salvia foliis imis cordatis, superioribus longe lanceolatis; verticillis nudis, in spicas continuatis. HALL. *Hist.* n. 253.

DIAGN. *Corollae faux clausa lamellis bidentatis et fulcro subcontiguis. Calyces horizontaliter patent.*

Habitat in pratis collibusque, circa medium Maii florens,

Verticilli sexflori. Calycis labium superius tribus pli-
cis in apice coeuntibus, inferius vero octo lineis ele-
vatis striatum est. Corollae caeruleae galea con-
duplicata, obtusa, falcata, ex apice proferens stylum.
Lamellae basi attenuatae, incurvae, cohaerentes.
Corollae tubus suavi nectare scatet ab Apibus expe-
rito.

DIGYNIA.

14. ANTHOXANTUM.

DALECHAMP, I. BAUHIN. LINN. *Gen.*
Plant. 40.

Gramen diandrum. LINN. HALL.
ADANS. Calyx biglumis, uniflorus. LINN.
LUDW.

LUDW. Corolla bivalvis LINN. triglumis
ADANS. Sed omnino biglumis est et aristata in cuius sinu latet nectarium biglume ad basin germinis. Sunt et styli longi ante stamina erumpentes, ut in CARICE et PLANTAGINE.

38. ANTHOXANTHUM *odoratum*.

Anthoxanthum, spica oblonga, ovata; flosculis subpedunculatis, aristata longioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 67. *Spec. Plant.* 28. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 33. *Fl. Carniol.* p. 182. IACQUIN. *Austr.* p. 6.

Avena diantha; folliculo villoso; calycis glumis inaequalibus, altera de imo dorso, altera de summo aristata. HALL. *Hist.* n. 1491.

Anthoxanthum foliis brevius acuminatis; spica laxa, fastigiata et angusta. GLEDITSCH. apud BOEHM. *Lipf.* 597.

Gramen pratense; spica flavescente. C. BAUH. *Pin.* p. 3. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 88.

DIAGN. *Pannicula spicata*. *Calyx petalis inaequalibus obtusisque longior*. *Petalum unum e basi profert aristam refractam*.

Habitat in pratis ubique.

Glumae glabrae. Petala villosula, aristata; aristata una breviore erecta e medio petali nata, alia longiore denticulata et quasi geniculata prodit e basi petali alterius. Antherae subrubrae, utrinque bifidae; segmentis divaricatis. Germen oblongum, acuminatum. Styli staminibus duplo longiores. Nectarii gluma una acuminata, altera obtusa et subcrenata.



CLASSIS III.
T R I A N D R I A.
MONOGYNIA.

15. VALERIANA.

LINN. *Gen. Plant.* 43.

Calyx vix ullus. Corolla monopetala, quinquefida, supera. Stamina pauciora ac segmenta corollae. Capsula non dehiscens. Semina solitaria LINN.

VALERIANA TOUR. Corolla calcarata, Stam. 1—3. Fructus floris hermaphroditi fertilis explicans ex margine apicis setulas 10—20.

VALERIANELLA EIUSDEM. Fructus non papposus, 1-locularis.

FEDIA ADANS. Stam. 4. Fructus muticus.

39. VALERIANA officinalis.

Valeriana floribus triandris; foliis omnibus pinnatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 72. *Spec. Plant.* p. 31. n. 5.

Fl. Suec. 2-34. *Fl. Carniol.* p. 346. n. 1. KRAM.

Austr. p. II. n. 3. JACQUIN. *Austr.* p. 7.
BOEHM. *Lips.* 97.

Valeriana foliis pinnatis; pinnis dentatis. HALL.
Hist. n. 210.

DIAGN. *Folia omnia pinnata.*

Habitat ad sepes et circa Fluvios.

VARIET. I. *Foliis ternis.*

In montibus circa Goriziam. R. P.
WULFEN.

VA-

VARIET. 2. *Foliis oblongis utroque latere dentatis.*

Ad viam, inter *Idriam* utramque.

Foliorum paria (6.), unciam lata, digitum longa.

— 3. *Foliis lanceolatis, uno latere eoque inferiore dentatis.*

In *Sylvestribus.*

— 4. *Foliis lanceolatis, utroque latere dentatis.*

In *Monte sancto.*

Cum stylus respectu staminum iusto brevior sit, sic *Antherae* in hoc Genere pollinem spargunt, dum flos adhuc clausus est.

Radicis vim antepilepticam, ab *III. COLUMNA.* inse ipso aliisque expertam, insigni exemplo confirmavi in *Fl. Carniol. I.* Eadem postea, aliis in casibus, usus sum saepius, et semper felici cum successu.

40. VALERIANA dioica.

Valeriana floribus triandris, dioicis; foliis pinnatis, integerrimis. LINN, *Syst. Nat.* p. 72. *Spec. Plant.* p. 31. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 35. KRAM. *Austr.* p. 10. n. 1. JACQUIN. *Austr.* p. 7.

Folia ima non sunt pinnata, nec sexus constans.

Valeriana foliis radicalibus petiolatis, ovatis; caulinis pinnatis, sexu distincta. HALL. *Hist.* n. 288. BOEHM. *Lipf.* 98.

Phu minimum. MATTHIOL. *Diosc.* p. 35.

DIAGN. *Ex apice radicis prodeunt stolones foliosi: foliis ovatis et ellipticis; petiolis triquetris longis. Caulina folia pinnata aut pinnatifida.*

Habitat in pratis paludosis, umbrosis, initio Maii florens. Millena specimina examinavi, et nunquam vidi flores dioicos, sed nunc omnes hermaphroditos, nunc filamento uno aliove castrato instructos, nunc masculos et feminineos in eadem planta, ita tamen ut masculi flores continerent rudimentum germinis et styli; sine feminis vero perfectis nullam haec tenus inveni plantam.

41. VALERIANA *tripteris*.

Valeriana floribus triandris, foliis dentatis radicalibus cordatis; caulinis ternatis, ovatis, oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 72. *Spec. Plant.* p. 32. n. 7. IACQUIN. *Austr. Obs.* 2. p. 201.

Valeriana foliis ad caulem tripteris. HALL. *Opus.* *Botan.* p. 180 — 184. *Hist.* n. 211.

Valeriana Alpina prima. C. BAUHIN. *Prodri.* p. 86. cum icone optima.

Valeriana alpina. I. BAUH. *Hist.* III. 2. p. 208.

DIAGN. Fruticans; surculis aliis foliosis, aliis vero floriferis. Surculi foliosi gerunt folia petiolata et cordata; floriferi autem ima folia subcordata, superiora profunde trifida et lanceolata, suprema linearia et indivisa,

Habitat in sylvestribus locis, super rupes.

Semen rufum, quatuor lineis elevatis striatum, an-
ceps, coronatum radiis pilosis (13.)

Haec florente GRYLLUS stridet in campis, UPUPA
foetidum nidum aedificat, RANA in fruticibus laete
coaxat.

42. VALERIANA *montana*.

Valeriana floribus triandris; foliis ovato-oblongis,
subdentatis; caule simplici. LINN. *Syst. Nat.*
p. 72. *Spec. Plant.* p. 32. n. 8. IACQUIN.
Austr. Obs. 3. p. 202.

Valeriana foliis omnibus integris, ex ovato-acumi-
natis, leviter tendatis. HALL. *Op. Bot.* p. 184
— 187. *Hist.* n. 212.

Valeriana Serophulariae folio. C. BAUH. *Prodri.* p. 87.

DIAGN. Folia ima ovalia obtusiora, superiora ob-
longa acuminata, dentata, suprema subsessilia.

Habitat in *Alpibus Vochiniensibus*.

Folia semper indivisa distinguunt hanc speciem a priore.

Figura C. BAUHINI folia integra representat,
qualia apud nos non occurunt.

43. VALERIANA *saxatilis*.

Valeriana floribus triandris; foliis subdentatis: radicalibus ovatis, caulinis linearis-lanceolatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 72. *Spec. Plant.* p. 33. n. 11. IACQUIN. *Austr.* p. 204. Obs. 5.

Valerianae minimae icon interior. L. BAUHIN.
Hist. III. 2. p. 206.

DIAGN. *Folia radicalia quatuor oblonga, ad apicem obiter dentata, caulina linearia.*

Habitat super rupes et in harum fissuris, cum PRIMULA *Integrifolia* & VIOLA *LUTEA* florens.

Caulis unicus, ex tereti anceps, spithamam raro excendens. Plantae folia in locis minus insolatis nitidiora, eoque obturiora ac minus dentata, quo magis in longitudinem extenduntur. Corollae albidae tubus pone non bifidus. Antherae pallide luteae. Stigma ovatum. Radii pilosi in semine (12—14).

Descriptio VALERIANAE *tertiae* Fl. Carniol. huc pertinet, sed non Synoyma, idem error irrepsit in VALERIANA *secunda* quae Synonyma Dioicae, descriptionem vero Tripteris habet.

44. VALERIANA *elongata*.

Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus ovatis, caulinis cordatis, sessilibus inciso sub hastatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 72. IACQUIN. *Austr.* Obs. 6. p. 205. Tab. I. cum optima figura.

DIAGN. *AIUGAE folia, habitus pyramidalis.*

Inveni in Alpibus Vochinenibus Ao. 1761. et in notis vocaueram *AIugoidem*.

Differt a VALER. *Montana*, gemma radicali, caule panniculato, foliis sub primis racemis plerumque trifidis a V. *Tripteri* foliis undique dentatis; caulinis ovatis, radicalibus vero petiolo proprio semper longioribus.

45. VALERIANA *celtica*.

Valeriana floribus triandris; foliis ovato-oblongis, obtusis, integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 22. *Spec. Plant.* p. 32. n. 9,

Valeriana foliis integerrimis; radicalibus ovatis, caulinis linearibus, obtusis. HALL. *Hist.* n. 209.

DIAGN. *Folia integerrima, obtususcula: binis in medio caule coniugatis, nec floriferis.*

Habitat in Alpibus Carnioliae superioris, non frequens.

VARIET. 1. *Pedunculis corymbosif.*

Et haec est VALERIANA *minima Nardifolia*, exteriore figura, bene expressa a I. BAUH. *Hist.* III. p. 206. VALERIANA *alpina parva Nardo Celticae similis inodora*. PLUKENET. *Phyt. Tab.* 232. fig. 2. SPICA *Celtica fastigiata ordine flosculorum* CAMERARII et VALERIANA *Celtica IACQUINII*, quam a VALERIANA *Saxatili*, distinguit habitus et locus natalis.

— 2. *Pedunculis subverticillatis.*

Quae vera SALIUNCA, seu NARDUS *celtica*, a Styris Speich dicta, quam in copia reperi in *Alpibus styriacis supra Wafferberg et Iudenburg*.

46. VALERIANA *locusta*.

Valeriana floribus triandris, caule dichotomo; foliis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 72. *Spec. Plant.* 33. n. 14, *Fl. Suec.* 2. 36. *Fl. Carniol.* 349. n. 4.

Valerianella foliis oblongis, ferratis; seminis corona tridentata. HALL. *Hist.* n. 215.

DIAGN. *Caulis annuus, dichotomus. Semina papulo minime radiata, apice tridentata.*

Habitat in arvis.

VALERIANÆ genus naturale comprehendit etiam
VALE-

VALERIANELLAM TOURNEFORTII, habitus vero nihil cum DIPSACEIS, multoque minus cum GLOBULARIA, commune gerit, quod etiam demonstrat proportio numerica staminum ad segmenta corollae.

16. CROCUS.

THEOPH. DIOSC. PLIN. TOURN. I. R. H.
p. 350. Tab. 183. 184.

Corolla *Colchici*; segmentis aequalibus.
Stigmata tria.

47. CROCUS *sativus*.

Crocus spatha univalvi, radicali; corollae tubo longissimo. LINN. *Syst. Nat.* p. 75. *Spec. Plant.* p. 36. n. 1. β. *Fl. Carniol.* p. 228. GRONOV. *Orient.* 13. KRAM. *Austr.* p. 11.

Crocus tuba brevissima trifida. HALL. *Hist.* n. 1257.
cum varietat.

Crocus sativus. C. BAUH, DU HAMEL. *Act.*
Paris. A. 1728. Tab. I.

DIAGN. *Corollae tubus limbo longior.*

Habitat in pratis montanis, non rarus, circa medium
Aprilis florens.

Radix orbiculata, depressa, minorem sustinet. e qua
folia graminea bina aut terna. Corollae tubus teres.
Antherae filamentis longiores.

17. GLADIOLUS.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 365. Tab. 190.

Corolla (Calyx ADANS.) sublabiata
RAI. labiata $\frac{1}{3}$ TOURN. Sextpartita LINN.
Germen inferum TOURN. B. stigma trifidum LINN. segmento singulo sustinente foliolum MALPHIG. Semina Calyptra involuta, subrotunda LINN. LUDW. cylindrica

drica ADANS. Radix duplii tubere constans, altera alteri incumbens. RAI, TOURN.

48. *GLADIOLUS communis.*

Gladiolus foliis ensiformibus; floribus distantibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 76. *Spec. Plant.* p. 36.

n. 1. *Fl. Carniol.* p. 232. GRONOV. *Orient.*

14. KRAM. *Austr.* p. 12. IACQUIN. *Austr.*

p. 9. BOEHM. *Lips.* 100. HALL. *Hist.*

n. 1261. ROYEN. *Lugdb.* p. 19.

DIAGN. *Folia ensiformia. flores secundi, purpurei. Corollae segmenta tria inferiora alba macula notata.*

Copiosus circa *Lacum Zirchnicensem*, crescit etiam *Vipaci* in pratis, nec non inter *Loitsch* et *Houchdedroustza*.

Flores in uno scapo raro ultra (5), unica longiores.

Corollae segmenta tria inferiora lanceolata. Antherae viridi-luteo polline plenae. Semina imbricata, in uno loculo (ad 8).

48. *IRIS.*

LINN. *Gen. Plant.* 57. LUDWIG. *D. G.* 8.

Corolla enneapetala RAI hexapetala BOERH. monopetala sexfida. TOURN. RUPP. MAGNOL. LINN. HALLER. ADANS. Stamina tecta stigmatibus petaliformibus, quae prope talis habuit RAIUS. Germen inferum TOURN. magnitudo aut varia superficies segmentorum aliquorum Corollae. Genus hoc naturale in artificialia plura dilacerant systematici.

49. *IRIS pseudacorus.*

Iris corollis imberibus; petalis interioribus stigmate minoribus; foliis ensiformibus. LINN. *Syst.*

Nat. p. 77. *Spec. Plant.* p. 38. n. 7. *Fl. Suec.* 2. 37.

Fl. Carniol. p. 231. n. 1. KRAM. *Austr.* p. 13.

115

Iris laciniis corollae interioribus stigmate brevioribus.

BOEHM. *Lipf.* 3.

Iris imberbis lutea; nervo folii eminentia. HALL.

Enum. p. 281. n. 4. G MELIN. *Sibir.* I. p. 31.

*Iris caule inflexo, foliis ensiformibus; petalis ere-
ctis minimis, reflexis, imberbibus.* HALL.
Hist. n. 1260.

DIAGN. *Imberbis, lutea, palustris.*

Habitat in fossis.

Segmenta minora corollae sunt ligulae basi auriculatae,
apice dilatatae, staminibus breviores. Antherae
obscure violaceae. Germen trigonum.

50. IRIS graminea.

*Iris corollis imberbibus; germinibus sexangulari-
bus; caule ancipi; foliis linearibus.* LINN.

Syst. Nat. p. 78. *Spec. Plant.* p. 39. n. 13. *Fl.
Carniol.* p. 232. n. 2. KRAM. *Austr.* p. 13.
n. 8. JACQUIN. *Austr.* p. 8.

Iris graminea. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 727.

Iris sylvestris. MATTIOL. *Diosc.* p. 18.

DIAGN. *Germen hexagonum, petalis triplo brevius.*

Passim adest in montibus circa Idriam, in M. Nanas,
Dull. In Comitatu Tolmieni, ad Straschiska. Fo-
lia modo angusta et linearia LINN. modo latiora,
quae Lippizae vidi, et in M. Salvatino, ac campe-
stribus Agri Goriziensis iam pridem MATTHIO-
L U S. Variat caule unifloro et bifloro.

51. IRIS germanica.

*Iris corollis barbatis; caule foliis altiore, multifloro;
floribus inferioribus pedunculatis.* LINN. *Syst.
Nat.* p. 77. *Spec. Plant.* p. 38. n. 2. KRAM. *Austr.*
p. 12. IACQ. *Austr.* p. 18. ROYEN. *Lugd.* p. 17.

*Iris foliis ensiformibus distichis; petalis reflexis, bar-
batis, tubalibus arcu distinctis.* HALL. *Hist.*
n. 1268.

Habitat Lippizae.

19. SCHOENUS.

LINN. *Gen. Plant.* 60.

Dissert a SCIRPO calyce 5 - 6 glumi; sed SCHEUCHZERUS in descriptione SCHOENI albi, ait in harum squammarum locustas singulas componentium, duarum, trium, quatuorve, quandoque etiam sinu singulo semen refidet. PSEUDOCYPERI palustris p. 375. Squamas aliquas fertiles ponit, alias vero minime; et GRAMINIS cypereoidis p. 490. Singulam squammam florem fertilem sinu suo foventem habet. Probabile est itaque SCHOENUM LINN. in eo tantum a SCIRPO diversum esse, quod in hoc Genere omnes squammae fertiles sint, in eo vero eae solae, quae superiorem capitulorum partem constituunt. Hoc demonstrat etiam figura PSEUDOCYPERI DD. et CYPERELLAE A.C.D. MICHEL, nec non propria observatio rudimentorum floris et fructus in sinu uno aliove, earum squammularum, quas Ill. LINNAEUS pro glumis calycinis habet; vide etiam mecum hic consentientem ADANSONIUM in *Famil. Pl.* P. II. p. 40.

52. SCHOENUS albus.

Schoenus culmo subtriquetro folioso; floribus fasciculatis; foliis setaceis. LINN. *Syst. Nat.* p. 80.
Spec. Plant. p. 44. n. 9. *Fl. Suec.* 2. 41.

Gramen cyperoides, palustre Leucanthenum. RAI. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 503. Tab. 117. fig. 11. bene.

Scirpus foliis setaceis; pannicula plana; locustis teretibus. HALL. *Hist.* n. 1341.

DIAGN. *Corymbi florum albentium.*

Habitat in paludosis circa SEIRACH, et alibi non rarus.

Culmi

Culmi et folia tenuia. Flores primum albi, colorem per aetatem saepe mutant in fulvum aut alium, hinc bene MICHELIUS dixit CYPERELLAM palustrem, capitulis florum umbellatis compactis, primum albis, deinde fulvis.

20. CYPERUS.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 527. Tab. 299.

Squamae floriferae in spicam complanatam imbricatae ADANS. Semen absque setis. LINN.

53. CYPERUS *flavescens*

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbella triphylla; pedunculis simplicibus, inaequalibus; spicis confertis, lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 81. *Spec. Plant.* p. 46. n. 12. *Fl. Carniol.* p. 220.

Cyperus annuus; pannicula sparsa, subflavescente. MICHEL. *Gen. Plant.* p. 16. n. 16. Sed sparsa pannicula non est. Nominis inventor TOURNEFORTIUS est, qui paniculam posuit flavescentem, una cum SCHEUCHZER. *Gram.* p. 385. Tab. 8. fig. 13.

Cyperus umbella trifolia, spicis sessilibus, umbellatis, glumis obtusis. HALL. *Hist.* n. 1348.

DIAGN. *Culmus obtuse trigonus. Spicae in capitulum coadunatae. Semen subcordatum, punctis impressis scrobiculatum.*

Habitat in pratis paludosis.

Definitio Linnaeana, meo iudicio non satis exprimit differentiam CYPERI huius, a sequente; nam panicula trifida, et Spicae lanceolatae occurunt etiam in C. *fusco*.

54. CYPERUS *fuscus*.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbella trifida; pedunculis simplicibus, inaequalibus; spicis con-

fertis, linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 81. *Spec. Plant.* p. 46. n. 13.

Cyperus panicula sparsa, nigricante. TOURN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 384. n. 4.

Cyperus umbella trifolia; spicis petiolatis, congestis: glumis ovato-lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 1349.

DIAGN. *Culmus exæte triqueter. Panicula laxior et ramosior. Semen ovatum, nec punctatum.*
Habitat cum priore, non adeo frequens.

Nescio, quid significant pedunculi simplices LINN. cum corymbis insigniter ramosus sit. Culmus in hac specie crassior, altior, nec adeo splendens; Squamae quoque minores et auctiores. SCHEUCHZERI descriptio bona est. CYPERI cum CARICE adfinitas evidens.

55. CYPERUS longus.

Cyperus culmo triquetro, folioso; umbella foliosa, supradecomposita; pedunculis nudis; spicis alternis. LINN. *Syst. Nat.* p. 81. *Spec. Plant.* p. 45. n. 5.

Cyperus odoratus; radice longa, S. Cyperus Officinalium C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 378. bene descriptus.

DIAGN. *Pedunculi (ad 12) umbellati, eo breviores, quo interiores: exteriore semipedali. Sub cingulo est folium pedunculo longius. Spicae in ramulis corymbosae, tenues, acuminatae, rufo-rubrae.*

Habitat circa Tergestum, Goriziam, Cormons, et Medeam, in fossis.

Scapus et pedunculi nudi, trigoni. Spicae lineam latæ, (4—5.) longae Squamulae ellipticae; dorso viridi et prominulo. Spicae alternae, aggregatae.

21. SCIRPUS.

LINN. Gen. Plant. 62.

Squamae in spicam rotundatam imbricatae,
foventes semina totidem setulis circumvallata.

* *Spicis terminatricibus.*

56. SCIRPUS palustris.

Scirpus culmo tereti nudo; spica subovata terminata. LINN. Syst. Nat. p. 82. Spec. Plant. p. 47. n. 2. Fl. Suec. 2. 42, KRAM. Austr. p. 14. sed spica oblonga est.

Scirpus culmo tereti, nudo; spica oblonga, terminali. Fl. Carniol. p. 221. n. 1.

Scirpus caule terete; spica unica, terete, multiflora. HALL. Hist. n. 1336.

Scirpus culmo nudo tereti, simplicissimo; spica solitaria, simplici, oblonga, terminatrice. GLEITSCH. apud BOEHM.

Scirpus palustris, clavatus; caule rotundo, molifissimo, nitido, atrovirente. MICHEL. Gen. Plant. O. III. n. 1. 4.

Scirpus Equifeti capitulo. SCHEUCHZ. Gram. p. 360-361.

DIAGN. *Spica oblonga terminans scapum nudum.*

Habitat in paludosis passim.

Culmus non prorsus teres, sed leniter anceps. Folia basi ferruginea, compressa. Germen sub apice coarctatum. E basi germinis setulae (3—4).

57. SCIRPUS maritimus.

Scirpus culmo triquetro; panicula conglobata, folacea; spicularum squamis trifidis: intermedia subulata. LINN. Syst. Nat. 84. Spec. Plant. p. 51. n. 20. Fl. Suec. 2. 47.

Cyperi SCHEUCHZERIANI. p. 398. Tab. 9.
fig. 7. 8. et p. 400. fig. 10.

DIAGN.

DIAGN. *Spicae ferrugineae, oblongae; squamis tridentatis; dente medio aristato. E basi germinis prodeunt paleolae (2—3). truncatae, albae, stylo breviores.*

Habitat in maritimis nostris abunde.

VARIET. 1. *Spicis sessilibus; foliis caulinis, culmo longioribus.*

Spicae semiunciales et breviores; squamis bisidis, e divisura aristam proferentibus.

— 2. *Spicis sessilibus; foliis caulinis, culmo brevioribus.*

Hanc exprimit SCHEUCHZERI fig. 7. Tab. 9.

— 3. *Spicis sessilibus et pedunculatis.*

SCHEUCHZ. Gram. Tab. 9. f. 9,

Bene LINNAEUS in unam speciem coniunxit omnes, quibus semen fusco-ferragineum, ovatum, splendens, compressum, acuminatum, et exiguis setulis ferrugineis ad basin septum; styli fusco-rubri; stigmata inaequalia; Paleolae squamis longiores, obtusae et emarginatae.

58. SCIRPUS *sylvaticus.*

Scirpus culmo triquetro folioso; umbella foliacea; pedunculis nudis, supradecompositis; spicis confertis. LINN. *Syst. Nat.* p. 84. *Spec. Plant.* p. 51. n. 22. *Fl. Suec.* 2. 48. *Fl. Carniol.* p. 222. n. 3. IACQUIN. *Austr.* p. 19.

Scirpus planifolius, panicula ramosissima, loculis ovatis. HALL. *Hist.* n. 1340.

DIAGN. *Inflorescentia IUNCI PILOSI spicae ovatae.*

Habitat in aquosis.

Calamus triqueter. Folia planiuscula. In apice culmi panicula sparsa et facta pluribus columnis pedunculatis, e quibus pedunculi florales undique prodeunt plerum-

plerumque ramosi. Spicarum squamae ovatae. Antherae flavae, circa germen fetae (3—4).

** *Spicis lateralibus.*

59. **SCIRPUS lacustris.**

Scirpus culmo tereti nudo; spicis ovatis, pluribus, pedunculatis, terminalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 83. *Spec. Plant.* p. 48. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 46. KRAM. *Austr.* p. 15.

Scirpus culmo tereti, nudo; panicula laterali; spicis ovatis. *Fl. Carniol.* p. 221. n. 2.

Scirpus culmo nudo, simplicissimo, tereti; pannicula sub apice sessili, sparsa et ramosa. GLE-DITSCH. apud BOEHM. *Lips.* 652.

Scirpus caule tereti; panicula laterali, ramosa; loculis ovatis. HALL. *Hist.* n. 1337.

DIAGN. *Culmus teres, aphyllus. Spicarum squamae bifidae. Semen trigonum.*

Habitat in Lacu Veldensi. Zirchnicensi, aliisque, frequens.

Spicae ellipticae. E squamarum divisura acumen oritur. E basi germinis fetae (5—6) ad lentem basin versus subciliatae. Semen fuscum.

60. **SCIRPVIS mucronatus.**

Scirpus culmo triquetro, nudo, acuminato; spicis conglomeratis, sessilibus, lateralibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 83. *Spec. Plant.* p. 50. n. 14.

Scirpus caule triquetro; panicula laterali, ramosa; loculis ovatis. HALL. *Hist.* n. 1338.

Scirpo-Cyperus maritimus, humilis; caule pallide virente; panicula glomerata. MICHEL. *Gen. Plant.* p. 47. O. II.

Scirpo-Cyperus; panicula glomerata, e spicis imbricatis composita. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 404. Tab. IX. fig. 14? videtur.

DIAGN.

DIAGN. Culmus triqueter trium digitorum transversorum distantia ab apice profert fasciculum spicarum ferruginearum.

Habitat in *Austriaco Littorali*.

Squamae in spicis eadem, quae in *S. Lacustri*. Tolerabilem figuram huius plantae habemus in *Prodromo Bauhiniano*, cum addito nomine *IUNCI acuti, maritimi, caule triangulo*, quod SCHEUCHZERUS *Cypero* suo duodecimo Tab. IX. non bene applicavit.

61. SCIRPUS holoschoenus.

Scirpus culmo tereti nudo; spicis subglobosis, glomeratis, pedunculatis, involucro diphyllo, inaequali, mucronato. LINN. *Syst. Nat.* p. 83. *Spec. Plant.* p. 49. n. 9.

Scirpoides maritimum; capitulis sparsis, glomeratis. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 371.

DIAGN. Scapus semicylindricus, ad basin alatus alba ac folia cohaerente membrana. Spicae glomeratae. Folia teretia.

Habitat circa mare Adriaticum, Tergesti.

Folia prodeunt ex vaginis, quarum margines lacero-ciliati sunt. Capitula rotunda, uno aliove sessili, aliis petiolatis; petiolis angulatis. Squamae florales subrotundae, albido tenuique acumine terminata.

Specimen a SCHEUCHZERO depictum. Tab. VIII. fig. 2. magnum est et polystachium, attamen capitulum unum sessile repraesentat, ut ideo omnes spicae pedunculatae dici minime possint.

62. SCIRPUS setaceus.

Scirpus culmo nudo setaceo; spicis lateralibus, sub-solitariis, sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 83. *Spec. Plant.* p. 49. n. 11. *Fl. Suec.* 2. 45.

Scirpus spicis paucissimis, sub apice culmi conglomeratis. HALL. *Enum.* p. 248. n. 3.

Scirpus omnium minimus; capitulo breviori. TOURNEF. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 358. n. 3.

DIAGN.

DIAGN. *Culmus teres. Spicae oblongae, sessiles.*

Habitat in *Maritimis Carnioliae* paßim.

Culmus nudus, pedalis et longior. Spicae (2—3) lineas longae fusco-rubrae.

63. SCIRPUS glomeratus.

Scirpo-Cyperus, panicula glomerata, e spicis imbricatis composita. SCEUCHZ. Gram. p. 404. descriptio utcumque convenit, sed Fig. 14. Tab. IX. Folium sub panicula nimis erectum exhibet.

DIAGN. *Culmus triquierter, nudus, spicae oblongae, congestae, terminales. Sub spicis folium trigonum fere horizontale.*

Habitat in fossis, circa Cormons.

Culmus pedalis, et altior, mollis, flexilis. Spicae etiam ultra viginti, sessiles, conglobatae, (4—5) lineas longae. Squamae ovatae, concavae. Semen trigonum, vallatum aristis (5—7) rigidis, semine vix longioribus.

22. LINAGROSTIS.

TOURN. I. R. H. p. 664. LUDWIG. D. G. 844
ERIOPHORUM LINN. G. P. 63.

Setulae niveae, tenuissimae, molles e receptaculo germinis ortae, longissimae, distinguunt Genus a SCIRPO.

64. LINAGROSTIS vaginata.

Eriophorum culmis vaginatis teretibus; spica scariosa. LINN. Syst. Nat. p. 84. Spec. Plant. p. 52. n. 1. Fl. Suec. 2. n. 50.

Eriophorum culmo tereti; foliis caulinis vaginalibus; spica erecta, ovata. HALL. Hist. n. 1332.

Iuncus alpinus; capitulo languinoso, seu Schoenolaguros. C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram. p. 302. Tab. 7. fig. 1. 2. 3. Prodrom. p. 26. Tab. 7. Iuncus alpinus etc. I. BAUHIN. Hist. II. p. 514.

DIAGN.

DIAGN. *Culnum teretem terminat globus niveo et bombacino pappo undique tectus.*

Habitat in *Vochein*, sub M. *Private*.

Scapus nudus, striatus, fuscis vaginis ad basin cinctus, terminatus unica spica; cuius squamae imae oblongae, maiores, steriles; superiores vero canaliculatae, lineares, fertiles. Semen trigonum, apice dilatatum.

65. LINAGROSTIS alpina.

Eriophorum culmis nudis triquetris, spica pappo breviore. LINN. *Syst. Nat.* p. 84. *Spec. Plant.* p. 53. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 51.

Eriophorum caule foliisque triquetris; spica pauciflora. HALL. *Hist.* n. 1333.

Linagrostis lunccea alpina; capitulo parvo; tomento rariore. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 305.

Iuncus alpinus, Bombycinus. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Prodr.* Tab. VIII.

DIAGN. *Culmus triqueter. Pappus fluitans penicillum representat.*

Habitat in *Paludibus Labacensibus*, non vero in *Alpibus nostris*.

Radix repens, multicaulis. Culmi semipedales. Spica unica, ovato-oblonga. Semen fuscum, acuminatum.

66. LINAGROSTIS polystachia.

Eriophorum culmis teretibus; foliis planis; spicis Pedunculatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 84. *Spec. Plant.* p. 52. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 49. KRAM. *Austr.* p. 15.

Eriophorum foliis planis; spicis pendulis. HALL. *Hist.* n. 1331.

DIAGN. *Polytachion, palustre, obtusangulum, cernuum, vulgare.*

Habitat in pratis paludofis.

Spicae ovatae, acuminatae. Antherae apice rotundatae,

tae, et integrae. Germen ovatum. Florescentia post medium Aprilis.

Pappus lana, aut goffypio mixtus idem praestat ac pilis Castoris. Vide Cl. GLEDITSCHII *Observ. Oeconom.*

23. NARDUS. *)

LINN. *Gen. Plant.* 65.

Corolla nuda, bivalvis. LINN. GLEDITSCH. foliolo maiore aristato LUDW. utroque ADANS. Spicula uniflora, flores spicati. ADANS. Semen tenue, longum LUDWIG.

67. NARDUS *striata*.

Nardus spica setacea, recta, secunda. LINN. *Syst. Nat.* p. 84. *Spec. Plant.* p. 53. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 52. *Fl. Carniol.* p. 180. IACQUIN. *Austr.* p. 10. BOEHM. *Lips.* 598. HALL. *Hist.* n. 1410.

Nardus foliis capillaceis; spica angustissima, recta; loculis aristatis, uno versu dispositis. GLEDITSCH. ap. BOEHM. *l. c.*

Gramen sparteum, iuncisolum. C. BAUHIN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 90. Tab. 2. fig. 10.

DIAGN. *Folia capillacea. Spiculae heteromallae, graciles.*

Habitat in Alpibus circa Crainburg, et in pratis prope Alpen.

Culmus tenuis, erectus, spithameus. Spiculae (ad 18) aristatae, saepius coloratae secundae, ad angulum obtusum cum culmo positae.

DIGT-

*) GRAMINUM generibus limites certos non ubique posuit industria Linnaeana. Hos ego in sola structura quaerere conabor, cum inflorescentia et numerus partium floris ac fructus non sufficere videantur.

DIGYNIA.**24. PANICUM.**PLIN. ADANS. *Famil. Pl. p. 35.*

Locusta uniflora SCHEUCHZ. Cal. glumae 2 - 3. Setulae 1 - 10. ADANS. Semen subrotundum LUDWIG. Flores spicati TOUR. mutici, hermaphroditi et masculi saepius ex eodem calyce biglumi, seta una aut pluribus involucrati. Corolla bivalvis.

68. PANICUM cynosuroides.

Panicum spica tereti; involucellis unifloris, radiis pilosis. LINN. *Syst. Nat. p. 870. A.*

DIAGN. *Spica simplex. Pedunculi uniflori, simplices setae (ad 12) e basi flosculi singuli.*

Habitat ubique ad vias, in hortis et agris, ad calamitatem usque.

Stupenda res est, plantam vulgatissimam adeo difficultem visam fuisse Viris Clariss. ut Ill. LINNAEUS meminerit huius in posthumis solum operibus, Austriaci vero Botanici ne quidem nominaverint. Certe hoc est GRAMEN paniceum f. PANICUM sylvestre spica simplici. C. BAUHIN. SCHEUCHZERI, TOURNEFORTII, HALLERI, aliorumque, quod I. BAUHINO est PANICUM sylvestre dictum, TABERNEMONTANO GRAMEN paniceum I. cui MATTHIOLUS dedit iconem PANICI cruris corvis ineptam prorsus, et si hac planta nihil frequentius sit in agro Tridentino.

Pedunculi adfixi axi subtrigonae, et repandae, spicam simplicem et teretem faciunt, cui apprime convenit definitio a Cl. GLEDITSCHIO data in *Flora Lipiensi* Celeberr. BOEHMERI n. 605, ubi dicitur

tur PANICUM *spica cylindracea*, *simplici*, *pilosa*, et si caetera synonyma, in eodem numero posita, non hanc plantam, sed aliam speciem indicent, nempe sequentem, quam LINNAEUS inter CYNO-SUROS numeravit. Neque minus plantae nostrae aptari potest *Synon. PANICI spica simplici*, aristis aggregatis, flosculo subiectis, quod Indiae et Virginiae plantae tribuit Cl. GRONOVIUS in *Fl. Virgin.* p. 12. et si Indica planta differat caule ramoso, et hinc etiam polystachio. Tertia glumma in hisce terris non semper adest, et saepe binae sunt, quarum maior trinervis corollam amplectitur; cui petalum unum subbifidum, aliud integrum et acuminatum. Semen transversas rugas gerit. Setae plus minus hispidae sunt.

69. PANICUM vagum.

Hoc nomen omnino meretur.

Cynosurus panicula subspicata; flosculis simplicibus biaristatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 876. *Spec. Plant.* p. 73. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 90.

DIAGN. *Panicula spicam referens, facta pluribus racemulis inferne remotioribus acuminata et aspera.*

An glumae duae tantum moverunt LINNAEUM ut GRAMEN hoc a PANICIS separaverit, et *Cynosurus* adiunxerit? Sed habitus et alia non consentiunt, ut a PANICIS removeatur.

Coniungunt quidam speciem cum priore, sed inflorescentia, habitus, et structura, non consentiunt. Alii denuo confundunt cum PANICO insequente, ut ex icone Matthiolica *Panici sylvestris* clare patet. Monendum denique valvas, quas LINNAEUS vocat aristatas, non semper, apud nos occurrere.

70. PANICUM crus galli.

Panicum spicis alternis coniugatisque, spiculis subdivisis; glumis aristatis, hispidis: rachi quinqueangulari. LINN. *Syst. Nat.* p. 87. *Fl. Suec.* 2. 55.

Panicum spica ramosa, fetis nullis. HALL. *Hist.*
n. 1544.

DIAGN. *Panicula facta pluribus spicis. Glumae muticæ et aristatae.*

Habitat circa hortos et in uidis. Longis aristis donato specimina legi circa Cormons ad fossas.

Panicula etiam semipedalis rachi 4 - 5 angulari. Spicae saepius alternae, axi trigona. Calyx hispidus, coloratus, et excolor; gluma una acuminata et non raro longe aristata.

71. *PANICUM crus corvi.*

Panicum spicis alternis, secundis; spiculis subdivisis; glumis subaristatis, hispidis rachi trigona. LINN. *Syst. Nat.* p. 87. D.

DIAGN. *Paniculae racemi secundi. Rachis communis trigona, partiales setosae.*

Habitat cum priore.

Si data differentia non sufficiens nec constans, coniungenda erit haec species cum priore.

25. DIGITARIA.

HEIST. ADANS. HALL. *Hist. II.* p. 244.

72. *DIGITARIA sanguinalis.*

Panicum Spicis digitatis, basi interiore nodosis; flosculis geminis, muticis; vaginis foliorum punctatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 87. *Spec. Plant.* p. 57. n. 8. IACQUIN. *Austr.* p. 11. *Flor. Carniol.* p. 178.

Digitaria foliis subhirsutis; caule debili; spicis verticillatis; scapo ancipite HALL. *Hist.* n. 1526.

Gramen dactylon; folio latiore. C. BAUHIN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 101. Tab. 2. fig. 2. G H.

DIAGN. *Spicae longae, lineares e summitate caulis annui et ramosi. Flores binati, pedunculati: pedunculo uno longiore, sustinente florem femineum, altero hermaphroditum.*

Habi-

Habitat in hortis passim.

Culmus teres, saepe ramosus, basi procumbens. Folia in margine obscura rubra; vaginis pilosis. Flores secundi in spicas alternas et oppositas longasque dispositi. Spicarum axes subtrigonae: angulo uno, cui flores adpresso adhaerent, obtusiore. Calyx biglumis, glumis bisidis, muticis. Petala subaequalia; uno breviter et inaequaliter bifido. Styli et antherae violaceae. Falsum est semen colligi et pro cibo haberri in Carniola, ut ex MATTHIO-LO narrant GESNERUS et SCHEUCHZ.

Glumis muticis Genere differt ab *Andropogone* LINN.

73. DIGITARIA *dactylon*.

Panicum spicis digitatis, patentibus, basi interiore villosis; floribus solitariis; sarmentis repentibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 87. *Spec. Plant.* p. 58. n. 15.

Digitaria stolonibus teretibus, foliis patulis, glabris; spicis digitatis. HALL. *Hist.* n. 127.

Gramen dactylon; folio arundinaceo, maius. C. BAUHIN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 104. Tab. 2. fig. II. I. ZANNICHEL. *Ven.* p. 166. Tab. 192. n. 2.

DIAGN. *Spicae lineares, terminales; rachi semicylindrica, cuius planae facie adhaerent flosculi alterni solitarii imbricati. Florens flosculos, ex uno latere stigmata et stamina profert, ex altera vero dentem, quem facit gluma patula.*

Habitat in Carniola calidore.

Spicae rigidae, fusco-rubrae. Gluma media iuxta axin spicae collocata, suo apice contingit basin glumae similis flosculi superioris.

26. PHLEUM.

Pedunculi simplices et ramosi, in spicam digesti. Calyx biglumis. Petala bina: uno certe bifido.

74. PHLEUM *pratense*.

Phleum spica cylindracea, longissima. LINN. *Syst.*

Nat. p. 771. *Spec. Plant.* p. 59. n. 1. *Fl. Suec.*
2. 56. BOEHM. *Lipf.* 601.

Phleum caule erecto, spicis cylindricis longissimis,
glumis calycinis oblique truncatis. HALL.
Hist. n. 1528.

Phleum radice nodosa; spica cylindracea, longissi-
milla GLEDITCH. apud BOEHM. *I. c.*
Fl. Carniol. p. 185.

Gramen typhoides, maximum; spica longissima. C.
BAUH. *Pin.* p. 4. n. 1. *Prodr.* p. 10. n. XXV.
cum icon. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 60. Tab. 2.
fig. 5. ZANNICHEL. *Ven.* p. 121. Tab. 144.
SEGUIER. *Veron.* I. p. 349.

DIAGN. *Culmus nodis* (4). *Spica longa, cylin-*
drica. Petalum unum bifidum, aliud integrum.

Habitat in pratis.

Spica etiam uncias quinque longa, spiculae compressae.
Glumae aequales, corolla longiores. Petala parva.
Germen subrotundum, absque nectario.

75. PHLEUM *alpinum*.

Phleum spica ovato - cylindracea. LINN. *Syst.*

Nat. p. 88. *Spec. Plant.* p. 59. n. 2. *Fl. Suec.*
2. 57. JACQUIN. *Austr.* p. 12.

Phleum spicis ovatis, loculis longe bicornibus.
HALL. *Hist.* n. 1529.

Gramen typhoides alpinum; spica brevi, densa et
veluti villosa. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 6.
Prodr. Tab. 3. MONT. *Prodr.* p. 50. SE-
GUIER. *Veron. Suppl.* p. 155. n. 15.

DIAGN. *Glumae villosae, aristatae. Petalum unum*
truncatum, alterum bifidum.

Habitat in Alpibus Carnioliae super, non rarum.

Spica saepius cylindrica, uncialis, et biuncialis SE-
GUIER. Antherae luteolae. Germen ovatum, Pe-
tala duo. SCHEUCHZERI figura bona est.

76. PHLEUM nodosum.

Phleum spica cylindracea; culmo adscendente; foliis obliquis; radice bulbosa. LINN. *Syst. Nat.* p. 88.

Gramen typhoides asperum, alterum. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 62. SEGUIER. *Veron. Suppl.* p. 154.

DIAGN. *Glumae acuminatae, in margine versus apicem denticulatae. Culmis subdecumbens.*

Habitat in *Littorali Austriaco.*

Spica cylindracea.

77. PHLEUM flavum.

DIAGN. *Panicula spicata, flavescens. Glumae aristatae. Petalum unum tridentatum, alterum bifidum.*

Habitat secus agros, circa *Goriziam*, Septembri M. in flore adlatum.

Culmus pallide virens, pedalis, subinfractus. Folia culmi longitudine, duas lineas lata, marginibus albidis. Pedunculi plerique ramosi unciam et biunciam spicam constituunt. Glumae acuminatae, fere aequales, corolla longiores. Petalum maius subovatum involvens aliud bifidum. Filamenta spiculis longiora. Bracteola ovalis sub imis faltem spiculis.

Pro ALOPECURO *Agresti* LINN. habet Cl. SCHREBER. in *Litt.*

78. PHLEUM aegilops.

Aegilops spica ovata; calycibus omnibus triaristatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 671. *Spec. Plant.* p. 1050. *H. Upsal.* p. 301.

Gramen spicatum; durioribus et crassioribus loculis, spica brevi. TOURN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. II. Tab. I. fig. 2.

DIAGN. *Calycina gluma exterior striata, scabra, educens tres aristas rectas, spica longiores; interior paulo brevior, binasque similes aristas efferens.*

Habitat circa *Tergestum*.

Spica oblonga, nec ovalis, facta spiculis sessilibus (3-4.). Calyx biflorus, cum rudimento tertii flosculi intermedii, ut in *MELICA*.

PHLEUM voco ex structura floris; nam sexus vix aliquid probat, modo enim flores hermaphroditi sunt, modo stamna sola videntur, modo germina et stamna desunt.

79. PHLEUM capitatum.

DIAGN. *Culmus nudus, digito vix longior, terminatus spica subrotunda.*

Habitat in summo et difficillimo M. *Grindovitz*.

Cespitus foliorum linearium, semiuncialium, educit culmum unum vel alterum tenuem, duas aut tres uncias longum. Capitulum florale, tres lineas vix longum, sit glomerulis florum sessilium. Calycinae glumae acuminatae, aequales, corolla longiores; quarum una bifida, altera acuminata. In horum sinu latent petala duo, ex his unum et maius bifidum, scabro nervo instructum, e divisura promit aristulam brevem; aliud vero muticum est, bifidum pariter et in margine villosulum. Germen flavicans, subtriquetrum.

80. PHLEUM autumnale.

DIAGN. *Florescentia autumnalis. Spica longa, fastigia pedunculis simplicibus. Calyx breviter aristatus, petalo utroque bifido longior.*

Inveni in M. *Medea*, florens 28 Sept.

Culmi plures ex eadem radice, bipedales, tenues. Folia angusta, glabra, erecta. Spicae duas unicas longae, tenues. Calyx albidus, in acumen aristae-forme attenuatus, fovea flosculos plerumque tres, quibus

quibus folliculus exterior, longior, bifidus, ex divisura brevem aristam proferens; Folliculus alter paulo brevior, pariter bifidus est, muticus, foveatus stylum et stamina tria.

Species haec mihi ab omnibus aliis congenерibus distincta videtur, nec a SCHEUCHZERO vel alio quolibet descripta. Spicis modice coerulescentibus proxime accedit PHLEO *coeruleo*, sed calyces triflori et follicolorum fabrica omnino diversa sunt. Gramen hoc saepius examinavi, et nunc iterum coram habeo, ne increduli habeant pro paradoxo.

81. PHLEUM cristatum.

Cynosurus bracteis pinnatifidis. LINN. *Syst. Nat.*

p. 95. *Spec. Plant.* p. 72. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 88.

Fl. Carniol. p. 185. BOEHM. *Lips.* 637.

Cynosurus involucris pinnatis, retusis. HALL.
Hist. n. 1545.

Cynosurus spica angusta; locustarum fasciculis elongatis, alternis, ad unum latus spectantibus.
GLEITSCH. ap. BOEHM. *l. c.*

Gramen pratense cristatum, seu spica cristata, levi.
C. BAUH. SCHEUCH. *Gram.* p. 79.

Gramen cristatum. I. BAUH. *Hist.* II. p. 468.

DIAGN. *Folium pinnatifidum, fulciens pedicellos binos, sustinentes totidem spiculas unum latus spectantes.*

Habitat in pratis.

Culmus trinodis. Spica attenuata. Spiculae triflorae et quadriflorae. Bracteae laciniae utrinquae (5-6). Petalum maius breviter aristatum, alterum bicorne. Squamulae binae nectariferae ad basin germinis. Antherae rubellae.

27. ALOPECURUS.

LINN. Gen. Plant. 72.

Calyx biglumis, fovea petalum unicum, aristatum LINN. Bifidum ADANS. crista e basi LVDW.

Alopecurus differt ab omnibus aliis graminibus, glumis calycinis monophyllis, corollaceis, cucullatis Cl. SCHREBER. in *Litt.*

82. ALOPECURUS *geniculatus*.

Alopecurus panicula cylindracea; calycibus villosis; arista recta. *Fl. Carniol.* p. 184. n. 2.

Alopecurus culmo spicato, infracto; corollis muticis. LINN. *Syst. Nat.* p. 89. *Spec. Plant.* p. 60. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 60. HALL. *Hist.* n. 1541.

Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum. C. BAUHIN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 72. Tab. 2. fig. 6. C. D. E.

DIAGN. *Culmus infractus*, *Calyces villosi*.

Habitat in uidis circa *Labacum* et *Alpen*.

Culmus adscendens. *Glumae aequales*. Petalum calyce brevius, proferens e basi aristam rectam uno latere denticulatam, spicula longiore. *Antherae ochroleucae*.

28. MILIUM.

TOURN. I.R. H. p. 514. Tab. 298.

Calyx bivalvis, uniflorus. Petala duo, obtusa. Stigmata pennicilliformia. Semen nitens. LINN.

83. MILIUM *paradoxum*. Tab. 1.

Agrostis racemis ternatis, pendulis; spiculis aristatis; arista undulata, longa. *Flor. Carniol.* p. 186.

Milium flosculis paniculatis, aristatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 89. Habitus *MILII*, nec semen reputatur; sed stigmata *AGROSTIS*.

DIAGN.

83. *Milium Paradoxum.*

Tab. 1.



DIAGN. *Panicula laxissima; racemis ternis. Flosculi solitarii, penduli, aristati: aristis repandis, semiuncialibus.*

Habitat in sylvis circa Idriam. Prope viam regiam inter Loitsch et Hipperbabacum Culmi glabri, fere tripedales; nodis tribus, basi subinfractis. Folia basi rubella, semipedalia, lineas (4—5) lata. Panicula valde laxa, spithamam longa. Racemi remoti, ex uno loco (2—5) tenues, undulati, longi. Flosculi in uno racemo non ultra (12.) elliptici, solitarii, pedicellis propriis longis et apice dilatatis, sustentati. Glumae fere aequales, carinatae, tribus lineis striatae, glabrae, corolla longiores. Petala splendida, demum fuscescentia, quasi cartilaginea, venosa; quorum unum ellipticum et terminatum arista repanda ac lineas ($5\frac{1}{2}$) longa, alterum fere aequa longum, acuminatum, muticum, absque duplicatura. Stamina alba; antheris flavis, sed ante explicationem ferrugineis. Styli duo. Stigmata plumosa. Germen nitidum, obpyriforme, glaberrimum, binis squamu- lis septum. Semen ellipticum, nigrum corolla tectum.

Esse MILIUM Paradoxum Ill. LINNAEI docuerunt me specimina visa in ditissimo Herbario Nobiliss. Viri et Consiliarii Aulici Francisci a MYGIND, quae ex seminibus Linnaeanis in Horto Botanico nata sunt, nec non ipse LINNAEUS, qui specimen a me missum determinavit.

29. AGROSTIS.

Calyx bivalvis, uniflorus. Styli papillis hirti. Semen utrinque acuminatum.

84. AGROSTIS *spica venti.*

Agrostis petalo exteriore arista recta, stricta, longissima; panicula patula. LINN. *Syst. Nat.* p. 90. *Spec. Plant.* p. 91. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 62. KRAM. *Austr.* p. 18. BOEHM. *Lips.* 610.

Avenā

Avena monantha, panicula adscendente, multiflora; calyce laevi, florali aristata longissima. HAL. Hist. n. 1480.

Agrostis culmo longissimo; panicula amplissima, sparsa, nutante; gluma exteriore aristam rectam et longissimam emitte. GLEDITSCH. ap. BOEHM. l. c.

Germen segetum; altissima panicula sparsa. SCHEUCHZ. Gram. p. 144 Tab. 3. fig. 10.

Germen agrorum. I. BAUHIN. Hist. II. p. 461.

DIAGN. *Panicula magna, diffusa. Petala bifida: maiore aristato: arista recta et flosculo quadruplo longiore.*

Habitat inter segetes *Carniolae* nimium frequens.

85. AGROSTIS interrupta.

Agrostis petalo exteriore aristato; panicula attenuata, coarctata, interrupta. LINN. Syst. Nat. p. 90.

Germen capillatum; panicula angustiore et interrupta. VAILLANT. Paris p. 88. Tab. 17. fig. 4.

Germen arvense paniculatum; spica interrupta. SCHEUCHZ. Gram. p. 146.

DIAGN. *Panicula contracta. Petala integra: maiore aristato: arista longa, recta, infra apicem prodeunte.*

Habitat in cultis *Carnioliae* calidioris.

Facies et structura omnino alia, ac in *spica venti*, cum qua coniungitur ab Ill. HALLERO.

Figura VAILLANTII bona est, sed flosculus profeminis non bene sumitur. Habitus Paniculae verticillatus.

86. AGROSTIS alpina.

Avena monantha, panniculata; gluma calycina exasperata; arista florali, aequali. HALL. Hist. n. 1477.

Germen

Gramen parvum paniculatum, alpinum; Panicula spadicea, aristatum. SCHEUCHZ. *Gram.* pag. 140. *Prodr.* p. 22. Tab. 4. fig. 1.

DIAGN. *Unum petalum truncatum aut bifidum, e basi promit aristam apice recurvatam.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Gramen hoc quod SCHEUCHZERUS invenit, descripsit, et optime delineavit, cespitosum est; culmis binodiis, vix semipedalibus, rigidis; foliis linearibus; panicula contracta, unciali aut paulo longiore; glumis inaequalibus, viridibus, spadiceis, violaceis aut viridibus, glabris.

Confundi non debet, cum *A. canina*, quae prostrata, crebro geniculata et foliorum setaceorum fasciculis instrueta SCHEUCHZ. Petalum unum adeo parvum est, ut nudo oculo discerni non possit.

87. AGROSTIS capillaris.

Agrostis panicula capillari, patente; calycibus subalatis, aequalibus, hispidiusculis, coloratis; flosculis muticis. LINN. *Syst. Nat.* p. 90. *Spec. Plant.* p. 62. n. 8.

Poa monantha; caule erecto; panicula diffusa; calycibus exasperatis. HALL. *Hist.* n. 1475.

Gramen montanum; panicula spadicea, delicatiore. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 129. Tab 3, fig. 5. B.

DIAGN. *Panicula laxa, mutica. Calyces colorati, subaequales. Petalum alterutrum obtusum.*

Habitat in fiscioribus pratis.

An diversa sit AGROSTIS alba. LINN. etiamnum dubito. Ea certe specimina *A. albae*, quae ex aliis terris obtinui, sola densiore panicula et pedicellis rigidioribus differunt ab *A. capillari*, petalum unum aliquando adeo minutum est, ut vix appareat; unde natus ALOPECURUS panicula capillari, patente; spiculis coloratis, muticis. FL. CARNIOL. p. 184. Aliam graminis huius possideo varietatem, panicula flavescente et glumis transversim rugosis.

Ad-

Adsumptum structurae principium, Gramina quoque sequentia, ad hoc Genus reducit.

88. *AGROSTIS incurvata.*

Ægilops spica subulata, mutica, laevi, incurva; calycibus unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 671.

NARDUS articulata et ÆGILOPS incurva. LINN. *Spec. Plant.* p. 53. 1051.

Gramen loliaceum, maritimum, scorpioides. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 42. *Spicis articulatis.* MORISON. *Hist. Ill. Sect. 8. Tab. 2. fig. 8.*

DIAGN. *Culmus ramosus. Spicae lineares, rigidae; incurvae; articulis (ad 14.)*

Habitat circa *Tergestum.*

Singulo articulo adsidet spicula, cui Calyx biglumis: glumis aequalibus, acuminatis, muticis, unifloris. Petala bina, acuminata, tenuia, calyce duplo breviora; uno bifido. Stamina tria, petalis breviora; antheris fulvis. Germen fulvum; stylis duobus; stigmatibus plumosis. Calycem triflorum et flores masculos hermaphroditis immixtos, in hac specie non invenio.

89. *AGROSTIS aculeata.*

Schoenus culmo tereti, ramoso; capitulis terminalibus; involucro triphylio brevissimo, rigido, partente, LINN. *Syst. Nat.* p. 80.

Gramen album; capitulis aculeatis, Italicum. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 85.

Gramen supinum, aculeatum, I. BAVHIN. *Hist. II.* p. 461.

DIAGN. *Culmus ramosus. Flosculi collecti in capitula terminalia, suffulta vaginis duabus, in longum et rigidum folium attenuatis.*

Habitat in *Austriaco Litorali.*

Culmus rigidus, cum foliis pallide virens. Nodi rubelli e quibus totidem folia digitii longitudine et in apicem

cem rigidum attenuata prodeunt. Culmum ramosque terminant capitula haemisphaerica, fere ut in ERYNGIIS. Flos quilibet constat calyce evidenti, biglumi, rigido, lanceolato, mutico; petalis duobus; seniue oblongo ferrugineo; sed stylus unicus est et stigma simplex. Ergo vel AGROSTIS, vel novum Genus est.

30. SESLERIA.

Fl. Carniol. p. 189.

Cal. bisflorus. Petalam unum bifidum, alterum trifidum; segmento medio longiore. Ad basin germinis nectarium biglume nullum.

90. SESLERIA coerulea.

Sesleria *Fl. Carniol. l. c. loculis trifloris imbricatis, flore tricorni.* HALL. *Hist. n. 1446. Errat. 217.*

Sesleria caerulea ARDUIN. *Spec. 2. p. 18. Tab. 6. TURRA Mont. Bald. n. 20.*

Sesleria ADANSON. *Fam. Plant. P. 2. p. 496.*
Aira foliis planis; spica subovata, densa. IACQUIN.

Austr. p. 15.

Cynosurus bracteis integris. LINN. *Syst. Nat. p. 95. Spec. Plant. p. 72. n. 5. Fl. Suec. 2. 89.*

Gramen glumis variis. C. BAUHIN. *Prodr. p. 21. cum icono, SCHEUCHZ. Gram. p. 83. Tab. 2. fig. 9. A. B.*

DIAGN. *Panicula spicata, demum caerulescens.*

Facies ANTHOXANTHI. Floresentia AIRÆ.

Habitat in locis aridis, floretque circa medium Aprilis. PHLEIS proximum gramen.

31. AIRA.

Quaenam Generis essentia? Bisflorum caly-
cem gerunt etiam AVENÆ nonnullæ, et
SESLERIA nostra. AIRA caerulea calycibus
1-5-flo-

1—5-floris, cuius Generis erit? nonne etiam AVENAE et ARUNDINES *uniflorae* et *multiflorae*. Ego sub AIRAE genere, militare volo.

Gramina, quorum spiculae constant receptaculo sustinente flores plerumque binos, biglumi calyce binisque petalis compositos, quorum utrumque muticum est, aut unicum aristatum: arista minime tortili. Praeterea huic Generi proprium est habere flores hermaphroditos, petalum unum absque duplicatura; et Germen duabus squamulis nectariferis vallatum.

91. AIRA caerulea.

Agrostis racemis solitariis, suberectis; spiculis muticis, pedicello brevioribus. *Fl. Carniol.* p. 186. cum spiculae nostrae pleraequem monanthae sint.

Aira panicula coarctata; floribus pedunculatis, muticis, convoluto-subulatis; foliis planis. LINN. *Syst. Nat.* p. 91. *Spec. Plant.* p. 63. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 67. IACQUIN. *Austr.* p. 14.

Gramen paniculatum, autumnale; panicula ampliore, ex viridi nigricante. TOURN. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 207. idemque est gramen aliud SCHEUCHZERI p. 209. n. 3.

DIAGN. *Florescentia canicularis.* Culmus uno nodo instructus, eoque prope radicem.

Habitat in pratis uidis et siccis.

Rigida et magna panicula gerit flosculos convolutos, numero et colore variantes. Helvetica specimina plerumque biflora sunt, quem numerus naturalem facit III. LINNAEUS Austriaca exemplaria, quae ab Amicis obtinui, glumas habent trifloras, quadrifloras et quinquefloras. Specimen Lipsia missum a CL. SCHREBERO 1—3 floras. Color etiam spicularum iuniorum viridis, florescentiae tempore mutatur in fusco-rubrum, aut fusco-nigrum. BURSER

Amoen.

Amoen. Academ. I. p. 303. aut viridi nigricantem.
TOURNEFORT. Hinc Gramen medium inter
AIRAM et POAM.

92. *AIRA cristata.*

Aira panicula spicata; floribus muticis, pedunculo longioribus; glumis acuminatis inaequalibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 873. *Poa Cristata Syst. Nat.* p. 94. *Spec. Plant.* p. 63. n. 2. *Fl. Carniol.* p. 192. JACQUIN. *Austr.* p. 14. KRAM. *Austr.* p. 18.

Festuca locustis bifloris, mucronatis, confertis imbricatis, paniculatis, in spicam congestis. HALL. *Hist.* n. 1444.

Gramen spica cristata, subhirsutum, C. BAUHIN. *Pin.* p. 3. *Prodrom.* p. 8. n. XIX. cum iconē SCHEUCHZ. *Gram.* p. 166. Tab. 3. fig. 15. SEGUIER. *Veron.* I. p. 354. n. 4. MONT. *Prodr.* p. 56.

DIAGN. *Panicula angusta, pyramidalis, digitum longa, sese expandens florescentiae tempore. Pedicelli spiculis breviores.*

Habitat in pratis siccioribus, collibusque.

Panicula rigidula, absoluta florescentia denuo contrahitur ad instar spicae. Spiculae 2 — 3 floriae, tres lineas longae, vix unam crassae. Calyx inaequalis, corolla longior. Petala mutica. Stamina violacea. Germen obtusum, ovatum, Glumulae nectariferae apice incisae.

Proprius huic est Paniculae albidus ex virore translucens color.

93. *AIRA caespitosa.*

Aira foliis planis; panicula patente; petalis basi villosis, aristatis: arista recta, brevi. LINN. *Syst. Nat.* p. 92. *Spec. Plant.* p. 64. n. 8. *Flor. Suec.* 2. 70. *Fl. Carniol.* p. 191. n. 3. JACQUIN. *Austr.* p. 14.

Avena diantha; panicula amplissima, patula, bicolore, HALL. Hist. n. 1487.

Gramen segetum; panicula arundinacea. C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram. p. 244. Tab. 5. fig. 2. 3.

DIAGN. *Flosculi ad basim villosi; uno sessili, altero pedunculato.*

Habitat in agris, pratis, et alpibus.

Propriæ huic Gramini sunt 1) Panicula magna, sparsa. 2. Spiculae biflorae. 3) Calycis una gluma flori primo aequalis, secundo longior. 4) Petala apicibus denticulatis. 5) Basis flosculi singuli, ut et Pedicellus, denso villo pubescens. His addit LINNAEUS aristam brevem, rectam e basi flosculi, quae tamen non semper adest.

Non bene coniungitur cum AGROSTI *spica venti* a I. BAUHINO, TOURNEFORTIO, SCHEUCHZERO, aliisque.

94. AIRA aquatica.

Aira panicula patente; flosculis muticis, laevibus, calyce longioribus; foliis planis. LINN. Syst. Nat. p. 92. Spec. Plant. p. 64. n. 6.

Gramen miliaceum, aquaticum. SCHEUCHZ. Gram. p. 176. VAILLANT. Paris. p. 89. Tab. 17. fig. 7.

DIAGN. *Culmus binodis. Racemi capillacei. Spiculae spadiceo-virides. Calyces flosculis vix breviores.*

Habitat circa Idriam, prope Fluvium, in sylvosis rupibus.

Panicula laxa, palmaris. Spiculae duplo minores, quam in iconē VAILLANTIL. Petalum internum, ad lentem bifidum.

32. MELICA.
LINN. Gen. Plant. 76.

Nectarium pedunculatum, seu rudimentum tertii flosculi intra flores LINN. Spiculae muticae, ne confundatur cum PHLEO *Aegylope*.

95. MELICA *nutans*.

Melica pedunculis simplicibus; spiculis nutantibus, secundis glabris. *Fl. Carniol.* p. 197.

Melica petalis imberbibus; panicula nutante, simpli- ci. LINN. *Syst. Nat.* p. 92. *Spec. Plant.* p. 66. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 76.

Melica radice repente; panicula spicata, simplici; loculis obtusis, pendulis, uno versu dispositis.

GLEDITSCH. ap. BOEHM. *Fl. Lips.* 614.

Melica flosculis glabris; summo inaequaliter curtato. GMELIN. *Sibir.* I. p. 97. BOEHM. *Lips.* I. c.

DIAGN. *Spiculae imberbes, secundae, pendulae.*

Habitat in montanis Carnioliae, passim.

Gestatio dierum (28). Nectarii pedunculus teres. Stigmata arbusculae similia. Germen receptaculo impositum. Semen lanceolatum, compressum fusco-ferrugineum, obscurioribus punctis variegatum, utrinque acuminatum.

96. MELICA *ciliata*.

Melica panicula spicata; spiculis patentibus; floscu- lo maiore lanato. *Fl. Carniol.* p. 198.

Melica petalis exterioribus ciliatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 874. *Spec. Plant.* p. 66. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 77. nunc flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Syst. Nat.* edit. 12. p. 92.

Gramen avenaceum, lanuginosum HALL. *Enum.* p. 217. n. 24.

Gramen avenaceum; spica simplici; loculis densif- simis, candidantibus et lanuginosis. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 174. *Tab.* 3. fig. 16. G. K. L.

DIAGN. *Flosculus primus externam superficiem longis pilis barbatam habet.*

Habitat circa rupes et muros. In *Districtu Gorizienſi*, circa *Idriam* in *Struk.* in *Vochein* ad *Nomeno*.

Panicula spicata. Calyces glabri. Petalum internum bifidum, et focio duplo brevius. Flos secundus imberbis et saepe sterilis. Semen oblongum, nitens, tenuissime striatum.

I. BAUHINUS iconem suam ex TABERNAEMONTANO defumſit. C. BAUHINI figura in *Prodromo* data spiculas nimium laxas habet. MELICARUM icones Clufianaæ malae sunt, quod mirum fane.

33. CYNOSURUS.

LINN. *Gen. Plant.* 81. *Species petalo non bifido.*

Difſert a PHLEO, folliculis integerrimis.

97. CYNOSURUS *echinatus.*

Cynosurus bracteis pinnato-paleaceis, aristatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 95.

Gramen Alopecuroides; spica aspera. SCHEUCHZ.
Gram. p. 80. *Tab. 2. fig. 8. D.*

DIAGN. *Bracteae pinnatae; pinnis patulis, aristatis, flosculi bini, aristati et excepti calyce bivalvi, subargenteo, mutico, acuminato.*

Habitat circa *Duinum*.

Culmus 4-nodis. Spica uncialis. Bracteae una cum floribus, secundae. Glumae flosculis longiores. Bractearum paleae utrinque (6—8). Folliculus involutus, arcte comprehendens minorem et muticum.

34. POA.

Spicula multiflora, mutica, (nec priorum notae).

98. POA

98. *POA decumbens.*

Poa spiculis trifloris, glabris; pedicellis simplicibus; culmo diffuso. *Fl. Carniol.* p. 192.

Festuca panicula erecta; spiculis subovatis, muticis; calyce flosculis maiore; caule decumbente.

LINN. *Syst. Nat.* p. 97. *Spec. Plant.* p. 75. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 92.

Festuca locustis teretibus, muticis, octifloris; flosculis alternis imperfectis, HALL. *Hist.* n. 1434.

Gramen montanum, avenaceum; locustis muticis, tumentibus, pilosum. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 170.

DIAGN. *Culmus adscendens. Panicula uncialis, rara, contracta. Spiculae 3-4-florae.*

Habitat in pratis siccioribus.

Culmi infraesti, pedales; articulis tribus. Foliorum vaginae pilosae. *Panicula* erecta, subspicata, sustinens spiculas raro ultra septem. Pedunculi imi duas spiculas, alii unicam gerunt. Spicula lineas (3—4) longa, unam crassia, pallide virens. Glumae aequales, floribus longiores. Petala basi pilosa, mutica: maiore tridentato, minore bifido. Semen ovatum flavescent, compressum, glabrum, setulis duabus aut tribus ad basin instructum.

99. *POA trivialis.*

Poa spiculis trifloris, basi pubescentibus; glumis aequalibus. *Fl. Carniol.* p. 193. n. 2.

Poa panicula diffusa; spiculis trifloris, basi pubescentibus; culmo erecto, tereti. LINN. *Syst. Nat.* p. 93.

Eadem structura est Graminis alterius, quod *Poa* spiculis quinquefloris; ovatis; flosculis lanuginosis; culmo tereti. *Fl. Carniol.* p. 195. n. 7.

Poa panicula diffusa; spiculis quadrifloris, pubescentibus; culmo erecto tereti. LINN. *Syst. Nat.* p. 874. *Spec. Plant.* p. 67. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 81.

DIAGN. *Lanugo ad basin petali exterioris.*

Habitat ubique in pratis.

Adducta Synonyma satis indicant notissimum Gramen, ut amplius describi necesse non sit. POA M quoque triviale ab angustifolia diversam non esse, nullum fere dubium est.

100. *POA pratensis.*

Poa spiculis trifloris, glabris; glumis inaequalibus.
Fl. Carniol. p. 193. n. 3.

Poa panicula diffusa; spiculis trifloris. LINN.
Spec. Plant. p. 67. n. 5. quinquefloris glabris;
culmo erecto tereti. LINN. *Syst. Nat. p. 93.*

Poa panicula diffusa; locustis trifloris glabris. HALL.
Hist. n. 1465.

Poa panicula diffusa, amplissima; locustis muticis,
ovatis, compressis et villosis. GLEITSCH.
ap. BOEHM. *Lips. 632.*

Gramen pratense paniculatum, maius. C. BAUHIN.
SCHEUCHZ. *Gram. p. 177. Tab. 3. fig. 17. A.*

DIAGN. *Panicula diffusa. Spiculae 2-3-florae;*
glumis inaequalibus: lanagine nulla.

Habitat in pratis fertilioribus.

Lanae defectus, non vero numerus floscularum, distinguunt hanc speciem a priore.

101. *POA dura.*

Cynosurus spiculis alternis, secundis, sessilibus, rigidis, obtusis, oppressis. LINN. *Syst. Nat. p. 95.*
Spec. Plant. p. 72. n. 4.

Gramen arvense; polypodii panicula crassiore. BABELLIER. *Tab. 50.*

DIAGN. *Spiculae 2-4-florae, imbricatae, secundae, in duas series spicatim ordinatae.*

Habitat Tergesti, iuxta vias, in aridis.

Radix est iuba composita radiculis plurimis albidis.
Culmi multi, digitum longi, rigidi, super terram rosacee

facee saepius diffusi. Folia superiora longiora. Spica floralis recta, rigida, facta spiculis imbricatis duris compressis lanceolatis. Calyx muticus, glaber, petalis brevior, glumis inaequalibus. Petala inaequalia; uno obtuso, altero acuminato. Germen oblongum. Styli (2—3). Semen ferrugineum, utrinque acuminatum, uno latere connexum, alio angulatum. Flos tertius aut quartus, saepe incompletus. Planta adulta, tota spadicea est.

BARRELLIERII figura bona est, sed nimis erecta; Charakterem vero **CYNOSURI** non invenio.

102. *Poa annua*.

Poa spiculis quinquefloris, ovatis; culmo compresso.

Flor. Carniol. p. 195. n. 8.

Poa panicula diffusa; angulis rectis; spiculis obtusis; culmo obliquo, compresso. LINN. *Syst. Nat.* p. 93. *Spec. Plant.* p. 68. n. 6. *Fl. Suec.* 2. 38.

Poa culmo infracto; panicula triangulari; loculis trifloris, glabris. HALL. *Hist.* 1466.

Gramen pratense paniculatum, minus. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 189. Tab. 3. fig. 17.

DIAGN. Culmus semiprocumbens, compressus, ex annua radice.

Habitat passim in pratis hortisque.

Flosculi nunc virides, nunc rubore suffusi. Spiculae 4-5-florae, vere floridae. Styli albidi. Germen ovatum, absque glumulis nectariferis.

103. *Poa bulbosa*.

Poa panicula secunda, patentissima; spiculis quadrifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 83. *Spec. Plant.* p. 79. n. 17.

Poa foliis bulbosis; panicula diffusa; loculis quadrifloris: folliculis subvillosis. HALL. *Hist.* n. 1461.

DIAGN. *Culmi et foliorum radicalium bases tuberosae.*

Habitat in herbidis et pascuis.

Data differentia huic vere essentialis, nec alia certior.
Flosculi, in terris hisce plerique steriles occurunt et
foliolo terminati, quae facies est POAE spiculis qua-
drifloris, flosculis superioribus foliolo terminatis.
Fl. Carniol. p. 194. n. 6. GRAMINIS arvensis, au-
gustifolii, panicula densa, foliacea; foliis in panicu-
la angustissimis. SCHEUCHZ. Gram. p. 211.
GRAMINIS arvensis &c. C. BAUHINI Prodri.
p. 6. nec non GRAMINIS cum panicula molli ruben-
te. I. BAUH. Hist. II. p. 464.

104. POA compressa.

Poa panicula coarctata, secunda; culmo obliquo,
compresso. LINN. Syst. Nat. p. 93. Spec. Plant.
p. 69. n. 15. Fl. Suec. 2. 84.

Poa culmo compresso declinato; loculis distichis,
sexfloris. HALL. Hist. n. 1455.

Gramen paniculatum; radice repente; culmo com-
presso; loculis distichis, pulchellis. SCHEUCHZ.
Gram. p. 198.

DIAGN. *Panicula rigida, erecta, angusta; spiculis lanceolatis, secundis, 6-8-floris.*

Habitat in siccis Austriaci Littoralis.

Scapi vix semipedales, duri, modice compressi, foliosi.
Folia angusta, glabra, longitudine paniculae. Pan-
icula fit racemis eo minoribus et invicem minus re-
motis, quo magis a radice distant. Primi racemi
gerunt spiculas ad (4). Glumae flosculis breviores,
muticae. Petala mutica acuminata; interioris mar-
gine denticulato. Antherae fulvae.

Graminis huius ramosa varietas est POA spiculis se-
ptemfloris; foliis glabris; culmo ramoso. Fl. Car-
niol. p. 196. n. 9.

105. POA aquatica.

Poa panicula diffusa; spiculis sexfloris, linearibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 92. *Spec. Plant.* p. 67.

n. 1. *Fl. Suec.* 2, 78. IACQUIN. *Austr.* p. 15.

G MELIN. *Sibir.* I. p. 105. BOEHM. *Lipf.* 633.

Poa altissima; foliis latissimis; panicula amplissima; locustis distichis, multifloris. HALL. *Hist.* n. 1454.

Poa culmo longissimo; panicula ramosa, pedali; locustis imbricatis, distichis, sexfloris, muticis.

GLEBITSCH. ap. BOEHM. l. c.

Gramen palustre paniculatum, altissimum. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 191.

DIAGN. *Panicula maxima, erecta rigida. Pedicelli flexuosi. Spiculae sexflorae, petalum exterius striatum.*

Habitat in aquosis.

Panicula spadiceum colorem demum acquirit. Spiculae non bene dicuntur lineares, sed potius lanceolatae, quas pinxit etiam SCHEUCHZERUS. Ex TABERNEMONTANO exscripsit Editor *Historiae I. BAUHINI.*

106. POA fluitans.

Poa spiculis decemfloris, teretibus, rachi adpressis; racemis binatis, secundis, patulis. *Fl. Carniol.* p. 196. n. 12.

Festuca panicula ramosa, erecta; spiculis subseffiliibus, teretibus, muticis. LINN. *Syst. Nat.* p. 97. *Spec. Plant.* p. 75. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 95.

Poa locustis teretibus, multifloris; glumis floralibus; exterioribus truncatis, interioribus bifidis. HALL. *Hist.* n. 1453.

Gramen aquaticum, fluitans; multiplici spica. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 199. Tab. 4. fig. 5.

DIAGN. Culmus basi ramosus, ex imis geniculis radicatus. Panicula sparsa. Spiculae teretes. Calyces albidi, polyanthi: flosculi (ad 12).

Habitat in aquosis et circa lacus.

Culmus basi procumbens bene pingitur a I. BAUHIL NO Hist. II. p. 490. Panicula foliis longior. Spicula rachi adpressae. Glumae inaequales. Petalum unum tridentatum: dente medio longiore. Antherae luteolae. Styli duo, stigmata ramosa.

Germen teretiusculum, striatum, obtusum, apice albis villis pubescens. Glumulae neectariferae nullae.

107. *Poa Phoenix.*

Poa spiculis octofloris, teretibus compressis, pendulis. Fl. Carniol. p. 196. n. 10.

Gramen loliaceum; panicula multiplici et spicata.

TOURNEF. SCHEUCHZ. Gram. p. 200. Phoenix multiplici spicata panicula. PARK. Th. 1145.

DIAGN. Panicula laxa; racemis binatis, nutantibus. Spiculae quales in BROMO PINNATO, sed breviores. Petala aequalia: interiore bifido.

Habitat in pratis, minime rara.

Culmus bipedalis et longior. Panicula etiam semipedalis. Racemi laxi, flacci.

In uno racemo spiculae raro ultra quatuor lineas (9-10.) longae. Glumae inaequales, floribus breviores.

Germen obtusum, duabus glumulis vallatum. Variat Spiculis 4-5-floris et 14-floris, nec non panicula erectiore magisque contracta.

108. *Poa nemoralis.*

Poa panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. LINN. Syst. Nat. p. 93. n. 16.

Poa culmo debili; panicula nutante, locustis-bifloris; folliculis subvillosis. HALL. Hist. n. 1469.

DIAGN. Panicula laxa. Spiculae parvae.

In Kubillae saxis, prope Idriam.

Cul-

Culmus pedalis, tenuis. Panicula palmaris, laxa. Spiculae pauciflorae, acuminatae non scabiae.

35. BRIZA.

LINN. *Gen. Plant.* 78.

Spicula basi emarginata; reliqua POAE.

109. BRIZA media.

Briza spiculis septemfloris, ovatis. *Fl. Carniol.* p. 198.

Briza spiculis ovatis; calyce flosculis breviore.

LINN. *Syst. Nat.* p. 94. *Spec. Plant.* p. 70.
n. 2. *Fl. Suec.* 2. 86.

Poa petiolis tenuissimis; locustis ovatis. HALL.
Hist. n. 1448.

Gramen tremulum, maius. C. BAUH. SCHEUCH-
ZER. *Gram.* p. 204.

DIAGN. *Calyces septemflori. Culmus nodis (5)*
tribus prope radicem. Racemi binati, undulati.

Habitat paßim in pratis.

Glumae ovatae carinatae. Petalum minus ovatum, bi-
fidum, duplicatura instructum. Antherae fusco-ru-
brae; apicibus flavicantibus: polline luteo. Germen
apice bifidum. Styli duo plumosi; calyce longia-
res. Germini adiacet nectarium uniglumae.

110. BRIZA eragrostis.

Briza spiculis lanceolatis; flosculis viginti. LINN.

Syst. Nat. p. 94. *Spec. Plant.* p. 70. n. 4.

Poa locustis distichis, decemfloris; calycibus acutis.
HALL. *Hist.* n. 1450.

Gramen paniculis elegantissimis, five 'Εραγρόσις,
maiis. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.*
p. 194. Tab. 4. fig. 4.

DIAGN. *Culmus ascendens. Spiculae lanceolatae;*
flosculi plures quam (12).

Habitat circa Goriziam et Tergestum.

Culmus saepe ramosus. Panicula rigidula; racemis
oppositis et alternis. Spicularum figura fere eadem,
quae

quae spicarum CYPERI Flavescentis. Numerus florū varius, nam in Austriacis exemplaribus, coram habeo (15), in Carniolici (20); in Italici plures. Semen rotundum, flavicans, reticulato-rugosum.

36. BROMUS.

GRAMINA polyantha mutica ab aristatis dividere potui, **FESTUCAS** vero et **TRITICA** ^a **BROMIS** notam aliquam, quae vere distinguat, invenio nullam. Coniungam itaque haec tria Genera in unum, cum idem sit, five Ordines accurati militent sub uno vexillo Generis naturalis, five Ordo quilibet proprium Genus constitutus, dummodo cognitio specierum difficilior non reddatur. Character itaque **BROMI** erit spicula multiflora, plus minus aristata; flosculis omnibus hermaphroditis.

(*) **FESTUCAE, PANNICULATAE.**

(*) *Arista terminali.*

III. BROMUS glomeratus.

Poa spiculis quadrifloris, glomeratis, asperis; ramis solitariis. *Fl. Carniol.* p. 194. n. 5.

Bromus locustis tetranthis, fasciculatis, imbricatis. *HALL. Hist.* n. 1512.

Dactylis panicula secunda, glomerata. LINN.
Syst. Nat. p. 95. *Spec. Plant.* p. 71. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 86. nunc *CYNOSURUS*.

Gramen spicatum; folio aspero. C. BAUH. *Pin. 3.*
Prodr. p. 9. cum iconē. SCHEUCHZER,
Gram. p. 299. *Tab. 6. fig. 15.*

Gramen asperum. I. BAUH. *Hist.* II. p. 467.

DIAGN. *Spiculae quadrijlorae, glomeratae, asperae.*

Habitat in pratis siccioribus et iuxta vias.

Attributa Graminis huius sunt; 1. Nodi in culmo (5).
2. Folia in culmo tria; vaginis ancipitibus et villo-sis.

sis. 3. Racemi solitarii, rigidi. 4. Tumor calosus inter culmum et racemum primum. 5. Racemus primus, florescentiae tempore, horizontaliter patens, dein deflexus. 6. Spiculae secundae, asperae, compressa, glomeratae, 3.4-florae. 7. Petala bifida, maiore e divisura aristulam proferente. 8. Florescentia circa medium M. Iulii. A. POA remouet petalum unum aristatum, a CYNOSURO calyx multiflorus, et bractee defectus, a DACTYLI calyx acutissimus. ZANICHELIUS pro icone Graminis huius, CARICEM nescio qualem, proposuit, et male dicitur spicatum a C. BAUHINO, Gramen adeo evidenter paniculatum.

112. BROMUS ovinus.

Festuca panicula secunda, coarctata, aristata; culmo tetragono, nudiusculo; foliis setaceis. LINN.
Syst. Nat. p. 96. *Spec. Plant.* p. 73. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 91.

Festuca foliis perangustis; panicula stricta. HALL.
Hist. n. 1441. 1442.

Gramen foliolis iunceis, brevibus, maius; radice nigra. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 279. Tab. 6. fig. 8.

DIAGN. Culmus tenuis, erexitus. Folia setacea. Panicula coarctata, erecta; racemis solitariis. Calyx flosculis brevior. Petalum interius bifidum. Semen coloratum. Styli in lanam fatiscentes.

Habitat in pratis, pascuis, et alpibus.

VAR. 1. *Calycibus trifloris.*

In Pascuis, et ex *Austria* missus.
Culmus binodis, teretiifculus. Panicula uncialis spiculae virides, cum rudimento quarti flosculi. Petalum externum acuminatum, subaristatum.

2. — *quadrifloris.*

In M. Grindovitz.

Culmus subangulatus. Panicula biuncialis,
flavicans, Petalum muticum.

VAR. 3. Calycibus 4-5-floris.

In Carniolia non rarus, et ex Austria missus.
Panicula biuncialis, laxior. Spiculae pallide
virentes et rubore aliquo tinctae. Petalum
aristatum; arista aequante longitudinem al-
terius petali.

— 4. — *quinquefloris.*

In Carniolia et ex Austria.

Culmus teres. Panicula triuncialis. Gluma-
rum apices rubri. Petali arista lineam longam.

— 5. — *5-6-floris.*

Apud nos frequens.

Petalum subaristatum.

— 6. — *sexfloris.*

In Carnioliae pratis fuccis.

Culmus uno nodo instructus, supra medium
una cum pedicellis violaceo-ruber.

Arista petali duas lineas longa.

— 7. — *6-7-floris.*

In Alpibus.

Culmus trinodis, teretiusculus. Petalum mu-
ticum.

— 8. — *septemfloris.*

In M. Grindovitz.

Culmus teres, pedalis et longior, Panicula
triuncialis. Spiculae pallide virides.

Gramen SCHEUCHZERI iuncifolium primum, va-
rietati 3 proximum; secundum et tertium 4tae, quar-
tum et quintum 3tiae.

113. BROMUS sterilis.

Bromus panicula nutante; pedunculis simplicibus;
arista pedalis longiore. Fl. Carniol. p. 203. Sed
Linneana Synonyma aliam plantam indicant.

Bromus panicula patula; spiculis oblongis, distichis,
glumis subulato-aristatis. LINN. Syst. Nat.
p. 97. Spec. Plant. p. 77. n. 5.

Bro-

Bromus panicula nutante; locustis septifloris; glumis argute lanceolatis, lineatis, subhirsutis.
HALL. Hist. n. 1505.

Gramen avenaceum; panicula sparsa; locustis majoribus et aristatis. SCHEUCHZER. Gram. p. 258. Tab. 5. fig. 14.

Aegilops I. MATTHIOL. Diosc. p. 746. I. BAUHIN. Hist. II. p. 439.

DIAGN. *Spicula, una cum suis aristis, duas uncias longa, septemflora, e longo tenui et ancipiti pedunculo pendens. Arista uncialis, petalo proprio longior.*

Habitat circa hortos et vias.

Calmus cubitalis. Folia superne villosula. Panicula foliis caulinis longior, nutans.

Pedunculi longi et saepe indivisi paniculam constituunt. Aristae apex demum ruber. Petalum minus bifidum, ciliatum, longitudine glumae minoris. Antherae flavae. Germen ovatum, apice pubescens. Nectarium biglume, germen ambiens.

114. BROMUS strictus.

DIAGN. *Spiculae 2-3-florae, axi adpressae, Petalum exterius bifidum, e medio aristatum, interior muticum, bipartitum.*

Inveni 2. Octobr. In colle Medeae.

Culmi bipedales, diffusi, vix lineam crassi. Folia refracta, vix biuncialia. Panicula 2-3-uncialis, laxa, rigida. Racemi ad angulum rectum cum rachi communi, pauciflori, plerumque simplices. Spiculae 2-4-lineas longae, violaceo viridiisque colore tintae, glabrae. Cal. biglumis, muticus, petalis minor. Descriptionem non invenio.

(**) *Arista dorsali.* BROMI LINN.

115. BROMUS polymorphus.

DIAGN. *Vaginae foliorum villosae. Nodi fascia atro-rubra notati. Spiculae teretes, lanceolatae,*

tae, crassae. Calyx longitudine petali primi. Glumae et petala striata. Petalum internum truncatum, ciliatum.

Habitat in Arvis, pratis, et circa vias.

Inter BROMOS Linnaeanos, *secalinum*, *squarrosum*, *hordeaceum*, *arvense* et *tectorum* certos limites non invenio; Nam 1. GRAMEN *avenaceum arvense*, *glumis non villosis*, et *veluti compressis*. RUPPII coniungit BROMUM *squarrosum* cum *arvense*. 2. Ill. HALLER, qui specimina Graminum Scheuchzerianorum. 4. 5. *Histor. Gram.* p. 253. 254. coram habuit, minima diversa esse docet. 3. Ill. LINNAEUS ipsem in *Syst. Nat.* coniunxit BROMUM *Secalinum* cum *Hordeaceo*. 4. BROMUS *secalinus*, non alia certiore nota differt a *squarroso*, quam aristis erectis, quae in hoc patentiores sunt, sed hoc discriminis insufficiens est, nam si spiculae muticae et aristatae in eodem Gramine SCHEUCHZERI p. 253. n. 4. reperiuntur, nec situs aristae sufficere poterit ad specierum distinctionem, cum ego in eadem specimine BROMI *squarroso* viderim aristas, etiam erectas et inflexas. 5. Habitus Paniculae plus minus contractae, pendet unice a loco natali, et cultura mutari potest. 6. In BROMO *secalino* spiculae non sunt ovatae, nec lineares in B. *tectorum*, sed omnino lanceolatae. 7. Omnibus dictis Bromis praeter notas in Diagnosi dictas, proprium est gerere culmum crassis nodis, et foliis quatuor instructum, Petala aequalia bifida, Petalum internum planum marginatum et absque duplicatura, Antheras flavae demum ferrugineas, Nectarium biglume, setaceum ad basin germinis.

116. BROMUS giganteus.

Bromus panicula nutante; racemis secundis, binatis; spiculis quadrifloris, fluitante aristा brevioribus. *Fl. Carniol.* p. 205. n. 16. Specimen glabrum.

Bro.

Bromus panicula nutante; racemis binatis; spiculis sexfloris; petalo minore, glumis breviore *Fl. Carniol.* p. 206. n. 18. Varietas pilosa.

Bromus panicula nutante; spiculis quadrifloris, aristis brevioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 97. *Spec. Plant.* p. 77. n. 9. *Fl. Suec.* 2. 99.

Bromus glaber; locustis quadrifloris, nutantibus; longissimis. HALL. *Hist.* n. 1510.

Gramen Bromoides, aquaticum, latifolium; panicula sparsa, tenuissime aristata. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 264. HALL. *Enum.* p. 209 n. 2. 4.

Gramen sylvaticum. VAILLANT. *Paris.* Tab. 18. fig. 3.

DIAGN. *Gramen sylvestre, magnum, latifolium;*
panicula sparsa.

Habitat in uidis et umbrosis, Iunio florens.

V A R. 1. *glabra et minor.*

Culmus tripedalis, levis, nodis foliisque tribus etc. Folia glabra, spithamea semiunciam fere lata. Panicula semipedalis; racemis patentibus solitariis et binatis, ultra duodecim spiculas raro gerentibus. Spiculae 4-5-florae, lineas quatuor longae, unam crassae. Glumae inaequales, corollis breviores. Arista lineam longa. Antherae rubellae. Nectarium biglume.

— 2. *villosa et maior.*

Culmus humanae statura, calami scriptorii crassitiae; nodis sex. Foliorum vaginae pilosissimae; binis denticulis albidis, culmum amplexantibus. Panicula magis nutans, maior. Racemi binati, gerentes spiculas raro plures quam septem, Petalum externum villosulum. Aristae longitudo eadem, quae petali bifidi.

117. *BROMVS montanus.*

Bromus panicula suberecta; pedicellis simplicibus, distichis: arista petali longitudine. Fl. Carniol. p. 205. n. 15.

Bromus glaber, panicula nutante; locustis quadri-floris; glumis subhirfutis. HALL. Hist. n. 1506.

Gramen Bromoides, montanum, hirsutum; panicula minus sparsa, corniculata. SCHEUCHZ. Gram. p. 263. hoc pertinere videtur.

DIAGN. *Panicula potius contracta. Gluma maior et petalum aristatum tribus lineis eminentibus striata; media scabra. Arista longitudine petali proprii.*

Habitat in montibus circa Idriam.

Panicula uncias tres et quatuor longa, erecta, non diffusa. Pedunculi ramosi et simplices ex eodem verticillo. Spiculae 5-6-florae, per aetatem rufescentes, angustae ut in *BROMO sterili*, sed breviores. Calyces acutissimi, mutici, inaequales, Petalum interius bifidum, calyce nihilo brevius, ciliatum. Gerumen apice dilatatum, glabrum, coronatum villis.

118. *BROMUS pinnatus.*

Bromus spiculis subsessilibus, alternis, teretibus, patulis. Fl. Carniol. p. 201. n. 5.

Bromus culmo indiviso; spiculis alternis, subsessilibus, teretibus, subaristatis. LINN. Syst. Nat. p. 98. Spec. Plant. p. 78. n. 10. Fl. Suec. 2. 109.

Triticum spicis distichis, locustis teretibus, hirsutis, aristatis, duodecimfloris. HALL. Hist. n. 143¹. Gramen spica Brizae, maius. C. BAUHIN. Prodr. p. 18.

DIAGN. *Spiculae longae, teretes; brevibus pedicellis.*

Habitat in pratis.

Spicu-

Spiculae unciam longae 12-18-florae. Flosculi puncto fuso signati, imbricati. Petala aequalia. Germen obcordatum. Nectarium biglume.

Gramen C. BAUHINI huc omnino pertinet, sed hoc ipsum SCHEUCHZERUS diversum facit a Gramine *Loliaceo corniculato* TOURNEFORTII.

Species haec coniungit BROMOS paniculatos cum spicatis.

(**) TRITICA. SPICATA.

119. BROMUS villosus.

DIAGN. Flosculi aristati. Receptaculum villosum.

VAR. 1. Spiculis 6-7-floris; petalo aristato, glumis longiore.

Triticum radicibus repentibus, vaginosis; foliis hirsutis; loculis octofloris. HALL.
Hist. 1427.

Gramen latifolium; spica triticea, compacta. C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram.

p. 4.

Habitat secus vias in Carniola caldiore.

Culmus humanae quoque statura. Spica semipedalis. Petali arista semiuncialis, aut brevior, quale specimen Labaco misit P. WULFEN.

Eandem Plantam Lipsia misit Cl. SCHREBERUS cum nomine ELYMI canini LINN. cum vero careat involucro multiferto ELYMI canadensis, ac Genuinum gerat BROMI characterem, sic aliam sedem dare nolui.

— 2. Spiculis 10-12-floris; culmo nodis vaginisque pilosis.

Gramen spica triticea compacta, hirsutum, aristatum. SCHEUCHZ. Gram. p. 9.

n. 7.

Habitat prope aquae ductus Idrienses.

Spica semipedalis. Gluma maior interiore petalo longior. Arista terminalis, petalo pro-

prio longior. Petalum internum truncatum; marginalibus nervis in brevem aristam exentibus. Nectarium biglume; apice ciliatum.

Huc pertinet *BROMUS distachyus* LINN, iuxta specimem missum a Cl. SCHREBERO.

VAR. 3. *Spiculis subquadrisporis, breviter aristatis.*

Gramen tritici spica muticae simili, angustifolium. SCHEUCHZ. Gram. p. 7.

Habitat in agris.

Gramen Tritici statura; nodis sex. Folia semipedalia, tres lineas lata. Spica quatuor uncias longa. Spiculae 3-4-florae. Calyx muticus. Petalum maius lineas quatuor longum, brevi arista terminatum.

120. *BROMUS glaber.*

DIAGN. *Flosculi submutici. Receptaculum glabrum.*

VAR. 1. *Spiculis trifloris.*

Bromus spiculis sessilibus, alternis, trifloris, calyce brevioribus. Fl. Carniol. p. 199. n. 1.

Triticum calycibus subulatis, trifloris, acuminatis. LINN. Syst. Nat. p. 880. Spec. Plant. p. 86. n. 6. Fl. Suec. 2. 114.

Triticum radicibus repentibus, vaginosis; foliis hirsutis; loculis quinquefloris. HALL. Hist. 1426.

Gramen caninum arvense, f. Gramen *Discoridis.* C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram. p. 5. n. 2.

Habitat in et circa hortos.

Glumae trinerves. Petala aequalia. Germen in apice, et lateraliter supra medium villis pubescentes. Nectariferae glumulae apice denticulatae.

— 2, *Spiculis quinquefloris.*

Habitat in cultis.

Caly-

Calycina gluma petalo maiori aequalis. Petalum maius trinerve, aristula terminatum.

121. *BROMUS truncatus.*

DIAGN. *Spiculae muticae septemflorae; calycibus petalisque truncatis.*

Habitat in *Austriaco Litorali*, et ex *Austria* quoque missus ab *Eruditissimo a MYGIND.*

Spicae longitudo quae in *BROMI villosi Var. I.* Spiculae remotae, muticae. Glumae oblique truncatae. Petala bifida, planiuscula. An hic *TRITICUM iunceum LINN.*? Numerus florum in hoc Genere fallacissimus. Solus situs spicularum distinguit *TRITICA a BROMIS.*

37. *STIPA.*

LINN. *Gen. Plant.* 84.

Aristae longissimae, basis inarticulata apicem petali maioris.

122. *STIPA pennata.*

Stipa aristis lanatis. LINN. *Syst. Nat.* 98. *Spec. Plant.* p. 78. n. 1. *Fl. Carniol.* p. 187. KRAM. *Austr.* p. 23. IACQUIN. *Austr.* p. 15. HALL. *Hist.* n. 1514.

Festuca iunceo folio. C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 151. Tab. 3 fig. 13.

Aegilops IV. TABERNEM. p. 545.

DIAGN. *Arista etiam semipedalis, undique emitens pilos albos tenuissimos, patulos.*

Habitat in *M. Nanas*, circa *Pottgueib*, *Lipputtam*, et in *Karrschia*.

E primo paniculae articulo racemi duo, ex aliis unicis oritur, idemque ut plurimum simplex. Glumae glabrae, attenuatae in aristam. Petalum maius apice glabrum est, alibi villosum, aristatum. Aristae ad basin contorta est funiculi adinstar, dein fle-

Etitur ad latus, ac demum erigitur et villos emitit. Plumosa pars aristae, totius paniculae longitudinem faepius adaequat, pars vero imberbis duplo certe brevior est.

123. STIPA iuncea.

Stipa aristis nudis rectis; calycibus semine longioribus; foliis intus laevibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 98. *Spec. Plant.* p. 78. n. 2. IACQUIN. *Austr.* p. 13. HALL. *Hist.* n. 1513.

Festuca glumis unifloris; aristis longissimis. G. M. LINN. *Sibir.* I. p. 114. charactere generico latoni-
mis. BOEHM. *Lips.* 644. cum in congrua ci-
tatione I. BAUHINI.

Festuca iunceo folio. C. BAUH. SCHEUCHZ.
Gram. p. 151.

Aegilops IV. TABERNEM. p. 545.

DIAGN. *Panicula exit e folio convoluto, tanquam ex spatha. Petalum basi lanatum. Arista pilis desituta.*

Rarior in his terris.

Arista in hac specie, basin minus contortam et potius semicylindricam habet, et caret illa flexura, quam su-
perior portio aristae prioris speciei habet.

38. AVENA.

LINN. *Gen. Plant.* 85.

Arista e dorso corollae articulata, intorta,
constituit essentialem characterem. LINN.
Flores omnes hermaphroditi; hinc *Avena Ela-*
tior LINN. ad *Holci* Genus amandanda, vi
methodi sexualis.

124. AVENA pilosa.

Gramen hoc essentialem suum characterem mirifice
occultat. Statura spicularum et numerus floscu-
lorum non sunt notae constantes, sed mutabiles a
climate

climate et loco natali. Arbitror itaque AVENAM flexuosam, flavescentem, satuam, pratensem, nudam et fragilem. Celeberr. LINNAEI, non esse species distinctas, sed ad uniam commode reduci posse. En rations 1. Omnibus his suppositis speciebus hae notae communes sunt. Panicula erecta, non adeo longa, racemis et pedicellis tenuibus. Calyx coloratus, nitidulus. Receptaculum pilosum. Petalum maius apice incisum, et e dorso proferens aristam tortilem, infractam, flosculo duplo longiorem. 2. AVENA flexuosa, biflora, flavescens et satua subtriflorae, pratensis. 3-5-flora, nulla et fragilis subquadriflorae. 3. AVENAE pratensis flosculos LINNÆUS numerat quinque, SCHEUCHZERUS (2—5), HALLERUS tres, Ego tres et quatuor, aut tres, cum rudimento quarti flosculi, et tunc receptaculum cum longius esse debeat, ita calyceum ut excedat oportet. 4. Conferantur horum Graminum Descriptiones et icones SCHEUCHZERIANAE, et patebit, non aliter inter se diffrerentia, quam statura spicularum et numero flosculorum. An vere diversa AVENA pensylvanica LINN.? certe specifica differentia non prodit verum discriminem, et in Herbario Eruditissimi MYGINDI vidi specimen idem prorsus quod SCHEUCHZERUS pinxit in Tab. 5. fig. 1. et a LINNAEO habetur pro AVENA satua, loco AVENAE pensylvanicae positum.

39. ARUNDO.

SCHEUCHZ. LINN. Gen. Plant. 87.

Pappus simplex, intra florem, s. lana cinctum. GLEDITSCH.

125. ARUNDO epigeios.

Arundo calycibus unifloris; panicula erecta; foliis subtus glabris. LINNAEI Syst. Nat.

p. 100. *Spec. Plant.* p. 82. n. 5. *Fl. Suec.*
2. 106.

Arundo locustis unifloris, sericeis, muticis; pani-
cula stricta. HALL. *Hist.* n. 1520.

Gramen arundinaceum; panicula molli, spadicea.
SCHEUCHZ. *Gram.* p. 122. Tab. 3. fig. 3. B.
Prodri. p. 21. Tab. 5.

Gramen plumosum. I. BAUH. *Hist.* II. p. 476.

DIAGN. *Culmus simplex. Calyces uniflori. Petalum unicum, convolutum, calyce longius.*

Habitat in Carniola calidiore.

In hac specie pariter omnia confusa sunt. KRAMERUS ARUNDINEM *calamogrostidem*. LINN. ad ripas et Lacus Danubiales in Austria inventam adducit sed ibi (ut certum me fecit Eruditiss. Amicus) non *calamogrostis* nascitur, sed *Epigeios*. Certe specimina A. *calamogrostidis* quae vidi in Austria a LINNAEO missa, ramosos culmos habebant, qua nota caret *Epigeios*. Sed quare LINNAEUS pro ARUNDINE *calamogrosti*. ponit GRAMEN *arundinaceum* SCHEUCHZERI Tab. 3. fig. 3. B.? de quo SCHEUCHZERUS non scripsit ha-
bere culmum ramosum, quodque cum speciminibus nostris ARUNDINIS *Epigeios* omnino convenit?

126. ARUNDO *Agrostis.*

Arundo calycibus unifloris; petalo maiore aristato:
arista e basi recta, glumis longiore. *Fl. Carniol.*
p. 209. n. 2.

Agrostis panicula oblonga; petalo exteriore basi
villoso; arista torta, calyce longiore. LINN.
Syst. Nat. p. 90. *Spec. Plant.* p. 61. n. 3. *Fl.*
Suec. 2. 63.

Arundo locustis unifloris, glumis ex imo dorso ari-
statis. HALL. *Hist.* n. 1522. bene.

Gramen avenaceum, montanum; panicula angu-
sta, e dilutissimo fusco - albicante et papposa.
SCHEUCHZ. *Gram.* p. 507.

DIAGN. *Calyces uniflori. Petala bifida: exterio-
re supra basin aristam educte.*

Habitat circa Fluvios. Floret initio M. Julii.

Sed quare AGROSTIS, cum pappus adeo manifestus
sit intra flores? Nec arista recta est, sed e medio
modice refracta.

127. ARUNDO donax.

Arundo calycibus trifloris; panicula diffusa. LINN.

Syst. Nat. p. 190. *Spec. Plant.* p. 81. n. 2.

Arundo caule lignoso, geniculato; foliis latissimis;
locustis trifloris. HALL. *Hist.* n. 1516.

Arundo sativa, f. donax DIOSCORIDIS. SCHEUCHZ.
Gram. p. 159.

Arundo maxima. I. BAVHIN. *Hist.* II. p. 486.

DIAGN. *Panicula diffusa, calyces triflori.* LINN.
ROYEN.

Habitat Tergesti inter vineas et sylvas.

128. ARUNDO phragmites.

Arundo calycibus quinquefloris; panicula laxa.

LINN. *Syst. Nat.* p. 100. *Spec. Plant.* p. 81.
n. 3. *Fl. Suec.* 2. 105. *Fl. Carniol.* p. 209. n. 3.

Arundo foliis secantibus; locustis trifloris, papposis,
muticis. HALL. *Hist.* n. 1515.

Arundo vulgaris, sive phragmites DIOSCORIDIS.
C. BAUH. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 161. Tab.
3. fig. 14, ZANNICHEL. *Ven.* p. 22. Tab. 183.

DIAGN. *Panicula laxa, calyces quinqueflori.*
LINN, ROYEN. KRAM. IACQUIN.

Habitat in et circa fossas.

Coram habeo calycem biglumem, muticum, dein glu-
mam aliam duplo longiorem, muticam, fulcientem
flosculos binos, quorum petalum unum aristatum,
aliud muticum et integrum est; Ergo numerus flo-
rum characterem specificum nullum facit.

40. LOLIUM.

LINN. Gen. Plant. 90.

Cavitas axi spicae insculpta, loco glumae calycinae alterius HALL. Cal. linearis, multiflorus, Cor. inaequivalvis GLEDITSCHE. arista ex apice petali exterioris. ADANS.

129 LOLIUM perenne.

Lolium spica mutica; spiculis compressis, multifloris. LINN. Syst. Nat. p. 100. Spec. Plant. p. 83. n. 1. Fl. Suec. 2. 112. Fl. Carniol. p. 182.

Lolium radice perenni; locustis contiguis, octofloris. HALL. Hist. n. 1416.

Gramen loliaceum angustiore folio et spica. C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram. p. 25. ZANNICHEL. Ven. p. 117. Tab. 66. fig. 1.

DIAGN. Spicula 4-6-flora, mutica, calyce longior.

Habitat secus vias, et in pratis sterilioribus.

Culmus facile decumbens, Florescentia aestiva. Petalum externum acuminatum, alterum bifidum, et duplicatura instructum. Nectarium biglume.

130. LOLIUM temulentum.

Lolium spica aristata, spiculis compressis, multifloris. LINN. Syst. Nat. p. 100. Spec. Plant. p. 83. n. 2. Fl. Suec. 2. 109. Fl. Carniol. p. 181.

Lolium annum; locustis diffitis. HALL. Hist. n. 1420.

Gramen Loliaceum spica longiore, seu Lolium DIO-
SCORIDIS. C. BAUH. SCHEUCHZ. Gram. p. 31. Tab. 1. fig. 7. E.F.

DIAGN. Radix annua. Spiculae aristatae.

Habitat inter Segetes.

Notissima Zizania est, Homini et Suibus temulentiam inducens vapida semenis aura.

HORDEI species nostrae indigenae Polygamiae sunt, hinc in Cl. XXIII. recensendae.

TRI-

TRIGYNIA.

41. POLYCARPON.

LINN. *Syst. Nat.* p. 881.

Calyx pentaphyllus, pentagonus, Corolla longior. Petala persistentia. Capsula ad basin usque dehiscens in valvas tres intortas et lanceolatas.

131. POLYCARPON *tetraphyllum*.

Polycarpon. LINN. l. c.

Moilugo foliis quaternis, obovatis; panicula dichotoma. LINN. *Syst. Nat.* p. 104.

Triclis Tristemon; foliis coniugatis. HALL. Goett. pag. 25.

DIAGN. *Caulis erectus, dichotomus, stipulae albae, conicae. Folia elliptica, obtusa integerrima.*

Habitat in *Istria*, circa *Duinum* et *Tergestum*.

Radicula annua, tenuis. Caules digitii longitudine.

Folia bina in caule, ad originem ramorum quaterna.

Flores in summis ramis subcymosi; uno folitario inter ramos florales.





CLASSIS IV.
T E T R A N D R I A
MONOGYNIA.

42. GLOBULARIA.

TOURN. I. R. H. p. 466. Tab. 265.

Calyx communis imbricatus. LINN. proprius quinquefidus TOURN. D. H. Corollae unilabiatae, 3-5-fidae. TOURN. B. B. B. Semen intra calycem HALL. Capsula quae prius Calyx fuit TOURN. Stamina inaequalia ADANS. Receptaculum paleaceum LINN.

132. GLOBULARIA vulgaris.

Globularia caule herbaceo; foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. III. *Spec. Plant.* p. 96. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 116. *Fl. Carniol.* p. 349.

Globularia foliis radicalibus emarginatis, exnervo aristatis, caulinis lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 218.

DIAGN. *Scapus testus foliis imbricatis, lanceolatis.*

Habitat in collibus et pratis.

Prioris anni folia emarginata sunt, cum mucrone medio; recentia vero tridentata. Calyces subtetragoni, compressi, parumper gibbi. Stamina breviora laciniis labii superioris. Germen ovatum.

133. GLOBULARIA cordifolia.

Globularia caule subnudo; foliis cuneiformibus, tricuspidatis; intermedio minimo; LINN. *Syst. Nat.* p. III. *Spec. Plant.* p. 96. n. 5.

Glo-

Globularia caule unifolio, et unifloro, foliis emarginatis, nervo aristato. H ALL. *Hist.* n. 216.

DIAGN. *Cespitosa suffrutescens, super saxa et in aridis cespitose nascentes, nudicaulis.*

Habitat paßim.

Calyx proprius pubescens. Est Scabiosa X. sive repens CLUSII. Caulis in specimine HALLERIANO a Cl. WILLICH transmisso, ad basin ligulam foliacem gerit, folia tribus denticulis terminata.

134. GLOBULARIA nudicaulis.

Globularia caule nudo; foliis integerrimis, lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. III.

Globularia foliis oblongis, ovatis, integerrimis; caule nudo, unifloro. HALL. *Hist.* n. 217.

DIAGN. *Folia integerrima lanceolata, obtusa. Scapus subnudus. Corollae trifidae.*

In Alpibus Vochinenibus.

Scapus apud nos foliis paulo longior, duabus aut tribus squamis instructus, caeterum aphyllus. Flores trifidos plerosque video, aliquos vero quadrifidos.

43. SCABIOSA.

TOURN. I. R. H. p. 463. Tab. 263 264.

Germina dupli calyce coronata, infera, nuda.

(*) *Thalamo villoso.*

135. SCABIOSA arvensis.

Scabiosa corollis quadrifidis; receptaculis pilosis; foliis imis ovatis; superioribus pinnatifidis. Fl. Carniol. p. 350. n. I.

Scabiosa corollulis quadrifidis, radiantibus; caule hispido; foliis pinnatifidis, incisis. LINN. *Syst. Nat.* p. 112. *Spec. Plant.* p. 99. n. 8. *Fl. Suec.* 2. II7,

Sca-

Scabiosa corollulis quadrifidis; foliis interioribus pinnatifidis, caulinis dentatis. BOEHM. *Lipf.* 160.
Scabiosa foliis petiolatis, ovato lanceolatis, dentatis; superioribus semipinnatis. HALL. *Hist.* n. 206.

DIAGN. *Folia superiora pinnatifida.*

Habitat in pratis.

Tota Planta pallide viridis. Corollae extimae, obscure radiantes. Germen villosum e medio apicis educit pedicellum tubulosum, cui insidet Calyx villosus, seu cotyla radiata denticulis decem aristaeformibus villosis. Semen villosum, tetragonum: angulis alternis apice tridentatis.

136. SCABIOSA sylvatica.

Scabiosa corollis quadrifidis; receptaculis pilosis; foliis ovato-lanceolatis, ferratis, hispidis. *Fl. Carniol.* p. 351. n. 2.

Scabiosa corollulis quadrifidis; radiantibus; foliis inferioribus ovatis, ferratis: summis lanceolatis, integrerimis; caule hispido. IACQUIN. *Austr.* p. 22. *Obs. Bot.* I. p. 28. et *Obs. Botan.* III. p. 20. Tab. 72. LINN. *Syst. Nat.* p. 112.

Scabiosa caule hispido; foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis: inferioribus dentatis. HALL. *Hist.* n. 204.
Scabiosa latifolia. I. BAUHIN. *Hist.* III. P. I. p. 9.

DIAGN. *Folia nulla pinnatifida, oblonga, dentata.*

Habitat in locis sylvestribus.

Distinguunt ab *arvensi* 1. Viror obscurior. 2. hispidior facies. 3. folia semper indivisa. 4. Corollae obscure radiantes. 5. Bulbilli rubelli piliferi ad basin caulis. 6. Antherae caelureae. 7. Cotylae pedunculus occultus. 8. Radii cotylae basi minime dentati et glandulis stipitatis adspersi. 8. Foliorum bases cordatae et amplexicaules.

Huic potius, quam alteri convenit nomen integrifoliae, cuius folia culta pinnatifida video in specimine Willianiano.

137. SCABIOSA leucantha.

Scabiosa corollulis quiunque fidis radiantibus; foliis bipinnatis, linearibus LINN. *Spec. Plant.* p. 101. Corollis 5-fidis subaequalibus; squamis calycinis, ovatis, obtusis *Syst. Nat.* edit. 12. p. 112.

DIAGN. *Caulis fruticosus. Folia pinnata, villosa; pinnis lanceolatis, decurrentibus. Semina trigona.*

Habitat circa Duinum in Karrschia.

Folia uno aliove dente superne instructa. Cal. hemisphaericus; squamis imis (4—5) viridibus, aliis albo-rubellis, ovatis, acutis, margine saturatiis rubescens. Singula squama, quae supra medium calycis sita est, sovet flosculum 4-fidum, aquose luteolum, uno segmento maiore.

(**) *Thalamo paleaceo.*

138. SCABIOSA succisa.

Scabiosa corollis quadrifidis; receptaculis foliaceis; foliis ovato-lanceolatis. *Fl. Carniol.* p. 351.

Scabiosa corollulis quadrifidis, aequalibus; caule simplici; ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 112. *Spec. Plant.* p. 98. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 119.

Succisa caule trifloro; floribus convexis; foliis radiocalibus ovatis; caulinis lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 201.

Scabiosa corollulis quadrifidis; foliis ovato-lanceolatis, integris. BOEHM. *Lips.* 159.

Succisa MATTTHIOL. *Diosc.* p. 425.

DIAGN. *Folia oblonga. Floreſcentia sub finem Augusti M. cum VIRGA AUREA.*

Habitat secus vias, et in udis.

Germen pilosum, coronatum, calyce quadridentato villoſo. Ex hoc nascitur pedicellus brevissimus, membranaceus, fistulosus, tetragonus, sustinens coronulam geren-

gerentem quatuor aristulas nigricantes, et basi rubellas.

139. SCABIOSA graminifolia.

Scabiosa corollulis quinquefidis; foliis linearilanceolatis, integerrimis; caule herbaceo. LINN.
Syst. Nat. p. 113.

Succisa foliis gramineis, tomentosis. HALL. *Hist.* n. 203.

Scabiosa argentea, graminifolia. HERMAN. *Lugd.* p. 540. TOURNEF. *Inst.* p. 464. TILL. *H. Pis.* p. 153.

Scabiosa montana VII. C. BAUH. *Pin.* p. 27^o.
Prodr. p. 127. cum icone. SEGUIER. *Veron.* II. p. 181.

DIAGN. *Folia linearia, glauca, subtus lanuginosa.*
Corollae quinquefidae, ridentes.

Habitat circa Goritiam. P. WULFEN.

Germen incanum, sustinens calycem brevissimum, quinque fetulis denticulatis instructum. Hunc ambit corona plicata, foliacea, inciso-lacera.

140. SCABIOSA columbaria.

Scabiosa corollis quinquefidis; receptaculis foliaceis; foliis caulinis pinnatis; pinnis linearibus. *Fl. Carniol.* p. 352.

Scabiosa corollis quinquefidis, radiantibus; foliis radiicalibus, ovatocrenatis: caulinis pinnatis, setaceis. LINN. *Syst. Nat.* p. 113. *Spec. Plant.* p. 99. n. 10 *Fl. Suec.* 2. 118.

Succisa foliis imis ovatis, superioribus pinnatis; pinnis semipinnatis, acutis: ciliis flosculorum longitudine. HALL. *Hist.* n. 202.

DIAGN. *Folia ima oblonga, superiora ubique aut infra medium pinnatifida. Calyx proprius est annulus, e quo oriuntur setae nigrae (2-4).*

Habitat iuxta vias et in Alpibus. Varietas fl. albo inter *Idriam* utramque ad viam.

Multum

Multum variat, et quidem :

1. *Foliis imis oblongis undique dentatis, superioribus pinnatifidis : laciniis linearibus et plerisque indivisis.*

Setae e calyce proprio raro quatuor : Et haec vulgaris est planta.

2. *Foliis imis oblongis undique dentatis, superioribus pinnatifidis ; laciniis lanceolatis incisis.*

Planta alpina spithamea ; caule simplici, tribus foliorum paribus, horum primum indivisum, caetera infra medium pinnatifida. Aristae (5), e calyce proprio nigrae.

3. *Foliis imis oblongis, apice dentatis; supremis pinnatifidis: lacinia terminali oblonga, dentata, caeteris linearibus et indivisis.*

Caeterum similis Var. (2).

4. *Foliis omnibus oblongis, et undique dentatis, superioribus basi pinnatifidis.*

In calidiore Carniola non rara.

Effentiam specificam constituunt 1. Corollæ radiantes.

2. Germen villosum, coronatum. 3. Receptaculi paleae foliaceae, lanceolatae, breves.

44. DIPSACUS.

TOURN. I. R. H. p. 466. Tab. 265. VAILLANT.
Act. Paris. A. 1722. p. 234.

Calyx proprius tetragonus, integer, pilosus. Seumen tetragonum: linea elevata intra angulos. Capitulo subiacent angusta folia exstantia et rigida, ut paleae receptaculi.

141. DIPSACUS fullonum.

Dipsacus foliis integerrimis, glabris; capitulis subovatis. Fl. Carniol. p. 353.

Dipsacus foliis sessilibus, ferratis. LINN. Syst. Nat. p. III. Spec. Plant. p. 97. n. 1. GRONO V. Virgin. p. 17.

Fl. Carn. T. I.

G

Dipsa-

Dipsacus capitulis ovatis; foliis arcuatis circumvallato, aristis squamarum rectis. HALL. Hist. n. 198.
Labrum Veneris M A T T H I O L. Diosc. p. 450.

DIAGN. *Folia minime laciniata, dentata, glabra.*

Habitat in siccis et in cultis.

Solus folii nervus aculeatus. Corolla rubellae, villosulae. Galea ovalis, integra. Labii segmenta lateralia rotundata et minora; Capitula subovata.

142. DIPSACUS laciniatus.

Dipsacus foliis laciniatis, asperis; capitulis subrotundis. Fl. Carniol. p. 352.

Dipsacus foliis connatis, sinuatis. LINN. Syst. Nat. p. III. Spec. Plant. p. 97. n. 2.

Dipsacus foliis pinnatis: pinnis ferratis; capitulis globosis. HALL. Hist. n. 200.

DIAGN. *Folia laciniata hirsuta.*

Habitat in collibus et sterilibus locis.

Radix uno anno folia, altero caulem effert, dein motitur. Stamina alba. Antherae rubellae. Semina appetit FRINGILLA Carduelis.

Dipsacus scabiosis adfinis est. Plantisque capitatis.

45. SCHERARDIA.

LINN. Gen. Plant. 112.

Fructus coronatus calyce 1-6-dentato, in duo locula monosperma dividitur a septulo dimidiato, et cordiformi.

143. SCHERARDIA arvensis.

Galium floribus umbellatis terminalibus; seminibus coronatis. Fl. Carniol. p. 340.

Scherardia foliis omnibus verticillatis; floribus terminalibus. LINN. Syst. Nat. p. 116. Spec. Plant. p. 102. n. 1. Fl. Suec. 2. 120.

Scherardia foliis senis, lanceolatis; floribus sessiliibus, umbellatis. HALL. Hist. n. 734.

DIAGN.

144. *Galium Vernum*

Tab. 2.



Rein b. A.V.

DIAGN. *Folia ottōna, ciliata. Corollae terminales, rubrae, rotatae; tubo tenui, albo, subte-tragono.*

Habitat in arvis et hortis.

Villosa est superficies supera folii, nervusque subtus.

Stylus bifidus. Stigmata ovata. Antherae effundunt pollinem subcinereum, antequam corolla fuerit explicata.

46. GALIUM.

In constituendis Generibus Plantarum Stellatarum fructus corolla potentior est; Hinc GALLI character erit Fructus subrotundus, siccus, non coronatus. Stamina ultra favorem corollae elata.

(*) *Foliis quaternis.*

(†) *Fructibus glabris.*

144. GALLIUM vernum. Tab. 2.

Gallium floribus polygamis; racemis lateralibus, binatis, nudis; foliis quaternis, lanceolatis, glabris.

Fl. Carniol. p. 344. n. 11.

Gallium foliis quaternis, glabris, ovato-lanceolatis; racemis brevissimis, reflexis, aequalibus. HALL. *Nomencl. 720.*

DIAGN. *Folia ovalia, glabra, trinervia. Racemulus e qualibet ala. Flores diversi sexus. Corollae luteae.*

Habitat in herbidis circa Idriam primo vere passim florens.

Gemmae oriuntur ex aridis, antiquis, et humifusis caulis, caules erecti, glabri, vix semipedales, tetragoni, simplices. Folia ovata et oblonga. Flores plenique hermaphroditi, sed et masculi ac feminei, nec non imperfecti sine staminibus et cum styli rudimento. Stigmata orbiculata flava. Fructus glaberrimi,

quibus perfectis racemi florales reflexi sub foliis sese recipiunt.

III. LINNAEUS in litteris ait esse posse alteram speciem VAILLANTIAE. Facie convenit cum RUBIA quadrifolia L. BAUHIN. Hist. III. p. 719. sed non fructu, forte idem cum VALLANTIA Glabra LINN.

145. GALIUM cruciata.

Galium floribus polygamis; racemis lateralibus, ternatis, diphyllois; foliis quaternis, villosis. Fl. Carniol. p. 345. n. 12.

Vallantia floribus masculis quadrifidis; pedunculis diphyllois. LINN. Syst. Nat. p. 672. Spec. Plant. p. 1052. n. 4.

Galium foliis quaternis, hirsutis; petiolis octifloris. HALL. Hist. n. 709.

DIAGN. Caules cum foliis villosi. Racemi diphyllo. Flores flavi.

Habitat ad sepes.

Flores inveni 1. Hermaphroditos, tetrandros; stylo profunde bifido. 2. Masculos tetrandros cum annulo in centro floris. 3. Hermaphroditos 2 - 3- andros; annulo tumido styli basin ambiente. Corollas trifidas nondum vidi, nec sexui tantum tribuo, ut tota classis dividi possit a Fratribus contra leges Naturae.

146. GALIUM rubrioides.

Galium foliis quaternis lanceolato-ovatis, aequalibus, subtus scabris; caule erecto; fructibus glabris. LINN. Syst. Nat. p. 117. Spec. Plant. p. 105. n. 1.

DIAGN. Caules sursum strictu asperi. Folia lanceolata, marginibus reflexis, nervo spinulis aspero.

Habitat in paludosis circa Idriam et alibi.

Caules pedales et longiores, tenues. Foliorum apices non reflectunt marginem. Flores albi. Fructus glaberrimi.

147. *GALIUM Cynanchicum.*

Galium pedunculis trifloris, corymbosum; foliis quaternis, linearibus; summis oppositis. Fl. Carniol.
p. 344. n. 10.

Asperula foliis quaternis, linearibus, superioribus oppositis; caule erecto; floribus quadrifidis. LINN.
Syst. Nat. p. 116. Spec. Plant. p. 104. n. 6.

Asperula caule firme ramoso, foliis linearibus quaternis, summis coniugatis. HALL. Hist. n. 730.

DIAGN. *Caulis debiles. Folia linearia, summa pinnata.*

Habitat in muris et locis aridis.

Corollae rubellae, non albae, pictae lineis saturatioribus.
Germen villosulum.

148. *GALIUM taurinum.*

Asperula foliis quaternis, ovato-lanceolatis; floribus fasciculatis, terminalibus. LINN. Syst. Nat.
p. 116. *Spec. Plant. p. 103. n. 3.*

Asperula foliis ovato-lanceolatis, quaternis; petiolis unifloris, erectis, foliis circumvallatis. HALL.
Hist. n. 732.

DIAGN. *Folia ovato-lanceolata, villosula. Flores non ex aliis foliorum, sed in summo caule.*

Habitat in *Austriaco Litorali. Ill. a MYGIND.*

Priori valde similis, et tamen diversum, ut patet ex inflorescentia, caule ramoso, floribus omnibus hermaphroditis, et totius Plantae modica villositate.

149. *GALIUM tinctorium.*

Asperula foliis linearibus: inferioribus senis; intermediis quaternis; caule flaccido; floribus plerisque trifidis. LINN. Syst. Nat. p. 116. Spec.
Plant. p. 104. n. 4. IACQUIN. Austr. p. 35.

Asperula caule flaccido; foliis linearibus quaternis; umbellulis petiolatis. HALL. Hist. n. 729.

DIAGN. Caules erecti. Folia linearia, tenuiter et acute dentata. Flores trifidi, triandri.

Habitat in *Austriaco Litorali*. Ill. a M Y GIND.

(†) *Fruitibus hispidis.*

350. GALIUM rotundifolium.

Galium floribus paniculatis; racemis dichotomis; foliis quaternis, ovatis, glabris. *Fl. Carniol.* p. 344. n. 9.

Galium foliis quaternis, ovatis, obtusis, aculeato-ciliatis; seminibus hispidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 118. *Spec. Plant.* p. 108. n. 18. sed quare *rotundifolium*?

Galium foliis quaternis; petiolis longissimis, brachiatis; seminibus hirsutis. HALL. *Hist.* n. 727.

Rubia quadrifolia; I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 718. cum icone non mala, sed destituta flore et fructu.

DIAGN. Folia ovata, breviter et laxe ciliata. Racemus ex ala suprema bis dichotomus: ramis divaricatis. Flos pedunculatus inter primam dichotomiam.

Habitat in sylvis Idriensisibus.

Caules semipedales, glabri, simplices. Corollae albae, rotatae. Semen villis uncinatis hispidum, ut in *ASTRANTIA Diapensia*.

351. GALIUM boreale.

Galium floribus paniculatis, racemis diphyllis; foliis quaternis, trinerviis, lanceolatis. *Fl. Carniol.* 343. n. 8.

Galium foliis quaternis, lanceolatis, trinerviis, glabris; caule erecto; seminibus hispidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 118. *Spec. Plant.* p. 108. n. 16. *Fl. Suec.* 2. 124. JACQUIN. *Austr.* p. 24.

DIAGN. Folia trinervia, lanceolata, obtusa; marginibus reflexis. Paniculae rami diphylli.

Habitat in pratis humidoribus.

Corollae, apud nos, albae; segmentis ovatis.

(**) Fo-

(**) *Foliis caulinis pluribus, quam quatuor.*

152. GALIUM glaucum.

Galium foliis verticillatis, linearibus; pedunculis dichotomis; caule laevi. LINN. *Syst. Nat.* p. 118. *Spec. Plant.* p. 107. n. 13.

Galium foliis octonis, obtusis, supremis lanceolatis; floribus in summa planta fasciculatis. HALL. *Hist.* n. 716.

Rubia. I. C. BAUHIN. *Prodr.* p. 145.

DIAGN. *Folia linearia, ima (6), superiora (4), ramea (2), spicula terminata pedunculi ex aliis supremis tres, triflori; medio breviore.*

Habitat in fissuris rupium Alpinarum.

Caules tenues, ramosi, spithamei. Corollae rubrae et albae, longo tubo. Melius diceretur faxatile, quam glaucum. Germen in apice callosa tubercula gerit.

153. GALIUM verum.

Galium floribus paniculatis; foliis octonis, linearibus, sulcatis, glabris; caule ancipiti. *Fl. Carniol.* p. 341. n. 3.

Galium foliis octonis, linearibus, sulcatis; ramis floriferis brevibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 118. *Spec. Plant.* p. 107. n. 11. *Fl. Suec.* 2. 123.

Galium foliis linearibus, perangustis, octonis; racemis multifloris; spicatis. HALL. *Hist.* n. 710. Galion. MATTHIOL. *Diosc.* p. 702.

DIAGN. *Folia octona, fragilia, linearia, sulcata, Caulis paniculatus. Flores flavi, parvi.*

Habitat in pratis siccis.

Folia reflectantur, florente planta.

154. GALIUM rubrum.

Galium foliis verticillatis, linearibus, patulis; pedunculis brevissimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 118. *Spec. Plant.* p. 107. n. 15.

Galium Sprengerianum. I. BAUH. *Hist.* III. p. 721.

Galium rubro flore. CLUS. *Hist.* p. 175.

DIAGN. *Foliorum linearum margines spinulosi.*
Caulis scaber. Flores fuso-rubri.

Habitat in Agro Goriziensi et Tergestino.

Planta pallide virescens.

155. GALIUM *Mollugo.*

Galium caule quadrangulo; foliis octonis, glabris,
acuminatis. HALL. *Enum.* p. 461. n. 7. *Hist.*
n. 711.

Rubia angulosa. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 715.

Rubia sylvestris TABERNEM.?

Mollugo CLUS. *Hist.* p. 176.

DIAGN. *Caulis quadratus, praecopia ramorum patentium fere procumbens. Folia latiuscula.*

Habitat ad sepes passim.

Valde excrescit. Folia demum reflectuntur, uncia non quam longiora. Gemmae ex caulis antiquis oriuntur.

VARIET. 1. *Foliis imis emarginatis.*

— 2. — *apice rotundatis, nervo in acumen exente.*

— 3. — *spinoso-denticulatis.*

— 4. — *integerrimis et reflexis.*
Plantula digitum longa, alpina.

156. GALIUM *sylvestre.*

Galium caule tereti, fulcrato; foliis octonis, glabris et obtusis. HALL. *Enum.* p. 461. n. 8.

An hoc *GALIVM sylvaticum* LINN?

Rubia sylvatica laevis. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 716.

DIAGN. *Caulis teretiusculus, rigidus, erectus. Folia lanceolata, patula.*

Habitat in sylvestribus siccisque locis.

Caulis firmus, non vere quadratus. Gemma radicalis.
Folia glabra, longa, pallide viridia. Rami non patuli. Florescentia tardior. Corolla alba; segmentis

tis

tis acuminatis. Styli bini. Stigmata rotunda. Capsula glabra, subrotunda, altera saepius abortiente.

Hinc bene HALLERUS separavit *GALIVM album vulgare TOURNEFORTII* a *MOLLUGINE montana latifolia*, C. BAUHINI, quem fecutus est Cl. BOEHMERUS.

157. *GALIUM Aparine.*

Galium floribus panniculatis; foliis octonis, lanceolatis, scabris, retrorsum aculeatis. *Fior. Carniol. p. 342. n. 6.*

Galium foliis octonis, lanceolatis, carinatis, scabris, retrorsum aculeatis; geniculis villosis; fructibus hispidis. LINN. *Syst. Nat. p. 118. Spec. Plant. p. 108. n. 19.*

Galium caule ferrato, foliis fenis, linearibus, lanceolatis, ferratis; petiolis unifloris. HALL. *Hist. n. 723.*

Aparine MATTIOL. *Diosc. p. 537.*

DIAGN. *Anguli caulini et foliorum margines nervique aculeati. Fructus hispidi.*

Habitat ad sepes, et in Agris.

Corolla fere ad basin usque quadrifida. Styli duo divaricati, hinc digyna planta. Fructus et caules uncis suis vestibus adhaerent.

158. *GALIUM odoratum.*

Galium floribus paniculatis; foliis octonis, lanceolatis; caule glabro, simplici. Fl. Carniol. p. 343. n. 7.

Asperula foliis octonis, lanceolatis; florum fasciculis pedunculatis. LINN. *Syst. Nat. p. 116. Spec. Plant. p. 103. n. 1. Fl. Suec. 2. 121.*

Asperula caule erecto; foliis octonis; petiolis ramosis, erectis; seminibus hirsutis. HALL. *Hist. n. 728.*

DIAGN. *Folia lanceolata, octona, marginata. Panicula trifida. Flores albi, et omnium maximi. Germen villis hirsutum.*

Habitat in sylvis. Maio florens.

Foliorum margines et nervi spinulis mollibus instructi.
Flos niveus; segmentis tubo longioribus. Styli
duo breves.

47. ASPERULA.

In ASPERULA nostra video stamina in tubo
corollae et capsulas duas: una abortiva; quibus
notis a GALIO differt,

159. ASPERULA arvensis.

Galium floribus umbellatis, terminalibus; feminis
nudis. *Fl. Carniol.* p. 340. n. 2.

Asperula foliis senis; floribus sessilibus, aggregatis,
terminalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 116, *Spec.
Plant.* p. 103. n. 2.

Asperula foliis octonis, obtusis, floribus inter cilia-
ta folia sessilibus, congestis. HALL. *Hist.* n. 733.

DIAGN. Flores in summis ramis aggregati et val-
lati foliis hirsutis. Folia caulina (6-8), obli-
fuscata, lanceolato-linearia.

Habitat in Arvis.

Flores Caerulei.

Aparine, Crucifera, Rubeola, Asperula, ac similia
Genera videntur arbitraria.

48. RUBIA.

TOURN. I. R. H. p. 113. Tab. 38.

Baccae rotundae, monospermae.

160. RUBIA tinctorum.

ARDUIN. *Memor.* I. Tab. 8.

Galium floribus paniculatis; foliis senis; fructu bac-
cato. *Fl. Carniol.* p. 345. n. 13.

Rubia foliis senis. LINN. *Syst. Nat.* p. 893. *Spec.
Plant.* p. 109. n. 1. GRONOVI. *Orient.* p. 12.
foliis annuis caule aculeato. LINN. *Syst. Nat.
edit.* 12. p. 112.

Rubia

Rubia foliis ellipticis, asperis, quinis, senisque.
HALL. Hist. n. 708.

DIAGN. *Folia fena. Flores lutei.*

Habitat circa *Tergeustum*, et in Insula *Veglia*.

Anguli caulinis, et margines foliorum aculeati. Folia lanceolata. Racemorum pedunculi scabri et trigoni. De usu radicum *Rubiae* in Arte Tinctoria earamque cultura lege DU HAMELIUM, Collect. Oeconom. Bernenses, Collect. Stuttgardenes, et ARDUI-
NUM l. c.

49. PLANTAGO.

TOURN. I. R. H. p. 126. Tab. 48.

Calyx monophyllus TOURN. A. A. A. quadrifidus LINN. Corolla quadrifida TOURN. A. B. Stamina longa IDEM. Capsula unilocularis, circumcisca IDEM. E. F., polysperma IDEM. H. GLEDITSCH. Sem. 2 - 6. ADANS. Species indigenae pleraequa dispermae,

50. PLANTAGO *maior*.

Plantago foliis ovatis, glabris; scapo nudo, tereti; spica flosculis imbricatis. LINN. Syst. Nat. p. 122. Spec. Plant. p. 113. n. 3. Fl. Suec. 2. 131. Fl. Carniol. p. 280. n. 1.

Plantago foliis petiolatis, ovatis, glabris; spica cylindrica. HALL. Hist. n. 660.

Plantago maritima, latifolia, glabra, spica longissima purpurascente. ZANNICHEL. Ven. p. 212. Tab. 75.

DIAGN. *Folia septem nervia, ovata, glabra. Capsula locula disperma.*

Habitat in maritimis Carnioliae.

Petoli semipedales, canaliculati, basi lana ferruginea pubescentes. Folia spithamea integerrima. Scapi striati,

striati, modice lanuginosi. Spica spithamam fere longa. Flores rubri. Capsulae vertex, duabus lineis cruciformibus exaratus. Semina nigra.

162. PLANTAGO media.

Plantago folijs subhirsutis ellipticis; spica cylindrica, densa. HALL. Hist. n. 659.

Utramque hanc speciem coniungit LINNAEUS, et vocat *Plantaginem foliis ovatis, glabris; scapo nudo, tereti; spica flosculis imbricatis.* Synt. Nat. 122. Spec. Plant. p. 113. n. 3. Fl. Suec. 2. 131.

DIAGN. *Folia ovata; nervis subhirsutis. Capsula locula monosperma.*

Habitat ubique.

163. PLANTAGO lanceolata.

Plantago foliis lanceolatis; spica subovata, nuda; scapo angulato. LINN. Synt. Nat. p. 122. Spec. Plant. p. 113. n. 3. Fl. Suec. 2. 131. Fl. Carniol. p. 281. n. 2. HALL. Hist. n. 656.

Plantago longa. MATTHIOL. Diosc. p. 151.

DIAGN. *Scapus heptagonus. Folia lanceolata. Stamina alba.*

Habitat cum priore.

Plantaginum styli ante stamina prodeunt, ut in CARTICIBUS et ANTHOXANTHO.

164. PLANTAGO Holosteum.

Huc reduci posse videntur *Plantagine* LINNAEA-
NAE 8. 10. ac forte etiam 9. 11. 13. Spec. Plant.
HOLOSTEA strictissimo Folio C. BAUH. CO-
RONOPI serpent. maritim. et omnium minima.
I. BAUH. Conveniunt enim omnes; Scapis
teretibus subvillosis. Spica unciali anteflorescen-
tiam nutante; Foliis planiusculis, striatis, li-
nearibus, basi lanatis, margine ad Lentem exi-
guis dentibus instructo. Calyce villosulo. Corol-
lae

iae segmentis acutiusculis. Antheris luteolis. Capsulis dispermiis. Sem. rufis, hinc planis, inde convexis, oblongis. Et sane mihi conseruenti varia specimina PLANTAGINIS *alpinae*, *maritimae*, imo etiam *Loeflingii*; tam indigina quam extera ab Amicis communicata, nulla vera differentia nullique limites occurserunt.

165. PLANTAGO Psylgium.

Plantago caulibus erectis, herbaceis; foliis linearibus, patulis; capitulis ovatis. HALL. *Hist.* n. 661.

Psylgium. MATTHIOL. *Diosc.* p. 676.

DIAGN. *Caulis ramosus. Folia opposita, linearia, patula; spicae terminales, subrotundae.*

Habitat in *Agro Goriziensi*.

Planta nostra neque supina, neque sufruticosa, sed annua et erecta. Huic convenient synonyma, quae dedit LINNAEUS PLANTAG. *Cynops*, cuius specimen misit Celeberr. THEOD. GRONOVIUS foliis reflexis, supra medium uno aliove dente notatis; spicis ovalibus.

50. SANGUISORBA.

LUDW. *Defin. Gen.* 19.

Calyx persistens, fovea capsulam tetragonam bilocularem: loculis monospermis.

166. SANGUISORBA officinalis.

Sanguisorba spicis subrotundis; floribus hermaphroditis. *Fl. Carniol.* p. 280. n. 2.

Sanguisorba spicis ovatis LINN. *Syst. Nat.* p. 124. Pimpinella tetraestemon; spica brevi. HALL. *Hist.* n. 705. BOEHM. *Lips.* 16.

DIAGN. *Spica ovata. Flores omnes hermaphroditi. Florescentia sub initium caniculae.*

Habitat in pratis humidioribus circa Cranburgum.

167. SAN-

167. SANGUISORBA *Auriculata.*

Pimpinella maior rigida, praealta, auriculata, subnuda. BOCCON *Mus.* 2. p. 19. Tab. 7. eadem videtur.

DIAGN. *Spicae cylindraceae. Flores polygami.*

Habitat copiose in pratis *Vipacensibus.*

Caulis glaber tripedalis, ramosus. Folia oblonga glabra, superne splendentia, subtus pallidiora, dentata: dente singulo terminato acumine rubello et sursum flexo. Ad basin singuli petioli communis sedet folium sessile, ovatum, denticulatum. Spicae rubrae. Flores spicarum primarum plerique feminine, caeteri hermaphroditi; in aliis spicis flores supremi feminine sunt, alii et plerique hermaphroditi. *Flos feminineus* ruber est; stylo rubro, et umbilico albicans subtetragono, qui receptaculum constituit, prodeunte. Loco staminum sunt puncta ferruginea aut fusca quatuor. Sub flore est germen album, fultum bracteola lanceolata. *Flos hermaphroditus* albidus; stylo albo, stigmate rubro, staminibus longitudine corollae, aureo polline antherarum.

Ergo Planta omnino diversa à SANGUIS. *Officinali,* et iuxta LINNAEUM alia species *Poterii.*

168. SANGUISORBA *Minor.*

Sanguisorba spicis subrotundis; floribus polygamis.
Fl. Carniol. p. 279. n. 1.

Poterium inerne caulibus subangulosis. LINN.
Syst. Nat. p. 629. *Spec. Plant.* p. 994. n. 1.

Pimpinella polystemon. HALL. *Hist.* n. 706.

Sanguisorba polyanthera, foliis ovatis; spica brevi.
BOEHM. *Lips.* 17.

Pimpinella sanguisorba, minor. MATTHIOL.
Diosc. p. 657.

DIAGN. *Spicae subrotundae. Flores polygami, polyandri, digyni.*

Habitat in aridis et apricis,

Pinha.

Pinnarum paria (ad 12). Flores feminei superiores digyni. Hermaphroditii plures, staminibus longis (ad 40), pariter digyni. His addit HALLERUS *Masculos*, etiam a me visos.

SANGUISORBA *Auriculata* coniungit POTERIUM cum SANGUISORBA *officinali*; omnibus etiam habitus idem, vires medicae communes, fructificatio et floriflentia similis.

51. EPIMEDIUM.

DODON. TOURN. I. R. H. p. 232. Tab. 117.

Calyx tetraphyllus. Nectaria quatuor galeaeformia. Silicula lanceolata, bivalvis, polysperma.

169. EPIMEDIUM *alpinum*.

Epimedium LINN. I. BAUHIN. TABER NEM. etc.

DIAGN. Petioli terminales, terni, longi, triphylli: foliis oblongis cordatis; infra hos nascitur racemus floralis nudus, laxus, pauciflorus.

Habitat circa Goriziam in sylva della Torre, et in collibus sylvosis ad sinistram eiusdem sylvae; nec non in Silva Sabattina, trans Lisonium. P. WULFEN.

Caulis teres. Folia semel et bis ternata, pendula, serratula: dentibus pilo terminatis. Racemus longitudo digitii; ramulis (3-4), plerumque bifloris, bractea rufa fultis. Calycina folia ovata, rufescens. Petala ovata, patula. Nectaria flava, petalis incumbentia et paulo longiora, uno latere receptaculo adhaerentia. Stamina brevia. Antherae acuminatae; polline flavo. Siliqua mucronata. Stigma luteolum, anulo rubro inferne fasciatum. Semina oblique transversim sita.

TOURNEFORTIO ignota petala, MATTHIOLO tota planta, TABERNEMONTANI figura bona

bona est, ut et Descriptio I. BAUHINI, non autem icon, quae est *Ononidis spinosae*.

52. CORNUS.

PLIN. BRUNFELS. TOUR. I. R. H. p. 641.
Tab. 410.

Calyx quadridentatus, Petalorum et statim numerus idem. Drupa bilocularis, loculis monospermis. Non vero unilocularis, nec semina bilocularia. ADANS. DU HAMEL.

170. CORNUS mascula.

Cornus arborea; floribus umbellatis; foliis ovatis.

Fl. Carniol. p. 272. n. 1.

Cornus arborea; umbellis involucrum aequantibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 124. *Spec. Plant.* p. 117.
n. 2. HALL. *Hist.* n. 815.

Cornus MATTHIOL. *Diosc.* p. 192.

DIAGN. *Flores umbellati, flavi; primo vere ante folia prodeentes. Bacca cinnabrina, magnitudine et figura nucis Quercinae.*

Habitat in pratis siccis et sylvestribus.

Involucrum tetraphyllum, persistens, proferens pedunculos (ad 30) villosulos. Gemmae foliaceae subinvolucro. Petala patula, dein reflexa, staminibus longiora. Antherae ita incumbunt filamentis, ut pileus Agarici stipidi proprio. Styli apex incurvus, papillosum, flores plerique pereunt infoecundi. Gestatio plantae quinque mensium circiter. Bacca oblonga, cinnabrina, nitens, non punctata, nec calyce ac stylo terminata; Nucleo oblongo; lineis quatuor elevatis ad medium usque.

171. CORNUS sanguinea.

ARDUIN. *Memor.* I. p. 100. Tab. 19.

Cornus arborea; floribus cymosis. *Fl. Carniol.*
p. 273. n. 2.

Cornus

Cornus arborea cymis nudis; ramis rectis. LINN.

Syst. Nat. p. 125. *Spec. Plant.* p. 117. n. 3. *Fl.*

Suec. 2. 138. HALL. *Hist.* n. 816.

Virga sanguinea. MATTHIOL. *Diosc.* p. 193.

Cornus. DU HAMEL. *Arbor.* I. p. 184. n. 7.

DIAGN. *Cymae terminales, quinquefidae; radiis ramosis. Bacca nigra, iuniperinae statura.*

Habitat in asperis et incultis, initio Iunii M. florens.

Flores aliqui feminæ. Petala alba, lanceolata. Annum quadrilobus styli basin cingens. Bacca rotunda nigra, apice umbilicata et coronata calycinis dentibus inflexis, ac stylo. Eadem lineolis albis exiguis longitudinaliter variegata. Nucleus rotundus, obiter sulcatus.

TRAPAE fructum obtinui *Labaco*, quem ibidem lectum affirmarunt sed ipsa Planta nondum visa fuit.

CAMPHOROSMAE specimen Monspeliacam referens, *Tergesto* missum fuit, sed adeo imperfectum, ut describi non possit, cum etiam ignorem, an ibidem lectum fuerit, vel non?

52. THESIUM.

LINN. *Gen. Plant.* 258.

Calyx uniphyllus, staminifer. LINN. semiquinquefidus, persistens, intus coloratus. LUDW. Stamina quinque LINN. LUDW. ADANS. tot quot segmenta calycis. HALL. Semen unum inferum LINN. GLE-DITSCH. Calyx basi contracta fovens semen. LUDW. GLE-DITSCH. Capsula sphaerica, monosperma. ADANS. Sed stamina in THESIO *alpino* 3 - 4. ubique vidi, raro 5. 4. IACQUIN. 4. etiam in *Linophyllo* ROL-LANDER apud LINN. nec semen inferum, cum lateat intra basin calycis.

172. THESIUM *Linophyllum*.

Thesium panicula foliata; foliis linearibus. LINN.

Syst. Nat. p. 188. *Spec. Plant.* p. 207. n. 1. *Fl. Carn. T.I.*

H

Car-

Carniol. 265. n. 1. KRAM. *Austr.* p. 58. IAC-
QUIN. *Austr.* p. 40.

Thesium caule erecto, paniculato, foliis lanceola-
tis. HALL. *Hist.* 1573.

DIAGN. *Gemmae radicales. Folia lanceolato-li-*
nearia, sparsa, trinervia.

Habitat in montanis *Carnioliae* calidioris.

Caules pedales. Panicula sparsa. Fructus oblongi.

173. THESIUM *alpinum.*

Thesium Alpinum. ANN. II. *Hist. Nat.* p. 44.

Thesium caule diffuso, floribus alaribus, foliis linea-
ribus. HALL. *Hist.* n. 1574.

An hoc *Anonymous linifolio* CLUSII? sed caules
pedales et folia sparsa, priorem speciem demon-
strant. ALCHIMILLIS immissicuit TOURNE-
FORTIUS, plantam a Generis huius charac-
tere omnino alienam. Sapientior PONTEDERA
novum Genus instituit et LINOPHYLLUM ap-
pellavit, cui *Thesii* nomen substituit III. LIN-
NAEUS, qui tamen in adsignandis differentiis
specificis non adeo felix fuit; Primam enim spe-
ciem ita determinavit, ut a ramosioribus exem-
plaribus *THESII Alpini* distingui non possit;
secundam vero dixit *Thesium floribus sessilibus*
lateralibus, cum tamen vere paniculati sint, et
plerumque tetrandri, ut bene advertit CL. plan-
tarum Austriae et Americae Illustrator IACQUL-
NIUS. Degenerant tamen et hic stamina a nu-
mero quaternario; ita MICHELIUS trifidos
ideoque tetrandros adnotavit in *Horto Pisano*
TILLII; ego in Austriacis exemplaribus qua-
drifidos, in aliis vero etiam trifidos et quinque-
fidos video. Quamobrem differentia specifica
THESII alpini desumenda est et a notis hisce.
1. Gemmae ex antiquis stipidibus prodeunt. 2. Fo-
lia patentiora sunt, omnino linearia, enervia, ri-
gidiora et pauciora. 3. Caules semipedales. 4. Pa-
nicula

nicula totius caulis dimidiam longitudinem aequat, heteromalla. 5. Fructus ovales sunt, striati et ob coarctata calycis segmenta, collo quodam instructi.

54. ALCHEMILLA.

TOURN. I. R. H. p. 508. Tab. 289.

Calyx octofidus TOUR. C. Petala nulla. IDE M. Stamina quatuor. IDEM. A. Stylus unus et stigma unum. LINN. duplex. HALL. Styli duo in *Aphane*: Semen 1 - 2. RAI. KNAUT. ALCHEMILLAE unum, *Aphane* duo. ADANS. intra calycem GLEDITSCH. non vero capsulam ADANS.

174. ALCHEMILLA vulgaris.

Alchemilla floribus monogynis; foliis lobatis. Fl. Carniol. p. 576. n. 1.

Alchemilla foliis lobatis. LINN. Syst. Nat. p. 129. Spec. Plant. p. 123. n. 1. Fl. Suec. 2. 141.

Alchemilla foliis ferratis, palmatis, seminovemfidis. HALL. Hist. n. 1566.

Stellaria MATTHIOL. Diosc. p. 732.

DIAGN. Folium malvaceum, lobatum. Flores monogyni.

Habitat in sylvestribus montanisque locis.

Foliorum lobi tot quot radii a petioli centro excurrentes et aequae distiti. Flores subcapitati. Stigma rotundum, splendens, per aetatem nigricans.

175. ALCHEMILLA Arvensis.

Alchemilla floribus digynis. Fl. Carniol. p. 576. n. 2. Aphanes. LINN. Syst. Nat. p. 129. Spec. Plant.

p. 123. GRONOVI. Virgin. p. 22.

Alchemilla hirsuta, foliis trilobatis, lobis tripartitis et bipartitis. HALL. Hist. n. 1569.

DIAGN. Flores digyni, totidemque semina.

Habitat in arvis.

DIGYNIA.

55. C U S C U T A.

TOURN. I.R.H. p. 652. Tab. 422.

Species nostra addit characteri LINNAEA-
NO unitatem numeri partium omnium floris.

176. CUSCUTA *Europaea.*Cuscuta floribus sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 129.

Spec. Plant. p. 124. n. 1. Fl. Suec. 2. 144. Fl.

Carniol. p. 309. HALL. Hist. n. 654.

Cuscuta MATTHIOL. *Diosc.* p. 788.

DIAGN. *Flores sessiles et multo magis congesti,*
quam in Americana specie.

Parasita variarum Plantarum, nec arborum aut fruticum.

TETRAGYNIA.

56. A Q U I F O L I U M.

PLIN. RUELL. GESN. TOUR. I. R. H. p. 600.
Tab. 361. HALL. LUDWIG. ADANS.

Calyx quadridentatus. Corolla 4-fida
TOURN. A. B. C. utraque pars floris quan-
doque et trifida. GLEDITSCH. ADANS.
Tubae brevissimae. HALL. quae stigmata
sunt eaque quaterna ADANS. Bacca 3-4 lo-
cularis. GLEDITSCH. 4-lokul. ADANS.
Semina quatuor TOURN. et tria GLE-
DITSCH.

177. AQUIFOLIUM *Ilex.*

Ilex foliis ovatis, acutis, spinosis. LINN. *Syst.*
Nat. p. 130. Spec. Plant. p. 125. n. 1.

Aqui-

Aquifolia PLUSCH. *Spec. ac. della Nat.* III. Tab. 65.

GRONOV. *Virgin.* p. 22.

Aquifolium MATTHIOL. *Diosc.* p. 131. DU HA,
MEL. *Arbor.* I. p. 66. n. 1. HALL. *Hist.*
n. 667.

DIAGN. *Folia ovata, coriacea, perennantia, nitida, saepius sinuata: sinibus spina valida terminatis.*

Habitat circa Idriam in sylvis, et Goriziae in sylva Panevitz.

Folia in eadem planta modo inermia et integra, modo etiam spinosa, marginata. Flores ex nodo quodam squamoso oriuntur, laterales conferti, breviter pedicellati, ex uno stipitulo tres. Petala alba, concava, subrotunda. Bacca coccinea, rotunda, calyx persistenti innixa, apice nigricans. Semina subtriquetra, oblonga, obtusa, quaterna.

57. POTAMOGETON.

TOURN. I. R. H. p. 232. Tab. 103.

Calyx nullus Tourn. LINN. LUDW.
GLEBITSCH. Petala quatuor. Tourn.
persistenta HALL. hinc pro calyce sumpta
a RAIUS et ADANS. Semina rostris re-
curvis, loco tubarum. HALL. quae Capsu-
las monospermas vocat ADANS. Flores
spicati RAIUS, habitatio in aquis RAIUS,
TOURN. LUDWIG.

78. POTAMOGETON *ferratum.*

Potamogeton foliis lanceolatis, oppositis, subundu-
latis. LINN. *Syst. Nat.* p. 131. *Spec. Plant.*
p. 126. n. 6. *Fl. Carniol.* p. 177. n. 1.

Potamogeton foliis tenuibus, ellipticis; nervis con-
vergentibus. HALL. *Hist.* n. 846.

DIAGN. *Folia opposita, lanceolata, subundulata, sessilia, vaginis ciliatis.*

Habitat in fossis maioribus paludum *Labacensium*.

179. POTAMOGETON perfoliatum.

Potamogeton foliis cordatis, amplexicaulibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 130. *Spec. Plant.* p. 126.
n. 2. *Fl. Suec.* 2. 146.

Potamogeton altera, I. BAUH. *Hist.* III. p. 778.

DIAGN. *Folia alterna, cordata, amplexicaulia.*

Habitat in *Fluvio Labaco*.

Folia ad apicem tenuiter denticulata.

180. POTAMOGETON setaceum.

Potamogeton foliis oppositis, lanceolatis, planis.
Fl. Carniol. p. 117. n. 2.

Potamogeton foliis lanceolatis, oppositis, acumina-
tis. LINN. *Syst. Nat.* p. 131. *Spec. Plant.*
p. 127. n. 6. BOEHM. *Lips.* 260.

Fontinalis lucens. I. BAUH. *Hist.* III. p. 277.

DIAGN. *Folia petiolata, lanceolata, plana.*

Habitat in lacubus, et cum priore.

Vaginae petiolis longiores. Antherae subfessiles.

181. POTAMOGETON crispum.

Potamogeton foliis lanceolatis, alternis, undulatis,
ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 131. *Spec. Plant.*
p. 126. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 148. *Fl. Carniol.* p. 178.
n. 4. HALL. *Hist.* n. 848.

Fontinalis crispa. I. BAUH. *Hist.* III. p. 778.

DIAGN. *Folia alterna, lanceolata, sessilia, mar-
gine undulata.*

Habitat cum specie prima.

Folia ferrulata sunt.

182. POTAMOGETON pusillum.

Potamogeton foliis linearibus, oppositis alternis-
que, distinctis, basi patentibus; caule tereti.

LINN.

LINN. *Syst. Nat.* p. 131, *Spec. Plant.* p. 127.
n. 12.

Potamogeton caule tereti; foliis perangustis; spicis paucifloris, minimis. HALL. *Hist.* n. 852.

DIAGN. *Folia linearia, alterna; spicae ovatae, et oblongae.*

Habitat in lacubus minoribus.

Caulis subteres. Folia omnia alterna, linea angustiora, uncialia et longiora. Spicae factae flosculis oppositis (6-8); uncialibus pedunculis.

58. SAGINA.

LINN. *Gen. Plant.* 162.

Calycina folia et petala exigua tot, quot stamina styli et valvae fructus unilocularis, apud nos saltem, imo aliquando quinarius est partium dictarum numerus, Glandulae nectariferae coniungunt, cum *ALSINE media*, capsula vero quadrivalvis cum *MOEHRINGIA muscosa*.

183. SAGINA procumbens.

Alsine floribus tetrandris, tetragynis; caulis diffusis. *Fl. Carniol.* p. 496. n. 1.

Sagina ramis procumbentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 131. *Spec. Plant.* p. 128. n. 1. GRONOV. *Virgin.* p. 23.

Alsine tetraestemon foliis connatis, lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 861.

Alsine graminea; flore tetrapetalo. SEGUIER. *Veron.* I. p. 421. Tab. 5. fig. 3,

DIAGN. *Petala calyce multo minora.*

Habitat in sylvis inter muscos.

Petala viderunt RAIUS, PLUKENET. TOURNEF. HALL. SEGU. et Ego, eaque in sylvis maiora, in agris minora, qualia etiam erant in *Horto Acad. Vind.*



CLASSIS V.
P E N T A N D R I A.
M O N O G Y N I A.

59. **HELIOTROPIUM.**

DIOSC. TOURN. *I.R.H.* p. 138. *Tab. 57.*

Cor. hypocrateriformis TOURN. et quinquefida ADANS. cum interiectis dentibus. TOURN. *l. c.* LINN. hinc decemfida dicta. GLEDITSCH. Faux clausa squamis quinis LINN. quas TOURN. Vocat centrum stellae in modum corrugatum. Stigmata duo conica ADANS. Sem. 4. ovalia TOUR. E. F. Capsulae quatuor rotundatae ADANS. Florum spicae longae, scorpii caudae ad instar reflexae. LUDWIG.

184. **HELIOTROPIUM europaeum.**

Heliotropium foliis ovatis, integerrimis, tomentosis, rugosis; spicis coniugatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 144. *Spec. Plant.* p. 130. n. 2.

Heliotropium foliis petiolatis, ovatis; spicis inferioribus, simplicibus; supremis gemellis. HALL. *Hist.* n. 593.

Heliotropium maius. MATTHIOL. *Diosc.* p. 799.

DIAGN. *Folia ovata integerrima, rugosa; spicae coniugatae.* LINN.

Habitat in *Comitatu Goriziensi* ubi frequentissimum secus vias vidit MATTHIOL. Ego reperi ad murum Horti *Medeae*, qua itur ad Templum.

In summis ramis spicae geminae, spiraliter inflexae, sensim evolvendae. Calyces sessiles, pilosi, demum patuli. Capsulae rugosae.

60. MYO-

60. MYOSOTIS.

DILLEN. LINN. *Gen. Plant.* 165.

Genus dubium; ECHIUM *scorpioidem* ad LITHOSPERMUM retulit TOUR. ac nuper etiam LVDWIG. Myosotim DILLEN. BUGLOSSI speciem facit ADANS. Margobaseos tubi corollae introflexus crenulatus, et germina protegens, nec non semina nitentia, coniungunt Genus hoc cum LITHOSPERMO, a quo differt corollae centro clauso squamulis quinis, et stigmate simplici.

185. Myosotis *scorpioides*.

Myosotis feminibus nudis; foliorum apicibus callosis LINN. *Syst. Nat.* p. 144. *Spec. Plant.* p. 131. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 157. *Flor. Carniol.* p. 441. n. 1.

Scorpiurus annuus et perennis. HALL. *Hist.* n. 590. 591.

Heliotropium foliis glabris. BOEHM. *Lips.* 31.

DIAGN. *Folia lanceolata, tuberculo terminata.*

Habitat in pratis humidioribus, et in Alpibus.

Corollae color qui alarum *Papilionis Argioli* superne, quandoque carneus, raro albus; umbilico flavo et albo. Segmenta corollae, tubi longitudinem habent. Antherae fuscum pollinem fundunt. Stigma orbiculatum, modice concavum.

Planta alpina villotior est, coeruleo et albo flore.

61. LITHOSPERMUM.

LINN. *Gen. Plant.* 166.

Corollae faux pervia, et stigmata bina, distinguunt Genus hoc a priore.

186. LITHOSPERMUM *officinale*.

Lithospermum feminibus laevibus; corollis vix calycem superantibus; foliis lanceolatis. LINN.

Syst. Nat. p. 145. *Spec. Plant.* p. 132. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 159. *Fl. Carniol.* p. 442.

Lithospermum caule erecto ramosissimo, floribus calycem vix superantibus. HALL. *Hist.* n. 595.

DIAGN. *Corolla calyce vix longior, tubo supra medium pentagono: angulis singulis ad basin fo veala signatis.*

Habitat in montibus, asperisque locis.

Corollae diameter trium linearum, color albus; squamis ad faucem luteo-viridibus. Filamentorum bases glandulis stipitatis pubescentes. Stylus teres. Capsulae albae calycibus suis hyeme etiam adhaerent, solitariae aut binae, nunquam quaternae.

187. LITHOSPERMUM arvense.

Lithospermum seminibus rugosis; corollis vix calycem superantibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 145. *Spec. Plant.* 132. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 160. KRAM. *Austr.* p. 37. IACQUIN. *Austr.* p. 29.

Heliotropium foliis ligulatis; floribus tubulosis. HALL. *Hist.* n. 594.

Buglossum floribus alaribus; radice rubra. BOEHM. *Lips.* 23.

DIAGN. *Radix rubra, semina rugosa.*

Habitat in arvis *Gorizienibus* et *Tergestiniis*.

Pedunculi solitarii, calycibus breviores. Folia subtus exiguis tuberculis aspera. Capsularum rugas faciunt tubercula obtusa et confluentia.

188. LITHOSPERMUM purpureo-caeruleum.

Lithospermum seminibus laevibus; corollis calycem multoties superantibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 145. *Spec. Plant.* p. 132. n. 4. KRAM. *Austr.* p. 38.

Lithospermum caulis decumbentibus, radicatis; ramis floralibus erectis. HALL. *Hist.* n. 596.

190. *Cynoglossum. Ompha lodes.*

Tab. 3.



DIAGN. *Caulis procumbens, apice denuo radicatus.* RUPP. HALL. *Folia hispida. Semina glabra, subrotunda.*

Habitat Goriziae. P. WULFEN.
Laciniae calycinae lineares.

62. ANCHUSA.

LINN. *Gen. Plant.* 167.

Dissert ab HELIOTROPIO córollae segmentis aequalibus, a LITHOSPERMO capsulis viperino capiti similibus. His addit tubum basi prismaticum GLEDITSCH. Semina basi insculpta, LINN.

189. ANCHUSA officinalis.

Anchusa foliis lanceolatis; spicis imbricatis, secundis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 145. *Spec. Plant.* p. 133.
n. 1. *Fl. Carniol.* p. 445.

Buglossum foliis linguiformibus, asperis, spicis superimis gemellis. HALL. *Hist.* n. 599.

Buglossum vulgare MATTHIOL. *Diosc.* p. 737.

DIAGN. *Folia lanceolata. Spicae longae, secundae.*

Habitat in limitibus herbidis agrorum Carnioliac interioris.

Corollae tubus mellifer, Apum delitiae.

63. CYNOGLOSSUM.

TOUR. LINN. ADANS. HALL. *Hist.* p. 521.

Quatuor capsulae monospermae, stylo adfixae. TOUR. Tab. 57. E. orbiculares ADANS. hirtae aut villosae.

190. CYNOGLOSSUM Omphalodes. Tab. 3.

Cynoglossum fructu glabro; foliis petiolatis, ovatis; caule repente. *Fl. Carniol.* p. 439.

Cyno-

Cynoglossum repens; foliis radicalibus, cordatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 146. *Spec. Plant.* p. 135.
n. 6. Stolones repunt, non caulis florifer, cui
folia ovalia, et minime cordata.

DIAGN. *Primo vere floret, aestate stolonibus re-*
ptat.

Radix obliqua, perennis, fusca, fibrosa. Caulis florifer
simplex, semipedalis, e basi stolones longos educens.
Racemi alares, pauciflori. Corollae hypocrateriformes,
pulchre coeruleae, sex linearum diametro; tu-
bo lineam longo, obtuse pentagono. Faux corollae
stellam habet albida, plicis quinque cordiformibus
factam. Antherae luteo polline plenae. Stylus cy-
lindricus. Stigma haemisphaericum, stylo conco-
lor. Receptaculum marginatum. Capsulae villosu-
lae, in medio foveam gerunt ellipticam.

Omnis capsulae raro fertiles, sed una alteram suffocat,
monospermae, raro dispermae, in quo statu basis
capsulae bilocularis est.

Antiquum nomen LOBELII est *SYMPHYTI pumili*
repentis, *Borraginis facie*, quod retinuit I. BAU-
HINUS. MORISONIUS vocat BORRAGINEM
Herbariorum, et stolones in icona bene notavit.
TOURNEFORTIUS separavit a *SYMPHYTO*,
et dixit OMPHALODEM *pumilam vernam, symphyti*
folio, sed bene monet LINNAEUS solam fructus
asperitatem aut glabritiem, non sufficere ad novum
Génus constituendum.

191. *CYNOGLOSSUM officinale.*

Cynoglossum fructu echinato; foliis imis petiolatis:
caulinis sessilibus, amplexicaulibus. Fl. Carniol.
p. 439. n. 2.

Cynoglossum staminibus corolla brevioribus; foliis
lato-lanceolatis, tomentosis, sessilibus. LINN.
Syst. Nat. p. 146.

Cynoglossum foliis ellipticis, lanceolatis, sericeis;
caule folioso. HALL. Hist. n. 587.

Cynoglossum vulgare. MATTIOL. Diosc. p. 739.
DIAGN.

DIAGN. *Caulis ramosus. Folia lanceolata, sessilia.
Racemi monophylli. Capsulae echinatae.*

Habitat secus vias.

Corolla infundibuliformis; fauce clausa squamis ere-
ctis subemarginatis. Filamenta attenuata.

Stylus est pyramis obtuse tetragona. Stigma exara-
tum linea media.

In radice latet quid Narcotici.

192. CYNOGLOSSUM *Lappula.*

Myosotis *seminibus aculeis glochidibus; foliis lan-*
ceolatis, pilosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 145. *Spec.*
Plant. p. 131. n. 3.

Cynoglossum glanduliflorum glabris.
HALL. *Hist.* n. 589.

DIAGN. *Flores subsessiles, alares, Capsulae echi-*
natae: aculeorum apicibus stellatim fimbriatis.

Habitat prope vias.

Semina germinant relicto cortice echinato, et propria
membranacea epidermide tecta sunt.

193. CYNOGLOSSUM *eheirifolium.*

Cynoglossum corollis calyce duplo longioribus; fo-
liis lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 146.

DIAGN. *Folia utrinque albo villo canescens, inter*
flores nulla. Corollae albæ, venis violaceis et
caeruleis variegatae, calyce duplo maiores.

Habitat circa *Tergestum, Duinum &c.* ad vias.

Radix multicaulis. Folia superne nullis tuberculis aspe-
ra, ut in *CYNOGL. Officin.* per siccitatem nigricantia.

64. PULMONARIA.

TOURN. I. R. H. p. 136. Tab. 55.

Calyx prismatico - 5 - angularis LINN.
GLEDITSCH in *officinali*, faux coronata
villis conniventibus. Squamula nectarifera ad-
fidens

fidens germini singulo. Stigma bifidum; segmentis subrotundis.

194. PULMONARIA officinalis.

Pulmonaria foliis radicalibus in petiolum decurrentibus, caulinis sessilibus, semiamplexicaulibus.
Fl. Carniol. p. 442.

Pulmonaria foliis radicalibus ovato-cordatis, scabris,
L INN. *Syst. Nat.* p. 146. *Spec. Plant.* p. 135.
n. 2. *Fl. Suec.* 2. 163. HALL. *Hist.* n. 597.

Pulmonaria foliis radicalibus ovato-lanceolatis, inferius decurrentibus. BOEHM. *Lipf.* 30.

DIAGN. *Folia scapi floralis ovalia decurrentia, radicalia petiolata et ovato-lanceolata.*

Habitat in locis sylvestribus et umbrosis, floretque circa medium M. Martii.

Calycis verrucosae basi pentagona, nec non basis penduli rugis transversis corrugata est. Verrucæ terminantur papilla pellucida, quibus interiacent villi minores. Corollæ tubus sub pentagonus, diametro limbi brevior. Filamenta alba. Antherae nigricant, effuso polline. Germen singulum gerit lineam dorsalem elevatam.

65. SYMPHYTUM.

TOURN. *I. R. H.* p. 138. Tab. 56.

Staminibus interiacent pali, quorum margines denticulati sunt. Antherae sagittatae.

195. SYMPHYTUM officinale.

Sympytum foliis ovato-lanceolatis, decurrentibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 147. *Spec. Plant.* p. 136.
n. 1. *Fl. Suec.* 2. 165. caule alato. HALL. *Hist.*
n. 600. *Fl. Carniol.* p. 443. (a)

Consolida maior MATTHIOL. *Diosc.* p. 620.

DIAGN.

DIAGN. *Caulis alatus. Pali florales ad basin edentuli.*

Habitat in pratis pinguibus et pomariis, Maio M. florens.

Caulis valde ramosus. Folia alterna, decurrentia, uno latere usque ad solium subiacens, altero ad secundum folium usque; oris undulatis. Racemi cernui. Corollae rubrae. Stylus obiter sulcatus.

196. SYMPHYTUM tuberosum.

Sympytum radice tuberosa. IACQUIN. Obs. Botan. III. p. 12. Tab. 63.

Sympytum foliis semidecurrentibus: summis oppositis. LINN. Syst. Nat. p. 147. Spec. Plant. p. 136. n. 2. IACQUIN. Austr. p. 29.

Sympytum tuberosum. I. BAUH. Hist. III. p. 594. et DODONAEI.

DIAGN. *Caulis simplex, terminatus racemis duobus monophyllis. Pali florales undique denticulati.*

Habitat in sylvestribus, herbidis, Idriæ, et alibi, initio Aprilis florifer.

Radicis caput tuberosum. Caulis pedalis. Folia elliptica. Racemi oppositi et alterni, bifidi et trifidi, flore solitario e divisione nato; ramis 3-6-floris. Corollae pallide luteæ, limbo per aetatem ferrugineo. Stylus teretiusculus.

66. CERINTHE.

TOURN. I. R. H. p. 79. Tab. 16.

Corollæ segmenta erecta, acuminata, convergentia; foveis quinis ad originem tubi. Antherae pone in hamulos attenuatae, quibus invicem vinciuntur. Capsulae binae biloculares. TOURN.

197. CERINTHE *echioides*.

Cerinthe foliis lanceolato-linearibus, hispidis; fructibus geminis; corollis acutis, clausis. LINN.
Syst. Nat. p. 915. *Spec. Plant.* p. 137. nunc
Onosma echioidea. *Syst. Nat.* edit. 12. *Fl. Carniol.*
p. 444. n. 2. GRONOV. *Orient.* p. 16. n. 39.
Sympytum foliis lingulatis, hispidis; flore palis de-
stituto. HALL. *Enum.* p. 515. n. 2. *Hist.* n. 601.
Echium Anchusae facie &c. HERMANN. *Lugdb.*
p. 225.

DIAGN. *Caulis adscendens et una cum foliis lanceo-*
lato-linearibus hispidus.

Habitat in aridis montibus circa *Vipaccum*.

198. CERINTHE *Glabra*.

Complectitur tres SPECIES Linnaeanae, nempe
maiorem, *minorem* et *maculatam*; Omnibus
enim caulis erectus, hispiditas nulla; Folia am-
plexicaulia, sessilia, basi cordata plus minus ver-
rucosa; imis obtusis; Corollae flavae; Calyces
pentaphylli: foliis tribus maioribus; Capsulae
nigrae, plerumque binae; Facies una; In flo-
rescentia eadem.

CERINTHE *maior*. folia gerit obtusiora, per aeta-
tem coerulescentia, albis verrucis magis ad-
spersa, nec non corollae segmenta breviora.
— *maculata* folia possidet modo glabra et ma-
gis maculata, modo ad apicem verrucosa, et
corollae segmenta longiora.
— *minor*. diversa est corollae segmentis bre-
vioribus.

Plantarum harum specimina varia invicem contuli,
nec limites inveni.

67. ASPERUGO.

TOURN. I. R. H. p. 135. Tab. 54.

Capsulae a calyce eodem modo teguntur,
ut semen ATRIPLICIS *patulae* flore foecundo.
199. As-

199. ASPERUGO procumbens.

Asperugo LINN. HALL. IACQUIN. RUPP.
TOURNEFORT. ZANNICHELL. alio-
rumque.

DIAGN. *Caules prostrati, angulosi.*

Habitat circa sepes.

Flores parvi, violacei.

68. ECHIUM.

TOURN. I. R. H. p. 135. Tab. 54.

Corolla irregularis. Stamina inaequalia.

200. ECHIUM vulgare.

Echium spicis lateralibus; foliis lanceolatis, hispidis.
Fl. Carniol. p. 446.

Echium caule tuberculato-hispido; foliis caulinis
lanceolatis, hispidis; floribus spicatis, lateralibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 148. *Spec. Plant.*
p. 139. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 168.

Echium foliis lingulatis, hispidis, calycibus pungen-
tibus et hirsutis. HALL. *Hist.* n. 603. 604.

DIAGN. *Tota planta hispida; foliis lanceolatis.*

Habitat in pratis siccioribus.

Iuvenis planta caulem simplicem habet, adulta vero
saepe adeo ramosum, ut procumbere fere debeat.

Apes, quae hos flores saepius frequentant, erosas
acquirunt alas.

69. ANDROSACE.

LINN. *Gen. Plant.* 179.

Corollae limbus planus, quinquefidus, ut
in PRIMULA farinacea, sed tubus ovatus, Ca-
psula unilocularis, quinquevalvis.

Quaesivi *Ill.* HALLERUM, quem fru-
ctum gerat ARETIA sua secunda, et respondit
Fl. Carn. T. L. I huic

huic fructus subrotundus est, 4-5-valvis, cartilagineus, seminibus tribus grandibus ad receptaculum.
Ergo ARETIA LINN. non est Genus distinctum ab ANDROSACE.

201. ANDROSACE *maxima*.

Androsace perianthiis fructuum maximis. LINN.

Syst. Nat. p. 150. *Spec. Plant.* p. 141. n. 1. *H. Updal.* p. 36. KRAM. *Austr.* p. 31. IACQUIN.
Austr. p. 32.

Androsace stipulis quinis, amplissimis, HALL. *Hist.* n. 624.

Androsace vulgaris TOURN. *Inst.* p. 123.

Androsace altera MATTTHIOL. *Diosc.* p. 186.

DIAGN. *Folia radicalia, elliptica, dentata, acuminata.* Scapi nudi. Pedunculi umbellati. *Involucri folia denticulata, patula, elliptica, acuminata, coriacea.*

Habitat in cultis *Carnioliae* calidioris.

Radix annua, fibrosa. Scapi rubelli, dilatati, simplices, villosuli, digitum longi. Umbella quinqueflora; sexto flore medio. Calyx fructifer late campaniformis, plus quam semiquinquesfidus. Corolla albida. Capsula rotunda, cartilaginea, subpellucida, magnitudine pilulae maioris. Semina (ad 14) trigona, adhaerentia receptaculo crassio et alveato.

202. ANDROSACE *villoſa*.

Androsace foliis pilosis; perianthiis hirsutis. LINN.

Syst. Nat. p. 150. *Spec. Plant.* p. 142. n. 3. *Fl. Carniol.* p. 293. KRAM. *Austr.* p. 41. IACQUIN.
Austr. p. 33.

Aretia foliis ovatis, villosis; scapis umbellatis HALL.
Hist. n. 620.

Chamaeiasme. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 869.

Sedum minus X. Alp. IV. CLUS. *Hist.* II. p. 62.

DIAGN. *Folia lanceolata, una cum scapo et calycibus pubescentia. Corollae albae, circa faucem roseae aut luteae.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*, aliisque.

Folia ad terram in rosulas congesta, quae ungue digiti auricularis nunquam latiora sunt. Scapus rubellus, vix biuncialis. Pedunculi umbellati (3—6), involucro vix longiores. Corollae segmenta subovata, faux ornata glandulis flavescensibus. Antherae flavae. Capsula rotunda, disperma, quinque striis longitudinalibus instructa.

203. ANDROSACE *laetea*.

Androsace foliis linearibus, glabris; umbella involucris multoties longiore. LINN. *Syst. Nat.* p. 150. *Spec. Plant.* p. 142. n. 5. IACQUIN. *Austr.* p. 33.

Aretia foliis gramineis; scapis paucifloris. HALL. *Hist.* n. 622.

Phyllo Dalechampii. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 762.

DIAGN. *Folia angusta. Pedunculi (1—4) longi, Flores involucro longiores.*

Habitat in ruinis *M. Greben*, cum PAPAVERE *Alpino*. *Folia in rosulas congregata, sub quibus scapi prodeunt tenues, et triunciales. Pedunculi unciales, quandoque et unicus. Calyces ex viridi lutei; segmentis acutis, dorso angulatis. Corolla nivea; segmentis emarginatis; fauce glandulis luteis ornata. Capsula rotunda, seminibus (4—6) foeta.*

Raram varietatem in alpibus *Styriae* lectam misit P. BRIWALD, foliis lanceolatis et pedunculis folio brevioribus, unde patet *folia linearia non esse semper huic Plantae propria.*

70. PRIMULA.

LINN. *Gen. Plant.* 180.

Solus isque cylindricus corollae tubus separatur ab ANDROSACE.

204. PRIMULA *Sylvestris*.

Primula pedunculis radicalibus, unifloris. *Fl. Carniol.*
p. 293. n. 1.

Primula foliis dentatis, rugosis; pedunculis radicalibus unifloris; limbo corollarum plano. KRAM.
Austr. p. 42. n. 2.

Primula foliis hirsutis, rugosis, dentatis; scapis unifloris. HALL. *Hist.* n. 608.

Primula VI. TABERNEMONT. p. 701.

DIAGN. *Folia rugosa, villosa. Scapi radicales uniflori. Corollae limbus planiusculus, diametro sua superans longitudinem calycis.*

Habitat in sylvestribus herbidis, argillaceis, et sterilibus locis.

Pro varietate PRIMULAE *insequentis* habet III. LINNAEUS; sed citius floret, sylvas amat autumno quandoque bisera occurrit, aliam faciem, aliamque floris figuram habet, et culta in aliam speciem nunquam degenerat.

Hac florente MOTACILLA *Trochilus* cudit in sylvis, LACERTA *Agilis* prodit in lucem. TIPULA *Regulationis* choraeas instituit, Theatrum FLORAE panditur.

205. PRIMULA *Officinalis*.

Primula floribus subumbellatis; foliis rugosis, hirsutis. *Fl. Carniol.* p. 293. n. 2.

Primula foliis dentatis, rugosis; scapo multifloro; limbo corollarum concavo. KRAM. *Austr.* p. 42.
Primula foliis rugosis, dentatis, hirsutis; scapis multifloris. &c. HALL. *Hist.* n. 609. 610.

DIAGN. *Flores umbellati, penduli; corollarum limbis concavis, suaque diametro, calycis longitudinem non aequantibus.*

Habitat in pratis subalpinis, circa columnas M. Loibel, inodora vero varietas in M. Storschetz et Alpibus Vochinenibus.

Cum

Cum priore nunquam et serius floret, *Humi* nec terrae
martialis amica.

206. PRIMULA farinosa.

Primula foliis crenatis, glabris; florum limbo plano.

LINN. *Syst. Nat.* p. 150. *Spec. Plant.* p. 143.
n. 2. *Fl. Suec.* 2. 172.

Primula umbellifera; foliis ferratis, glabris, carnosis.
HALL. *Hist.* n. 612.

Primula veris purpurea. I. BAUHIN. *Hist.* III.
p. 498.

DIAGN. *Flores umbellati, eretti; limbo plano. Folia subtus albo polline adspersa.*

Habitat in pratis uidis *Carnioliae* superioris.

Corolla pulchre rubens. Folia oblonga, crenulata.
Calyx fructifer pentagonus. Capsula calyce paulo
longior 5-valvis.

Insignem varietatem tubis uncialibus, olim legi in Pa-
triis alpibus *Comitatus Tyroliensis*.

207. PRIMULA Auricula.

Primula foliis ferratis, glabris. LINN. *Syst. Nat.*
p. 150. *Spec. Plant.* p. 143. n. 3. *Fl. Carniol.* p. 294.
n. 3. KRAM. *Austr.* p. 42. GRONOV. *Orient.*
p. 17.

Primula umbellifera; foliis ferratis, glabris, carnosis.
HALL. *Hist.* n. 612.

DIAGN. *Flores umbellati. Folia crassa, ferrata,
glabra.*

Habitat in fissuris rupium Alpinarum.

Iuniora folia integra sunt, adulta vero supra medium
ferrata redduntur; margine albo. Calyx corollae
tubo triplo brevior. Corollae faux farina conspersa
est. Capsula pariter farinosa, coriaceo-cartilaginea,
subrotunda; vertice planiusculo.

208. PRIMULA integrifolia.

Primula foliis integerrimis, glabris, oblongis; calyci-
bus tubulofisis, obtusis. LINN. *Syst. Nat.* p. 150.

Spec. Plant. p. 144. n. 6. IACQUIN. Austr.
p. 32. Obs. II. *Obs. Botan.* I. Tab. 15.

Primula foliis ciliatis, ellipticis, carnosis, integerimis, HALL. *Hist.* n. 615. *Fl. Carniol.* p. 294. n. 4.

DIAGN. Flores umbellati, pauci, erexitusculi, rubri. Calycis longitudo est tertia pars diametri corollae.

Habitat in rupium fissuris, in Struk, prope Idriam, et in M. supra Schwarzenberg.

Diameter limbi corollae lineas (6—7) longa, tubus longitudine segmentorum. Filamenta alba. Antherae luteae. Germen basi virens, alibi rubrum et splendens. Stylus roseus, tres lineas longus. Stigma rotundatum, pulvinatum, pallide virens, modice ad latus flexum. Floris odor melleus. Semina in una capsula (40—50).

Floret cum CERASIS, RIBESIO, DENTARIA *Pentaph.* canente CUCULLO, parturiente RANA temporaria, florente PINGUICULA.

Unifloram varietatem inveni in M. Grindovitz.

209. PRIMULA minima.

Primula foliis cuneiformibus, dentatis, nitidis, hirsutis; scapis subunifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 151. *Spec. Plant.* p. 143. n. 4. KRAM. Austr. p. 42. n. 5.

Primula foliis cuneiformibus, nitidis; scapis unifloris. IACQUIN. Austr. p. 32. Obs. 10. *Obs. Botan.* I. Tab. 14. HALL. *Hist.* n. 614.

DIAGN. Folia cuneiformia, apice dentata, scapus uniflorus.

Habitat in Alpicus Vochinenibus.

Determinatio Linnaeana non valde bona est; folia enim nec minima, nec corollis longe minora sunt, sed semiuncialia, extrorsum latiora, apice rotundata, et dentibus usque septem ibidem instructa. Corollae carneae segmenta semibifida, tubus calyce longior. Calyx

Calycina segmenta obtusa. Capsula subrotunda, in vertice plana et rubens. Semina (ad 60), receptaculo ovato et pedunculato affixa.

71. SOLDANELLA.

GESN. CLUS. TOUR. I. R. H. p. 82. Tab. 16.

Petalum campanulatum; laceris oris. Capsula oblonga, striata, colorata, unilocularis; apice demum decem dentato. Receptaculum ovale, stylo terminatum.

210. SOLDANELLA *alpina*.

Soldanella. LINN. HALL. Fl. Carniol. aliorumque.

DIAGN. Folia subrotunda, integerrima, firma.

Habitat in Alpibus Carnioliae superioris.

Specimen maximum, quod possumus, folium habet undecim lineas longum, unciam latum, basi emarginatum; petiolo fere biunciali. Scapus praeterea nudus, unicus, spithameus, tribus floribus terminatus, medio longiore. Corollae caeruleae, cum aliquo immixto rubore, modice nutantes. Fructus erecti, et valde similes capsulae CERASTII Arvensis. Receptaculum infidet pedunculo columnari, et linearum longo. Semina subrotunda (ad 60).

Quare Goliam vocat religiosissimus alioquin TOURNEFORTII Cultor ADANSONIUS?

72. CYCLAMINUS.

DIOSC. et PLIN. L. 21. C. 9. 38.

Corolla profunde quinquesida: segmentis reflexis et semel tortis; tubo subrotundo, antherifero. Capsula hemisphaerica, unilocularis, stylo terminata, intus pulposa GLEDITSCH. Semina multa, parva, subrotunda.

211. CYCLAMINUS *europaeus*.

Cyclamen corolla retro flexa. LINN. *Syst. Nat.*
p. 151. *Spec. Plant.* p. 145. *Fl. Carniol.* p. 292.
IACQUIN. *Austr.* p. 32. KRAM. *Austr.* p. 43.
Cyclaminus flore cernuo, segmentis sursum reflexis.
HALL. *Hist.* n. 635.

DIAGN. *Folia bina, radicalia, cordata, denticulata.*

Habitat in Humo vegetabili, sylvestribus umbrosisque
in locis, sub finem Iunii M. florens. Subrotundam
duramque radicem tegit cuticula ferruginea, cutis-
que lineam crassa, sub qua alba caro et fere insipida.
Folia persistunt in alium annum, subtus rubra, su-
perne viridia et punctulis consertis prominulis adspic-
ta. Pedunculus et petioli radicales sunt teretes.
Calycini dentes crenulati, interna vero superficies
variegata venis fuscis ramosis, et per tubum corollae
transparentibus. Antherarum apices conniventes
germen tegunt.

73. MENYANTHES.

TOUR. *I. R. H.* p. 117. *Tab.* 15.

Corollae limbus semiquinquefidus; segmen-
tis tenuiter fimbriatis. Stigma discoidaeum,
bifidum. GLEDITSCH.

212. MENYANTHES *trifoliata*.

Menyanthes foliis ternatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 152.
Spec. Plant. p. 145. n. 3. *Fl. Carniol.* p. 295.
KRAM. *Austr.* p. 43. IACQUIN. *Austr.* p. 33.
BOEHM. *Lips.* 40. DALIBARD. *Paris* p. 62.
HALL. *Hist.* n. 633. ROYEN. *Lugd.* p. 430.
Trifolium fibrinum. III. TABERNEM. p. 906.

DIAGN. *Folia ternata, oblonga.*

Habitat in paludibus *Labacensibus*, et circa *Lokopolim*
in pratis, quae alluit, rivulus agitans rotam Molen-
dinii cartarii.

Sca-

Scapus nudus, racemosus. Calyx 6-7 fidus, corollae tubo duplo brevior; segmento uno longiore. Corolla albida, rubore aliquo suffusa; segmentis superne barbatis. Stigma quadrifidum. Capsula continet semina in duos ordines collocata.

Vires egregias possidet in corrigendo humorum lento-re, et acida acrimonia.

74. HOTTONIA.

BOERRH. LUDWIG. LINN. Gen. Plant. 186.

Calyx ad basin usque quinquefidus. Cor. hypocrateriformis; fauce flava. Ad basin segmenti singuli duae plicae. Stylus longitudine calycis. Planta aquatica, floribus in spica verticillata. LUDWIG.

213. HOTTONIA palustris.

Hottonia pedunculis verticillato-multifloris. LINN.

Syst. Nat. p. 152.

Hottonia florum verticillis spicatis. HALL. *Hist.* n. 632.

DIAGN. *Scapus fistulosus, flores verticillatim collocati, pedunculis unifloris, bractea suffultis.*

Habitat in fossis *Labacensibus* frequens Maio M.

Folia submersa, verticillata, pinnata: pinnis linearibus.

Scapus nudus. Corollae albae stamna flava.

75. LYSIMACHIA.

TOURN. I. R. H. p. 141. Tab. 59.

Differit ab ANAGALLIDE capula decemvalvi, nec circumcissa; persistente stylo breviore, crassam placentam fovente, in cuius alveolis sunt semina trigona, dorso parietem coriacem capsulae contingentia, nonnullis abortientibus.

214. LYSIMACHIA vulgaris.

Lysimachia racemis lateralibus; caule fulcato. *Fl. Carniol.* p. 282.

Lysimachia paniculata; racemis terminalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 152. *Spec. Plant.* p. 146. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 175. GRO NOV. *Orient.* p. 17.

Lysimachia foliis ovato-lanceolatis; spicis paniculatis. HALL. *Hist.* n. 630.

Lysimachia MATTHIOL. *Diosc.* p. 614.

DIAGN. *Racemi terminales. Stamen unum longius, et e contra.*

Habitat in pratis.

Corolla adspersa glandulis brevissime pedicellatis. Stamina etiam glandulosa, exceptis apicibus, Antherae obtusae; septo rubro. Germen glandulosum. Stylus basi tenuior. Stigma non crassius stylo.

215. LYSIMACHIA punctata.

Lysimachia pedunculis axillaribus, teretibus, unifloris; foliis ellipticis; caule erecto. *Fl. Carniol.* p. 283. n. 4.

Lysimachia foliis subquaternis; pedunculis verticillatis. unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 153. *Spec. Plant.* p. 147. n. 6.

Lysimachia lutea minor. I. BAUH. *Hist.* II. p. 304.
Lysimachia lutea. H. CLUS. *Hist.* p. 52.

DIAGN. *Ex qualibet ala folii utrinque villoso produnt pedunculi duo simplices. Folia subtus nigro-punctata. Germen croceis punctulis variegatum.*

Habitat in aridis et sterilibus montibus Carnioliae passim.

E singula basi folii duas lineas decurrent per caulem simplicem et ramosum. Folia digitii longitudine, unciam lata subsessilia. Saepius ternata. Pedunculus unus citius floret et caulem respicit, alter vero folium. Calyx villosus, profunde quinquesfidus. Corollae tubus interne purpurascens. Filamenta ubique

que villis capitatis adspersa. Stylus in herbis, corona fulvo-ferruginea terminatus.

216. LYSIMACHIA *Nummularia*.

Lysimachia pedunculis axillaribus, angulatis, solitariis; foliis ovatis, caule repente. *Fl. Carniol.* p. 283. n. 3.

Lysimachia foliis subcordatis; floribus solitariis; caule repente. LINN. *Syst. Nat.* p. 153. *Spec. Plant.* p. 148. *Fl. Suec.* 2. 177.

Lysimachia caule prostrato; foliis subrotundis; petiolis alaribus, unifloris. HALL. *Hist.* n. 629.

Lysimachia humifusa. TOURNEF. *Inst.* p. 141.

DIAGN. *Caulis repens, tetragonus. Pedunculi solitarii. Calycina segmenta cordata.*

Habitat circa sepes.

Tota glabra; foliis floribusque secundis. Pedunculi pentagoni. Margines segmentorum calycis ad basin reflexi. Antherae acuminatae. Filamenta duo longiora, aut unum longius stylo.

Olea infusa Planta necat Curculionem *Granarium*.

76. ANAGALLIS.

TOURN. *I. R. H.* p. 141. *Tab. 59.*

Differet a LYSIMACHIA filamentis hirsutis. GLEBITSCH. Capsula circumcisca, receptaculo alveolato.

217. ANAGALLIS *Phoenicea*.

Anagallis foliis indivisis; caule procumbente. LINN. *Syst. Nat.* p. 153. *Spec. Plant.* p. 148. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 178. *Fl. Carniol.* p. 282. HALL. *Hist.* n. 625. 626.

Anagallis mas. MATTHIOL. *Diosc.* p. 424.

DIAGN. *Caules angulosi. Folia subtus punctata.*

Habitat secus hortos, et interdum in agris.

Anagallis flore coeruleo, seu *Anagallis fem.* MATTH. differet

differunt tantum colore floris alio, caule ramosiore, et pedunculis plerisque foliorum longitudinem non superantibus, qualis habitat *Tergesti* et *Goriziae* in colle *Medaeae*.

77. AZALEA.

LINN. *Gen. Plant.* 195.

Staminum numero ab ERICA et ANDROMEDA primario differt. A SEDIS nostris differt calyce quinquefolio. HALL. sed quinque-dentatus est LUDWIG. aut 5-fidus LINN. GLEDITSCH.

218. AZALEA procumbens.

Azalea ramis diffuso-procumbentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 154. *Spec. Plant.* p. 151. n. 6. *Fl. Suec.* 2. 179. KRAM. *Austr.* p. 45. IACQUIN. *Austr.* p. 34.

Anagallis caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, calycis segmentis lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 625.

DIAGN. *Ramosa, procumbens,*

Habitat in Alpibus Carnioliae super.

Flores solitarii ex summis alis et breviter pedunculati. Calyx fere ad basin usque quinquefidus.

78. COVOLVULUS.

TOURN. *I. R. H.* p. 82. *Tab.* 17.

Corolla campanulata, plicata. Capsula bilocularis: loculis dispermis. LINN. quadrispermis GLEDITSCH. ut et TOURN. I. ADANS. coniungit cum IPOMAEA LINN.

219. CONVOLVULUS arvensis.

Convolvulus foliis sagittatis, utrinque acutis; pedunculis subunifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 155. *Spec.*

Spec. Plant. p. 153. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 181. *Fl. Carniol.* p. 291. n. 1.

Convolvulus foliis sagittatis, latescentibus; petiolis unifloris; stipulis remotis, subulatis. HALL. *Hist.* n. 664.

Helxine cissampelos MATTTHIOL. *Diosc.* p. 646.

DIAGN. *Folia sagittata; apice et hamis acuminate. Pedunculi uniflori.*

Habitat in agris et hortis, proditorio amplexu viventibus fulcris ingrata planta.

Folia et flores uno versu dispositi. Pedunculi, petalo etiam duplo longiores, binis bracteolis in medio instructi. Calycina folia quina, ovata. Filamenta plana, basi latiora, apice teretia, villis capitatis adspersa. Germen album, inpositum disco croceo neistarifero subquinquelobo. Stylus apice furcatus.

220. CONVOLVULUS *sepium.*

Convolvulus foliis sagittatis, postice truncatis; pedunculis tetragonis, unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 155.

Convolvulus foliis sagittatis; hamis emarginatis, angulosis; petiolis unifloris; stipulis cordatis, maximis. HALL. *Hist.* n. 663.

Smilax laevis. MATTTHIOL. *Diosc.* p. 750.

DIAGN. *Ambitus nectarii cotylaeformis in hac specie quinquedentatus est.*

Habitat in hortis vitiosissimus.

Calycis folia duo exteriora cordata. Corolla nivea magna.

221. CONVOLVULUS *Cantabrica.*

Convolvulus foliis linear-lanceolatis, acutis; caule ramoso, erectiusculo; calycibus pilosis; pedunculis subbifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 157. *Spec. Plant.* p. 158. n. 22. KRAM. *Austr.* p. 45. in eodem, quem notat, loco, a me etiam visus, Ao. 1763, cum montes Badenses concenderem.

Vol-

Volvulus terestris. I. BAUH. *Hist.* II. p. 49.
Cantabrica quorundam. CLUS. *Hist.* p. 49.

DIAGN. *Tota planta villosa. Folia lanceolata, subfessilia. Pedunculi saepe biflori.*

Habitat in montibus circa *Tergeustum*, in colle *Medaeensi*, et trans *Lisoncium*, via ad sylvam *Sabotinam* P. WULFEN, et circa *Duinum*.

Calyx semi quinquefidus. **Corolla** rubra. **Capsula** acuminata, bilocularis; loculis mono- et dispermis. **Sem.** fusca, glabra, subhemisphaerica.

222. CONVOLVULUS *Soldanella*.

Convolvulus foliis reniformibus; pedunculis unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 157. *Spec. Plant.* p. 159. n. 29.

Brassica marina, f. *Soldanella*. I. BAUH. *Hist.* II. p. 166.

DIAGN. *Folia reniformia. Pedunculi uniflori.*

Habitat *Tergesti*, al *Molo*.

Caulis decumbens. **Folia** crassula, obtusa, glabra. **Pedunculi** striati, petiolis longiores. **Calyx** internus profunde quinquefidus. **Corolla** profunde quinquepartita; segmentis acuminatis.

79. CAMPANULA.

TOURN. I. R. H. p. 108. Tab. 37.

Ovarium coronatum calyce quinquefido et fulcrite campanam quinquedentatam, quae demum collabitur, et basi sua tegit receptaculum, e quo valvae quiniae staminiferae, unum medio stylo trifido prodeunt. Fructus latere dehiscent trilocularis: loculo singulo fovente placentam bilobam, alveolatam, cui horizontaliter adfixa sunt semina ovata compresa multa.

(*) Fo-

225. *Campanula Cespitosa.*

Tab. 4.



(*) *Foliis levioribus.*

123. CAMPANULA pulla.

Campanula caulinis unifloris; foliis caulinis ovatis, crenatis; calycibus cernuis. LINN. *Syst. Nat.* p. 159. *Spec. Plant.* p. 163. n. 2. IACQUIN. *Austr. p. 35. Observ. Botan. I. Tab. 18.*

DIAGN. *Folia crenata; ima subrotunda, obtusa, minima cordata; superiora ovato-lanceolata, acuminata. Caules villosuli, saepius uniflori.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus.*

C. BAUHINUS in *Prodromo ramosam speciem pinxit, calycibus corolla duplo brevioribus. Exemplaria ramosa et ego vidi, nunquam vero corollas adeo longas, et adeo pendulas, ut cernuae dici queant.*

124. CAMPANULA rotundifolia.

Campanula foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 159. *Spec. Pl.* p. 163. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 184.

DIAGN. *Folia omnia acuminata: ima subrotunda et crenata; superiora lanceolata. Caules 2-3-flori.*

Habitat in *Alpibus nostris.*

Et haec est CAMPANULA minor etc. CLUSII *Hist.* p. 173. CAMPANULA alpina, rotundifolia minor.

C. BAUHIN. *Prodr.* p. 34. CAMPANULA parva, *Anguillarae. Cantabrica,* I. BAUHIN. *Hist.*

II. p. 796. consequenter etiam CAMPANULA rotundifolia LINN. et si folia radicalia reniformia nulla videam, Flos in hac specie est lata campana, eaque nullo folio brevior. Vide *Annal. II. Histor. Nat.* p. 46.

125. CAMPANULA Cespitosa Tab. 4.

Campanula caule angulato; foliis imis ovatis, ferratis, glabris; germinibus decagonis. *Fl. Carniol.* p. 261. n. 51. non vero Synon.

DIAGN.

DIAGN. *Folia caulina congesta, dura, dentata.
Flos est campanula ovalis, ad ventrem crassior.
ac est diameter oris.*

Habitat in fccis, saxofisque montibus, initio Augosti florens.

Plures caules et surculi ex una radice, cespitem faciunt. Surculi sola gerunt folia petiolata, ovata, acuminate, dentata, alioque anno floriferi fiunt, spithamam longi, ramosi: ramis laxis, tenuibus, paucifloris; foliis ad basin imbricatis, lanceolatis, sessilibus, sparsis, et subtus punctatis, supra medium modice concavis, dentatis: dentibus rubella glandula terminalis. Foliis hisce tertia pars caulis singuli tecta est, caetera vero folia linearia sunt, integerrima remotiora. Campanulae nutant, fature caeruleae, semiunciam longae, quatuor lineas crassae; segmentis singularis trilineatis. Calycini dentes longitudinem habent segmentorum corollae, errecti, non dentati, tenues et acutissimi. Germen glaberrimum, decagonum: angulis alternis crassioribus. Semina elliptica, compressa, aliaque parte colorata dum iuniora sunt.

III. de HALLER. missam Plantam habuit pro Varietate *Campanulae alpinae* C. BAUH.

226. CAMPANULA linifolia.

Campanula linifolia. Ann. II. Hist. Nat. p. 47.

DIAGN. *Folia caulina linearia integerrima, digitum longa. Dentes calycini setacei, inaperto flore longiores.*

Habitat in Carnioliae subalpinis, inter Veldes, et Vochein.

Caulis pedalis, simplex, teretiusculus. Folia radicalia subrotunda et cordata pereunt, dum floret planta, caulina heteromalla, mollia. Ex alis superioribus prodeunt pedunculi solitarii setaceo foliolo instructi. Videtur CAMPANULA caule simplici etc. HALL. Hist.

Hist. n. 100. Sed in Litteris monet ad CAMPANULAM rotundifoliam C. BAUH. pertinere.

227. CAMPANULA patula.

Campomanula caule angulato; foliis lanceolatis, serratis; calycinis segmentis erectis, basi dentatis.

Fl. Carniol. p. 262. n. 7. non vero synon.

Campomanula foliis strictis, radicalibus lanceolato-ovalibus; panicula patula. LINN. *Syst. Nat.* p. 159.

Spec. Plant. p. 163. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 186.

Campomanula caule brachiato, foliis lanceolato-linearibus, glabris; petiolis paucifloris, nudis. HALL.

Hist. n. 698.

DIAGN. *Caulis striatus, ramosus; ramis sparsis, paucifloris. Denticulus utrinque ad basin singuli segmenti calycini.*

Habitat circa vias et hortos.

Radix obliqua. Caules angulati; angulis plus minus scabris. Folia lanceolata, glabra, sessilia crenata. Calycina segmenta erecta; germine duplo longiora, basi utrinque uni- et bidentata, Corollae os patulum, unciali diametro instructum, semiquinquesfidum; segmentis brevioribus, ac sunt dentes calycini. Ger- men glabrum, decagonum. Capsula trilocularis.

228. CAMPANULA persicifolia.

Campomanula caule unifloro, tereti; foliis imis subobtusatis; superioribus lanceolatis. *Fl. Carniol.* p. 261. n. 4.

Campomanula foliis radicalibus obovatis, caulinis lan- ceolato-linearibus, subserratis, sessilibus, ra- mosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 159. *Spec. Plant.* p. 164. n. 7. *Fl. Suec.* 2. 197.

Campomanula foliis radicalibus ovatis, caulinis linearibus; petiolis longissimis, paucifloris. HALL.

Enum. p. 494. n. 12.

Campomanula Persica folio. CLUS. *Hist.* p. 171.

DIAGN. *Tota planta glabra. Folia lanceolata. Germina hirta.*

Habitat in *M. Nanas*, et circa *Goriziam*.

Facile dignoscitur germinibus et capsulis hirtis, in planta alibi glabra; nec non campanae apertura maiore ac tota eiusdem longitudine est.

In *Hungaria* occurrit etiam caule unifloro, bifloro, trifloro.

229. *CAMPANULA pyramidalis.*

Campanula foliis laevibus, serratis, cordatis: caulinis lanceolatis; caulis iunceis, simplicibus; umbellis sessilibus, lateralibus. LINN. *Syst. Nat. p. 159. Spec. Plant. p. 164. n. 8.*

Campanula pyramidata. TOURN. *Inst. p. 109. Pyramidalis laevis.* I. BAUHIN *Hist. II. p. 808.*

DIAGN. *Caulis quadripedalis, ab imo ad summum ramis brevibus paniculatus. Folia omnia ovata, petiolata, breviter dentata.*

Habitat circa *Idriam* in *Struk*, inter fissuras rapium. In *M. Sancto*, in muris circa *Heidenschaft*, et in *M. S. Caterinae*. P. WULFEN.

Laetescunt radix et caulis. Dentes foliorum pallidiore glandulae terminati. Campana patulae, ultra medium quinquefida. Calycini dentes, etiam dum colla clausa est, horizontaliter patentes, germine duplo longiores. Germen trigonum.

230. *CAMPANULA rhomboidalis.*

Campanula foliis rhomboidibus, serratis; spica secunda; calycibus dentatis. LINN, *Syst. Nat. p. 160. Spec. Plant. p. 165. n. 11.*

Campanula caule levi, simplici; foliis glabris, ovato-lanceolatis, serratis; petiolis paucifloris. HALL. *Hist. n. 693.*

Campanula, alpina, glabra etc. I. BAUHIN. *Hist. II. p. 804.*

DIAGN.

DIAGN. Flores approximati, in spicam secundam dispositi. Capsulae glabrae, venosae: venis anastomosantibus.

Habitat in *Agro Gorizieni*, et *M. S. Caterinae*. P. WULFEN.

Data differentia coniungit CAMPANULAM rhomboideaem, cum *Rapunculoide* LINN. caulis plus minus ramosis, et superficie inferna foliorum plus minus scabra, diversam.

231. CAMPANULA *Rapunculus*.

Campanula foliis undulatis; radicalibus lanceolato-ovalibus; panicula coarctata. LINN. *Syst. Nat.* p. 159. *Spec. Plant.* p. 164. n. 5. *H. Upsal.* p. 40.

DIAGN. Folia undulata. Paniculae racemi unciales, demum erecti. Flores subcorymbosi.

Habitat *Goriziae* in colle *Medeae*. P. WULFEN.

Panicula spithamea; racemis imis 4-5-floris, et ita canli adpositis, vt verticillos repraesentent. Dentes calycini erecti, setacei, germine longiores.

(**) Foliis asperioribus.

232. CAMPANULA *Bononiensis*.

Campanula foliis ovato-lanceolatis, subtus scabris, sessilibus; caule paniculato. LINN. *Syst. Nat.* p. 160. *Spec. Plant.* p. 165. n. 15.

Campanula caule erecto, ramosissimo; foliis ovato-lanceolatis, subtus tomentosis; petiolis multifloris, erectis. HALL. *Hist.* n. 689.

DIAGN. Folia sessilia, amplexicaulia, crenata; nervis subtus ferruginea lana pubescentibus,

Habitat in *Austriaco Litorali*. Ill. a MYGIND.

Caulis teres. Flores in longam et strictam paniculam dispositi. Facies CAMPANULÆ *Pyramidalis Pendunculi* 3-5-flori, supremi uniflori. Calycina segmenta erecta, lanceolata, germine duplo longiora.

233. CAMPANULA *thyrsoides*.

Campanula hispida; racemo ovali, oblongo, terminali; caule simplicissimo; foliis lanceolato-linearis. IACQUIN. Austr. p. 37. Obs. 13. Observ. Botan. I. Tab. 21. LINN. Syst. Nat. p. 160. Campanula foliis lingulatis, asperis; floribus hirsutis, densissime spicatis. HALL. Hist. n. 668.

DIAGN. *Folia lanceolato-linearia. Tota planta hirsuta. Flores sessiles in longam spicam dispositi.*

Habitat in Alpibus nostris.

Descriptionem vide apud Celeb. HALLERUM l. c.

234. CAMPANULA *Trachelium*.

Campanula caule angulato; foliis petiolatis; calycibus ciliatis; pedunculis trifidis. LINN. Syst. Nat. p. 160. Spec. Plant. p. 166. n. 18. Fl. Suec. 2. 189. Fl. Carniol. p. 263. n. 8.

Campanula foliis cordato-lanceolatis, acute ferratis, hirsutis; petiolis ex alis paucifloris; calycibus hispidis. HALL. Hist. n. 690.

DIAGN. *Ima folia cordata. Pedunculi plerumque triflori. Calycina segmenta rigidis albidisque pilis minus adspersa, quam germen.*

Habitat in aridis, saxosis, et circa muros.

VAR. 1. *Pedunculis imis trifloris, supremis unifloris.*
Haec synonyma dicta genuit, sed detur etiam,

— 2. *Pedunculis unifloris.*

In agro Gorizieni lecta, et misla a P. WULFEN, cui caulis minus angulatus, et subteres. Folia omnia subcordata, asperiora, dentata. Pedunculi omnes uniflori; flore longiores.

235. CAMPANULA *glomerata*.

Campanula caule angulato, simplici; floribus sessilibus; capitulo terminali. LINN. Syst. Nat. p. 160. Spec. Plant. p. 166. n. 19. Fl. Suec. 2. 190. Fl. Carniol. p. 262. n. 6.

Camp-

Campanula caule simplici, aspero, foliis amplexicaulis, floribus capittatis. HALL. Hist. n. 685.

DIAGN. *In summitate plantae et e supremis foliorum alis prodeunt flores glomerati, sessiles.*

Habitat in pratis passim.

E singula basi folii decurrit per caulem linea elevata. Folia ima in petiolum decurrentia; superiora sessilia, rigida, amplexicaulia. Calycini dentes erecti, infra medium dente utrinque instructi; oris villosis, infra medium reflexis. Corollae semiquinquefidae, faux pilosa. Capsula trilocularis.

236. CAMPANULA medium.

Campanula capsulis quinquelocularibus, obtectis; caule indiviso, erecto, folioso; floribus erectis. LINN. Syst. Nat. p. 161. Spec. Plant. p. 167. n. 22.

Viola Mariana quorundam. CLUS. Hist. p. 172.

DIAGN. *Calyx tot ligulas deorsum protendit, quot segmenta sursum educit. Campanula calyce triplo longior.*

Habitat in *Agro Tergestino*, et *Gorizieni*.

Pedunculi biflori et triflori; sed data diagnosis CAMPANULAE etiam *Alpinæ IACQUINII* communis est, et erit, donec sera dies deteget, quantum valeat natale solum, et aeris ingenium, in mutanda facie Plantarum, quae in his saltem speciebus varia omnino se prodit.

(***) *Corolla rotata.*

237. CAMPANULA Speculum.

Campanula caule angulato, ramoso; calycibus corolla longioribus; capsulis prismaticis. Fl. Car- niol. p. 263. n. 9.

Campanula caule ramosissimo, diffuso; foliis oblone- gis, subcrenatis; floribus solitariis; capsulis prismaticis. LINN. Syst. Nat. p. 161. Spec. Plant. p. 168. n. 22.

Campanula caule procumbente; fructibus prismati-
cis, floribus rotatis, longissime petiolatis, foli-
tariis. HALL. Hist. n. 703.

DIAGN. *Calyces corollis longiores. Capsulae pris-
maticae.*

Habitat in arvis.

Annua, ramosa, subdecumbens; flore quasi pentape-
talo, rotato, expanso, et omnino degenera.

80. RAPUNCULUS.

TOURN. I. R. H. p. 113. Tab. 38. HALL. Hist. 303.
PHYTEUMA. LINN. G. P. 203.

Petalum corniculatum, in laciniis quinque
lineares ab imo sursum pandendas, dehiscens.

238. RAPUNCULUS spicatus.

Phyteuma spica oblonga; capsulis bilocularibus; fo-
liis radicalibus cordatis. LINN. Syst. Nat. p.
103. Spec. Plant. p. 171. n. 4. Fl. Carniol.
p. 259. n. 2.

Rapunculus foliis radicalibus cordatis; tubis, bico-
nibus, revolutis. HALL. Hist. n. 684.

Rapunculus spicatus. C. BAUH. Prodr. p. 32.

DIAGN. *Flores in longam spicam congesti. Stami-
num filamenta transversim undulata.*

Habitat in sylvestribus umbrosisque locis, circa finem
M. Maii florens.

Spica floralis digitum longa. Apices dentium calyci-
norum pellucidi. Bracteola linearis sub singulo fla-
re. Filamenta villosa. Antherae filiformes.

Huius Varietas est *Rapunculus* I. Tab. I. Instit. Bonon.
Tom. IV. p. 296. fig. I.

239. RAPUNCULUS orbicularis.

Phyteuma capitulo subrotundo; foliis ferratis; ra-
dicalibus cordatis. LINN. Syst. Nat. p. 163.
Spec. Plant. p. 170. n. 3. Fl. Carniol. p. 259. n. 1.
Rapun-

Rapunculus foliis imis longe cordatis, caulinis sessilibus, acutis; bracteis ovato-lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 681.

DIAGN. *Folia lanceolata: infima duo, aut unicum basi cordatum. Flores collecti in capitulum subrotundum, non ultra (50).*

Habitat in muris et rupibus, circa Idriam, et alibi, circa medium Iunii florens.

Folia dura; ima petiolo proprio breviora; superiora breviter dentata, subitus pallidiora, marginibus modice deflexis. Caulis teres, nec striatus, ut in priore. Dentes calycini germine longiores. Corolla basi pentagona, dum adhuc clausa est. Filamenta minime undulata. Flores breviter pedunculati.

240. RAPUNCULUS *comosus.*

Phyteuma fasciculo terminali, sessili; foliis dentatis: radicalibus cordatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 163. *Spec. Plant.* p. 171. n. 5. IACQUIN. *Austr.* p. 35.

Rapunculus foliis imis longe petiolatis, caulinis linearibus, integris; bracteis linearibus: duabus imis longissimis. HALL. *Hist.* n. 632.

Rapunculus Alpinus corniculatus. C. BAUHIN. *Prodri.* p. 33.

Rapunculo spicato adfinis etc. L. BAUHIN. *Hist.* II. p. 811.

DIAGN. *Capitulum terminale duobus foliis suffulatum. Folia lanceolata: ima petiolata; superiora semiamplexicaulia.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus.*

Nescio quam laxam capituli deformationem pinixerint FRATRES BAUHINI; nec folia illa subrotunda et cordata, qualia pinxit C. BAUHINUS in meis exemplaribus tam indigenis, quam exteris, adfunt.

241. RAPUNCULUS pauciflorus.

Phyteuma capitulo subfolioso; foliis omnibus lanceo-latis. LINN. *Syst. Nat.* p. 162.

Rapunculus foliis ovatis, obtuse dentatis; bracteis maximis, obtusis. HALL. *Hist.* n. 680.

Rapunculus alpinus, parvus. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 811.

DIAGN. *Caulis biuncialis. Folia lanceolata. Flores duo tresve intra folia in summo caule sepulta.*
Habitat cum priore.

Folia obiter, crenulata et glabra. Calycinè dentes longitudine germinis. Folia exteriora, quae floribus circumstant, cordata sunt.

In multis convenit cum specie priore, cuius forte sabor est. ANN. II. *Hist. Nat.* p. 48.

Huc spectat *Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari.*
C. BAUH. pictus in Tom. IV. *Comment. Inst. Bonon.* ob folia omnia lanceolata.

81. LONICERA.

LINN. *Gen. Plant.* 210.

Germen subrotundum, coronatum, calyce parvo, quinquedentato, e quo surgit corolla longa, limbo quinquefido: lacinia una profundius separata. Bacca subrotunda, modo unica, modo cum socia connata. Notae hae coniungunt CAPRIFOLIUM SYMPHORICARPOS, XYLOSTEUM, DIERVILLAM; in unum Genus Naturale, et si idem non sit in omnibus loculorum baccae, ac seminum numerus CAPRIFOLII nomen genericum retineri potuisset, praestantius LONICERA, quae est LORANTHUS VAILLANT.

242. LONICERA Caprifolium.

Lonicera floribus verticillatis, terminalibus; foliis summis connato-perfoliatis. LINN. *Syst. Nat.*

Nat. p. 163. *Spec. Plant.* p. 173. n. 1. *Fl. Carniol.*
p. 267. n. 4.

Caprifolium, DUHAMEL. *Arbor.* I. p. 123.

DIAGN. *Flores solitarii, verticillati, sessiles, terminales.*

Habitat ad sepes agri *Labacensis*, *Vipacensis*, *Gorizien-sis*, *Tergestini*, circa *Lok*, *Ober-Laybach*; Folia glabra. Flores (6—8). Corollae labium tubo unciali longus. Stamina sub stylo collocata *Baccae rubrae*, subovatae, foetae feminibus (1—6).

243. LONICERA *Periclymenum*.

Lonicera capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus; foliis omnibus distinctis. LINN. *Syst. Nat.* p. 165. *Spec. Plant.* p. 173. n. 3.

DIAGN. *E supremissis foliis prodeunt pedunculi 4-6-flori.*

Habitat in Agro *Gorizien-si*.

244. LONICERA *Xylosteum*.

Lonicera pedunculis bifloris; baccis distinctis; foliis integerrimis, pubescentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 166. *Spec. Plant.* p. 174. n. 6. *Fl. Carniol.* p. 268. n. 3. HALL. *Hist.* n. 677.

Xylosteon, DUHAMEL. *Arbor.* II. p. 373.

DIAGN. *Folia integerrima, villosa, Baccae rubrae, distinctae, geminiae.*

Habitat ad sepes, et circa sylvas. Maior M. florens. Folia ovata. Pedunculus teres, uncialis, tribus bracteis instructus, quarum media setacea, aliae autem ovatae sunt. Calyx tridentatus: dentibus glandulosis. Corolla alba, labii inferioris latitudine eadem, quae galeae laciniarum laterali; tubo subtus strumoso. Antherae rufescentes, polline luteolo, Filamenta pilosa ubique, apice excepto. Stylus totus villosus. Stigma bifidum, orbiculatum viride. *Baccae rotundae*, latere coalitae, rubrae, triloculares:

loculis dispermis. Semina ovalia, complanata, flavescens.

245. LONICERA alpigena.

Lonicera foliis ovali-lanceolatis; pedunculis bifloris; baccis coadunatis, didymis. LINN. *Syst. Nat.* p. 166. *Spec. Plant.* p. 174. n. 8. *Fl. Carniol.* p. 268. n. 2. HALL. *Hist.* n. 675.

DIAGN. *Folia glabra, ovato-oblonga. Floris galea triloba. Baccae connatae, rubrae.*

Habitat in sylvis, et pratis subalpinis.

Folia subtus splendentia. Pedunculi striati, digitum longi. Bracteae binae. Corolla rubra. Calix quinque-dentatus. Filamenta basi pilosa. Antherae corollae concolores.

246. LONICERA caerulea.

Lonicera pedunculis bifloris; baccis coadunato-globosis; stylis indivisis. LINN. *Syst. Nat.* p. 166. *Spec. Plant.* p. 174. n. 9.

Caprifolium foliis ovatis, bacca singulari, ovata, biflora. HALL. *Hist.* n. 674.

DIAGN. *Folia oblonga, nervosa. Baccae coalitae, nigro-caeruleae.*

Habitat in pratis subalpinis, circa Vojska. Bacca succo tinctorio plena.

82. VERBASCUM.

LINN. *Gen. Plant.* 217.

Calyx modice irregularis. TOURN. Tab. 61. D. Cor. rotatae, 5-fidae, tubus brevis. Stamina inaequalia. Capsul. bilocul. TOURN. E. F. bivalvis. LINN. valvis bifidis. Receptacula semenum bina, subrotunda, septo adnata.

Si VERBASCUM est Planta Personata, tunc etiam HYOSCYAMUS, STRAMONIUM, et aliae similes.

247. VERBASCUM Thapsus.

Verbascum foliis decurrentibus, utrinque tomentosis; caule simplici. LINN. *Syst. Nat.* p. 169.

Spec. Plant. p. 177. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 159. *Fl. Carniol.* p. 284. n. 1. HALL. *Hist.* n. 581.

Verbascum I. MATTHIOL. *Dioct.* p. 716.

DIAGN. *Folia amplexicaulia, utrinque tomentosa.*

Flores in longum thyrsum spicati.

Habitat in aridis, circa vias.

Folia crenata. Flores quatuor simul. Stamina flava: binis imberibus et truncatis, caeteris flavicante lana pubescentibus. Antherae fulvo-rubrae. Semina in uno loculo (ad 315).

Radix recens et sicca gallinaceam gentem mire nutrit ad obaeſitatem usque, acrimoniam quoque demulcet, ideoque utilifima in Phthysī bovilla LINN. imo et humana ZANNICHEL. et in cruciatibus dysentericis et haemorrhoidalibus. In Carniolia habetur ubique pro specifico in morbis Pulmonum Bovillae Gentis, dictum ideo *Plutschnik*, *Plutschentza*.

248. VERBASCUM Lychnitis.

Verbascum foliis cuneiformi-oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 169. *Spec. Plant.* p. 177. n. 2. *Fl. Carniol.* p. 284. n. 2.

Verbascum spica ramosa; foliis ovato-lanceolatis; inferioribus petiolatis. HALL. *Hist.* n. 583.

Verbascum pulverulentum, I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 872.

DIAGN. *Tota planta tomento pulverulento testa.*
Folia inferiora lanceolata, superiora sessilia et auriculata.

Habitat in incultis circa Gartschereutz.

Tomentum farinaceum, huic uni proprium,

249. VERBASCUM nigrum.

Verbascum foliis cordato - oblongis, petiolatis. LINN.

Syst. Nat. p. 169. *Spec. Plant.* p. 178. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 197.

Verbascum foliis imis petiolatis, cordato-lanceolatis: superioribus sessilibus, ovatis, acutis. HALL.
Hist. n. 584.

Verbascum nigrum. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 17².

DIAGN. *Caulis et rami laxe spicati; pedunculis ex uno loco (ad 7). Stamina omnia barbata villosa fluitantibus, et ovali saturatiore capitulo clavatis.*

Habitat ad radices montium,

Caulis angulatus, rubens. Folia oblonga, duplucato-crenata, superne rugosa et obscure virentia, subtus subhirsuta. Corollae faux maculis rubris, luteo variegatis, hemisphaericis coronata. Filamentorum apices luteo virides et imberbes. Antherarum pollen flavus. Stigma ad latera styli decurrentes. Capsula obtusa.

250. VERBASCUM phoeniceum.

Verbascum foliis ovatis, nudis, crenatis, radicalibus; caule subnudo, racemoso. LINN. *Syst. Nat.* p. 169. *Spec. Plant.* p. 178. n. 7.

Verbascum flore coeruleo vel purpureo, I. BAUH.
Hist. III. p. 875.

DIAGN. *Pedunculi uniflori, solitarii, subiecto folio longiores, in racemum longum digesti. Folia caulina lanceolata, sessilia, crenata, subvillosa.*

Habitat in *Kartschia* et *Istria*.

Caulis angulatus, folia sub floribus ovata. Pedunculi et calyces villosi. Tubo postice adsident maculae virides cordiformes. Filamenta barbata. Antherae fulvo polline plenae. Stylus glaber.

251. VERBASCUM *blattaria*.

Verbascum foliis glabris; imis petiolatis, sinuatis;
superioribus sessilibus; floribus solitariis. *Fl. Carniol.* p. 285. n. 3.

Verbascum foliis amplexicaulibus, oblongis, glabris;
pedunculis solitariis. LINN. *Syst. Nat.* p. 170.
Spec. Plant. p. 178. n. 4.

Verbascum spica rarissima, foliis glabris, ferratis,
dato-lanceolatis; imis semipinnatis, superioribus
amplexicaulibus. HALL. *Hist.* n. 585.

Blattaria lutea I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 874.

DIAGN. *Folia glabra: ima sinuata, superiora am-*
plexicaulia.

Habitat ad vias, non rarum.

Caulis striatus. Foliorum orae crispae et dentatae.
Corollae flavae. Pedunculi subiecto folio breviores.
Calyces glandulosi. Filamenta supra medium bar-
bata villis rubris et clavatis; sed stamen supremum
et duo alia huic proxima albam barbam gerunt. Sty-
lus glandulosus. Germen glandulosum. Capsula
rotunda.

83. STRAMONIUM.

TOURN. I. R. H. p. 118. Tab. 43.

Calyx tubulosus. C. semideciduus. GLE-
DITSCH. Corolla infundibul. plicata. Stig-
ma bilamellatum. Caps. 4-valvis. *Idem.*

152. STRAMONIUM *Foetidum*.

Datura pericarpiis spinosis, erectis, ovatis; foliis ova-
tis, glabris. LINN. *Syst. Nat.* p. 170. *Spec.*
Plant. p. 179. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 181. *Fl. Carniol.*
p. 290. STOERCK. *libell. de Datura cum icon.*
Stramonium foliis angustis; fructu erecto, murica-
to; calyce pentagonio. HALL. *Hist.* n. 586.
Solanum maniacum. COLUMN. *Phythob.* p. 47.

DIAGN. *Capsulae spinosae, erectae, ovatae.*

Habitat fecus vias, *Styriam* versus.

Capsulae quadriloculares valvae contextae nervis ramo-
sis anastomosantibus, quorum aliqui connivent et co-
alescunt in spinas. Septa omnino bina, sed unicum
usque ad apicem capsulae extensum. Semina (ad
160), nigra, reniformia, foveis exarata.

84. HYOSCYAMUS.

TOURN. I.R.H. p. 117. p. 42.

Calyx quinquedentatus. Corolla infundi-
 buliformis. Capsula bilocularis, circumscissa,
 polysperma.

253. HYOSCYAMUS niger.

Hyoscyamus foliis amplexicaulibus sinuatis; floribus
 sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 170. *Spec. Plant.*
 p. 179. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 199. GRONOVI. *Orient.*
 p. 20. *Fl. Carniol.* p. 289. HALL. *Hist.* n. 580.
 STOERCK. libell. de *Hyoscyam.* cum iconē.

DIAGN. Pilosus, ruderalis; floribus pallide luteis,
 capsulis secundis.

Habitat in oppidis et pagis circa domos.

Capsula cupellae furni anemii similis, quam culter faci-
 le in duas separat interno latere fissas. Corolla in-
 aequaliter 5-fida, operculum capsulae bilocularē.

254. HYOSCYAMUS Scopolia.

Atropa caule herbaceo; foliis ovatis integris; caly-
 cibus erectis; fructu capsulari. *Fl. Carniol.*
 p. 288. n. 2.

Hyoscyamus foliis ovatis integris; calycibus infla-
 tis, campanulatis, laevibus. LINN. *Syst. Nat.*
 p. 171.

Scopola Carniolica. IACQUIN.

Solanum somnificum, alterum. MATTHIOL. non
 enim alia planta Solanoides in eo, quem indicat,
 loco

loco nascitur; sed bonus homo, maluit fructum baccatum dicere, quam sibi ignotum ingenue fateri.

Radix pereennis, transversa, nodosa, crassa, ramosa, flexuosa, pollicis crassitie, humo tecta.

Caulis etiam tripedalis, herbaceus, teres, glaber, digitis crassitie, trifidus et bifidus; ramis dichotomis, ut in *ATRORA Belladona*.

Folia ovata et oblonga, digitii longitudine: ima integrerrima, superiora non raro modice sinuata, aut repanda.

Pedunculi uniflori, penduli, ex axillis et alis, debiles, biunciales.

Calyx pendulus, glaber, quinquedentatus, persistens, amplior fructu, et quasi inflatus.

Corollae color et figura eadem, ut in *ATROPA Bellad.*
Stamina attenuata, villosa.

Antherae biloculares, luteolae.

Stylus deciduus, staminibus longior; stigmate capitulo, subbifido, pulvinato, et in apice trigona foveola notato.

Germen sessile, glabrum, fasci flavum.

Capsula tenuis, diametro quinque linearum, calyce minor, difficulter dehiscens; operculo signato lineis duabus cruciformibus.

Semina in singulo loculo (20 — 24), receptaculo orbiculato adfixa, non germinantia.

Habitat in sylvis circa Idriam, frequens, circa medium Aprilis florens.

Ab *ATROPA* differt fructu capsulari, calyce, stigmate, et receptaculi dentibus nectariferis.

Pro novo Genere sub *Scopolae* nomine proposuit Cl. IACQUINIUS. Verumtamen merita mea in re herbaria non ea esse fateor, quae me viris illis ad numerare queant, quorum cognomina novis plantarum generibus data fuerunt. Alii sunt his honoribus longe digniores. Vide ANN. nostrum IV. Hist. Nat. in *Dubiis Botan.*

85. BELLADONNA.

CLUS. TOURN. I. R. H. p. 77. Tab. 13.

Bacca subrotunda, patulo calyce imposita.
TOURN. E. C. Segmenta quoque calycina
haud prorsus aequalia sunt. C.

255. BELLADONNA *Trichotoma*.

Atropa caule herbaceo; foliis ovatis, integris. LINN.
Syst. Nat. p. 171. *Spec. Plant.* p. 181. n. 1. *Flor. Carniol.* p. 287. n. 1.

Belladonna caule herbaceo, brachiato, foliis ovato-lanceolatis, integerimis. HALL. *Hist.* n. 579.

Belladonna. CLUS. *Pann.* p. 503.

DIAGN. *Caulis herbaceus. Folia ovata, et integra.* LINN.

Habitat in sylvis nostris, non rara, sub initium Iunii
florens.

Inter locula antherarum iacent bina tubercula. Stigma
bilobum. Bacca stellato calyci insidens, nigra, luci-
da, succulenta valde, obtusa et punctulis impressis
notata; receptaculis duobus cordiformibus, quibus
adhaerent semina (110).

86. PHYSALIS.

DIOSC. L. 4. C. 67.

Bacca rotunda, bilocularis, inflato calyce
tecta. TOURN. I. R. H. Tab. 64. H. E. F.

256. PHYSALIS *Halicacabum*.

Physalis foliis geminis integris, acutis; caule herba-
ceo, inferne subramosa. LINN. *Syst. Nat.*
p. 172. *Spec. Plant.* p. 183. *Fl. Suec.* 2. 183. *Fl.*
Carniol. p. 285.

Physalis foliis coniugatis, cordatis, sinuatis; caule
ramoso. HALL. *Hist.* n. 577.

Solanum Halicacabum, MATTHIOL. *Diosc.* p. 677.

DIAGN.

DIAGN. *Folia gemina LINN. cordata. Calyx rubens.* HALL.

Habitat in siccis et sylvestribus, sub finem M. Maii florens.

Radix translata in hortis, reptatu suo denique molesta est. Unica ala florida. Pedunculus corollae diametro brevior. Calyx cum albida corolla villosus. Stamina tria longiora. Germen basi fulvum. Stigma subtrigonum, fere ut in *Liliis*.

87. SOLANUM.

TOURN. I. R. H. p. 148. Tab. 62. et LYCOPER-
SICUM EIUSD.

Antherae circa stylum coalitae. Bacca calyce patulo nec turgido fustentata.

257. SOLANUM Dulcamara.

Solanum caule inermi, fruticoso, tereti; foliis superioribus hastatis; racemis dichotomis, oppositis. Fl. Carniol. p. 286. n. 1.

Solanum caule inermi, frutescente, flexuoso; foliis superioribus hastatis; racemis cymosis. LINN.
Syst. Nat. p. 173. Spec. Plant. p. 185. n. 5. Fl. Suec. 2. 201.

Solanum caule flexuoso frutescente; foliis supremis tripartitis et cordato-lanceolatis. HALL. Hist. n. 575.

Vitis sylvestris. MATTHIOL. Diosc. p. 790.

DIAGN. *Caulis frutescens, inermis. Folia superiore hastata, Racemi dichotomi, folio oppositi.*

Habitat in ruderolis, circa sepes, et aquaeductus. Pedunculi florales ad basin bulbosi. Calycina segmenta acuminata. Corolla violacea ad basin singuli segmenti habet maculas duas virides et ovatas. Fructus continet semina (20).

258. SOLANUM *nigrum*.

Solanum caule inermi, herbaceo, ancipiti; foliis ovatis, angulatis; umbellis solitariis, cernuis.
Fl. Carniol. p. 287. n. 2.

Solanum caule inermi, herbaceo; foliis ovatis, dentato-angulatis; racemis distichis nutantibus.
 LINN. *Syst. Nat.* p. 173. *Spec. Plant.* p. 186. n. 12.
Fl. Suec. 2. 200. HALL. *Hist.* n. 576.

DIAGN. *Caulis anceps*, herbaceus. *Folia ovata*,
angulata. *Umbellae solitariae*, cernuae.

Habitat in cultis.

Pedunculi subumbellati. Calycis segmenta subrotunda.
 Corollae albae. Stamina villosa. Baccæ nigrae.

88. RHAMNUS.

LINN. *Gen. Plant.* 235.

Calyx divisus in dentes patulos tot, quot stamina. Petala parva, ligulata, sub quibus stamina latent. Fructus saepius baccatus et divisus in locula tot, quot styli aut stigmata.

259. RHAMNUS *catharticus*.

ARDUIN. *Memor.* I. p. 74. Tab. 13.

Rhamnus spinis terminalibus: floribus quadrifidis, dioicis; foliis ovatis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 178. *Spec. Plant.* p. 193. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 202. *Fl. Carniol.* p. 589. n. 3.

Rhamnus foliis spinosis, ovato-lanceolatis, ferratis.
 HALL. *Hist.* n. 824.

Spina infectoria. MATTHIOL. *Diosc.* p. 129.

DIAGN. *Frutex erexitus*. *Calyces quadrifidi*. *Floræ hermaphroditi in una planta*, masculi in alia.
Stylus semitrifidus.

Habitat ad vias, sepes, colles.

Petala alba. Semen quasi pyriforme, fuscum, uno latere futura marginatum, basi rotundatum, apice acuminata.

minatum. Bacca rotunda, separabilis a calyce persistente et integro. Semina raro ultra quatuor,

260. RHAMNUS *Lycium*.

Rhamnus catharticus minor, ARDUIN. *Memor*. I.

p. 78. Tab. 14. DU HAMEL. *Arbor*. II. p. 214. n. 2.

Grain d' Avignon. TOURN. *Inst.* p. 593.

Lycium Gallicum. I. BAUHIN. *Hist.* I. P. II. p. 58.

DIAGN. *Flores hermaphroditi et masculi in diversis plantis. Floris hermaphroditi. Calyx cyathiformis, edentatus. Stylus indivisus et truncatus.*

Habitat inter lapidum fissuras, supra *Prewald*, ad radicem *M. Nanas*.

III. LINNAEUS in litteris fecit varietatem RHAMNI *cathartici*. Huic Radix intra lapidum fissuras adeo arcte descendit, ut evelli non possit. Caulis statim supra radicem sinditur in ramos ramosissimos, quibus densum cespitem constituit. Spinae terminales et laterales, nudae, Folia elliptica, ferrulata, subitus villosula. Flores copiosi axillares, alares, et infra folia. Calyces luteoli. Petala minuta, flavescentia, Bacca trilocularis; loculo anno saepius inani.

261. RHAMNUS *Alpinus*.

Rhamnus inermis; floribus dioicis; foliis duplicato-crenatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 179. *Spec. Plant.* p. 193. n. 2.

Rhamnus inermis, foliis ovatis, crenulatis. HALL. *Hist.* n. 823.

DIAGN. *Flores hermaphroditi. (Femineos nondum vidi.) Petala bifida. Styli trifidi.*

Habitat passim in montanis nostris, et ad vias publicas, non ubique florens.

Folia magna, ferrata, oblonga; nervis ferrugineis. Flores ex alis et infra folia. Calyces quadrifidi; segmentis demum reflexis.

262. RHAMNUS *Rupestris*. Tab. 5.

Frangula montana, pumila, saxatilis; folio subrotundo. TOURNEF. *Inst.* p. 612?

DIAGN. *Folia ovata, obiter crenata, nervis ferruginea lana testis.*

In montibus et rupibus, circa *Goriziam* invenit et communicavit. P. WULFEN.

Arbuscula parva, inermis. Folia vix uncialia; oris subcartilagineis, albidis, et obsolete crenatis. Flores omnes hermaphroditi, 4-5-fidi; segmentis calycinis subdenticulatis. Petala et stamina alba. Fructum nondum vidi.

263. RHAMNUS *Frangula*.

ARDUIN. *Memor.* I. p. 80, Tab. 15.

Rhamnus inermis; floribus monogynis, hermaphroditis; foliis integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 179. *Spec. Plant.* p. 193. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 203. *Fl. Carniol.* p. 588. n. 1.

Rhamnus inermis foliis oyato-lanceolatis, integris; floribus quinquefidiis, androgynis. HALL. *Hist.* n. 821.

Frangula MATTHIOL. *Diosc.* p. 783.

DIAGN. *Folia integerrima. Flores hermaphroditi, semiquinquefidi. Bacca primo rubra, dein nigra.*

Habitat in montibus et sepiibus passim.

Bacca trilocularis iuniperinae magnitudine. Semen ovatum flavum, compressum in quolibet loculo, uno quandoque caeteris minore, vel et penitus eliso.

264. RHAMNUS *Paliurus*.

Rhamnus aculeis geminatis: inferiore reflexo; floribus trigynis. LINN. *Syst. Nat.* p. 179. *Spec. Plant.* p. 194. u. 5. GRONOV. *Orient.* p. 23. *Fl. Carniol.* p. 589. n. 2.

DIAGN.

262. *Rhamnus Rupestris*.

Tab. 5.



DIAGN. Racemi laterales, folio breviores. Petiolus nascitur inter duos aculeos, quorum unus rectus et petiolo longior, alter reflexus est et brevior.

Habitat in Agro Vipacensi, et Gorizieni.

265. RHAMNUS Zizyphus.

Rhamnus aculeis geminatis, rectis; floribus digynis; foliis ovato-oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 180. *Spec. Plant.* p. 194. n. 10.

DIAGN. Aculei recti, geminati. Flores digyni LINN. Ego digynos et trigynos video.

Habitat Goriziae.

Calyx stellatus. Petala post nuptias reflexa, quae prius erecta erant.

89. EVONYMUS.

THEOPH. CLUS. TOURN. I. R. H. p. 617.

Tab. 388.

Calycini dentes, Petala, Stamina, Fructus locula, valvae, semina, (4-5). Stylus unicus. Fructus singularis constans cortice coriaceo, quadrilobo; loculo singulo fovente granum album, duplice cute miniata tectum, et continens nucleum ex binis lamellis viridis factum. Fructus hic latere dehiscens granum ostendit futurae albae loculi singuli tenui filo adpensum. Structura haec nec Capsulae, nec Baccae convenit.

266. EVONYMUS latifolius.

Evonymus pedunculis lateralibus; petalis subrotundis; fructibus alatis. Fl. Carniol. p. 325. n. 3. HALL. Hist. n. 829.

Evonymus latifolius. C. BAUHIN. Pin. p. 428. TOURNEFORT. Inst. p. 617. IONSTON. Dendr. L. 7. C. 3. Tab. 104. DUHAMEL. Arbor. II. p. 225. n. 3.

Evonymus I. CLUS. Hist. I. p. 56.

DIAGN. Petala rotunda. Filamenta sunt tuberculata conica, viridia, antheras sustinentia.

Habitat in frigidioribus sylvis.

Folia LONICERAE Alpigenae, serrulata, non lucida. Calycina segmenta rotundata, oris albidis. Petala saepius quina. Sigma bifidum. Capsula inaequaliter truncata, non depressa, quinis aliis a CLUSIO quoque notatis, plerumque instructa, latitudine summa dimidia longitudinis.

267. EVONYMUS vulgaris.

Evonymus pedunculis solitariis; petalis oblongis; fructibus apteris Fl. Carniol. p. 324. n. 1.

Evonymus foliis ovato-lanceolatis, serratis; ramis tetragonis. HALL. Hist. n. 829.

Evonymi Europaei. LINN. Spec. Plant. p. 197. Var. (a).

DIAGN. Petala oblonga; oris revolutis. Valvorum apices elevati, capsulae verticem deprimunt.

Habitat paucim ad sepes.

Petala (4) albo-viridia. Foveolae totidem nectariferae, receptaculo tetragono insculptae, e quibus stamina prodeunt, stylo duplo longiora. Capsula ad lentem villosula, cuius longitudo ad latitudinem summam se habet ut 3 ad 5.

268. EVONYMUS verrucosus.

Evonymus pedunculis lateralibus; petalis subrotundis; fructibus apteris. Fl. Carniol. p. 324. n. 2.

Evonymus granis nigris. IONSTON. Dendr. L. 2. C. 3. Tab. 104. cum icone non bene hirsuta.

Evonymus flore phoeniceo. I. BAUHIN. Hist. I. P. II. p. 203.

Evonymus II. CLUS. Hist. I. p. 55. verrucosa superficie bene expessa.

DIAGN.

DIAGN. Rami verrucosi. Calycis segmenta et petala utrinque rubro-punctata. Seminis portio excutientia prospiciens atra, ut semen GLYZNES Abri.

Habitat in rupibus et asperioribus sylvis.

Differet a prioribus 1. Caule ramisque verrucosis. 2. Petalarum pagina superiore exiguarum papillarum velle-re tecta. 3. Antheris rotundatis et filamento suo pyramidali ita impositis ut pileus in AGARICIS. 4. Tuberculo elevato, sustinente singulum filamentum. 5. Receptaculo rubris punctis variegato. 6. Stylo nullo, eiusque loco, stigmate vesicae simili. 7. Capsulae vertice depresso, superficie rugulosa, latitudine longitudini pari. 8. Seminibus seminigris.

90. GROSSULARIA.

TOURN. I. R. H. p. 639. Tab. 409.

Calycina Segmenta, Petala, Stamina (5). Stylus nullus. Bacca globosa, unilocularis, polysperma.

269. GROSSULARIA rubra.

Ribes inerme; racemis glabris, pendulis; floribus planiusculis. LINN. Synt. Nat. p. 184. Spec. Plant. p. 200. n. 1. Fl. Suec. 2. 205. GRONO V. Orient. p. 27. Fl. Carniol. p. 588.

Ribes inerme floribus planiusculis, stipulis minimis. HALL. Hist. n. 818.

DIAGN. Racemi florales, demum deflexi. Calyx rotatus. Petala sub hemisphaerica; erecta, parva.

Habitat in sylvis circa Idriam in Struk. Aprili M. florens.

Dubitare omnino licet, RIBES Alpinum LINNAEI a Rubro EIUSDEM non esse distinctum, cum ex Veterum descriptionibus et figuris, nullum verum discriminem erui possit; Dein RIBES rubrum sylva-

rum nostrarum incola racemos florales primo erectos habet, dein vero reflexos, quos etiam exhibet figura RIBESII *alpini* a I. BAUHINO data.

Cultura conciliat huic Plantae calycem magis erectum, petala emarginata, stamina e fundo calycis prodeuntia, bracteas subrotundas.

270. GROSSULARIA *Uva.*

DIAGN. *Spinosa; pedunculis unifloris; baccis hirsutis, pellucidis. albidis.*

Habitat circa Guelb, et alibi.

III. LINNAEUS separat GLOSSULARIAM ab UVA *crispa*, eique baccas hirsutas, huic vero glabras designat. Sed obiicere omnino licet 1. GLOSSULARIAM *simplici acina*, vel *spinosam sylvestrem*. C. BAUH. quam UVAM *crispam*, LINNAEUS appellavit, esse omnino, iuxta TOURNEFORTIUM et alios, UVAM *crispam*, s. GROSSULARIAM I. BAUHINI, cuius baccas hirsutas esse monet, non vero glabras. 2. HALLERUS et si de hirsutie baccarum RIBESII sui primi, qui est UVA *crispa* LINNAEI, mentionem nullam fecerit, attamen monuit, ovarium gerere subhirsutum. Quod si dicat, decuti hosce villos in fructu maturo, erit hoc ipsum evidens argumentum notae fallacis, cui inadficatae sunt effientiae specificae RIBESII *Grossulariae*, et UVAE *crispae*. 3. Si daretur Grossularia fructu glabro diversa ab alia, quae eosdem hirsutos habet, Veteribus sine dubio innotuisset, ut synonynum ex BAUHINI *Pinace* petere potuisset. III. LINNAEUS, ubi de RIBESIO *Grossularia* verba fecit.

91. HEDERA.

TOURN. I. R. H. p. 612. Tab. 384.

Petala quinque. Bacca pentasperma, receptaculo coronata. Cum UMBELLIFERIS in Ordine Nat. coniungi nullo modo potest.

271. HE-

271. HEDERA *Helix*.

Hedera foliis ovatis lobatisque. LINN. *Syst. Nat.*
p. 184. *Spec. Plant.* p. 202. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 209.
Fl. Carniol. p. 322.

Hedera foliis sterilibus, trilobatis, fructiferis ovato-lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 826.

DIAGN. *Folia angulata et integra*.

Habitat in arboribus antiquis, et muris.

Umbellae terminales globosae. Bacca subrotunda, apice dilatata, coronata receptaculo et stylo conico brevi, quadrilocularis; loculis monospermis: uno non raro inani.

Prodest in Erysipelite et cutaneis inflammationibus. Ingens copia infectorum in his floribus nectar lingit.

92. VITIS.

TOURN. I. R. H. p. 613.

Calyx exiguus, quinquedentatus. Petala (5.) mox decidua. Stylus nullus. Bacca unilocularis. Semina quatuor scutiformia, semibilocularia. LINN. GLEDITSCH.

272. VITIS *Labrusca*.

Vitis foliis cordatis, subtrilobis, dentatis, subtus tomentosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 184. *Spec. Plant.* p. 203. n. 3.

Vitis foliis semitrilobatis hirsutis, dentatis. HALL. *Hist.* n. 825.

DIAGN. *Folia lobata*.

Habitat ad sepes *Duinenses*, et *Gorizienses*.

Labrusca LINNAEI est planta Americana, quaenam ergo est *VITIS spontanea* ad sepes *Europæ Australis*, cui pariter descriptio quaelibet *VITIS sylvestris* haec data convenit? Haec *VITIS sativæ* mater, HALL. SEGUIER. Sapidissimum vinum præbet.

93. PERVINCA.

TOURN. I. R. H. p. 119. Tab. 45.

Apex singuli filamenti dilatatus retrorsum flectitur, latus vero adnatum antheram gerit. Sub stigmate rotundato et umbilicato est annulus eo amplior. Fructus sit binis folliculis semina nuda remota foventibus.

273. PERVINCA minor.

Vinca caulis procumbentibus; foliis lanceolato-ovatis; floribus pedunculatis. LINN. Syst. Nat. p. 189. Spec. Plant. p. 209. n. 1. HALL. Hist. p. 572.

Clematis I. MATTHIOL. p. 616.

DIAGN. *Caules steriles humifusi, viminei; florifer erectus. Pedunculus nudus ex una ala tertiae foliorum coniugationis.*

Habitat in siccis et asperioribus locis.

Planta suffrutescens, sempervirens, sub finem Martii florens; foliis marginatis, duris, oblongis; auriculis conicis, cohaerentibus, stellam facientibus in fauce corollae.

Herbae decoctum lacteum sanavit raucedinem, aphoniae fere similem.

274. PERVINCA maior.

Vinca caulis erectis, foliis ovatis; floribus pedunculatis. LINN. Syst. Nat. p. 189. Spec. Plant. p. 209. n. 2.

Pervinca caulis erectis, foliis ovato-lanceolatis, ciliatis, petiolis unifloris. HALL. Hist. n. 573.

Pervinca latifolia. TOURNEF. Inst. p. 119. TILI H. Pisan, p. 133.

DIAGN. *Caules erecti. Folia villosa. Calyx pentaphyllus; foliis duobus maioribus.*

Habitat Goriziae.

Folia

Folia ovata. Calycina folia lanceolata, villosa. Corollae segmenta integerrima. Filamenta glabra. Stylus flavescent; stigmate alba lana pubescente.

DIGYNIA.

94. ASCLEPIAS.

LINN. *Gen. Plant.* 270.

Stamina supra medium cohaerentia. Antherarum apices membranacei, germini apicis stellae ad instar circumpositi. Cotyla nectari-fera quinqueloba, germen sustentans. Styli nulli. Semina papposa, folliculis duobus inclusa.

275. ASCLEPIAS *Vincetoxicum*.

Asclepias foliis ovatis, basi barbatis; caule erecto; umbellis proliferis. LINN. *Syst. Nat.* p. 193. *Spec. Plant.* p. 216. n. 12. *Fl. Suec.* 2. 212. *Fl. Carniol.* p. 437.

Asclepias ex aliis racemosa; caulibus simplicibus erectis; foliis ovato-lanceolatis. HALLHIST. n. 571. Vincetoxicum MATHIOL. *Diosc.* p. 539.

DIAGN. *Corolla sine corniculis. Folia subcordata. Racemus floralis inter petiolos e latere caulis produens.*

Habitat in aridis collibus.

Foliorum nervi villosuli. Racemi foliis longiores. Corollae albae.

95. HERNIARIA.

TOURN. I. R. H. p. 507. Tab. 287.

Calycina segmenta tot, quot stamina (4-5), fertilia totidemque sterilia. LINN. Tuba bifida

fida HALL. Semen unicum. DILLEN.
Capsula polysperma. Semina involucro te-
nui tecta. RAI. monosperma TOURN.
GLEDITSCH. cum PORONYCHIA TOURN.
et ILLECEBRO LINN. coniungit. ADANS.
AMARANTHIS magis, quam SPERGULIS adnu-
meranda, ob intermedium QUERIAM.

276. HERNIARIA glabra.

Herniaria glabra. LINN. Syst. Nat. p. 194. Spec.
Plant. p. 218. n. 1. Fl. Suec. 2. 213.

Herniaria glabra; glomerulis multifloris. HALL
Hist. n. 1552.

DIAGN. Flores saepius solitarii.

Habitat in arenosis, aridissimisque locis, circa Duinum.
Caulis fere decumbens. Flores breviter pedunculati.
Bracteae albae et ciliatae.

277. HERNIARIA hirsuta.

Herniaria hirsuta. LINN. l. c. n. 2. I. BAUHIN
Hist. III. p. 379.

Herniaria hirsuta; glomerulis paucifloris. HALL
Hist. n. 1553.

DIAGN. Planta erecta hirsuta, ramosior, floribus
sessilibus, (usque 6) ex uno loco.

Habitat in Carniolia calidiore,

96. CHENOPODIUM.

TOURN. I. R. H. p. 506. Tab. 288.

Calyx profunde quinquefidus. Corolla
nulla. Stylus profunde bifidus. Semen nu-
dum orbiculatum. TOURN. erectum ADANS.
Capsula unilocul. LUDWIG.

278. CHENOPODIUM Bonus Henricus.

Chenopodium foliis triangulari sagittatis, integerri-
mis; spicis compositis, aphyllis, axillaribus.
LINN.

LINN. *Syst. Nat.* p. 194. *Spec. Plant.* p. 218.
n. 1. *Fl. Suec.* 2. 214. *Fl. Carniol.* p. 424. n. 1.

Chenopodium foliis triangularibus, undulatis integerrimis, subtus farinosis. HALL. *Hist.* n. 1578.

DIAGN. *Folia sagittata, integerrima, subtus saponaceo polline adspersa.*

Habitat in ruderatis et ad vias.

279. *CHENOPODIUM Polyspermum.*

DIAGN. *Folia ovata, integerrima. Caulis erectus, ramosus, racemis alaribus paniculatus.*

Habitat in cultis.

Specierum notitiae, earumque essentiae naturales, in hoc Genere, etiamnum mancae sunt. Ego hanc, in cultis, vulgarem plantam, ideo ad CHENOPOD. *Polyspermum* LINNAEI refiero, quia mea specimina cum figura et descriptione BLITI *erectioris*, *sive tertii* TRAGI a I. BAUHINO data, et ab HALLEERO citato cum Synonymo. C. BAUHINI eodem, quod LINNAEUS *CHENOPODIUM* vocat *polyspermum*, omnino convenient, sed caulis non decumbentibus, nec racemis dichotomis, ut habet LINNAEUS.

Nostrae plantae Caulis pedalis, obtusae tetragonus, glaber, rubellus, Rami oppositi, fursum breviores: binis supra radicem. Folia petiolata; oris rubellis. Racemi semiuncia raro longiores, cupressiformes, sed in supremis alis glomerati. Calyces pentaphylli, glabri. Stylus brevis, profunde bipartitus. Semen rubrum, calyci conniventi innixum.

280. *CHENOPODIUM viride.*

DIAGN. *Calycina segmenta et folia subtus farinacea. Racemi florales glomerati.*

Habitat in cultis.

Semen nigrum, rotundum, depresso, tectum membranula tenuissima aurato nitore fulgida.

Vix ulla diversitas inter CHENOPODIUM *viride* et *albūm* LINNAEI; et hoc forte ratio est, quod CHENOPOD. *Opuli folii* VAILLANTII in Spec. Plant. ad *viride*, in Fl. Suec. autem ad *albūm* relatum fuerit. An vere diversum CHENOP. *murale* LINN.? an non idem dubium de *rubro* movendum? certe si CHENOPODIUM *Daturae folium* a *viridi* natum fuisse suspicari potuit LINNAEUS, quidni etiam ex *Anserino pede Veterum* varias proles demum natas; dubitabimus?

281. CHENOPODIUM *Vulvaria*.

Chenopodium foliis integerrimis, rhomboe-ovatis; floribus conglomeratis, axillaribus. LINN. Syst. Nat. p. 195. Spec. Plant. p. 220. n. 13. Fl. Suec. 2. 222.

Chenopodium caule diffuso; foliis obtuse lanceolatis. HALL. Hist. n. 1577.

DIAGN. Foetor singularis speciem distinguit.

282. CHENOPODIUM *scoparia*.

Chenopodium foliis linear-lanceolatis, planis, integerrimis. LINN. Syst. Nat. p. 195. Spec. Plant. p. 221. n. 15.

Chenopodium Linifolio villoso. TOURNEFORT. Infl. p. 506.

Linaria Belvedere. I. BAUHIN. Hist. III. p. 462.

DIAGN. Folia linear-lanceolata, integerrima, villis ciliata. Flores duo sessiles in supremis alis.

Habitat Goriziae et Tergesti, in cultis.

Caulis teres. Folia subtus nervosa. Pericarpium pentagonum. Stylus bifidus et trifidus.

Planta haec Cimices pellit.

283. CHENOPODIUM *maritimum*.

Chenopodium foliis subulatis, semicylindricis. LINN. Syst. Nat. p. 195. Spec. Plant. p. 221. n. 16.

Chenopodium fedifolio minimo; kali facie ZANICHEL. Ven. p. 64. n. 67.

DIAGN.

DIAGN. *Folia linearia, glauca. Calyces sessiles in alis superioribus.*

Habitat *Tergesti.*

97. KALI.

TOURN. I. R. H. p. 247. Tab. 128.

Stamina inserta laciniis calycinis. Stylus bifidus. Semen spirale. Cal. 5 fol. Stigmata bina. ADANS.

284. KALI *Tragus.*

Salsola herbacea, erecta; foliis subulatis, spinosis, levibus; calycibus ovatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 195. a.

Kali spinosum; foliis crassioribus et brevioribus.

TOURNEF. *Inst.* p. 247. ZANNICHEL. *Ven.* p. 153. Tab. 17.

Tragum. MATTHIOL. *Diosc.* p. 658.

DIAGN. *Folium spina terminatum. Flores digyni.*

Habitat in maritimis *Austriaci Littoralis.*

Stamina ex receptaculo non ex calyce prodeunt. Capsula rotunda, tecta segmentis calycinis, fovens semen spirale.

285. KALI *Soda.*

Salsola herbacea patula, foliis inermibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 196. *Spec. Plant.* p. 223. n. 5.

DIAGN. *Folia longiora, tenuia, carnosa, inermia.*

Habitat ibidem.

98. ULMUS.

TOURN. I. R. H. p. 601. Tab. 372.

Calycinis dentes tot, quot stamina. (4-5). Corolla nulla. Fructus siccus, compressus, mono-

monospermus. DU HAMEL. Arbor. II.
p. 367.

286. *ULMUS campestris.*

Ulmus foliis duplicato - ferratis, basi inaequalibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 198. *Spec. Plant.* p. 225.
n. 1. *Fl. Suec.* 2. 226.

Ulmus foliis ovato - lanceolatis, dentatis, dentibus
ferratis. HALL. *Hist.* n. 1586.

DIAGN. *Dentes calycini duo minores, lobulo lat-*
rali ad basin aucti.

Habitat *Vipaci*, *Goriziae*, et alibi.

99. GENTIANA.

LINN. *Gen. Plant.* 285. HALL. *Hist.* p. 282.

Genus naturale, Radice fibrosa; Foliis in-
tegris, oppositis, Cal. monophyllo, tot den-
tibus quot seginenta Corollae, et quot Stami-
na. Stigmatibus binis. Capsula longa, uni-
loculari, polysperma.

Genera artificialia sunt, *CENTAURIUM mi-*
nus, *PNEVMONANTHE*, *SABATIA*, *TRETORHI-*
ZIA, *CIMINALIS*, *DASYSTEPHANA*, *CICENDIA*,
CHLORA, *ASTERIAS*, *COILANTHA*, *CYANA*,
THYLACITIS, *ERICOILA*, *ERITHRAEA*,
OPSANTHA, *EYRYTHROLIA*.

(*) *Corollis saepius quadrifidis.*

287. *GENTIANA ciliata.*

Gentiana corollis quadrifidis, margine ciliatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 201. *Spec. Plant.* p. 231.
n. 19. *Fl. Carniol.* p. 297. n. 2.

Gentiana flore quadrifido; oris ciliatis. HALL.
Hist. n. 653.

Gentiana lanuginosa. I. BAUH. *Hist.* III. p. 525.

DIAGN.

DIAGN. *Folia linearis-lanceolata. Segmenta corollae per oram barbata. Florescentia a fine Augusti M. per totum autumnum.*

Habitat in collibus siccis, circa Idriam, et alibi.

Caulis subdecumbens. Folia longitudine calycis tetragonii et rubro-punctati. Filamentorum bases ad oram barbatae, apices decurvi. Germen pedicellatum: pedicello tubulofo; cui adsident quatuor glandulae nectariferae; stigmata foliacea; subrotunda; marginibus reflexis.

288. GENTIANA Crucifera.

Gentiana corollis quadrifidis, imberbis, verticillatis, sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 201. *Spec. Plant.* p. 231. n. 20. *Fl. Carniol.* p. 296. n. 1.

Gentiana foliis ovato-lanceolatis, nervosis, vaginibus; floribus verticillatis et umbellatis. HALL. *Hist.* n. 643.

Gentiana minor. MATTHIOL. *Diosc.* p. 439.

Tretorhiza. RENEALM. *Spec.* 74. Tab. 73. A-DANS. *Famil. Pl.* p. 503.

DIAGN. *Flores verticillati. Corollae imberbes.*

Habitat secus vias et in aridis.

Caules magna ex parte diffusi et quatuor ex una radice. Pedunculi triflori, supremi uniflori. Calyx fructifer in hac specie non rumpitur latere. Capsulae erectae. Semina ovata, exigua, ferruginea, rugulosa, splendida (ad 216).

289. GENTIANA campestris.

Gentiana corollis quadrifidis, fauce barbatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 200. *Spec. Plant.* p. 250. 251. n. 17. 18. *Fl. Carniol.* p. 300. n. 10.

Gentiana faucibus barbatis, calycis segmentis quinis aequalibus. HALL. *Hist.* n. 651.

DIAGN. *Corollae in fauce barbatae. Folia amplexicaulia.*

GENTIANAM *campestrem* cum *Amarella*, in unam speciem, sequentes notae coniungunt. Corollae instantे pluvia sese claudentes. Auriculae tenuiter laciñiatae, erectæ. Calycinorum dentium margines reflexi. Corollae basis tam firmiter adhaerens calyci, ut avulsa interiorem eius cutim secum rapiat, Stigmata lamellosa, erecta, adposita, integerrima et obtusa.

(**) *Corollis quinquefidis.*

(†) *Hypocrateriformibus.*

290. GENTIANA *pumila*.

Gentiana corolla quinquefida, infundibuliformi, sub-serrata; foliis lanceolato-linearibus. LINN.
Syst. Nat. p. 200. IACQUIN. Austr. p. 215.
n. 18. Obs. Botan. II. p. 29. Tab. 49.

Gentianella omnium minima. C. BAUH. Prodri.
p. 97.

DIAGN. *Calyx semiquinquefidus, quinque lineis elevatis angulatus. Corollae segmenta integerrima. Auriculae bicornes.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*; ex *Austria* quoque specimen obtinui, nostris simillimum.

Folia acuta, quatuor lineas vix longa, unam lata. Cauliculus circiter uncialis; duobus paribus foliorum: uno prope calycem. Corollae tubus flavescens, non plicatus.

An differat a GENTIANA *verna*, dubitat III. HALLER dum ait: *Neque ego credo Gentianam minimam differe ab Hippio.* in Epist.

291. GENTIANA *verna*.

Gentiana corolla quinquefida, hypocrateriformi; segmentis crenulatis; caule simplici. Fl. Carniol.
p. 299. n. 8.

Gentiana corolla quinquefida, infundibuliformi; caule excedente; foliis radicalibus confertis, maioribus

ioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 199. *Spec. Plant.* p. 228. n. 9.

Gentiana foliis ovato-lanceolatis; caule unifloro. HALL. *Hist.* n. 645.

Ciminalis. ADANS. *Famil. Plant.* p. 504.

DIAGN. *Corollae segmenta crenulata. Calyx pentapterus.*

Habitat in pratis et collibus, circa medium Aprilis florēns.

A priore diversa est foliis canaliculatis, rigidioribus et semiamplexicaulibus, plicis calycinis, in totidem dentes calycem terminantes, elevatis; Auriculis emarginatis; stigmatibus ferrulatis et scyphulum representantibus.

292. GENTIANA utriculosa.

Gentiana corollis quinquefidis, hypocrateriformibus, glabris; calycibus plicatis. *Fl. Carniol.* p. 299. n. 9.

Gentiana corollis quinquefidis, hypocrateriformibus; calycibus plicato-carinatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 200. *Spec. Plant.* p. 229. n. 13.

Gentiana caule ramoso; calycibus alatis, HALL. *Hist.* n. 646.

DIAGN. *Membrana calycis exterior plicas quinque alis similes duplicata constituit. Stigmata formant pileum vertice depresso, ambitu Papillosum.*

In montibus Idriensisbus. M. Nanas, Dul., et alibi occurrit.

Caulis angulosus, ramosus: ramis unifloris. Folia in rosam tetragonam super terram congesta. Calycis tunica interna omnino adponitur corollae tubo. Corolla auriculas conduplicatas bifidasque gerit, tum vero calyce longiore et interne decem striatum; striis alternis crassioribus et staminiferis. Stigmata albida.

293. GENTIANA *Centaurium*.

Gentiana corollis quinquefidis, infundibuliformibus;
caule dichotomo; pistillo simplici. LINN. *Syst. Nat.* p. 200. *Spec. Plant.* p. 229. n. 14. *Fl. Suec.* 2. 232. *Fl. Carniol.* p. 301. n. 13.

Gentiana corolla quinquefida; foliis lanceolatis.
BOEHM. *Lips.* 57.

Gentiana caule dichotomo; floribus infundibuliformibus, striatis, quinquefidis. HALL. *Hist.* n. 648.

Centaurion. ADANS. *Famil. Plant.* p. 502.

DIAGN. *Flores corymbosi. Corolla sine auriculis.*
Antherae elatae supra stigmata, haemisphaerico-cordata.

Habitat in Montibus aridis non rara.

Calyses pentagoni segmentum unum caeteris longius.
Corollae purpureae aut albae tubus flavescens, striatus, calyce longior.

Decoctione pediculos necat; Extractum est sapo bilis succedaneus.

(**) *Campanulatis.*

294. GENTIANA *acaulis*.

Gentiana corolla quinquefida, campanulata, callilem excedente. LINN. *Syst. Nat.* p. 199. *Spec. Plant.* p. 228. n. 8. *Fl. Carniol.* p. 297. n. 3.

Gentiana foliis lanceolatis, caule unifloro, flore maximo, campaniformi. HALL. *Hist.* n. 642.

Gentiana magno flore. I. BAUH. *Hist.* III. p. 523. *Ciminalis*. ADANS. *Famil. Plant.* p. 504.

DIAGN. *Corolla biuncialis, caule longior.*

Habitat in pratis subalpinis, et etiam in *Alpibus Vochinenibus*, et M. *Storschetz*.

Caulis fructifer non semper, imo faepius corollae longior est. Semina (ad 150), fulcata, ovata.

295. GENTIANA *Pneumonanthe*.

Gentiana corollis quinquesfidis, campanulatis, oppositis, pedunculatis; foliis linearibus. LINN.
Syst. Nat. p. 199. *Spec Plant.* p. 228. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 228. *Fl. Carniol.* p. 298. n. 5.

Gentiana alis floriferis; foliis linearibus. HALL.
Hist. n. 641.

Criminalis ADANS. *Famil. Pl.* p. 504.

DIAGN. *Folia lanceolato-linearia; coniugationibus inferioribus ex ala unica, supremis ex utraque florem edentibus.*

Habitat in montanis circa Idriam, Seirach. Reifnitz;
Autumno florens.

Plantae huius definitionem aptam, Schola Botanica nondum dedit; Corollae enim imae pedunculatae, non terminales, sed ex alis foliorum prodeentes. Folia non vere linearia.

296. GENTIANA *asclepiadea*.

Gentiana 6. 7. *Fl. Carniol.* p. 298. Utramque misi
Celeberr. LINNAEO et ex una *Asclepiadeam*,
ex altera vero *Punctatam* fecit, sed specimina bene examinata docent, esse unam eademque Plantam.

Gentiana corollis quinquesfidis, campanulatis, etc.
LINN. *Syst. Nat.* p. 199. *Spec. Plant.* p. 227.
n. 4.

Gentiana floribus campaniformibus; alis paucifloris;
foliis ovato-lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 640.
Dafystephana. RENEALM. ADANS. *Famil. Plant.* p. 502.

DIAGN. *Calyces prismatici, pentagoni, sessiles, solitarii, alares. Styli divaricati, spiraliter revoluti. Floret cum AIRA coerulea.*

Habitat circa Idriam, passim.

Calycini anguli et dentes tuberculofo-rugosi. Corollae tubus calyce fere duplo longior, limbus interne se-

riebus punctorum fusco-caeruleorum, longitudinaliter variegatus. Antherae dentibus calycinis longiores.

Folia a situ bivario in cruciformem transeunt, sive flores pariter situm mutant, ut saepe vidi.

(***) *Corollis saepe plus quam quinquefidis.*

297. GENTIANA PANNONICA.

Gentiana foliis ovato-lanceolatis, nervosis; floribus campaniformibus, punctatis. HALL. Hist. n. 638.

Gentiana corollis campanulatis, 6-7-fidis, punctatis, verticillatis, IACQUIN. Obs. Bot. II. p. 17. Tab. 39.

Gentiana flore purpureo. I. BAUH. Hist. III. p. 521.

Gentiana I. CLUS. Hist. I. p. 312.

Gentiana alpina, floribus punctatis. BESLER. Gazzophyl. C. 12.

DIAGN. Flores verticillati, sessiles; corollis et calycibus sexfidis. Stigmata hemisphaerica.

Habitat in M. Burzen.

Caulis cubitalis. Folia quinquenervia, digito longiora. Flores in uno verticillo (4-6). Calyces pallide viridi-rubroque varii; dentibus viridibus: uno longiore: Corolla unciam et lineas tres longa, nigro-punctata, obscure rubineo calore tincta; segmentis ovatis, obtusis, cum interiectis lingulis. Filamenta pallide virentia. Antherae flavae, acuminatae, quatuor lineas longa. Germen nigro-punctatum. Stigmatum orae denticulatae, et violaceae.

298. GENTIANA lutea.

Gentiana corollis quinquefidis, rotatis, verticillatis; calycibus spathaceis. LINN. Syst. Nat. p. 199. Spec. Plant. p. 227. n. 1. Fl. Suec. 2. 227.

Gentiana caule folioso, foliis ovatis, nervosis; floribus rotatis, verticillatis. HALL. Hist. n. 637.

Gentiana maior. MATTHIOL. Diosc. p. 439.

DIAGN.

DIAGN. Flores verticillati. Calyx est spatha bicornis. Corollae luteae, profunde, et fere ad basin usque difflatae.

Habitat in *M. Dull*, *Nanas*, allisque. Initio Iulii florens.

Verticillus quilibet sit racemis duobus, e basi ramosis et flores suos in corymbum disponentibus. Corollae segmenta lanceolata, acuminata, tribus seriebus punctorum fuscorum longitudinaliter interne variegata. Inter has lacinias oriuntur filamenta sursum attenuata. Antherae circa stylum coalitae, ut in floribus semiflosculosis. Stylus profunde bifidus. Stigmata patentia, simplicia, minime foliacea. Semina compresia, in duas series imbricata. Larva quaedam hasce capsulas saepius inhabitat.

299. GENTIANA perfoliata.

Gentiana corollis octofidis; foliis perfoliatis. LINN.

Syst. Nat. p. 952. *Spec. Plant.* p. 237. n. 23.

Gentiana foliis radicalibus ovatis, caulinis triangularibus, perfoliatis; floribus octofidis. HALL.
Hist. n. 649.

Perfoliatum Centaurium. I. BAUH. *Hist.* III. p. 355.

Chlora. RENEALM. ADANS. *Fam. Pl.* p. 503.
foliis perfoliatis. LINN. *Syst. Nat.* Edit. 12.
p. 267.

DIAGN. Folia perfoliata. Corollae flavae, octofidae.

Habitat in udis circa *Goriziam*, et *Cormons*.

Planta glauca, glabra, spithamea. Corollae octofidae; flavae. Stamina octo.

UMBELLIFERAE.

Semina sola suppedant notas infallibiles, quae certos horum Generum limites statuant. Involucra Artediana fallere videntur in CARO, SPHONDILIO *Vulgari*, ATHAMANTIS, aliisque.

que. Florum regularitas aut irregularitas in multis Generibus nimium minutis et omnino incertas exhibent differentias. Verbo: omnia fallunt excepto fructu, iuxta cuius structuram aut superficiem, meas Plantas umbelliferas in sua Genera dividere conabor, faciam praeeuntibus, RIVINIO, MORISONIO, TOURNEFORTIO, HALLERO, aliisque.

I. UMBELLIS SIMPLICIBUS.

100. ERYNGIUM.

TOURN. I. R. H. p. 317. Tab. 173.

Receptaculum paleaceum sustinet flores hermaphroditos, sessiles, semina teretia, calyces coronata. HALL. latere plano continua. LUDWIG. striata. ADANS.

300. ERYNGIUM *alpinum*.

Eryngium foliis radicalibus cordatis oblongis, caulinis pinnatifidis; capitulo subcylindrico. LINN.
Syst. Nat. p. 202. *Spec. Plant.* p. 233.

Eryngium foliis radicalibus petiolatis, cordatis; involucro pinnato, ciliato. HALL. *Hist.* n. 736.
Eryngium alpinum. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 1.
p. 88.

DIAGN. *Folia cordata, dentata: inferiora longe petiolata, suprema amplexicaulia.*

Habitat in *Alpibus Tolminenibus*.

Folia ima similia CACALIAE foliis, ut bene notat HALLER. sed acutiora et dentata, dentibus molli spinula terminatis. Haec bene exprimuntur in icona I. BAUHINI. Folia superiora, pinnatifida LINNAEI, aut laciniata I. BAUHIN. mihi nunquam videre licuit. Capitulo florali oblongo circumstant folia amethystina, quorum aliqua setacea et reflexa, alia vero pinnatifida et lanceolata sunt. Petala alba.
Anthe-

203. *Astrantia Epipactis.*

Tab. 6.



Antherae virides. Calyces corollis longiores, aristati. Paleae setaceae, rigidae.

301. ERYNGIUM campestre.

DIAGN. *Folia pinnato-diffusa. Tota fere planta per aetatem amethystino-coerulescens.*

Habitat in Campis.

Neque inter ERYNGIUM Campestre et Amethystinum discrimen invenio, nisi quod folia in uno minus, in alio magis incisa sint. Confer icones ERYNGII montani, vulgaris, et caerulei MATTHIOL. I. BAUHIN. CLUSII, MORISONII aliorumque, et videbis, quam difficulter invicem distingui possint; sed neque in Herbariis Amicorum specimina vidi, quae inter ea ERYNGIA differentiam veram ostenderint.

302. ERYNGIUM maritimum.

Eryngium foliis radicalibus, subrotundis, plicatis, spinosis; capitulis pedunculatis; paleis tricuspidatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 202. *Spec. Plant.* p. 233. n. 5.

DIAGN. *Dura et spinosa sunt folia, nec divisa ut in Campestris.*

Habitat in Maritimis Litoralis Austriaci.

101. ASTRANTIA.

Fl. Carniol. p. 336.

Flores masculi et feminei in eodem capitulo, cui subiacet involucrum patulum et persistens. Fructus angulatus, subrotundus.

303. ASTRANTIA Epipactis Tab. 6.

Astrantia floribus masculis pedunculatis; femineis sessilibus; seminum angulis obtusis, glabris. *Fl. Carniol. p. 337. n. 2.*

Sanicula involucris maximis; quinquefoliis; seminibus tuberculosis. HALL. *Nomencl. 737.*

Helleborine. TABERNEMONT. p. 247. figura, non descriptio.

Helleborine. VII. C. BAUH. Pin. p. 186.

Epipactis. MATTHIOL. Diosc. p. 721.

Alpina Elleborine, Saniculae et Ellebori nigri facie. LOBELL, Icon. p. 664. bona.

DIAGN. *Scapi angulati, nudi, radicales. Folia ad basin usque trifida: lobo medio trilobo, lateribus bilobis.*

Habitat copiose circa Idriam et Goriziae. Martio M. florens.

Plantulam elegantem a LINNAEO aliisque derelictam, accurate describere, et in speciei dignitatem restituere visum est.

Radix perennis extus nigricans, longis funiculis radicalia. Gemmae bivalves: valvis ovatis, carinatis, acuminatis. Ex his unum prodit folium, et unus scapus. Folium scapo brevius, petiolo trigono, laevi, terminato foliis aut lobis tribus nitidis dentatis; dentibus molli spinula terminatis. Scapus laevis, tot angulos habet, quot sunt involucri folia. Involucrum naturaliter pentaphyllum; foliis ovatis, supra medium dentatis; dentibus breviter aristatis. Capituli rotundati; convexi diameter linearum (4-6). Huic flores insident lutei, calycibus 3-5-fidis, petalis inflexis. Horum alii hermaphroditi, pauci, sessiles, staminibus (2-5); tubis duabus reflexis. Alii masculi pedunculati, plures quam feminei, pentandri. Alii denique feminei, sessiles, digyni. Semina duo, subrotunda, plicis quinis in apice et basi evanescuntibus instructa. Haec decidunt remanentibus pedunculis et calycibus florum masculorum.

304. ASTRANTIA *Diapenſia*.

Astrantia floribus sessilibus; feminibus aculeatis. *Fl. Carniol.* p. 336. n. 1.

Sanicula foliis radicalibus simplicibus; flosculis omnibus sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 202. *Spec.*

305. *Astrantia Minor.*

Tab. 7.



Spec. Plant. p. 235. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 235. (Europaea.)

Sanicula foliis radicalibus trilobatis, lateralibus lobis bipartitis; umbellis globosus. *HALL. Hist.* n. 737.

Diapensia MATTTHIOL. Diosc.

DIAGN. *Ex apice caulis prodeunt rami (4-5): medio indiviso, exterioribus trifidis. Capitula floralia subrotunda, parva. Flores polygami: masculis pedunculatis, hermaphroditis feminineisque sessilibus.*

Habitat in sylvis, Maio M. florens.

Rami umbellati. Femininei flores apetalii sunt, receptaculo cotyleformi et albo. Germen incurvis setis hispidum.

Diffr. ab *Astrantia*, ut *GALIUM mollugo* ab *APARINE*.

305. ASTRANTIA minor. Tab. 7.

Astrantia floribus pedunculatis; seminum angulis alato-plicatis. *Fl. Carniol.* p. 337. n. 4.

Astrantia foliis digitatis, septenis, integris, dentatis. *HALL. Hist.* n. 791.

DIAGN. *Habitus prioris, sed flores omnes pedunculati masculi et hermaphroditici. Semina oblonga, ornata, quatuor seriebus longitudinalibus pli-carum tuberculatarum: intermediis duplicitibus.*

Habitat in sylvestribus saxosis udisque locis, circa Idriam.

Radix perennis, nigricans, fibrosa. Caulis etiam pedalis, ramosus, obiter striatus. Folia longe petiolata, glabra, triloba et quinqueloba: lobo medio, trifido, lateralibus semibifidis: lobis incisis, dentatis; dentibus aristatis. Rami umbellati (4—5) medio indiviso, caeteris trifidis, ut in specie priore. Umbellae parvae. Involucri folia (ad 12), albentia, lanceolata. Flores in umbellis hisce (14—16), albi, in-

terioribus hermaphroditis. Pedunculi tenuissime denticulati; semen quodlibet dimidia parte corollae et stylo uno terminatum, dorso tribus ordinibus denticulorum vesiculos referentium duplii serie, margine vero simplici serie instructum; Eiusdem facies interior plana et lineis tribus elevatis longitudinaliter striata est. Mares persistunt, nec decidunt.

Habitus, flores, et involucra eadem ut in ASTRANTIA foliis digitatis, septenis dentatis. HALL. Hist. cuius specimina ab HALLE RO misla, benevole communicavit. Cl. WILLICH. diversitas fere unica in foliis erat, quae in ASTRANTIA HALL. omnino plura et distincta communis petiolo insidebant, in nostra autem perpetuo lobata sunt; ut ergo certior essem, misi Plantam Celeb. HALLE RO, qui demum monuit esse omnino minorem, sed Cl. WILLICHUS aliter sentit. In Illustrat. 1766. XXXI. quid ergo statuendum?

306. ASTRANTIA nigra.

Astrantia floribus pedunculatis; seminum angulis denticulatis. Fl. Carniol. p. 337. n. 3.

Astrantia foliis quinquelobis: lobis trifidis. LINN. Syst. Nat. p. 203. Spec. Plant. p. 235. n. 1. (maior).

Astrantia. TOUNEFORT. Inst. Tab. 166.

DIAGN. *Involucri folia (ad 15). Flores omnes pedunculati. Pedunculi involucro breviores.*

Habitat in pratis, ad sepes.

Distinguitur a priore, natali loco, umbellis coloratis magnis, involucri foliis venosis: venis anastomosantibus, calycibus aristatis.

II. UMBELLIS COMPOSITIS.

(*) *Seminibus villosis*

102. DAUCUS.

TOUR. I. R. H. p. 307. Tab. 161. exceptis speciebus
caucalis.

Petalum extimum caeteris multo maius.
TOURN. Invol. pinnatifida, in DAUCO *Carota*, in aliis simplicia. Styli erecti. Tourn.
D. Semen singulum quatuor angulis donatum,
e quibus pili rigidi prodeunt. Inter angulos
linea est elevata.

307. DAUCUS *Carota*.

Daucus seminibus hispidis; petiolis subtus nervosis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 206. *Spec. Plant.* p. 242.
n. 1. *Fl. Suec.* 2. 237. *Fl. Carniol.* p. 327.

Daucus involucris cavis, communibus, pinnatis, peculiariis linear-lanceolatis. HALL. *Hist. n.* 746.
Pastinaca sylvestris. MATTHIOL. *Diosc.* p. 500.

DIAGN. Radix fusiformis. *Involucrum primum patens, pinnatifidum.*

Habitat in siecioribus pratis.

Centrum umbellae occupat parvum et obscure rubrum capitulum, quae nota propria est *Staphylinus* DIOSCORIDIS, iuxta C. BAUH. postea vero veteres DAUCI nomen dabant. Plantis umbelliferis, quas alio referre non poterant, unde insuperabiles difficultates occurruunt illis, qui veterum DAUCOS extricare conantur.

Apud nos sues optime saginantur Radice DAUCI *sativi*, *Corene* dicta.

308. DAUCUS *Grandiflorus*.

Caucalis involucro regulari, pentaphyllo; petalo exteriore maximo. *Fl. Carniol.* p. 327.

Caucalis involucris singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo maiore. LINN. *Syst. Nat.* p. 205.
Spec. Plant. p. 240. n. 1.

Caucalis umbellis planis; petalis extremis et involucris maximis. HALL. Hist. n. 740.

Caucalis I. TABERNEM. p. 290.

DIAGN. *Involucri primarii folia quinque lanceolata, oris albis, longitudine petali maximi.*

Habitat *Vipaci* et *Goriziae* ad sepes, nec non *Tergesti*. Petalum maximum ad basin usque bifidum, ut in non-nullis speciebus *ALSTINES*: segmentis lanceolatis, obtusis, et septem venuulis ferrugineis longitudinaliter striatis. Setae, quae ex angulis feminum oriuntur, subulatae sunt, et sursum versae.

309. DAUCUS *Leptophyllum*.

Caucalis semen aculeis triglochidibus, uncinatis: pilis verticillatis hispidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 205. *Spec. Plant.* p. 242. n. 6.

Lappula tenuifolia. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 80. foliis non bonis.

DIAGN. *Involucrum primum monophyllum aut nullum.*

Habitat in Agro *Vipacensi* et *Tergestino*.

Umbellae radii pauci. Flores albi,

310. DAUCUS *Platycarpos*.

Caucalis umbellis trifidis: umbellulis trispermis; involucellis triphyllis. LINN. *Syst. Nat.* p. 205. *Spec. Plant.* 241. n. 4.

Caucalis foliis triplicato-pinnatis, involucris ligulatis; universali unifolio. HALL. *Hist.* n. 739. *Echinopora*. RIVIN. *Pentapet.*

DIAGN. *Caulis rigidus, angulatus. Radii (2-3) trispermi. Semina (4-5) lineas longa.*

Habitat circa *Tergestum*.

Folia bipinnata: pinnis profunde pinnatifidis, subtus rugosulis. Involucrum primum nullum aut monophyllum. Seminum aculei rufescentes.

303. CAUCALIS.

RIVIN. *Pentap.*

Semina minime sulcata, aculeis sparsis densis hispida.

311. CAUCALIS *Anthriscus.*

Tordylium umbellis confertis; foliolis ovato-lanceolatis, pinnatifidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 205.

Spec. Plant. p. 240. n. 6. *Fl. Suec.* 2. 236.

Caucalis foliis duplicato-pinnatis, nervo multoties latoribus. HALL. *Hist.* n. 741.

Daucus annuus minor. TOURNEFORT. *Inst.* p. 308.

Anthriscus semine aspero. I. BAUH. *Hist.* III. p. 83.

Torilis. ADANS. *Famil. Plant.* p. 99.

DIAGN. *Caulis striatus, scabriusculus. Umbellae radii (ad 12). Pedunculi raro plures, quam (8) villi seminum sursum curvi, et ad lentem aculeati.*

Habitat in saxosis sylvofisisque locis,

Vidi in culta planta involucrum primum monophyllum et nullum. Flores rubelli, et albi irregulares. Fruetus neque marginatus, neque compressus, removet plantam a *Tordyliis*.

312. CAUCALIS *Scandix.*

Scandix (Anthriscus.) seminibus ovatis, hispidis; colloris uniformibus; caule laevi. LINN. *Syst. Nat.* p. 214. *Spec. Plant.* p. 257. n. 4.

Caucalis vaginis lanuginosis; foliis triplicato-pinnatis; seminibus rostratis. HALL. *Hist.* n. 743.

Caucalis foliis Chaerefolii. RIVIN. *Pentap.*

DIAGN. *Umbellulae parvae. Semen clavaeforme, aculeis incurvis hirtum.*

Habitat in Carniola calidiore.

Semina carent rostro, quo aliae species Scandicinae gentis instructae sunt.

313. CAUCALIS Nodosa.

Tordylium umbellis simplicibus, sessilibus; seminibus exterioribus hispidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 204. *Spec. Plant.* p. 240. n. 7.

DIAGN. *Umbellae ad nodos caulis sessiles: radiis inaequalibus.*

Habitat in *Istria*, et circa *Duinum*.

Folia tenuiter divisa, utrinque villosa. Glomeres seminum foliis oppositi. Semina interiora verrucosa.

104. LIBANOTIS.

RIVIN. et HALLER. *Hist.* 325.

KITLINGA ADANS. *Fam. Pl.* p. 498.

Fructus oblongus, striatus, villosus, non echinatus, neque marginatus.

314. LIBANOTIS Cretensis.

Athamanta foliis linearibus, planis, hirsutis; petalis bipartitis; seminibus oblongis, hirsutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 208. *Spec. Plant.* p. 245. n. 5.

Libanotis foliis hirsutis, triplicato-pinnatis, lobulis profundissime bipartitis. HALL. *Hist.* n. 745.

Daucus creticus. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 56.

DIAGN. *Tota planta villosa. Invol. primum nullum, vel mono- et diphyllum, foliola ultra duas lineas raro longa.*

Habitat in *Alpibus Vochinensibus*.

Caulis striati. Foliola terminalia trifida. Involucrum partiale longitudine pedunculorum. Petala alba. Fructus albo et denso villo canescens, coronatus receptaculo flavicante, tubisque ferrugineis et angulum rectum inversu situ facientibus.

315. LIBANOTIS Rupestris Tab. 9.

DIAGN. *Folia fetacea, sere uncialia, glabra, Flores omnes fertiles.*

Habitat *Tergesti*, et circa *Quelb.*

Cau-

315. *Libanotis Rupestris.*

Tab. g.



Caulis cubitalis, ramosus, subvillosum, tenuiter striatus
Foliorum caulinorum vaginae unciales, educunt tres
petiolos, fulco exaratos, bipinnatos. Foliola capil-
lacea sunt, pedicellata, superne linea exarata, subtus
convexa. Invol. primum diphyllum, partialia poly-
phylla, et radiolis duplo ac triplo breviora. Radii
(16) et plures, biunciales villosi. Pedunculi (ad 30).
Petala alba aequalia. Semina albo villo pubescens.

III. HALLERUS I. c. et Cl. VILLICHIUS in
Epiſt. in eam sententiam ire videntur, Plantam hanc
esse posse Varietatem speciei prioris, ac per confe-
quens huc etiam pertinere ATHAMANTAM annuam.
Celeberr. LINNAEI. Sed figura MYRRHIDIS an-
nuae semine villoso &c. MORISONII quam pro
varietate DAUCI cretici habet HALLERUS, plan-
tam nostram minime ostendit. Insignis quoque coro-
na seminum DAVCI cretici, quam haec species non
habet, differentiam subministrat. Res tamen, non
omnino improbabilis est. Verum tamen non aliter,
quam experimentibus hortensibus explananda, aut ea
copia speciminum, quae per gradus insensibiles, a
Cretica, ad *Rupeſtre* metamorphosin demonſtrent.

316. LIBANOTIS Riviniana.

Athamanta. (*Libanotis.*) LINN. *Syst. Nat.* p. 207.
Daucus montanus, Apii folio minor. C. BAUHIN.
Prodri. p. 77.

DIAGN. Pallide virens. Pinnae nullae inter costam
et primos ramos.

Habitat Goriziae, et Tergesti.

Tam indigenae quam exteræ Plantæ exemplaria evi-
denter a specie sequenti differentiam vel inde, de-
monſtrant, quod cruciformes illas pinnas primas ra-
morum primorum, costae non adnectant, quod etiam
ostendit figura. C. BAUHINI.

317. LIBANOTIS Daucoides.

Libanotis pinnulis circa costam decussatis. HALL.
Enum. p. 451. n. 1. sed confusa cum specie priori.
Scopoli *Flora Carn.* T. I. N Dauci

Dauci species alia. HALL. It. *Helv.* n. 42. p. 250.
cum bona descriptione.

DIAGN. *Folia pinnata, pinnis pinnatifidis; segmentis plerisque trifidis. Involucra linearia.*

Habitat in *Alpibus Vochinensibus*.

Planta cubitalis. Folia tri- et quadriuncialia; pinnis uncia vix longioribus. Caulis striatus, exiguis villis, tanquam polline, adspersus. Pinnae primae, ramulorum primorum insident costae, cruciformes, et verticillatae. Umbellae densissimae. Radii (ad 40), villosuli. Involucra secunda pedunculis longiora, et erecta. Petala alba, fere aequalia. Styli albi, non deflexi. Germina hirsutula.

105. TORDYLIUM.

TOURN. I. R. H. p. 320. Tab. 170.

Semina compressa, marginata, pilosa.

318. *TORDYLIUM Syfolium*. Tab. 8.

DIAGN. *Folia pinnata; pinnis sessilibus, oblongis, serratis. Petala rubra; uno maximo in floribus exterioribus.*

Habitat in *Alpibus Vochinensibus*.

Caulis pedalis, simplex, sulcatus, fere nudus. Folia radicaria semipedem longa. vaginis suis membranaceis caulem amplexantia, semel pinnata, villosa; pinnarum paribus duobus, quae oblongae sunt, semicordatae, sessiles, dentatae. Primum par, ad basin, auctum est lobis duobus. Impar folium caeteris maius et semitrifidum est. Involucrum primum fit uno aliote foliolo. Umbellae radii (7—9). Involucra secunda, patula, linearia, polyphylla. Corollae rubrae, fere eadem quae in DAUCO *grandifloro*. Fructus ovatus, marginatus, pilis hispidus, coronatus calyce et stylis deflexis.

Synonyma non invenio.

319. *Tor-*

318. *Tordilium Syfolum.*

Tab. 8.



Rein sc. A. V.

319. TORDYLIUM maximum.

Tordylium umbellis consertis, radiatis; foliolis lanceolatis, inciso-ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 204.

Spec. Plant. p. 240. n. 4.

Tordylium maximum. TOURNEFORT. *Inst.* p. 320.

Caucalis maior CLUSIO. I. BAUH. *Hist.* III. p. 85.

DIAGN. *Tota planta scabra et hispida: Folium radicale triiugum; foliis sessilibus, subcordatis, crenatis; impare maiore, ovato, modice inciso.*

Habitat in *Istria*, et *Tergesti*.

Caulis subangulatus, durus, Folia caulina, lanceolata, radicalia vero alterius figurae. Involucra pentaphylla. Flores albi et irregulares. Fructus calyce coronatus, cuius dentes duo exteriores, longiores sunt.

Figura bona huius Plantae etiamnum deest.

(**) *Seminibus alatis.*

106. LASERPITIUM.

TOURN. I. R. H. p. 324. Tab. 172.

Singulum semen quatuor alis longitudinibus instructum est, hinc totus fructus octapterus.

320. LASERPITIUM latifolium.

Laserpitium foliolis cordatis: inciso-ferratis. LINN.

Syst. Nat. p. 209. *Spec. Plant.* p. 248. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 242. HALL. *Hist.* n. 792.

Seseli Aethyopicum. MATTHIOL. *Diosc.* p. 502. Libanotis Theophrasti Costus, &c. I. BAUH. *Hist.* III. p. 165.

DIAGN. *Folia cordata, ferrata, non raro biloba, et triloba, amplis tumidisque vaginis caulem glabrum et substriatum amplexantibus.*

Habitat in pratis montanis.

Folium tres et quatuor uncias longum, duas circiter latum, dentibus tenuissime serrulatis; costa ancipi. Radii umbellae primariae (ad 60). Semen quatuor lineas longum, duas et paulo plus latum.

321. LASERPITIUM *gallicum*.

Laserpitium foliolis cuneiformibus, furcatis. LINN.

Syst. Nat. p. 209. *Spec. Plant.* p. 248. n. 3

IACQUIN. *Austr.* p. 48.

Laserpitium minus. RIVIN. *Pentap.*

Laserpitium Massilioticum. TABERNE M. p. 211.

Laserpitium e Massilia. C. BAUH. *Hist.* III. p. 137.

DAIGN. *Caulis fulcatus, scaber. Folia bipinnata. Foliola sessilia, laciniata; laciniis lanceolatis, acutis, alternis; costa ramisque villosis.*

Habitat circa Goriziam, et in M. Medeae.

Folia variant latitudine et longitudine. Umbella radii uncia paulo longiores (ad 12). Semen vix duas lineas longum, ovato ambitu; alis pellucidis.

322. LASERPITIUM *Siler*.

Laserpitium foliolis ovali-lanceolatis, integerrimis, petiolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 210. *Spec. Plant.* p. 249. n. 6.

Laserpitium foliis duplicato-pinnatis, pinnulis integerrimis, lanceolatis, simplicibus et ternatis. HALL. *Hist.* n. 794.

Ligusticum MATTHIOL. *Diosc.* p. 499.

Siler montanum. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 168.

DIAGN. *Divisiones foliorum patulae, et angulum fere rectum cum costa facientes. Semen oblongum, brevibus alis percussum, quibus interiacet linea elevata.*

Habitat in montanis circa Idriam, et alibi.

Folia ima diffusa; ramis adscendentibus. Foliola tres lineas lata, uncialia et longiora, oris albidis, et subdiaphanis. Umbellae magnae; radiis (40—50), lon-

longitudine digiti. Pedunculi ex uno radio (ad 40); exterioribus fertilibus. Flores exteriores unum petalum caeteris maius habent. Involucra parva.

Planta haec iuxta semen, media est inter LASERPITIUM, et SILEREM Aquilegiae folium.

323. LASERPITIUM *Angustifolium*.

DAIGN. *Folium bipinnatum: ramis secundis sustentibus tria folia lanceolata, integerrima, sessilia, venoso-striata. Semen erectiusculo stylo terminatum.*

Habitat in Alpibus Carnioliae super et circa Idriam, Umbellae radii raro decem. Petala regularia, albo-rubella, Fructus ovalis.

Huc omnino reducendum est LASERPITIUM *primum*.

Fl. Carniol. LASERPITIUM *Peucedanoides foliorum segmentis angustissimis.* SE GUIER. Veron. suppl. p. 227. Tab. 7. LASERPITIUM *tenuifolium*, &c. PLUKENE T. Phyt. Tab. 198. fig. 4. LASERPITIUM *angustifolium*, *segmentis indivisis.* MORISON. Hist. II. S. 9. Tab. 19. F. 8. nec non, iuxta descriptionem, LIGUSTICUM *five* SILER *montanum angustifolium*, C. BAUHIN. Prodr. p. 85. et si hanc plantam ad LASERPITIUM *silerem* referat HALLERUS. Quomodo inter se differunt LASERPITIA *Linnaeana*, nempe *angustifolium*, *Pru-* *tenicum*, et *Peucedanoides*?

324. LASERPITIUM *Chironium*.

DIAGN. *Totum hirsutum est. Folia ovata, serrata, uno lobo acuta; terminalibus trilobis.*

Habitat in montibus Lokopolitanis. P. WULFEN. Radix acerrimo et aromatico sapore praedita. Caulis humanae fere statura, crassitie unciali; striatus et hispidus, fungosa medula farctus. Costae foliorum radicalium bipedales, pilosae, dividuntur in tres ramos. Foliola petiolata, subtus hispida, et aequa ampla, ac in ANGELICA Archangelica. Foliola

caulina amplissimas vaginas cauli circumponunt. Involucri primi folia uncialia et demum reflexa. Radii (ad 30). digitii longitudine. Flores plerique steriles. Semen quatuor fere lineas longum, tres latum, ampla ala in margine cinctum, quae in dorso minores sunt.

Ergo nullum est dubium esse speciem LASERPITI^T, quod vero non differat a LASERPITIO Chirano LINNAEI, et si nostrum folia oblique cordata non habeat, demonstrat RIVINUS iconem PANACIS, quae nostram plantam exakte refert. Dein, cum duos Panaces habeamus, nempe Heracleum et Pastinacaefolium, quod est species Pastinacae, non vero Laserpitii, sequitur omnino Panacem hunc alium esse non posse quam Chiroum LINNAEI. sed non bene determinatum.

325. LASERPITIUM Selinoides.

Peucedanum foliis pinnatifidis; lacinias oppositis. LINN. Spec. Plant. p. 246. n. 3? Sed Involucrum universale non diphillum.

Peucedanum. HALL. Hist. n. 797. videtur idem.

DIAGN. Involucra reflexa. Involucella pedunculis breviora. Florescentia initio autumni.

Habitat in pratis montanis, non rarum.

Caulis striatus, eubitalis et longior. Folia pinnata; pinnis pinnatifidis: lacinias lanceolatis, pilo terminalis, et margine rubro fructificationis tempore saepius instructis. Petioli caulini membranaceum marginem habent. Flores parvi, albi, et rubelli. Pedunculi plerique fertiles sunt, et ita uniti, ut penicillum repraesentent. Seminis alae marginales in omni aetate evidentes ac maiores, intermediae tres obscurae in semine immaturo manifestae, marginalibus tamen minores in maturo; media itaque Planta inter Laserpitium, et Selinum, prioris tamen Genetris, ob semen singulum quinis alis instructum.

107. ANGELICA.

LINN. Gen. Plant. 309.

Seminum alae marginales, et dorsum tribus lineis longitudinalibus angulatum, sunt notae, quae IMPERATORIAE et AETHUSAЕ quoque conveniunt; sed fructus constans duobus feminibus, dorso unice cohaerentibus, ali-
bi vero liberis, ANGELICAE proprius est.

326. ANGELICA Archangelica.

Angelica foliorum impari lobato - LINN. Syst. Nat.

p. 211. Spec. Plant. p. 250. n. 1. Fl. Suec. 2. 245.

Angelica foliis duplicato-pinnatis, ovato lanceolatis,
ferratis. HALL. Hist. n. 807.

Angelica sativa. TOURNEFORT. Inst. p. 317.

Archangelica. I: BAUHIN. Hist. III. p. 143.

DIAGN. Folia pleraque lobata.

Habitat circa Goriziam in montibus.

Umbellae radii (ad 60), Petala pallide viridia et aequa-
lia. Flores omnes fertiles. In hac specie feminis
dorsum convexum magis et vere fulcatum est, ita ut
non lineatum, sed vere angulatum dici queat.

327. ANGELICA sylvestris.

Angelica foliis aequalibus, ovato-lanceolatis, ferra-
tis. LINN. Syst. Nat. p. 211. Spec. Plant. p. 251.
n. 2. Fl. Suec. 2. 246. Fl. Carniol. p. 331.Angelica foliis duplicato-pinnatis, ovatis, ferratis.
HALL. Hist. n. 806.

Angelica palustris. RIVIN. Pentap.

Angelica sylvestris. MATTHIOL. Diosc. p. 729.

DIAGN. Folia pleraque aequalia, nec lobata.

Habitat secus aquas, et aquaeductus.

Folia minora, planioraque; impare plerumque lobato.

108. IMPERATORIA.

LINN. Gen. Plant. 321.

Difserit ab ANGELICA seminibus planioribus, tota interna facie invicem cohaerentibus, dorsoque lineis elevatis, non autem angulis, striato; involucris nullis.

328. IMPERATORIA Ostruthium.

Imperatoria LINN. HALL. MATTHIOLI aliorumque, excepto TOURNEFORTIO, qui cum Angelicis coniunxit, servato tamen IMPERATORIAE nomine.

DIAGN. *Involucrum primarium nullum. Folia magna, lobata, dentata.*

Habitat in Alpibus Carnioliae super.

Folium impar perpetuo trilobum. Flores qui in loco natali steriles sunt, si planta in hortum transferatur, fertiles fiunt. Styli in fructu breves reflexi. Semen singulum lineis quatuor longitudinalibus.

(***) *Seminibus marginatis.*

109. SELINUM.

Petala regularia. Semina ovata, compresa, lineis elevatis (3-5) longitudinaliter striata.

329. SELINUM Austriacum.

Selinum foliolis subovatis, trifidis, incisis. IACQUIN. Austr. p. 49. Obs. 22. ut viva planta in Horto Academicu Viñdobonensi a Cl. Viro translata, me docuit.

Seseli II. montanum Pannonicum CLUS. Hist. II. p. 193, cum icone Cervariae.

DIAGN. *Petioli lineis (8-10) albidis, elevatis, longitudinaliter striati. Foliola elliptica; terminalibus trifidis.*

Habitat in sylvis circa Idriam non rarum. Inveni etiam in Austria, circa Baden.

Radix

Radix initio autumni modicam copiam lactis albo-lutei fundit. Caulis striatus, glaber. Folium radicale tereti petiolo dividitur, in tres ramos, denuo ramosos. Rami secundi gerunt pinnas sessiles et fere ad basin usque divisas in segmenta lanceolata simplicia bifida et trifida. Folia haec plana sunt, superne sature viridia, subtus pallidiora. Praeterea his Varietatibus, proprium est habere apices albidos et veluti spinula molli terminatos. Involucrum primum reflexum, vix semiunciam longum, polyphyllum: foliorum oris albidis, et quasi membranaceis. Radii umbellae (ad 22) villosuli. Involucella patentia. Pedunculi etiam ultra (40). Petala alba, aequalia, cordata. Styli erecti, et demum divaricati. Flores non omnes fertiles.

C. BAUHINUS confundit cum DAUCO montano *Apii folio maiore*, seu LIBANOTIDE RIVINI. Semina adulta margines ita denique explanant, ut alata dici queant, ideoque seminibus ANGELICAE *sylvestris* aut IMPERATORIAE valde similia.

330. SELINUM *Oreoselinum*.

Athamanta foliolis divaricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 208. *Spec. Plant.* p. 244. n. 3.

Selinum foliis triplicato-pinnatis; angulis divisionum obtusis. HALL. *Hist.* n. 803.

Oreoselinum. CLUS. et RIVIN.

DIAGN. *Foliorum rami naturaliter quodammodo refracti et patentissimi. Radii striati. Petala subaequalia.*

Habitat in herbidis, siccioribusque pratis, Omnia notanda cum RIVINO refracta foliorum ramifications. Involucrum primum breve et reflexum. Radii ultra (30), Pedunculi (ad 40). Styli divaricati, Eadem est ATHAMANTA. *Fl. Carniol.*

331. SELINUM *Cervaria*.

Athamanta foliis pinnatis, decussatis, inciso-anulatis; seminibus nudis. LINN. *Syst. Nat.*

p. 207. quae *Selinum* erat in *Append. Spec. Plant.*

Selinum foliis duplicato-pinnatis; pinnulis semibilobis, circum ferratis. HALL. *Hist.* n. 804.

Cervaria RIVINI Pentap. irreg.

Daucus II. MATTHIOL. Diosc. p. 518.

DIAGN. *Folium semel ramosum. Folia pleraque sessilia, elliptica, acuminata, dentata: terminalibus trilobis et in petiolum decurrentibus.*

Habitat circa *Goriziam* et *Vipaccum*.

Foliorum specifica durities, et firmitas, fere eadem quae in foliis *Pyri* huic Plantae propria.

332. SELINUM palustre.

Selinum leviter lactescens; radice unica. HALL.

Enum. p. 443. n. 3. LINN. *Syst. Nat.* p. 207.

Spec. Plant. p. 244, n. 2.

Selinum sublactescens, leve, foliis quadruplicato-pinnatis, linearibus. HALL. *Hist.* n. 799.

DIAGN. *Caulis sulcatus. Habitatio in paludibus.*

Habitat in *paludibus Labacensisibus*, versus viam publicam, qua itur *Carlstadum*.

Diversissima species est; sed radix unica, et sublactescens, non satis distinguit a SELINO primo.

110. PASTINACA.

TOURN. *I. R. H.* p. 319. *Tab.* 170.

Differt a SELINO defectu involucri utriusque, et semine evidentius marginato, caeterum quoque plano, ovato, et tribus striis dorsibus lineato.

233. PASTINACA sativa.

Pastinaca foliis simpliciter pinnatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 216. *Spec. Plant.* p. 262. n. 1. HALL. *Hist.* n. 808. *Fl. Carniol.* p. 336.

Pastinaca Germanica. I. BAUH. *Hist.* III. p. 149.
DIAGN.

DIAGN. *Flavi flores. Folia semel pinnata.*

Habitat ad vias, in salicetis, et in sterilibus locis.

Receptaculum nectare suavi madidum frequentant **MUSCAE**, **CONOPSES**, aliaque Insecta. Styli patentissimi. Semen viride convexum, obscurius marginatum lineatumque, sed siccescens explanatur, et Genus indicat.

334. **PASTINACA Glauca.**

Pimpinella foliis supra decompositis; caule angulato ramosissimo. LINN. *Syst. Nat.* p. 217. *Spec. Plant.* p. 264. n. 2.

Tragoselinum foliis tenuissime divisis; pinnulis ultimis tripartitis. HALL. *Enum.* p. 430. n. 5. *Op. Botan.* p. 197 - 200.

Tragoselinum caule crasso, sulcato, divaricato; foliis multifidis, capillaribus. HALL. *Hist.* n. 788.

DIAGN. *Folia ter divisa in ramos, denique sustinentes foliola lineam lata, et unicum fere longa terminalibus trifidis: Flores albi.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis striato-angulosus. Foliorum caulinorum vaginæ longae, striatae; marginibus albidos. Radii (ad 20). Flores omnes fertiles: Receptaculum album. Styli rubri, deorsum reflexi, lineam fere longi.

Semina omnino aliter constituta, ac in **PIMPINELLA saxifraga**, nullisque adeo similia, quam illis, quae **PASTINACA sativa** producit, elliptica sunt tamen, et dum recentia, etiam convexa, interim evidenter marginata, et tribus striis prominulis longitudinaliter lineata.

III. SPHONDYLIUM.

TOURN. *I. R. H.* p. 319. Tab. 170.

Semen compressum, subcordatum, striis quatuor nigricantibus, non elevatis, nec ad apicem aut basin usque extensis longitudinaliter

ter lineatum. Styli retrorsum deflexi, receptaculo triplo longiores.

335. SPHONDYLIUM Branca.

Heracleum foliis pinnatifidis, laevibus; floribus radiatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 210. *Spec. Plant.* p. 249. n. 1. *Fl. Carniol.* p. 330.

Sphondylium foliis hirsutis, pinnatis: pinnis quinquelobis. HALL. *Hist.* n. 809.

Sphondylium MATTHIOL. *Diosc.* p. 525.

DIAGN. *Folia amplissima, lobata, semiseffilia.*

Habitat in *Cemeteriis*, et pinguiore solo.

336. SPHONDYLIUM Austriacum.

Heracleum foliis pinnatis, utrinque rugosis, scabris; floribus subradiatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 210. *Spec. Plant.* p. 249. n. 4. IACQUIN. *Austr.* p. 45. Obs. 19.

DIAGN. *Radii umbellae non ultra (10). Pedunculi plerique steriles, fructu nihilo longiores.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis striatus. Folia pinnata, villis utrinque hispida.

III2. FERULA.

TOURN. *I. R. H.* p. 321. *Tab.* 170.

Semen magnum, ellipticum, basi emarginatum, primo convexum, dein per maturitatem explanatum, tribus striis elevatis longitudinaliter lineatum, TOURN. D. E. Styli brevissimi C.

337. FERULA nodiflora.

Ferula foliolis appendiculatis; umbellis sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 209. *Spec. Plant.* p. 247. n. 7.

Ferula ad singulos nodos umbellifera. TOURNEFORT. *Inst.* p. 321.

DIAGN.

DIAGN. *E nodis caulinis singulis, quatuor umbellae prodeunt.*

Habitat circa Quelb, Tergestum, et alibi in Carniola calidiore.

Ultimae foliorum ramifications divaricatae sustinent foliola acerosa plerumque terna. E nodis caulinis quae prodeunt umbellae, pedunculatae sunt, nec sessiles. Involucra brevissima et reflexa. Radii umbellae primariae (ad 14). Pedunculi (ad 12). Petala lutea,

(*****) *Seminibus plicatis, s. sulcatis.*

113. LIGUSTICUM.

TOURN. I. R. H. p. 323. Tab. 171.

Fructus ovalis emarginatus, brevibus et divaricatis stylis terminatus. Semen gibbum plica longitudinali, quam inter et marginem duae aliae lineae elevatae prominent.

338. LIGUSTICUM *Peloponesiacum.*

Ligusticum foliis duplicato-pinnatis; pinnulis acute dentatis, longe lanceolatis. HALL. His. n. 758.

DIAGN. *Folia pinnata, pinnis lanceolatis, pinnatifidis.*

In montibus circa Goriziam invenit, et communicauit. P. WULFEN.

Attritum potenter olet, odore fere aromatico. Caulis fistulosus, humanae statura et crassitie duorum digitorum. Involuci generalis folia angusta et uncialia. Umbellae radii (ad 30). Involucella pedunculis aequalia. Petala alba, aequalia. Flores non omnes fertiles.

Omnino est SESELI *Peloponesiacum*, quem ex MATTHIOLO repetit CAMERARIUS, et I. BAUHINUS coniungit cum SESELI I. montano Pannonicico CLUSII, seu LIGUSTICO *Austriaco LINNAEI,*

NAEI, quo nomine insignitam hanc plantam vidi etiam in amplissimo Horto sicco Nobilissimi MYGINDI. Certe folia SESELIOS CLUSIANI primi, dempto nitore, cum foliis LIGUSTICI huius, valde congruunt, ut operae pretium videatur inquirerere, an LIGUSTICUM *Austriacum*, a Peloponesea vero diversum sit.

114. AETHUSA.

LINN. *Gen. Plant.* 317.

Fructus pyriformis octagonus.

339. AETHUSA *Cynapium.*

Aethusa. LINN. *Syst. Nat.* p. 213. *Spec. Plant.* p. 256. HALL. *Hist.* n. 765.

DIAGN. *Folia bipinnata; suprema e vaginis bifidis genita. Umbellarum radii (5-6).*

Habitat in cultis.

Foliola oblonga, incisa; segmento terminali longiore latioreque. Varietatem segmentis linearibus et ubique aequa latis Gorizia misit P. WULFEN. Dentes calycini quandoque foliolum lineare producunt.

115. CONIUM.

THEOPH. LINN. *Gen. Plant.* 299. *Cicuta* PLIN. TOURN.

Fructus ellipticus. Semen quatuor plicis crenulatis et subrepandis praeditum.

340. CONIUM *maculatum.*

Conium seminibus striatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 206. *Spec. Plant.* p. 243. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 238.

Cicuta MATTH. *Diosc.* p. 693. HALL. *Hist.* n. 766.

STOERCK. libell. de *Cicuta*, aliorumque,

Cicutaria vulgaris. CLUS. *Hist.* p. 200.

DIAGN.

342. *Ammi Daucifolium*.

Tab. 10.



DIAGN. *Caulis maculatus. Foliola pinnatifida;*
laciiniis dentatis.

Habitat ad sepes et vias, nec non circa Prardt.
 Planta foetida, villosa; caule ad genicula crassiore, et
 rubris maculis variegato.

Cancri specificum, iuxta Observationes Ill. et Celeberr.
 STOERKII.

116. MYRRHIS.

TOURN. I. R. H. p. 315. Tab. 166.

Semina longa pentagona; angulis scabris,
 acutis.

341. MYRRHIS Odorata.

Scandix feminibus fulcatis, angulatis. LINN. *Syst.*

Nat. p. 213. *Spec. Plant.* p. 258. n. 1.

Myrrhis foliis triplicato-pinnatis, mollibus; semi-
 nibus fulcatis, maximis. HALL. *Hist.* n. 753.

Odorata. RIVIN. *Pentap.*

DIAGN. *Folia villosa, benevolentia, terdivisa, se-
 men nitidum, nigricans.*

Habitat in pascuis nostris subalpinis, In Vochein.

Caulis striatus, fistulosus. Folia filicinis accendentia.
 Flores albi modice irregulares. Semen lineas (8-9)
 longum, et omnino aliud ac in PECTINE Veneris,
 CEREFOLIO, et similibus.

117. AMMI.

TOURN. I. R. H. p. 304. Tab. 159.

Semen gibbum, trifolatum, deflexo stylo
 terminatum. Involucrum primum, pinnati-
 fidum.

342. AMMI Daucifolium. Tab. 10.

Ammi maius, exoticum; foliis per ambitum elegan-
 ter incisis. PLUKENT. *Phyt.* Tab. XI. fig. 1.
 huic proximum.

DIAGN.

DIAGN. *Folia bipinnata: pinnis pinnatifidis, trifidisve; primis costae communi verticillatim adnatis.*

Circa *Idriam*, in *Kubillae* rupibus, prope rivum.

Planta bi- & tripedalis, glabra. Caulis sulcatus, ramosus, auricularis digitii crassitie. Folia pedalia; costa striata; segmentis terminalibus trifidis; omnibus planis, glabris, subitus pallidioribus. Involucrum primis folia linearia, patula, demum revolvuntur, apice pinnatifida, radiis duplo breviora. Radii (ad 40), digitii longitudine. Involucra secunda polyphilla, setacea, patula, indivisa, pedunculis nihilo breviora. Pedunculi (40-45), tres lineas longi, plerique fertiles. Petala albida, cordata, subaequalia. Styli albi, demum reflexi. Fructus ellipticus linearum et dimidiatum longus. Semen singulum marginatum; lineis tribus, aut duobus, dorsalibus, valde elevatis. Lente vitrea videntur quandoque ad basin linearum marginalium seminis cuiusque, prominentiae quaedam exiguae. Non ergo credibile est esse Varietatem LIBANOTIDIS *Halleriana* *prima*.

343. *AMMI maius* LINN. audio crescere in *Austriaco Littorali*, sed ego nondum vidi.

(******) *Seminibus striatis.*

118. PIMPINELLA.

MATTHIOL. LINN. *Gen. Plant.* 328.

Semen striis quinis, pallidioribus, elevatis, et stylis erectis instructum.

344. *PIMPINELLA Rotundifolia.*

Tragofelinum foliis pinnatis; pinnis ovatis. HALL.
Hift. n. 786.

Pimpinella saxifragia. MATTH. *Dioſc.* p. 657.
Tragofelinum minus. TABERNEM. p. 255.

DIAGN.

DIAGN. *Caulis striatus villosulus. Foliorum pinnae subrotundae, sessiles; imis subcordatis.*

Habitat in siccis et sylvestribus.

Pinnae dentatae, modo acuminatae, modo obtusiores; terminali semper indivisa.

345. PIMPINELLA saxifraga.

Tragofelinum foliis pinnatis; pinnis lanceolatis, serratis, extremis trilobatis. HALL. Hist. n. 785.

DIAGN. *Caulis sulcatus glaber. Foliorum pinnae ovatae, incisae et lobatae; impare trilobo.*

Habitat cum priore.

VAR. I. *Floribus albis.*

Folia petiolata; dentibus herbaceo acumine terminatis. Petala subinaequalia.

2. *Floribus rubris.*

Habitat in Alpibus.

Folia sessilia, villosula, ovata; stamina pedalis duplo longiora. Antherae albae. Receptaculum album, rubris punctis lineisque variegatum.

Bene Celeberr. HALLERUS distinxit has species, quas in unam coniunxit Ill. LINNAEUS.

119. BUPLEURUM.

TOURN. I. R. H. p. 309. Tab. 163.

Semen oblongum, nigricans, striis quinis maioribus aliisque minoribus lineatum, stylis suberectis terminatum. His addit HALLERUS folia integerrima.

346. BUPLEURUM rotundifolium.

Bupleurum involucris universalibus nullis; foliis perfoliatis. LINN. Syst. Nat. p. 203. Spec. Plant. p. 236. n. I.

Bupleurum caule brachiato, ramosissimo; foliis ova-to-lanceolatis, amplexicaulibus. HALL. Hist. n. 767.

Scopoli Flora Carn. T. L.

O

Perfo-

Perfoliata. M A T T H. *Diosc.* p. 721. annua. I.
BAUH. *Hist.* III. p. 198.

DIAGN. *Folia perfoliata. Involucrum generale nullum; Partialia ovata.*

Habitat in cultis circa *Tergeustum*.

Folia obtusa, nervo tamen in acumen exeunte. Radii (3-5).

347. BUPLEURUM *falcatum*.

DIAGN. *Folia radicalia petiolata, longa, duas lineas lata; caulina linearia. Involucra universalia subdiphylla, partialia pentaphylla.*

Habitat in districtu *Vipaccensi*, *Gorizieni*, et *Tergestino*.

Caulis cubitalis. Folia radicalia, semipedalia; petiolis foliaceis, compressis, longis. Radii (8-9), unciales.

348. BUPLEURUM *odontites*.

Bupleurum foliis linearibus; involucellis pentaphyllis, aristatis, rigidis. *Fl. Carniol.* p. 329.

Bupleurum involucellis pentaphyllis, acutis, universali triphylo; flosculo centrali altiore, ramis divaricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 203. *Spec. Plant.* p. 237. n. 6.

Auriculae adsinis, Odontitis, etc. I. BAUH. *Hist.* III. p. 201.

DIAGN. *Caulis vix triuncialis. Folia linearilanceolata. Involucrum utrumque pentaphyllum, aristatum, rigidum; partiali pedunculis longiore.*

Habitat *Vipacci* in arvis.

Radix repanda, longitudine caulis. Caulis statim supra basin ramosus, angulatus. Folia sessilia.

120. SCANDIX.

TOURN. *I. R. H.* p. 326. Tab. 173.

Fructus attenuatus, rectis stylis terminatus, cuius crassities raro est sexta pars longitudinalis totius.

349. SCANDIX Pedet.

Scandix seminibus rostro longissimo. LINN. *Syst.*

Nat. p. 213. Spec. Plant. p. 156. n. 2. sed omnino laevia non sunt.

Myrrhis feminis cornu longissima. HALL. *Hist.*

n. 754.

DIAGN. *Umbellae radii (2-3). Semina longissimo rostro, Geraniorum adinstar, terminata.*

Habitat in siccioribus *Agri Tergestini.*

Involucra partialia apice incisa, hinc ramosa dicta a Cl.

ADANSONIO. *Fam. Pl. p. 96.*

350. SCANDIX Hirfuta.

Chaerophyllum caule aequali; foliolis incisis, acutis; fructibus biauristatis. LINN. *Syst. Nat. p. 214.*
Spec. Plant. p. 257. n. 4.

Myrrhis radice praelonga; foliis triplicato-pinnatis, acutis; seminibus cylindricis. HALL. *Hist.*

n. 755.

Myrrhis palustris. RIVINI *Pentap.* non male.

DIAGN. *Caulis obiter striatus. Folia subtus nitida, pinnatifida, ampliuscula. Involucella polyphilla, reflexa.*

Habitat secus fluvios et in sylvis humidis *Carnioliae* frigidioris.

Est omnino *Cicutaria latifolia* L. BAUH. modo hirsuta, modo vero glabra. Caulis et rami, sub umbellis evidenter striati sunt. Umbellae primariae radii (17-20) biunciales et longiores. Petalum unum in floribus extimus, paulo maius caeteris est. Locus natalis, superficies prona folii nitens, et genicula minime tumida. Speciem hanc abunde distinguunt a sociis. Flores plerosque steriles habet, et odorem non ingratum, fere *Petroselini*. Semina aristata, longa, coniungunt cum *Pettine*.

351. SCANDIX *Tinctoria*.

DIAGN. *Folia simplicia, ternata, elliptica, duplicito-ferrata, glabra. Semina recentia, si digitis fricentur, eos fusco-rubro colore inficiunt.*

Crevit in horto, ex seminibus, nescio an indigenis. Caulis teres, laevis, ramosus, aequalis. Folia dicta, digitum longa. Umbellae radii (2-5). Involucella exigua, seminibus breviora. Pedunculi (ad 5), inaequales, fertiles. Fructus striis quinis pallidioribus lineatus, brevi stylo terminatus. An CHAEROPHYLLUM aromaticum LINNAEI?

121. SESELI.

Huc refero Plantas omnes Umbelliferas
Fructu ovato, striato, stylis deflexis terminato: Alii mea pace dividant in tot Genera,
quot iis placent.

(*) *Involucro universalis et partialis.*

352. SESELI Meum.

Athamanta foliolis capillaribus; seminibus glabris,
striatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 208. *Spec. Plant.*
p. 245. n. 2.

Meum Anethifolium. TOURNEF. *Inst.* p. 312.
Tab. 165. ADANS. *Fam. Pl.* p. 97.

Meum. MATTHIOL. *Diosc.* p. 23. HALL. *Hist.*
n. 761.

DIAGN. *Folia bipinnata; foliolis capillaceis.*

Habitat in summo, et fere inaccesso dorso M. Greben.
In *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis pedalis, striatus, ramosus, Umbella radii non
ultra duodecim, inaequales. Pedunculi pauci ferti-
les, hique breviores. Petala alba. Semina obiter
striata.

Incolae vocant *Sterbitz*.

353. SESELI *Nodiflorum.*

Sium foliis pinnatis; umbellis axillaribus, sessilibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 211. *Spec. Plant.* p. 251.

DIAGN. *Umbellae inter ramos sessiles, nudae; ex alis subsessiles, et fultae folio profunde trifido.*

Habitat in fossis *Carnioliae* calidioris.

Caulis striatus, ramosus: Radii unciales et breviores.

Pedunculi vix duas lineas longi. Folium impar non trifidum,

354. SESELI *Falcaria.*

Sium foliis linearibus, decurrentibus, connatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 211. *Spec. Plant.* p. 252.
n. 6.

Sium foliis firmis, serratis, pinnatis, nervo folioso,
laetescente. HALL. *Hist.* n. 782.

DIAGN. *Costa foliosa dividitur in angustas, longas,
dentatas, planas et pallide virentes lacinias.*

Habitat aridis et montosis *Austriaci Littoralis.*

Spatia seminum lineis interiecta rugosula. Calycis con-
niventes denticuli, qui fructum terminant aliquam
plantae, cum PHELLANDRIO adsinitatem indicant.

355. SESELI *Amomum.*

Sison foliis pinnatis; umbellis erectis. LINN. *Syst.
Nat.* p. 212. *Spec. Plant.* p. 252.

DIAGN. *Foliolum terminale perpetuo trifidum. Um-
bellae pedunculatae.*

Habitat in fossis.

Mea Planta omnino est SISON *Lugdunensium*, seu
AMOMUM *Officinarum*. MORISON. *Hist.* III. S. 9.
Tab. 5. fig. 7.

(**) *Involucro partiali tantum.*

356. SESELI *annuum.*

Sefeli petiolis rameis membranaceis, ventricofis,
emarginatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 215. *Spec.*

O 3 Plant.

Plant. p. 260. n. 4. IACQUIN. Austr.
Obs. 28.

Saxifraga Pannonica. I. BAUH. Hist. III. p. 19. ex
CLUSIO.

DIAGN. *Folia bipinnata. Foliola profunde trifida.*

Habitat in montanis Carnioliae, non rarum.

Planta adulta rubens. Vaginae foliorum superiorum
margines membranaceos, et rubellos habent. Bonam iconem huius plantae, aut saltem meliorem Clu-
siana dedit VAILLANTIUS in Bot. Paris.
Tab. 9. fig. 4.

357. SESELI glaucum.

Seseli foliis linearibus, triplicato-pinnatis, caule
vaginoso. HALL. Hist. n. 762.

Seseli petiolis ramiferis membranaceis, oblongis,
integris: foliolis singularibus binnatisque cana-
liculatis, laevibus, petiolo longioribus. LINN.
Syst. Nat. p. 215. *Spec. Plant.* p. 260.

DIAGN. *Folia bipinnata. Foliola solitaria, unica-
lia: terminalibus ad basin usque trifidis.*

Habitat in asperis Carnioliae interioris.

Planta haec omnino est PEUCEDANUM Pannonicum
CLUSII, non confundenda cum SELINO pumila,
EIUSD. nec cum HIPPOMARATHRO RIVINI.
Neque huic trahi potest SAXIFRAGA tertia MAT-
THIOLI, ut censet I. BAUHINUS, quae pa-
radoxa omnino videtur.

358. SESELI Hippomarathrum.

Seseli involucris connato-monophyllis. IACQUIN.
Austr. p. 52. Obs. 25. LINN. *Syst. Nat.* p. 215.
Hippomarathrum. RIVINI et KRAMERI.

DIAGN. *Involucella monophylla, dentata, et pel-
vis figuram referentia notante KRAMERO.*

Habitat in montibus Carnioliae calidioris.

Foliola heteromalla, rigida, et veluti fasciculata. Involucra pelyiformia bene exprimit figura Riviniana. In Austria invenit KRAMERUS, illustravit IAC-QUINIUS, sed DAUCUS montanus multifido brevique folio C. BAUHINI, hue trahi nequit.

(***) *Involucris nullis.*

359. SESELI Aegopodium.

Aegopodium foliis caulinis, summis ternatis. LINN.
Syst. Nat. p. 217. *Spec. Plant.* p. 265. *Fl. Suec.*
2. 263. sed quid opus differentia, cum unica
planta unum Genus constituit?

Podagraria. RIVIN. HALL. *Hist.* n. 759.

DIAGN. *Petiolus dividitur in tres ramos triphylos; foliis ovato-lanceolatis, dentatis, subtus villosulis.*

Hortorum calamitas.

Funiculi albi, longi, reptantes, radicem faciunt. Folia superiora triloba. Petala alba. Semen oblonguin.

360. SESELI Graveolens.

Apium foliis caulinis cuneiformibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 217. *Spec. Plant.* p. 264. n. 2.

DIAGN. *Umbella sessilis in qualibet axilla, folio trifido suffulta; radis inaequalibus.*

Habitat in humidis *Austriaci Litoralis*, non frequens. Seminis structura eadem quae in *PIMPINELLA saxifraga*, sed styli retroflexi.

361. SESELI Carum.

Carum. OMNIUM BOTANICORUM.

DIAGN. *Folia bipinnata; costa primaria, ad exortum ramorum primorum, foliolis verticillata.*

Habitat in pratis siccioribus passim.

Caulis striatus. Sub Umbella unum plerumque folium. Radii (ad 12). Pedunculi (ad 20). Flores omnes

fertiles. Antherae luteolae. Styli rubelli. Semen in igne crepitans. Gestatio menstrua.

122. PHELLANDRIUM.

TOURN. I. R. H. p. 306. Tab. 161.

Fructus decemstriatus, oblongus, coronatus calyce conspicuo tubisque recurvis.

362. PHELLANDRIUM *Mutellina*.

Phellandrium caule subnudo; foliis pinnatis. LINN.
Syst. Nat. p. 213. *Spec. Plant.* p. 255. IAC.
QUIN. *Austr.* p. 51. Obs. 24.

Seseli foliis duplicato-pinnatis; pinnulis semipinnatis, lobulis lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 763.
Mutellina. I. BAUH. *Hist.* III. p. 66.

DIAGN. *Folia bipinnata: pinnulis acute multifidis.*
Umbella purpurascens.

Habitat in *Alpibus Vochinensibus*.

In alpibus parva planta, triplo maior in horto redditur, et calyce insigni non vero circulo coronatos fructus exhibet.

363. PHELLANDRIUM *aquaticum*.

Phellandrium foliorum ramificationibus divaricatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 213. *Spec. Plant.* p. 255.
n. 1. *Fl. Suec.* 2, 252.

Phellandrium foliis refractis. HALL. *Hist.* n. 757.

DIAGN. *Caulis dichotomus, aquis immersus. Foliorum rami divaricati.*

Habitat in fossis maioribus paludum *Labacensium*.
Caulis valde crassus. Foliola parva, incisa, sessilia; supremis confluentibus.

123. OENANTHE.

TOURN. I. R. H. p. 312. Tab. 166.

Differt a PHELLANDRIO stylis erectis fructum terminantibus, et calycinis dentibus saepius inaequalibus.

364. OENANTHE *pimpinelloides*.

Oenanthe foliis radicalibus, cuneatis, fisis; caulinis integris, linearibus, longissimis, canaliculatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 213. *Spec. Plant.* p. 255. n. 5.

Oenanthe-folio Apii. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 190.

Filipendula II. TABERNEM. p. 419.

DIAGN. *Structura floris et fructus una semper.*
Folia valde mutabilia. Umbellae radius, non discus, in hac specie abortivus.

Habitat Goriziae ad sepultra Iudeorum, P. WULFEN.
 Caulis sulcatus, laevis, ramosus. Folia radicalia latiora, rotundato-cuneata, serrata; caulina linearia et longiora. Rami nudi. Involucrum generale constat foliis setaceis (8-9). Involucra partialia polyphylla. Dentes calycini duo caeteris maiores. Petala alba in radio maiora. Napuli ovales radicibus adpensi.

124. SILER.

MORISON. *Hist.* II. et RIVIN. *Pentap.*

Fructus oblongus. Semina convexa et porcata. In fructu viridi et immaturo striae per siccitatem attenuatae, breves alas representant, quae in perfectis seminibus obtusae sunt, nec alis similes.

365. SILER *Trilobum*.

Lasferpitium foliolis trilobis, incisis. LINN. *Syst. Nat.* p. 209. *Spec. Plant.* p. 248.

Angelica foliis tripartitis; lobis superne incisis, obtusis. ROYEN. *Lugdb.* p. 104. GRONO V. *Orient.* 85.

Laserpitium foliis imis rotunde lobatis, vaginalibus, lateralibus, trifidis, HALL. *Hist.* n. 793.

Angelica Aquilegiae foliis. TOURN. *Inst.* p. 313.

Siler foliis *Aquilegiae*. RIVIN. *Pentap.* MORISON. *Hist.* II. S. 9. Tab. 3. fig. 3. PLUKE-NET. *Phyt.* Tab. 223. fig. 7. bene.

Liguisticum RAUWOLFIL. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 148. ab Inventore ita dictum.

Libanotis latifolia. C. BAUH. *Prodr.* p. 83.

DIAGN. *Folia AQUILEGIAE ampla et triloba.*

Communicavit Amicus inter plantas alias Carniolicas; hinc nescio, an indigena sit. Vidi hanc ipsam in Austria, circa Baden, vidensque miratus sum, de hoc loco natali nullam mentionem a CLUSIO factam fuisse; nec a FRATRIBUS BAUHINIS.

(******) *Seminibus omnino, aut maxima parte, laevibus.*

125. CHÆROPHYLLUM.

Fructus laevis, tenuis, longus, nitens, reflexis stylis terminatus.

366. CHÆROPHYLLUM *sylvestre.*

Chaerophyllum caule laevi, striato; geniculis tumidiusculis. LINN. *Syst. Nat.* p. 214. *Spec. Plant.* p. 258. n. 1.

Chaerophyllum foliis acute dentatis, triplicato-pinnatis, glabris: nervis hirsutis. HALL. *Hist.* n. 748.

DIAGN. *Caulis sulcatus. Petala inaequalia. Semina denique nigricantia.*

Habitat in Pomariis, et ad sepes, Maio M. florens.

Planta tripedalis. Vaginarum orae albae, et denso villo pubescentes. Folia Chaerophyllaea, utrinque glabra, sed subtus brevissimo villo ad lentem, adspersa, qui villi in oris pinnularum evidentiores sunt. Umbellae parvae, radiis non ultra decem. Involucella pentaphylla.

Omnino est CEREFOLIUM *sylvestre*, perenne, seminibus laevibus nigris. MORISON. Hist. III. S. 9. Tab. II. cum caulem striatum pinxerit. Flores omnes fertiles, quos LINNAEUS pro discrimine posuerat, non semper adsunt, imo in disco plerumque masculi sunt. Vitiosae quoque videntur Definitiones Linnæanae CHAEROPHYLLI *bulbosif*, et *tenuli*, hoc etenim caulem scabrum non habet, sed insimos tres articulos perpetuo villoso, illud vero pariter hirsutum est.

126. CRITHMUM.

TOURN. I. R. H. p. 317. Tab. 169.

Figura fructus cum SILERE convenit, differt vero seminibus laevibus.

367. CRITHMUM *maritimum*.

Crithmum foliolis lanceolatis, carnosum. LINN. Syst.

Nat. p. 208. Spec. Plant. p. 246. n. 1.

Crithmum I. MATTHIOL. Diosc. p. 355.

DIAGN. Quilibet secundus folii ramus sustinet tria folia lanceolata et carnosa.

Habitat Tergesti circa Mare, et Timavi fontem. MATTHIOL.

Folia nihil minora, ac in LASERPITIO Silere. Involucrum generale breve. Umbellae radii (ad 12). Involucra partialia seminibus breviora. Seminum sapor viscidus et acidulus.

TRIGYNIA.

127. COTINUS.

TOURN. I. R. H. p. 610. Tab. 380.

Calyx quinquesfidus, persistens. Petala quinque. Bacca unilocularis, monosperma. Semen triangulare.

368. COTINUS *Coggygria*.

Rhus foliis simplicibus ovatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 218. *Spec. Plant.* p. 267. n. 12.

Rhus racemis plumosiflora, foliis ovatis. HALL. *Hist.* n. 827.

Coggygria. CLUS. *Hist.* I. p. 16. I. BAUHIN. *Hist.* I. p. 494.

Cotinus coriaria. DODON. DUHAMEL. *Arbor.* I. p. 191.

DIAGN. *Paniculae terminalis racemi plerique in filamenta plumosa et sterilia desinentes. Fructus potius capsularis, semicordatus, ramosis venis instructus.*

Habitat *Vipacci* et *Tergesti* in montibus.

Arbusculae huius folia simplicia, ovalia, obtusa, integerrima; petiolis rubellis. Calyces 3-5-fidi, patent. Petala erecta, parva, tot, quot dentes calycini. Receptaculum rotundatum, carnosum, in eius centro sedet germen. Stylus medius deflexus et brevior.

128. VIBURNUM.LINN. GLEDITSCH. *Syst. Plant.* 845.

Corolla monopetala, rotata. Germen sustinens tubercula tria, loco stylorum. Bacca unilocularis, monosperma.

369. VIBURNUM *Lantana*.

Viburnum foliis cordatis, ferratis, venosis, subtus tomentosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 218. *Spec. Plant.* p. 258, n. 5. *Fl. Carniol.* p. 271, n. 1.

Viburnum foliis ovatis, ferratis, subtus tomentosis. HALL. *Hist.* n. 669.

Viburnum. M A T T H. *Diosc.* p. 167.

DIAGN. *Folia subtus albo tomento incana. Umbellae radii septem, bis trifidi.*

Habitat ad sepes, et in sylvis, initio Maii M. florens. Sub singulo ramo et pedunculo umbellae floralis est bractea decidua. Filamenta corollae diametro longiora. Corollae segmenta reflexa. Antherae flavae. Bacca ovalis, compressa, ferrugineo semine foeta.

370. VIBURNUM *Opulus*.

Viburnum foliis lobatis; petiolis glandulosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 218. *Spec. Plant.* p. 268, n. 7. *Fl. Suec.* 2. 264. *Fl. Carniol.* 272.

Opulus TOURNEFORT. ROYEN. HALL. *Hist.* n. 668.

DIAGN. *Folia triloba: petiolis glandulosis. Umbellae flores radiantes magni et steriles.*

Habitat circa aquas in sylvis. Foliorum lobi acuti, dentati. Glandulae aut tuberculatae inter folium et petiolum, et denuo alia pedunculata ad basin petioli. Umbellae radii sex, ramosi ramis pedunculisque bracteatis.

In hac specie videtur stylus brevis, crassus, et veluti ex tribus connatis ac subbisidis factus, Bacca subrotunda, mollis, loculum aut faccum membranaceum continet, in quo semen. Flores quoque in hortis imperfecti plures, quam ruri.

129. SAMBUCUS.

TOURN. I. R. H. p. 606. Tab. 376.

Differt a VIBURNO bacca rotunda, disperma TOURN. trisperma LINN. LUDW. GLEDITSCH. III. TOURNEFORTIUS, qui herbas ab Arboribus separavit, EBLUM cum SAMBUCO reliquit; quanta vis Generum naturalium!

371. SAMBUCUS *Ebulus*.

Sambucus cymis tripartitis; stipulis foliaceis. LINN.

Syst. Nat. p. 219. *Spec. Plant.* p. 269. n. 1. *Fl.*

Suec. 2. 266. *Fl. Carniol.* p. 270. n. 1.

Sambucus herbacea; floribus umbellatis. HALL.

Hist. n. 671.

Ebulus MATTHIOL. *Diosc.* p. 783.

DIAGN. *Gemma radicalis. Florescentia post solstitium aestivum.*

Habitat in montibus circa Idriam et alibi.

Caulis sulcatus. Folia lanceolata serrata, quadriunguis, petiolis septem striatis. Racemi oppositi trifidi. Calyx apice rubellus. Petalorum apices inflexi et rufi. Filamenta nodosa. Stigmata obscure rubra.

372. SAMBUCUS *nigra*.

Sambucus cymis quinquepartitis; caule arboreo.

LINN. *Syst. Nat.* p. 219. *Spec. Plant.* p. 269.

n. 2. *Fl. Suec.* 2. 265. *Fl. Carniol.* p. 270. n. 2.

Sambucus arborea; floribus umbellatis. HALL.

Hist. n. 670.

Sambucus MATTH. *Diosc.* p. 782. DUHAMEL.

Arbor. II. p. 253.

DIAGN. *Gemmae caulinae. Cymae florales quinquepartitae. Bacca nigra.*

Habitat circa Domos, et in sylvis, cum Rosis et CORNO sanguineo florens.

Omnis floris partes albae.

373. SAM-

373. SAMBUCUS racemosa.

Sambucus racemis compositis, ovatis; caule arboreo;

LINN. *Syst. Nat.* p. 219. *Spec. Plant.* p. 270.

n. 4. *Fl. Carniol.* p. 271. n. 3.

Sambucus arborea; floribus spicatis. HALL. *Hist.*

n. 672.

DIAGN. *Gemmae caulinæ. Racemi ovati. Baccæ rubra.*

Habitat in sylvis.

Stigma singulum nigra macula notatum.

130. STAPHYLLODENDRON.

PLIN. MATTH. TOURN. *I. R. H.* p. 616. *Tab. 386.*

Calyx quinquefidus, persistens, sustinens petala et stamina (5). Capsulae binae, inflatae, interiore futura connexae, foventes semina duo ossea et subrotunda. DUHAMEL. *Arbor.* II. p. 287.

374. STAPHYLLODENDRON Pinnatum.

Staphyllaea foliis pinnatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 219.

Spec. Plant. p. 270. n. 1. *Fl. Carniol.* p. 580. a

Calycifloris removenda, a quibus numero staminum, absentia receptaculi nectariferi, et fructu, differt. HALL. *Hist.* n. 831.

Staphyllumdendron TOURNEFORT. I. c. MATTHIOL. *Diosc.* p. 201.

DIAGN. *Folia pinnata. Racemi penduli; racemulis saepius oppositis, trifloris.*

Habitat in umbrosis et humidioribus sylvarum locis.

Foliorum iuga duo, cum impare, eaque oblonga, tenuerque ferrata. Bracteae ad petiolos et pedunculos. Calycis faux pentagona.

Hanc plantam *Digynam* video, nec *Trigynam*. Quare TOURNEFORTII nomen genericum anti-

quum

quum et efficax reliquit ADANS: contra legem propriam. *Praef.* p. 172. n. 1?

131. TAMARISCUS.

TOURN. *Inst. R. H.* p. 661. LUDW. HALL.

Calyx quinquefidus, permanens. Petala (5). Stylus nullus. Capsula unilocularis, trivalvis, valvis lanceolatis. Semina terminata stylo setulis undique papposo. His addit folia tenuissima Cupressinis similia LUDWIG.

375. TAMARISCUS *Germanicus.*

Tamarix floribus decandris. LINN. *Syst. Nat.* p. 219.

Spec. Plant. p. 271. n. 2.

Tamariscus spicis foliosis. HALL. *Hift.* n. 948.

Tamarix Germanica. I. BAUHIN. *Hift.* I. P. 1. p. 351.
DUHAMEL. *Arbor.* II. p. 299.

DIAGN. *Stamina alterna longiora, omnia insidenciae vaginae communis germe ambiente, diadelphica.*

Habitat circa fluvium Savam, et Idrizam.

Racemi terminales. Pedunculi bractea breviores, uniflori. Petala tenuia, obtusa, rubella, villosula, loco stylorum. Capsula calyce triplo longior, ad basin usque dehiscens. in tres valvas lanceolatas, acutas.

132. ALSINE.

LINN. *Gen. Plant.* 342.

Calyx pentaphyllus. Petala bifida (5).
Stamina (3-8). Capsula unilocularis quinquevalvis, foveis semina (15) rufa, ovalia, pedicellata, tuberculosa.

376. ALSINE *media.*

Alsine floribus pentandris; foliis ovato-cordatis. F.
Carniol. p. 496. n. 2.

Alsine

Alfine petalis bipartitis; foliis ovato-cordatis. LINN.

Syst. Nat. p. 221. *Spec. Plant.* p. 272. *Fl. Suec.*

2. 27.

Alfine foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, petalis bipartitis. HALL. *Hist.* n. 880.

DIAGN. *Petala bifida. Foliorum apices rubella glandula terminati. Petoli ciliati; ciliis uno in latere per caulem decurrentibus.*

Habitat in hortis, in quibus autumno nascitur ex seminibus aestivis, hyeme persistit, et altero anno sub veris initium flores explicat, plerumque triandros.

Antherae rubrae et roseae, flavo polline plenae.

Staminum numerus inconstans, indicat Genus ALFINES naturale. TOURNEF. LUDW. HALL, *Fl. Carniol.*

133. DRYPIS.

MICHEL, *Gen. Plant.* p. 24. Tab. 23.

Calyx monophyllus persistens. Petala (5) unguiculata. Capsula tenuis calyce indurato et connivente ita tecta, ut cum eo cadere debeat, antequam dehiscat; hinc capsula quevalvis MICHELI paradoxa est; neque etiam circumscissa dicenda, cum nullum sponte sepe aperiendi spatium habeat, et culter capsulae pelliculam basi abscedentem quidem representet, sed separatio haec minime naturalis sit. Semen unicum rufum, reniforme, ex hilo demittens filum, quo imo loco capsulae adfigitur.

377. DRYPIS spinosa.

Drypis. LINN. *Syst. Nat.* p. 221. IACQUIN. cum egregia illustratione.

Drypis Italica, aculeata; floribus albis, umbellatim compactis. MICHEL. l. c.

Scopoli *Fl. Carn.* T. I.

P

DIAGN.

DIAGN. *Caules tetragoni, ramosissimi. Folia iuniperina, patula, spinosa.*

Habitat ad radicem M. Grindovitz. In Istria ad portum S. Martini III. a MYGIND. Planta adulta frutescens. Rami patuli. Folia superna plana, subtus convexa, sub ramis summis infra medium utrinque spinosos dentes in margine proferentia. Petala apud nos rubella. Stamina decem ponit ADANS; quae ego nec in spontanea, nec in culta Planta hucusque vidi.

TETRAGYNIA.

134. PARNASSIA.

TOURN. I. R. H. p. 246. Tab. 127.

Calyx quinquefidus persistens. Petala quina, Nectaria totidem ciliata: ciliis globulo terminatis. Capsula quadrivalvis, pyriformis, polysperma.

378. PARNASSIA palustris.

Parnassia LINNAEI. HALLERI. LUDWIG.
GLEDITSCH. ADANS. &c.

DIAGN. *Petala alba, ovata, lineata. Stamina persistens.*

Habitat in udis.

Segmenta calycina longitudine staminum. Staminibus subulatis interiacent nectaria flavo-viridia; ciliata; ciliis luteolo globulo terminatis.

PENTAGYNIA.

135. STATICE.

LINN. Gen. Plant. 348.

Calyx proprius monophyllus, supra medium plicatus. Petala (5). Capsula obtusa, mo-

nosperma, stellam ex plicis quinque factam in apice gerens.

379. STATICE *Armeria*.

Statice caule simplici, capitato; foliis linearibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 222. *Spec. Plant.* p. 274. n. 1.

Fl. Suec. 2. 269. HALL. *Hist.* n. 835.

DIAGN. *Scapi radicales, nudi, florali capitulo terminati. Folia graminea, canaliculata, scapis triplo breviora.*

Habitat in Alpibus *Vochinenibus*. *Privele*, *Drasche-Vuorch*, *Tostetz*, *pot Rangor pot Stagam*, *pot Kopitzo*, *Debel-Vuorch*, *v Vercho*, et supra *Kointschka*.

Scapi teretes, paleolis oblongis ad basin septi. Perianthium commune descendit in scapum eumque vaginat. Calyces villosi. Petala in Alpibus basi modice cohaerentia, rosea, elliptica, obtusa; brevibus unguibus albisque. Antherae basi bifidae; segmentis inflexis. Germen circumdateum annulo nectarifero, flavescente, quinquelobo; lobis staminiferis. Styli albi, filamentis longiores, ad basin pilosi, semen ovatum, obtusum.

Flores novi successive prodeunt, postquam veteres arefacti sese retraxerunt, ut in *DIANTHO prolifero*. Nectarium ostendit adsinitatem cum *Alsinibus*, quibus glandulae ad bases staminum, Antherae effuso polline fusco caeruleescunt. Vagina perianthii com. in Alpibus rubra fit. Petala dempto calyce, vi elastica, sese subito pandunt. Pili stylorum superiores concole glandula terminati.

380. STATICE *Limonium*.

Statice caule paniculato, tereti; foliis laevibus, energiis subtus mucronatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 222.

Spec. Plant. p. 274. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 270.

Limonium MATTHIOL. *Diosc.* p. 630.

DIAGN. *Caulis paniculatus, nudus. Flores secundi: Folia glaberrima.*

Habitat ad *Littora Maris, Tergesti et in Istria*. In paludibus, quae *Timavi* fontibus irrigantur M A T T H. *Folia radicalia, oblonga, integerrima. Caulis rigidus, cubitalis. Paniculae rami dichotomi, angulati. Flores in summis ramis spicati, uno versu dispositi. Sub singulo calyce duae squamæ basi cohaerentes, ovatae, subvirides. Corolla caerulescens.*

136. LINUM.

* TOURN. I. R. H. p. 339. Tab. 176.

Calycina folia aut segmenta tot, quot petala, stamina, styli, et locula ac valvae Capsulae. Semen unicum in singulo loculo. TOURN. LINN. LUDW. GLEDITSCH. bina ADANS.

381. LINUM usitatissimum.

Linum calycibus, capsulisque mucronatis; petalis crenatis; foliis lanceolatis, alternis; caule sub-solitario. LINN. *Syst. Nat.* p. 223. *Spec. Plant.* p. 277.

Linum M A T T H. *Diosc.* p. 318. HALL. *Hijl.* n. 836.

DIAGN. *Planta annua, sativa, glabra, capsulis et calycibus mucronatis.*

Habitat in fiscis et sterilibus *Carnioliae* pascuis, forte natum ex dispersis seminibus plantae cultae.

Calycina folia ad apicem denticulata, in margine membranacea. Capsulae immaturaæ, foli expositæ, strepunt aut crepitant, dum locula separantur.

382. LINUM hirsutum. Tab. II.

Linum calycibus hirsutis acuminatis, sessilibus, alternis; foliis alternis; rameis oppositis. LINN. *Syst. Nat.* p. 224. *Spec. Plant.* p. 279. n. 3.

DIAGN.

Tab. II.

382. *Linum Hirutum*.

383. *Linum Sylvestre*.



384. *Linum Laeve*.

DIAGN. *Flores tetragyni. Germen totum hirsutum. Capsula quadrilocularis.*

Habitat in montanis Carnioliae calidioris.

Radix lignosa, repanda, descendens, pallida. Caules erecti, teretes, vix pedales, hirsuti, per aetatem rubore aliquo tincti. Folia sessilia, hirsuta, absque glandulis, semiunciam longa, duas lineas lata. E summo caule rami breves, corymbosi. Calyces hirsuti, sessiles, acuminati; marginibus foliorum glandulosi; glandulis flavis, et stipitatis. Corolla caerulea. Petala obtusissima, octo lineas longa; unguibus flavicantibus. Filamenta glabra, ad basin plana et latiora. Germen acuminatum; quatuor stylis instructum.

383. LINUM sylvestre. Tab. II.

DIAGN. *Folia lanceolata, denticulata; oris stipitas glandulas undique proferentibus. Calyces acuminati, secundi, pedunculati.*

Habitat circa Lippizam, et Idriae in montibus.

Si hoc est LINUM sylvestre, caeruleum, perenne, eretius, flore et capitulo maiore RAII quod LINNAEUS perenne vocat, certe male determinatum fuit, cum neque calyces neque capsulas obtusas habeat. LINUM sylvestre, latifolium, hirsutum, flore caeruleo. 1. BAUHINI, multa, cum nostro, communia gerit, ut etiam LINUM sylvestre latifolium CLUSII, et si neque figura, neque descriptio data sufficiat, ut a priore specie rite discerni queat, cum tamen differat. 2. Caule bipedali. 2. Foliis uncia longioribus, in margine glandulosi. 3. Ramis umbellatis. 4. Pedunculis florum unciali et maiore etiam intervallo, ex alis foliorum rameorum prodeuntibus. 5. Petalis non obtusis, sed in breve acumen sensim convergentibus. 6. Stylis (5—6). 7. Capsulis heteromallis, supra medium dantaxat villosis. 8. Cau lis foliorumque trinervium viscositate quadam manifesta.

384. LINUM *flavum*.

Linum calycibus subserrato-scabris, lanceolatis, subfessilibus; panicula ramis dichotomis. LINN.

Syst. Nat. p. 224. Spec. Plant. p. 279. n. 9. Fl. Carniol. p. 508. n. 2.

Linum latifolium luteum. I. BAUHIN. *Hist. III.*
p. 454.

D I A G N. *Caulis striis eminentibus angulatus. Petala flava, semiuncialia. Stamina quinque sterilia et breviora.*

Habitat in M. *Nanas*, et circa S. *Crucem*.

Caulis non villosus, pedalis, per quem a singula basi folii decurrit linea elevata. Folia uncialia et longiora, lanceolata, acuminata, Calyx acutus, non ferratus. Styli (4-5).

385. LINUM *Liburnicum*.

Ita voco plantam, quam vidi in Herbario *III. et Eruditissimi D. Consiliarii Aulici Francisci a MYGIND,* in *Istria* lectam ab eodem Viro Doctissimo; cui Radix tenuis, simplex, albida. Caulis pedalis, rigidus, dichotomus, paniculatus. Folia alterna, rigida, linearia, acuminata, semiunciam longa. Calyces brevissime pedunculati, remoti, sparsi, acuminati, glabri. Petala lutea et obtusa.

Valde accedit LINO *luteo* *Narbonensi* I. BAUHIN. seu *Maritimo LINNAEI*, quod in montibus *Badenibus* inventum KR AMERUS habet, mihi tamen, ut nec Cl. IACQUINIO, ibidem visum, bene vero LINUM *Luteum*, in eo quem indicat loco, crescens.

386. LINUM *tenuifolium*.

Linum calycibus acuminatis; foliis sparsis, linearifetaceis; retrorsum scabris. LINN. *Syst. Nat. p. 224. Spec. Plant. p. 278. n. 5.*

Linum foliis linearibus; calycibus longe aristatis. HALL. *Hist. n. 838.*

DIAGN.

DIAGN. *Folia linearia; oris deorsum striatu scabris. Calycina folia, rigido longoque acumine terminata, trilineata, et glandulis stipitatis marginalibus instrueta.*

Habitat in aridis et incultis.

Caules striati, villosuli, dichotomi. Calyx fructu longior.

387. LINUM *Laeve.* Tab. II.

DIAGN. *Folia nullibi scabra. Calycina foliola quinquelineata.*

Habitat in montanis Carnioliae calidioris.

Caules basi procumbentes, striati, glabri, spithamei, apice ramosi. Folia densa. Calyx minime attenuatus in acumen, neque glandulosus, ut in specie priore.

388. LINUM *austriacum.*

Linum calycibus rotundatis, obtusis; foliis linearibus, acutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 224. *Spec. Plant.* 278. n. 6.

DIAGN. *Calycina folia ovata, obtusifcula; marginibus albidis et membranaceis. Capsula calyce duplo longior.*

Habitat in *Distritu Gorizieni.*

Caules glabri, ramosi. Folia angusta, non scabra, nervo crasso destituta. Calycinorum foliorum margines subundulati. Dorsum vero miniine lineatum. Corolla non magna, caerulea.

389. LINUM *catharticum.*

Linum foliis oppositis, ovato-lanceolatis; caule dichotomo; corollis acutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 225. *Spec. Plant.* p. 281. n. 17. *Fl. Suec.* 2. 271. *Flor. Carniol.* p. 508. n. 1.

Linum foliis coniugatis, ovatis; calycibus aristatis, patulis, lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 839.

DIAGN. *Folia opposita. Pedunculi debiles, plurimque nutantes. Stamina quinque sterilia, totidemque fertilia.*

Habitat in herbidis collibus, passim.

Petala alba; unguibus flavis. Antherarum pollen levus. Styli ad basin in unum connati.

137. ROSSOLIS.

DODON. TOURN. I. R. H. p. 245. Tab. 127.

ADANS. Famili. Pl. p. 245.

Calyx semiquinquefidus. Petala (5). Capsula unilocularis, quinquevalvis, polysperma.

390. ROSSOLIS *Septentrionalis.*

Ita voco DROSERAM Roduntifoliam et *Longifoliam* LINNAEI, quae species distinctae non sunt, ut numerosa specimina ab una in aliam speciem sensim degenerantia, me docuerunt. Utraque habitat in *Paludibus Labacensibus*, et in uidis circa Seirach, Lutschenik et Cormons.



CLASSIS



CLASSIS VI.
HEXANDRIA
MONOGYNIA.

138. GALANTHUS.

LINN. *Gen. Plant.* 362.

NARCISSO-LEUCOIUM. TOURN. *Inst. Tab.*
208. C. B. NIVARIA HEIST. ACRO-
CORION ADANS. comprehendens et sequens
Genus.

Corollae petala tria interiora suberecta,
emarginata. Antherae aristatae.

391. GALANTHUS nivalis.

Galanthus LINN. *Fl. Carniol.* IACQUIN.
KRAMER.

Galanthus uniflorus; petalis alternis, cordatis, bre-
vioribus. HALL. *Hist.* n. 1254.

Narcisso-Leucoium. TOURN. *Inst.* p. 387. *Spec.* 6.
Tab. 208. B.

Leucoium triphyllum. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 591.
Narcissus VIII. MATTHIOL. *Diosc.* p. 770. figura
interior.

DIAGN. *Theatrum Florae pandit; scapo unifloro;*
petalis exterioribus lanceolatis.

Habitat ad radices montium.

Radix tunicata. Scapus anceps, striatus, basi involutus
foliis binis. Vagina albida truncata, involvens folia
et scapum. Folia basi flavescentia, triquetro-plana,
apicibus callosis. Pedunculus ex sinistro spathae lo-
culo plerumque prodiens, debilis, sub germine cor-
rugatus. Petala maiora patent elliptica, concava,

undatis rugis interne crispata. Petala minora. (*Nectarium LINN*) externe supra medium maculam viridem cordiformem gerunt, interne vero lineis septis luteo viridibus longitudinaliter striata. Antherae conniventia, apice dehiscentia. Filamenta antheris duplo breviora, prodeunt e foveis totidem marginatis. Stylus teres, subulatus, staminibus longior. Capsula obtusa, ovata, semiunciam longa, sine stylo, prosternens scapum. Semina oblonga (4—12) in uno loculo, unco proprio adhaerent receptaculo.

139. LEUCOIUM.

LINN. *Gen. Plant.* 363.

NARCISSO-LEUCOIUM. TOURN. *I. R. H.*
Tab 208. A. A.

Corolla hexapetala, campanulata; petalis apice incrassatis. Antherae muticae.

392. LEUCOIUM vernum.

Leucoium spatha uniflora; stylo clavato. LINN.

Syst. Nat. p. 234. *Spec. Plant.* p. 289. n. 1.

Galanthus uniflorus; petalis subaequalibus. HALL.
Hist. n. 1253.

Leucoium I. TABERNEM. p. 1005.

DIAGN. *Spatha uniflora.* *Florescentia initio veris.*

Habitat circa *Hipperlabacum*.

Spatha bivalvis, corolla nutans. Petalorum apices macula luteo-viridi utrinque notati. Stamina erecta. Antherae filamentis longiores, apice dehiscentes, biloculares; hinc **GALANTHO** valde similis planta.

393. LEUCOIUM aestivum.

Leucoium spatha multiflora; stylo clavato. LINN.

Syst. Nat. p. 234.

Leucoium bulbosum. etc. I. BAUHIN. *Hist.* II.
p. 592.

DIAGN.

DIAGN. *Spatha multiflora*. *Florescentia sub finem veris.*

Habitat in pratis uidis circa *Labacum*, et *Hipperlabacum*.

Scapus nudus, anceps, foliis brevior. Pedunculi ex una spatha (2-7). Flores albi, penduli. Petala elliptica. Stylus clavatus. Capsula pyriformis; loculis tetraspermis. Semina subrotunda.

Huc pertinet descriptio LEUCOII II. *Fl. Carniol.* non vero synonyma, nec non *NARCISSI secundi*. MATTHIOLI figura non bona.

140. NARCISSUS.

TOURN. I. R. H. p. 353. Tab. 185.

In centro corollae hexapetalaе sedet nectarium-monophyllum.

394. NARCISSUS poeticus.

Narcissus spatha uniflora; nectarii limbo rotato, brevissimo, scarioso, crenulato. LINN. *Syst. Nat.* p. 234. *Spec. Plant.* p. 289. n. 1. *H. Upsal.* p. 74.

Narcissus uniflorus; foliis ensiformibus; scypho brevissimo. HALL. *Hist.* n. 1250.

DIAGN. *Spatha uniflora*. *Nectarium breve, rotatum.*

Habitat *Lippizae*, et in *Kartschia*.

Nectarii limbus cinnaberinus.

395. NARCISSUS *Pseudo-Narcissus*.

Narcissus spatha uniflora; nectario campanulato, erecto, crispo, aequante petala ovata. LINN. *Syst. Nat.* p. 234. *Spec. Plant.* p. 289. n. 2.

Narcissus foliis ensiformibus; scapo unifloro; scypho undulato, ferrato, petalis aequali. HALL. *Hist.* n. 1252.

Bulbocodium, I. BAUH. *Hist.* II. p. 593.

DIAGN. *Spatha uniflora. Nectarium campanulatum, petalis concolor et aequale.*

Habitat in Pomariis, non rarus.

141. ALLIUM.

HALL. LINN. *Gen. Plant.* 370.

Capitulum florale, scapum terminans, spatham cohaerentem denique rumpit. Petala tria, alterna, basi staminifera. Antherae erectae. Sapor et Odor plerisque singularis.

(*) *Umbella bulbifera.*

395. ALLIUM scorodopraffum.

Allium caule planifolio, bulbifero; foliis crenulatis; vaginis ancipitibus; staminibus tricuspidatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 238. *Spec. Plant.* p. 297. n. II.

Allium staminibus alterne trifidis; capite bulbifero; foliis gramineis, leviter ferratis. HALL. de All. n. XII.

DIAGN. *Porraceum, foliorum oris tenuissime denticulatis; petalis exterioribus subtus tuberculosis.*

Habitat circa hortos.

Culmi basi adscident bulbi duo conici, acuminati, solidi, atro-rubelli, quibus quandoque alii minores adstant, quandoque unicus bulbus est; Culmus teres. Folia plana, et lata. Spatha longa. Capitulum valde bulbosum; bulbillis fusco-rubris. Petala rubra. Germinis lobus quilibet infra medium habet plicam transversam, tuberculo in medio signatam.

ALLIUM *Porraceum* illud appello, quod stamina trifida possidet: dente medio antherifero; *Cepaceum* autem, quod stamina apice indivisa et acuminata gerit.

397. ALLIUM carinatum.

Allium caule planifolio, bulbifero; staminibus subulatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 238. *Spec. Plant.* Al. p. 297. n. 13.

Allium bulbo sobolifero; foliis succulentis; spata bicorni; umbella bulbifera. HALL. Hist. n. 1224.

Allium inodorum; umbella bulbifera; vagina bicorni; foliis carinatis. HALL. de All. XXXVIII. Tab. 2.

DIAGN. *Cepaceum; foliis angustis, subtus striatis, obtusis, caule tereti, glabro.*

Habitat circa Tergestum, Idriam, Labacum, circa hortos.

Caulis teres, vaginis foliorum striatis instructus. Folia obtusa, non denticulata, carinata, apice plana: Spatha bicornis, longissima. Flores mei rubri.

(*) *Umbella non bulbifera.*

398. **ALLIUM paniculatum.**

Allium caule subteretifolio, umbellifero; pedunculis capillaribus, effusis; staminibus subulatis, spatha longissima. LINN. Syst. Nat. p. 239.

Allium radice dupli; foliis succulentis; spatha bicorni, umbellae radiis pendulis. HALL. Hist. n. 1225.

Allium foliis teretibus; vagina bicorni; umbella pendula, suave purpurea. HALL. de All. n. XXXVI, Tab. 1.

DIAGN. *Cepaceum, subteretifolium; pedunculis setaceis, et uno saltu spathae cornu quadruplo brevioribus.*

Habitat in Agro Tergestino, et Vipaccensi.

Spatha digito longior. Pedunculi exteiiores post nuptias deflexi, eundem habitum Umbellae conciliant, qui in capitulis TRIFOLIT Repentis observatur.

399. **ALLIUM —**

Allii secundi. *Fl. Carniol. descriptio.*

Allium montanum; radice oblonga; floribus albenscentibus. SEGUIER. Veron. Suppl. p. 233.

DIAGN. Floret cum *AIRA* *cærulea* caule basi triphylo; foliis supra medium planis, infra vero canaliculatis; *Cepaceum*.

Habitat in montibus circa *Idriam*, et *Pilliggratz*.

Radix obliqua oblonga, tunicata: cortice sanguineo. Caulis pedalis, striatus, tenuis, basi teretiusculus. Spatha subovata, brevis. Pedunculi erecti, laxam umbellam constituunt, quibus arida florum sterilium rudimenta interiacent, loco bulborum. Petala patula et albida. Filamenta subulata. Germen viride. Capsulae sulci albidi, locula disperma. In notis vocavi *ALLIUM obliquum*, cum huius descriptio a LINNAEO data, admodum conveniret, cum vero *III. LINNAEUS* specimen huius plantae a me missum, monuerit esse *ALLIUM angulosum*, sic malui speciem hanc sub nullo potius, quam sub incerto aut malo nomine proponere. Et sane, si Synonyma *ALLII Angulosi* a LINNAEO proposita valent. *ALLIUM Angulosum* certe non est, ut ex sequentis historia, cuius varietas *Angulosum* est, colligere licebit.

400. *ALLIUM Narcissifolium*.

DIAGN. *Allium radice senescente, lignosa, transversa.* HALL. *Enum.* p. 297. n. 2. de *All.* n. XXIX. *foliis radicalibus, gramineis; floribus Umbellasis.* *Hist.* n. 1227.

VAR. I. *Statura maioris.*

Allium senescens. LINN.

Allium umbelliferum pratense. I. BAUH.
Hist. II. p. 566.

In muris *Arcis Veldes*.

Scapus nudus, versus apicem anceps, ad basin duabus lineis eminentibus angulatus. Folia pedalia, canaliculata, apice torta et plana, lineas ($2\frac{1}{2}$) lata. Umbella densa globosa. Pedunculi ancipites. Petala rubra, non adeo patula. Antheræ flavescentes.

VAR.

VAR. 2. *Statura minoris.*

Allium angulosum. LINN.

Allium petraeum, umbelliferum. I. BAUH.

Hist. II. p. 566.

Circa Goriziam. P. WULFEN.

Omnino idem, cum priore, excepta maiore longitudine staminum, et rudimentis florum, loco bulborum.

Allii prioris species nunquam radicem habuit transversam et lignosam, quidquid plurima specimina in omni aetate, diligenter examinasse.

401. ALLIUM urfinum.

Allium scapo nudo, semicylindraceo; foliis lanceolatis, petiolatis; umbella fastigiata. LINN.

Syst. Nat. p. 239. *Spec. Plant.* p. 300. n. 23.

Fl. Suec. 2. 277. *Fl. Carniol.* p. 234. n. 3.

Allium foliis radicalibus petiolatis, ovato-lanceolatis; floribus umbellatis. ROYEN. *Lugdb.* p. 37. HALL. *Enum.* p. 297. *de All.* n. XXXII. *Hist.* n. 1228.

DIAGN. *Cepaceum; scapo trigono, nudo; foliis duobus ovato-oblongis.*

Habitat circa Idriam et alibi non rarum.

Multiplicatis radicibus cespites facit. Spatha huic cito cadens, alba, bivalvis, valvis ovatis. Flores albi. Sapor acerrimus.

142. LILIUM.

TOURN. *I. R. H.* p. 369. *Tab. 195. 196.*

Corollae campanulatae et fastuosae limbus patens; segmentis longitudinali fulco ad basin exaratis. Antherae incumbentes. Stigma crassum, subtrigonum. Semina plana.

402. LILIUM Martagon.

Lilium foliis verticillatis; floribus reflexis; corollis revolutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 240. *Spec. Plant.*

Plant. p. 302. n. 4. *Fl. Carniol.* p. 239. n. 2.

HALL. *Hist.* n. 1233. BOEHM. *Lips.* 527.

Martagon, MATTHIOL. *Diofc.* p. 548.

DIAGN. *Folia verticillata. Petala revoluta.*

Habitat in montanis nostris, non rarum.

Bulbus flavus. Petala exteriora crassum et lanatum dorsum habent, basi utrinque punctata. Germen basi attenuatum. Semina in uno loculo (ad 50).

403. LILIUM chalcedonicum.

Lilium foliis sparsis, lanceolatis; floribus reflexis; corollis revolutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 240.

Spec. Plant. p. 302. n. 4. *Fl. Carniol.* p. 239 n. 2.

Lilium rubrum, s. *miniatum byzantinum*. CLUS. *Hist.* I. p. 131. specimen monanthos.

DIAGN. *Folia sparsa, lanceolata. Corollae miniae, revolutae.*

Habitat circa Idriam, in M. Nanas, Dull, et circa Schenoschetz.

Petala duas uncias longa. Filamenta semicylindrica, uncialia. Antherarum pollen corollae concolor. Stylus semiuncialis. Odor floris aurantiacus.

404. LILIUM bulbiferum.

Lilium foliis sparsis; corollis campanulatis, erectis, intus scabris. LINN. *Syst. Nat.* p. 240. *Spec.*

Plant. p. 302. n. 2. *Fl. Carniol.* p. 240. n. 3.

GRONOV. *Orient.* 104.

Lilium caule folioso, foliis sulcatis, gramineis; floribus campaniformibus, intus floccosis. HALL. *Hist.* n. 1232.

DIAGN. *Folia sparsa; alis bulbiferis. Corollae erectae, interne papillis crassis simplicibus et ramosis exasperatae.*

Habitat in herbidis montosisque locis.

Folia lanceolata, alterna, trinervia; superioribus plurimque bacciferis. Pedunculi umbellati, alternis bifoliis.

bifoliis. Filamenta teretia. Antherae semiunciales, basi bifidae; segmentis incurvis. Locula capsulae fovent semina (ad 100); paucis ad debitam maturitatem pervenientibus.

143. FRITILLARIA.

LOBEL. TOURN. I. R. H. p. 376. Tab. 201.

Corolla infera, campanulata, hexapetala; unguibus petalorum nectarifera fovea excavatis, seu foveola rotunda ADANS. stigma triplex. GLEDITSCH. sed stigmata tria sunt.

405. FRITILLARIA Meleagris.

Fritillaria foliis omnibus alternis; caule unifloro.

LINN. *Syst. Nat.* p. 241. *Spec. Plant.* p. 304.
n. 5. *H. Upal.* p. 81.

Fritillaria caule paucifloro; foliis caulinis gramineis,
alternis. HALL. *Hist.* n. 1235.

DIAGN. *Florescentia vernalis. Caulis simplex, alternifolius. Corolla pentagona, pendula.*

Habitat *Hipperlabaci*, in pratis, trans portum. Floret initio Aprilis.

Radix parva, subrotunda, ad latus singulum habet duas alias spongiosas radices. Scapus teres. Folia quatuor canaliculata. Flos unicus Tulipaeformis, fusco-ruber. Petala oblonga, palidioribus subrotundis maculis variegata, callo viridi terminata. Antherae flavae. Filamenta pallide viridia, antheris vix longiora. Stylus viridis. Stigmata tria, obtusa.

144. ERYTHRONIUM.

LINN. *Gen. Plant.* 375.

Corolla infera, hexapetala, petalis e medio reflexis. Squamulae quatuor nectariferae
Scopoli Flora Carn. T. I. Q ad

ad basin singuli interni petali. Stylus et stamina basi attenuata.

406. ERYTHRIONUM *Dens-Canis.*

Erythronium. LINN. ROYEN. GMELIN.
HALL. *Fl. Carniol.*

Dens canis. CLUS. *Hist.* p. 266. TOURNEF.
Inst. p. 378. Tab. 202.

Mithridatum. ADANS. *Famil. Plant.* p. 48.

DIAGN. *Scapus nudus, uniflorus. Folia bina radicalia, elliptica.*

Habitat circa Idriam, verno tempore florens. Varietatem albo floro a CLUSIO quoque notatam Gorizia misit. P. WULFEN.

Radix iunior et nondum florida, unicum folium promit, quae in florente planta ubique duo sunt ovato-lanceolata, fusco-rubra, viridibus maculis variegata. Scapus teres, ruber. Petala lanceolata, uncialia; exterioribus basi virecentibus et truncatis, interioribus vero ibidem acuminatis. Squamae nectariferae laterales, bifidae. Filamenta quinque lineas longa. Antherae erectae, tres lineas longae. Stylus fistulosus, lineas septem longus, apice bifidus. Germen antheris brevius.

145. TULIPA.

GESN. TOURN. *I. H. R.* p. 373. Tab. 199. 200.

Corolla hexapetala. Stylus nullus, sed stigmata tria retrorsum flexa. D. Stigma trilobum GLEDITSCH. Radix tunicata, parte sessili fibrata. I. K.

407. TULIPA *Sylvestris.*

Tulipa flore subnutante; foliis lanceolatis. LINN.
Syst. Nat. p. 241.

Tulipa. HALL. *Hist.* n. 1236.

DIAGN.

DIAGN. *Folia angusta. Filamenta supra basi villosa.*

Habitat circa Goriziam. P. WULFEN.

Scapus teres, uniflorus. Flos subnutans. Corolla flava, petalis ovato-lanceolatis. Filamenta flava, erecta, albis pilis basi pubescentia. Antherae tetragonaee, polline flavo. Stylus nullus. Stigma triquetrum.

146. ORNITHOGALUM.

DIOSC. PLIN. TOURN. I. R. H. p. 378.

Tab. 203.

Corolla hexapetala TOURN. A. campaniformis ADANS. supra medium patens, una cum stylo persistens. LINN. Filamenta alterna, aut bina tantum, basi dilatata. LINN. GLEDITSCH. nec tamen ovarium tegentia. ADANS. Filamenta in quibusdam speciebus etiam omnia basi dilatata ponit LUDWIG. Eadem, sed tria tantum bifida affirmat RAIUS. Rad. tuberosa, aut bulbosea. TOURN. squamosa. ADANS.

ORNITHOGALUM LUDW. foliis ad pedunculos, loco calycis.

— DILLEN. est ANTHERICUM LINN.

— SIEGESBEK. comprehendit PHALANGIA umbellata. LUDWIG.

— TOURN. complectitur et STELLAREM, ac CORONAM regalem. DILLEN.

408. ORNITHOGALUM umbellatum.

Ornithogalum floribus corymbosis; pedunculis scapo altioribus; filamentis emarginatis. LINN.

Syst. Nat. p. 243. *Spec. Plant.* p. 307. n. 9.

Ornithogalum stipulis maximis, petiolis lateralibus longissimis. HALL. Hist. n. 1215.

DIAGN. Flores albi. Pedunculi imi supra caeteros elati. Folia radicalia (ad 9).

Habitat in cultis.

Stamina nulla bifida sunt. Spatha sub quolibet pedunculo.

Quid sibi voluit MATTIOLUS, dum plantam hanc in *Agro Tridentino* vulgatissimam, tam inepte, et quidem bis, delineavit?

409. ORNITHOGALUM pyrenaicum.

Ornithogalum floribus racemosis; filamentis lanceolatis; pedunculis simplicibus. Fl. Carniol. p. 242.

Ornithogalum racemo longissimo; filamentis lanceolatis; pedunculis floriferis, patentibus, aequalibus; fructiferis scapo approximatis. LINN.
Syst. Nat. p. 242. Spec. Plant. p. 306. n. 5.

Ornithogalum spica longissima; filamentis triangularibus. HALL. Enum. p. 294. n. 2. GRO-
NOV. Orient. 110.

DIAGN. Folia canaliculata et arescentia florente scapo. Flores in longum racemum dispositi, patuli;
Fructus erecti.

Habitat circa Idriam, Alpen, Reifnitz.

Praecipuam differentiam faciunt pedunculi florales patentissimi, fructiferi vero erecti, et scapo adpresso aut paralleli. Praeterea huic radix facile evelienda. Scapus teres, nudus, bipedalis. Folia tria aut quatuor flavescentia, dum planta floret. Filamenta alterna ad lentem breviter bifida. Capsula ovata, styllo terminata; loculis pentaspermis.

410. ORNITHOGALUM luteum.

Ornithogalum scapo angulo, diphyllo; pedunculis umbellatis, simplicibus. LINN. Syst. Nat. p. 242. Spec. Plant. p. 306. n. 1. Fl. Suec. 2.

Tab. 12.

#II. *Asphodelus Liburnicus*.



Phalangium radice subrotunda, bulbosa; stipulis maximis, hirsutis; floribus umbellatis; petiolis unifloris. HALL. Hist. n. 1213.

DIAGN. *Scapus angularis. Pedunculi umbellati, longi, inaequales.*

Habitat circa Pellant. Aprili M, florens.

Pedunculi (usque 7), involucro diphyllo saepius longiores. Flos flavus. Stamina omnia basi latiora, et si viderim etiam duo latiora tantum. Capsula styllo fistuloso prismatico terminata.

Nullum video discrimen inter ORNITHOGALUM hoc, et Minimum ex Austria missum; Idemque forte est ORNITH. bivalve.

147. ASPHODELUS.

DIOSC. TOURN. I. R. H. p. 343. Tab. 178.

Corolla sexfida. Squamulae sex nectariferae, germen tegentes. LINN. Calyx stellatus, filamenta germen tegentia. Semina angulosa ADANS. Stigma truncatum. GLEDITSCH. Radix et multis tuberibus. RAI.

III. ASPHODELUS *Liburnicus*. Tab. 12.

DIAGN. *Folia setacea.*

Novissimae Plantae specimen siccum, absque radice, in Istria lectum benevole communicavit Ill. a MEGIND. Cui caulis teres, pedalis, lineam, crassus. Flores penduli, lutei, laxi, unciam longi, quinque lineis fuscouscentibus striati. Pedunculi simplices, corollis duplo breviores, sub quibus bractea ovalis, albida et acuminata. Folia basin caulis occupant, subtriquetra, uncialia, aut paulo longiora, evaginis propriis membranaceis tenuissimis prodeuntia; angulis scabris et ad lentem quasi dentatis. Stamina tria longiora; filamentis croceis.

412. ASPHODELUS *ramosus*.

Asphodelus, caule nudo; foliis ensiformibus, carinatis, laevibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 244. Sp. *Plant.* p. 310. n. 3. *Fl. Carniol.* p. 241.

Hastula, s. Asphodelus. MATTH. *Diosc.* p. 414.

DIAGN. *Caulis nudus, Folia ensiformia, carinata.*

Habitat in Montibus Idriensis, in M. Nanas, versus Prewald.

Caulis tortilis. Filamenta villosa. Pedunculi petalis albis breviores. Capsulae locula disperma.

148. ANTERICUM.

LINN. *Gen. Plant.* 380.

Corolla hexapetala, patens. Filamenta attenuata, planiuscula. Capsula ovata. ANTERICUM ADANS. est PHALLANGIUM LUDWIG. diversum a SCILLA filamentis villosis; hanc notam reicit LINN. hinc SCILLAE et ANTERICA unum Genus constituent.

413. ANTERICUM *ramosum*.

Anthericum foliis planis; scapo ramoso; corollis planis, pistillo recto. LINN. *Syst. Nat.* p. 244. Spec. *Plant.* p. 310. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 289. *Fl. Carniol.* p. 242.

Phalangium radicibus teretibus; foliis duris gramineis: caule ramoso, laxe paniculato. HALL. *Hist.* n. 1208.

Phalangium parvo flore, ramosum. C. BAUHIN. ZANNICHEL. *Ven.* p. 209. Tab. 20. f. 12. Phalangium quibusdam, etc. I. BAUH. *Hist.* II. p. 635.

DIAGN. Teretes radices proferunt scapum paniculatum, teretem, nudum.

Habitat in Montanis, et asperioribus Carnioliae, passim. Flo-

Florescentia aestiva. Stylus basi tenuior. Capsula subrotunda, in tres valvas ad basin usque dehiscens; loculis dispermiis. Semina nigra, hinc convexa, inde angulata, duo aut quatuor in singulo loculo; septis adfixa.

414. ANTHERICUM Bifolium.

Scilla floribus erectiusculis, paucioribus. LINN.

Syst. Nat. p. 243, *Spec. Plant.* p. 309. n. 6. *Fl. Carniol.* p. 241.

Phalangium radice bulbosa; foliis latissimis, obtusis; spica pauciflora. HALL. *Hist.* n. 1211.

DIAGN. *Bulbus non solidus, sed squamosus. Folia duo, radicalia: Scapus nudus. Flores non ultra decem.*

Habitat circa Idriam. Aprili M. florens.

Bulbus pyriformis, insipidus, constat squamis crassis et albis (12-14). Folia basi flava, carinata; apicibus callosis. Scapus dilatatus, novem striatus. Flores erectiusculi, caerulei. Petala alterna, tuberculo terminata. Filamenta attenuata, modice compressa, duas lineas longa. Antherae transversae, quadriuscultae, effuso polline cinerascente, nigricantes. Germen ovatum. Stylus persistens heptagonus, apice attenuatus, ruffis papillis terminatus, germinis longitudine. Capsula ovata, obtusa, sine stylo; loculo uno saepius inani; aliis vero foventibus semina ovata (2-4).

415. ANTHERICUM Autumnale.

Scilla foliis filiformibus, linearibus; floribus corymbosis: pedunculis nudis, adscendentibus, longitudine floris. LINN. *Syst. Nat.* p. 243. *Spec. Plant.* p. 309. n. 7.

Ornithogalum autumnale, minus, caeruleum. TOURNEFORT. *Inst.* p. 381.

DIAGN. *Scapus racemosus. Pedunculi flore vix longiores. Germen ferrugineum quando siccum.*

Habitat in Austriaco Littorali, Septembri M. florens, et in M. Medeae.

Radix tunicata, non solida. Folia lineam lata, compressa. Flores racemosi. Filamenta plana, attenuata, colore petallorum, sustinentia antheram conditam, fusco polline plenam, corolla breviora. Germen pyriforme, stylo persistente terminatum. Locula disperma. Sem. nigra, cuneiformia.

449. ASPARAGUS.

TOURN. I. R. H. p. 301. Tab. 154.

Corolla rosea TOURN. sexfida. LINN.
Bacca trilocularis; loculis naturaliter monospermis. Semina rotundata, pulvinata, subtus in medio albidam cicatricem habentia. Stigma punctura prominens GLEDITSCH, tria ponit. ADANS.

416. ASPARAGUS officinalis.

Asparagus caule herbaceo, erecto; foliis setaceis; stipulis paribus. LINN. Syst. Nat. p. 245. Spec. Plant. p. 313. n. 1. Fl. Suec. 2. 291. Fl. Carniol. p. 238.

Asparagus foliis filiformibus, stipulatis. HALL. Hist. n 239.

Asparagus MATTH. Diosc. p. 349. DU HAMEL. Arbor. I. p. 84.

DIAGN. Caulis herbaceus. Folia setacea, fasciculata.

Habitat in pratis umbrosis et sylvestribus. Florens cum CONVALLARIA Maiali.

Caulis teres, sub singulo ramo bractea flaccida, linearis. Flores ramei, penduli, axillares, luteo-virides. Stamina tria breviora ex receptaculo, alia tria exunguis petalorum. Germinis apex trifidus: segmentis obscure bifidis. Bacca miniata, sphaerica, punctulis flavis variegata.

417. ASPARAGUS Corruda.

Corruda. I. BAUHIN. Hist. III. p. 726.

Corru-

Corruda prior. CLUS. *Hist.* p. 178.

Asparagus sylvestris. MATTHIOL. *Diosc.* p. 349.

DIAGN: *Caulis fructicosus. Folia teretiuscula, spina terminali, et punctulis subargenteis donata.*

Habitat ad sepes vivas *Agri Goriziensis*, circa *Comonis*, *Medeam*, *Duinum*, *Tergestum*.

Rami patuli angulati. Ramuli ad angulum rectum cum ramo positi, villosum, foliosi. Folia aggregata; spinula flava, terminali. Flores solitarii, albo-lutei, pedunculis folio vix longioribus. Cal. 5-fidus, glaber, patens; foliolis lanceolatis. Stam. 5-flavescens. Germen viride, pyriforme; styli rubelli, breves. Bacca rotunda albo adpresso calyce caryculata, trilocularis, uno loculo monospermo, suo semine caetera locula elidente.

Non omnes Plantae quolibet anno fructiferae sunt.

Surculi radicales Maio M. prodeunt gerunt folia elliptica, denticulata, glabra, duriuscula, obtusa, modo solitaria, modo vero ternata; impari tamen maiore. Petiolus alam foliaceam habet, quae surculum complectitur.

Quod I. BAUHINUS eam ipsam plantam descripsit, sub nomine CORRUDA^E, quae circa *S. Crucem*, *Goriziam*, et *Tergestum* ad sepes occurrit, minime dubito. Quod vero *Asparagus foliis acutis, et aculeatus alter tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum*. C. BAUHIN. Sint duae species distinctae, de hoc equidem magnopere dubito, etsi MATTHIOLUS *Corrudae* suae loca Natalia, circa *Goriziam* addidisset, iudicium facile foret. Certe si folia pro spinis habeantur, tunc erit *ASPARAGUS Aphillus*. LINN. si vero folia dicas, nihil obstat, esse *ASPARAGUM Acutifolium*, ut re ipsa *ASPARAGI Aphilli* specimina ab Amicis dono data, omnes notas habent *ASPARAGI Acutifolii*.

150. CONVALLARIA.

LINN. *Gen. Plant.* 383.

Corolla monopetala. Bacca maculata, quando adhuc immatura, supera. Numerus segmentorum Corollae, staminum, loculorum Baccae, et seminum varius; unde Genera artificialia UNIFOLII, VAGNERAE, LILII-CONVAL, POLYGONATI.

418. CONVALLARIA *maialis*.

Convallaria acaulis, bifolia; scapo nudo. *Fl. Carniol.* p. 236. n. 1.

Convallaria scapo nudo. LINN. *Syst. Nat.* p. 246. *Spec. Plant.* p. 314. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 292.

Polygonatum scapo diphylo; floribus spicatis, nutantibus, campaniformibus. HALL. *Hist.* n. 1246. *Lilium convallium.* TOURNEFORT. *Inst.* p. 77. Tab. 14.

DIAGN. *Bifolia; scapo nudo, radicali.*

Habitat in fiscioribus montanisque pratis, initio Maii M. florens.

Scapus semicylindricus. Flores secundi. Corollae tubus sphaericus. Filamenta sunt pyramides albae sustinentes antheras luteolas et albo polline plenas. Germen album. Stylus obtuse trigonus, fistulosus. Stigma sunt papillae numerosae, per angulos styli decurrentes.

419. CONVALLARIA *verticillata*.

Convallaria foliis verticillatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 246. *Spec. Plant.* p. 315. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 293. *Fl. Carniol.* p. 237. n. 4.

Polygonatum caule simplici erecto; foliis verticillatis, ellipticis. HALL. *Hist.* n. 1244.

Polygonatum ramosum. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 531.

DIAGN. *Folia verticillata.*

Habitat in montanis Carnioliae frigidioris.

Cau-

Caulis modo simplex, modo ramosus.

420. CONVALLARIA Polygonatum.

Convallaria foliis alternis, amplexicaulibus; caule
ancipiti; pedunculis axillaribus, unifloris. LINN.
Syst. Nat. p. 246. *Spec. Plant.* p. 315. n. 3. *Fl.
Suec.* 2. 294. *Fl. Carniol.* 236. 2.

Polygonatum caule simplici, angulo cernuo; foliis ovato-lanceolatis, rigidis, alis unifloris. HALL. *Hist.* n. 1242.

DIAGN. *Alternifolia; caule ancipiti; pedunculis unifloris.*

Habitat in asperis et umbrosis.

Caulis octagonus; angulis duobus oppositis maioribus. Alae uniflorae. Filamenta glabra. Segmenta corollae ellipsis transversim per medium sectam referunt.

421. CONVALLARIA multiflora.

Convallaria foliis alternis amplexicaulibus; caule tereti; pedunculis axillaribus, multifloris. LINN.
Syst. Nat. p. 247. *Spec. Plant.* p. 315. n. 4. *Fl.
Suec.* 2. 295. *Fl. Carniol.* p. 236. n. 3.

Polygonatum caule simplici, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris. HALL. *Hist.* n. 1243.

DIAGN. *Alternifolia, tereti caulis, pedunculis 2-3 floris.*

Habitat cum priore, et *Lippizae*.

Pedunculi compressi. Corollae segmenta subcordata. Filamenta villosula. Stigma flavescentia.

422. CONVALLARIA bifolia.

Convallaria foliis cordatis; floribus tetrandris. LINN.
Syst. Nat. p. 247. *Spec. Plant.* p. 316. n. 8. *Fl.
Suec.* 2. 296. *Fl. Carniol.* p. 337. n. 5.

Unifolium. HALL. *Hist.* n. 1240.

DIAGN.

DIAGN. *Racemus terminalis. Flores digyni.*

Habitat in sylvis.

Folia cordata, (1—3). Corollae quadrifidae, tetrandrae.

151. HYACINTHUS.

LINN. *Gen. Plant.* 385.

Corolla sexfida, hypocarpia GLEDITSCH. segmentis reflexis. Pori tres ad apicem germinis. LINN. *Muscari* differt a **HYACINTHO**, ut **LILIMUM convall.** a **POLYGONATO**.

423. HYACINTHUS comosus.

Hyacinthus corollis angulato-cylindricis; summis sterilibus, longius pedicellatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 247. *Spec. Plant.* p. 318. n. 8.

Hyacinthus spica longissima; floribus superioribus sterilibus, erectis; inferioribus secundis, patulis. HALL. *Hist.* n. 1247.

Hyacinthus maximus. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 574.

DIAGN. *Racemus longissimus, laxus; pedunculis supremis coloratis, sterilibus, deciduis.*

Habitat inter segetes et in agris.

Pedunculi florum fertilium horizontaliter patuli et scapo concolores, e fovea propria nascentur.

Pedunculi florum sterilibus una cum ea parte racemi, cui adhaerent, violacei.

424. HYACINTHUS botryoides.

Hyacinthus corollis globosis, uniformibus; foliis canaliculato-cylindricis, strictis. LINN. *Syst. Nat.* p. 247. *Spec. Plant.* p. 318.

Hyacinthus foliis gramineis; spica ovata; floribus globosis, secundis. HALL. *Hist.* n. 1246.

Muscari arvense, iuncifolium, caeruleum, minus. TOURNEF. ZANNICHEL. *Ven.* p. 188. Tab. 93.

DIAGN.

DIAGN. *Racemus uncialis, densus. Flores nutantes, odorati, pedunculo proprio vix longiores.*

Habitat cum priore, circa *Vipaccum* et *Tergeustum*.
Folia in cylindrum convoluta. Facies ANOTHERICI
Autumn.

152. HEMEROCALLIS.

THEOPH. LINN. *Gen. Plant.* 391.

Corolla campanulata. Stamina omnia infra stylum, sursum curva; superioribus duobus cohaerentibus. Semina pisiformia. Circa situm corollae non convenientia Authores. TOURN. inferam pingit Tab. 179. A. B. C. superam dicit GLEITSCH. semi inferam aut paulo plus ADANS. hinc AGAVES Genus dubium.

425. HEMEROCALLIS *Lilio-Aphodelus.*

Hemerocallis corollis flavis. LINN. *Syst. Nat.* p. 249.

Spec. Plant. p. 324. n. 1.

Lilio-Aphodelus flore luteo. CLUS. *Hist. I.*
p. 137.

DIAGN. *Scapus ramosus. Corollae flavae, monopetalae tubus uncialis.*

Habitat circa *Osetza* et *S. Udalricum.*

Corollae tubus crassitie calami scriptorii, segmenta duas uncias longa: internis latioribus. Filamenta basi anicipitia e tubo genita. Stylus teretiusculus, staminibus longior, apice deflexus. Stigma planum orbiculatum. Capsulae locula trisperma. Germen non est inferum, sed in fundo tubi corollae sedet.

153. ACORUS.

DIOSC. LINN. *Gen. Plant.* 392.

Folii latus sulcatum, profert spadicem nudum et sustinentem flores apetalos; calyce sex-

sexfido, stylo nullo. Capsula trilocularis, obtusa, fulcata; loculis foventibus semina (1-2). Stamina glabra. ADANS.

426. AEORUS Calamus.

Aeorus. LINN. ROYEN. HALL. DODON. GRONOV.

Calamus aromaticus. PETIVER. MONT. MICHEL. *Gen. Plant.* p. 43. Tab. 31.

DIAGN. *Spica attenuata, digitī longitudine.*

Habitat in fossis maioribus *Labacensium paludum*, uberrime.

Radix rependo multiplicata replet alveos, et ita promovet inundationes.

ACORVS proximus **IUNCOIDIS** MICHEL. haec SCHEUCHZERIA, SCHEUCHZERIA ANTERICO, ANTERICUM *Phallangiis*; hinc Familia Liliacearum ADANS. vere naturalis.

154. IUNCUS.

PLIN. TOURN. *I. R. H.* p. 246. Tab. 127.

Calyx hexaphyllus, persistens. Corolla nulla. Capsula unilocularis, trivalvis. Graminea facies.

(*) Legitimi. *Capsulis polyspermis.*

427. IUNCUS conglomeratus.

Iuncus culmo nudo, tereti; panicula laterali, densa, globosa, sessili. *Fl. Carniol.* p. 224. n. 2.

Iuncus culmo nudo, stricto; capitulo laterali. LINN. *Syst. Nat.* p. 250. *Spec. Plant.* p. 326. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 298.

Iuncus caule nudo; foliis teretibus, mollibus; panicula conglomerata. HALL. *Hist.* n. 1312.

Iuncus laevis; panicula conglomerata. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 343. n. 3.

Iuncus M A TTHIOL. *Diosc.* p. 659. I. BAUHIN.
Hist. II. p. 520.

DIAGN. *Culmus nudus. Panicula densa, lateralis,*
subrotunda.

Habitat in paludosis, et circa aquas.

Capsula trigona, obtusa. Semina rufa, cuneiformia.

428. IUNCUS effusus.

Iuncus culmo nudo, tereti; panicula laterali, sparsa.
Fl. Carniol. p. 223. n. 1.

Iuncus culmo nudo, stricto, panicula laterali. LINN.
Syst. Nat. p. 250. *Spec. Plant.* p. 327. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 299.

Iuncus caule nudo; foliis teretibus, strictis; panicula laterali, sparsa. HALL. *Hist.* n. 1311.

Iuncus laevis, panicula sparsa maior. SCHEUCHZ.
Gram. p. 341. *Descriptio.*

DIAGN. *Panicula sparsa, lateralis.*

Habitat circa aquas.

Squamulae duae rubellae, sub calyce, subaristatae. Antherae luteolae. Stigmata rubella. Semina rufa, ovata, nitida.

429. IUNCUS inflexus.

Iuncus culmo nudo, apice membranaceo, incurvo;
panicula laterali. LINN. *Syst. Nat.* p. 250.
Spec. Plant. p. 326. n. 4.

DIAGN. *Culmi apex attenuatus. Panicula spar-*
sa, lateralis.

Habitat in aquosis Agri Tergestini.

Culmus teres, nudus. Paniculae racemus unus fere
æque longus, ac apex culmi. Capsula fusca, acuminata. Semina in una valva (ad 50), oblonga,
compressa, ferruginea, apice membranaceo et flacci-
do instructa.

430. IUNCUS acutus.

Iuncus culmo subnudo, tereti, mucronato; panicula terminali; involucro diphyllo, spinoso. LINN.
Syst. Nat. p. 250.

DIAGN. *Culmi et folia teretia, definunt in acumen pungens. Panicula terminalis inter duo folia terminalia et pungentia nascitur.*

Habitat in paludosis, a S. Giovanni di Duino.

Culmus nudus vimineus. Capsulae ovatae, lucidae.

Panicula est potius lateralis, cum involucri folium longius, sit culmi continuatio.

431. IUNCUS articulatus.

Iuncus foliis nodoso-articulatis; petalis obtusis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 250. *Spec. Plant.* p. 327. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 203. *Fl. Carniol.* p. 224. n. 3-4.

Iuncorum Ord. III. MICHEL. et HALLER.

Iunci. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 331—335.

DIAGN. *Folia articulata. Panicula laxa, terminalis.*

Habitat in paludosis.

Culmus teres. Folia canaliculata, striata, plus minusve evidenter articulata. Panicula rigida. Bracteae binæ sub calyce. Margo calycinorum foliorum rubellus. Filamenta alba. Antherae luteae. Germen cum stylo rubrum. Stigmata stylo triplo longiora. Capsula calyce longior, atro-rubra. continens semina (33), teretia, flavicantia, striata, basi fusca.

432. IUNCUS trifidus.

Iuncens culmo nudo, floribus foliisque tribus, terminalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 250. *Spec. Plant.* p. 326. n. 6. *Fl. Suec.* 2. 301.

Iuncus acumine reflexo, maior et trifidus. C. BAUH. *Prodr.* p. 22. n. 5. cum icon. HALL. *Hist.* n. 1315.

Iuncus trifidus. I. BAUH. *Hist.* II. p. 521.

DIAGN.

DIAGN. *Culmus tenuis, mollis, supra medium foliosus: folio superiore ex ala florifero: floribus (1-3).*

Habitat in *Alpibus nostris.*

In aridissimo M. Grindovitz, cum plantam hanc primo vidisse scapis unifloris, novam speciem ratus, dixi IUNCUM foliis planis culmo unifloro. Prodiit postea FLORA AUSTRICA Cl. IACQUINII, et in ea pariter, IUNCUS hic in Alpibus inventus pro novo traditur, cum nomine IUNCI culmo folioso, gluma subuniflora, et pingitur in Tab. ad Obs. 33. Cum vero aliis annis conscendisse Alpes Vochinenses, ibique eandem plantam passim invenissem, culmis unifloris, bifloris, et trifloris, eademque prorsus quam in Prodromo pinxit BAUHINUS, in aliam sententiam ivi, eamque una cum speciminibus ab uniflora in triflorum degenerantibus, communicavi Cl. IACQUINIO, qui pariter faslus est, IUNCUM suum *Monanthos*, esse meram varietatem IUNCI trifidi. LINN.

In hac specie capsula fusco-rubra, nitida, ovata, acuminata, trilocularis, et trivalvis est; valvis septo medio in duo locula divisis, quorum quodlibet continet semina (3—4), subovata, et acuminata.

433. IUNCUS bufonius.

Iuncus culmo dichotomo; foliis angulatis; floribus solitariis, sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 250.

Spec. Plant. p. 328. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 305.

Iuncus caule brachiato; foliis setaceis; floribus solitariis, ad ramos sessilibus. HALL. *Hist.* n. 1319.

Gramen nemorosum; calyculis paleaceis, erectis. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 327.

Holostium MATTH. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 510.

Gramen iunceum. VI. TABERNEM. p. 536.

DIAGN. *Culmi setacei, ramosi. Flores solitarii, remoti, axillarum ramorumque lateri insidentes.*

Habitat in uidis, et argillosis..

Scopoli *Flora Carn.* T. I.

R

Folium

Folium unum setaceum in culmo, et pariter unum sub ramo quolibet. Culmi apex dividitur in ramos, quorum unus simplex, alter ramosus. Flores sessiles. Calycis foliola lanceolata, acutissima. Capsula oblonga, calyce brevior, fovens semina (ad 100), flava, apice fusca.

(**) *Iuncoides*. MICHEL. ADANS.
Capsulis trispermis.

434. *IUNCUS campestris*.

Iuncus foliis planis, subpilosis; spicis sessilibus pedunculatisque, LINN. *Syst. Nat.* p. 251. *Spec. Plant.* p. 329. n. 14. *Fl. Suec.* 2. 309. *Fl. Carniol.* p. 225. n. 7.

Iuncus planifolius; spicis petiolatis, nutantibus; petalis aristatis. HALL. *Hist.* n. 1330.

Iuncoides villosi. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 310. l. 2.

DIAGN. *Culmus terminatus spicis usque senis, inaequaliter pedunculatis, ovatis, gerentibus flores non ultra duodecim.*

Martio M. floret in collibus herbidis *Carnioliae* totius. Spica terminalis brevis pedicellata. Squamulae sub calyce apices ciliatos gerunt. Capsula trigona; angulis obtusis.

435. *IUNCUS pilosus*.

Iuncus foliis planis pilosis, corymbo ramoso. LINN. *Syst. Nat.* p. 251. *Spec. Plant.* p. 329. n. 13. *Fl. Suec.* 2. 308. *Fl. Carniol.* p. 226. n. 8.

Iuncus foliis planis hirsutis; floribus umbellatis, solitariis, petiolatis, aristatis. HALL. *Hist.* n. 1328.

Iuncoides hirsuti, latifolii. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 315-317.

DAIGN. *Pedunculi florales unico flore terminati prodeunt ex axi media paniculae.*

Habitat in sylvis.

Folia in culmo quatuor. Corymbus floralis subiecto folio longior. Pedunculi suffulti bractea aut vagina truncata. Capsula supra medium trigona; basi trilocularis. Semina ovata, et foliacea ligula terminata; quae ligulæ conniventes occupant apicem capsulae unilocularem.

436. IUNCUS mucosus.

Iuncus foliis planis; corymbis folio brevioribus; floribus fasciculatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 251. B.

Iuncus planifolius; paniculis umbellatis; petalis interioribus duplo longioribus. HALL. *Hist.* n. 1328.

Iuncoides montanum, nemorosum; flore niveo. SCHEUCHZ. *Gram.* p. 320. n. 8. Tab. 8. fig. 7.

Iuncoidum Ord. II. MICHEL. *Gen. Plant.*

Gramen Lazulae &c. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 492.

DIAGN. *Corymbus floralis*, subiecto folio brevior.

Flores albidi, duo et tres in apice singuli pedunculi.

Habitat in herbidis, umbrosisque.

Culmus hexaphyllus, teres, bipedalis. Ad basin singuli pedunculi bractea acuminata. Stigmata stylo duplo breviore et alba. Capsula obtusa, acumine terminata, trilocularis. Semina ovata, basi rotundata, nigra, tenuiter striata, apice albida, tenui villo adpersa. An forte melius squamulae sub calyce IUNCORUM pro calyce, et calyx pro corolla habendus?

155. BERBERIS.

BRUNFELS. TOURN. *I. R. H.* p. 614. *Tab. 385.*

Calycina folia et petala (6). Nectaria bina adnata basi petali singuli. Bacca cylindracea continens facculum, cuius imo loco brevissimis filis adligata sunt semina bina.

437. BERBERIS vulgaris.

Berberis pedunculis racemosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 252.

Berberis dumetorum. ARDUIN. *Memor.* I. p. 71.

Tab. 12. DUHAMEL. *Arbor.* I. p. 97.

Berberis racemifera; foliis ciliatis. HALL. *Hist.* n. 828.

DIAGN. *Flores flavi, racemosi. Baccae rubrae.*

Habitat passim in *Dumetis*.

Lignum flavum. Folia oblonga, acute dentata. Baccae acido succo plenae. Pedunculi basi articulati. Frutex spinosus, notissimus.

In his floribus in primis *Apes*, dein et *Scarabaeus nob*, nec non *Conopæs*, ac *Muscae variae*, nectar avide lingunt.

TRIGYNIA.

156. LAPATHUM.

HIPP. THEOPH. ADANS. *Famil. Plant.* p. 277.

Caulis hexaphyllus; foliis tribus reflexis, caeteris erectis, et semen protegentibus. Stigmata aspergilliformia exferenda inter folia erecta et conniventia. Semen unicum, triquetrum, nudum.

(*) *Acetosae.* TOURN.

438. LAPATHUM Acetosa.

Rumex floribus dioicis; foliis oblongis, sagittatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 255. *Spec. Plant.* p. 337. n. 21. *Fl. Suec.* 2. 318. *Fl. Carniol.* p. 418. n. 1.

Lapathum sexubus separatis; foliis sagittatis; hamis acutis, recurvis. HALL. *Hist.* n. 1596.

Oxalis f. *Acetosa*. MATTIOL. *Diosc.* p. 336.

DIAGN. *Flores dioici. Pedunculi ad articuli locum coarctati. Folia sagittata, oblonga; segmentis brevibus et oblique truncatis.*

Habitat in pratis.

Sub

Sub quolibet ramo bractea oblonga et acuminata. *Mas*
antheris semibifidis, calycibus obtusis. *Femina* mai-
or, calycinis foliis reflexis, acuminatis, caeteris ob-
tusis; marginibus undulatis.

439. LAPATHUM *Acetosella*.

Rumex floribus dioicis, foliis lanceolato - hastatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 255. *Spec. Plant.* p. 338.
n. 22. *Fl. Suec.* 2. 319. *Fl. Carniol.* p. 419. n. 2.

Lapathum sexubus distinctis; foliis sagittatis: hamis
retrorsum porrectis. HALL. *Hist.* n. 1597.

DIAGN. *Flores Dioici. Pedunculi absque articulo.*

Habitat in agrorum marginibus circa Idriam auf dem
Rosenberg. Labaci prope montem Arcis.

Folia lanceolata, acuminata, prope basin modice coar-
ctata; segmentis longis et divaricatis. Flores pa-
niculati.

440. LAPATHUM *Alpestre*.

Rumex floribus dioicis; foliis subrotundo - hastatis.

IACQUIN. *Austr.* p. 62.

DIAGN. *Flores Dioici. Pedunculi ad articuli lo-
cum crassiores. Folia ima cordato - sagittata;
segmentis acuminatis; petiolis duplo longioribus.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

A prioribus omnino diversus est. 1. Foliis spatulae for-
mibus. 2. Pedunculis articulatis. 3. Bracteis ample-
xicaulibus, 2-5-floris. 4. Ruptura facilis pedicello-
rum ad articuli sedem. 5. Foliis maioribus masculi
calycis ovatis et obtusis. 6. Caule femineo subnu-
do terminato florali et biunciali racemo. 7. Valvis
semen foventibus ovatis, obtusis, dentatis, crispis,
basi cordatis. 8. Angulis semenis ferrugineis.

(**) *Lapatha*. TOURN.

441. LAPATHUM *Crispum*.

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis integris,
graniferis; foliis lanceolatis, undulatis, acutis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 254. *Spec. Plant.* p. 335.
n. 9. *Fl. Suec.* 2. 314.

Lapathum foliis crispis, imis ovatis, supremis lanceolatis, calycibus verrucosis. HALL. *Hist.*
n. 1589.

DIAGN. *Flores hermaphroditi. Pedunculi ad articuli locum aequales. Folia lanceolata, undata.*

Habitat hinc inde etiam in cultis.

Valvae graniferae. Racemi subnudi.

442. LAPATHUM *Hydrolapathum.*

Lapathum foliis acutis, verticillatum. HALL. *Goetting.* p. 17.

Hydrolapathum minus. LOBEL. *Icon.* p. 286.

DIAGN. *Flores hermaphroditi; unica et exteriore valvula granifera. Folia planiuscula. Racemi foliosi.*

Habitat in udis.

Tardius floret, et tota facie a priore diversus est.

443. LAPATHUM *acutum.*

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis dentatis, graniferis; foliis cordato-oblongis, acuminatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 254. *Spec. Plant.* p. 335.
n. 10. *Fl. Suec.* 2. 316.

Lapathum petiolo latescente; foliis longe lanceolatis; calyce ferrato. HALL. *Hist.* n. 1591.

DIAGN. *Valvulae dentatae, graniferae. Folia cordato-oblonga.*

Habitat ad sepes, et in pingui solo.

Vidi in eadem planta flores hermaphroditos et feminos. Illos calyce viridi; foliolis internis ellipticis, planis; stylis albis; antheris rubellis. Hos vero foliolis praedictis oblongis et rubellis; stylis rubris.

Pedunculi in hac specie prope basin articulati.

444. LAPATHUM *aquaticum*.

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis integerimis, nudis; foliis cordatis, glabris, acutis. LINN.
Syst. Nat. p. 255. *Spec. Plant.* p. 336. n. 14. *Fl. Suec.* 2. 315.

Lapathum foliis longe lanceolatis; paniculis densissimis. HALL. *Hist.* n. 1588.

DIAGN. *Folia magna, cordata*.

Habitat in sylvis, ad rivos et fontes.

Folia superiora longiora, et in margine undata. Racemi longi floribus verticillatis. Valvae cordatae et integrae.

Folia in hoc Genere mire variant, hinc faciles errores in speciebus statuendis.

157. SCHEUCHZERIA.

LINN. *Gen. Plant.* 408.

Corolla hexapetala, persistens. Stigmata obtusa, absque stylis. Siliculae tres, polyspermae. Characterem hunc constantissimum video in hac specie, distinguenda ideo ab ANOTHERICO, cui stylus unus, stigma unum, germe unum.

445. SCHEUCHZERIA *Pseudo-Asphodelus*.

Scheuchzeria. *Fl. Carniol.* p. 227. descriptio non
Synon.

Anthericum (*calyculatum*) foliis ensiformibus; perianthiis trilobis; filamentis glabris; floribus trigynis. LINN. *Syst. Nat.* p. 244. *Spec. Plant.* p. 311. n. 9. IACQUIN. *Austr.* p. 59. Obs. 31. qui primus *Pseudo-Asphodeli* nomen imposuit, CLUSIO duce.

Phalangium alpinum, palustre. Iridis folio. TOURNEF. SEGUIER. *Veron.* II. p. 61. Tab. 14.

Anthericum filamentis glabris. HALL. *Hist.* n. 1205. Pseudo-Asphodelus II. CLUS. *Hist.* p. 198.

DIAGN. *Folia ensiformia. Racemus terminalis; pedunculis simplicibus: floriferis patentibus, fructiferis erectis. Capsulae polyspermae, non inflatae.*

Habitat in herbidis, udisque locis.

Pedunculus terminatur dentibus. (2—3) calycom referentibus, et corollae adpressis. Petala canaliculata, ubique aequa lata, angusta, colore staminum; apicibus inflexis et virescentibus. Filamenta attenuata, receptaculo imposita. Antherae erectae, ovales, acutae, flavae. Germina tria distincta, oblonga, acuminata, truncata. Adulti germinis apex nigrescit, et tunc petala connivent; persistentibus filamentis. In hac aetate plantae flos erigitur et scapo parallelus evadit. Siliculae tres. Semina oblonga, fulva, pentagona, angulis obtusis, (15—20).

Planta a reliquis *Anthericis* Ill. LINNAEI distinctissima, ipsa nunc etiam annuente Céleber. de HALLER. Corolla, staminum, stigmatum et capsularum numero SCHEUCHZERIAE. Cl. ADANSONIUS in Epist. negat ecquidem plantam hanc gerere ovaria tria, qualia tamen vidit etiam Ill. HALLERUS, dum ait — *Siliquae tres per aetatem distinctae.* Errorem, quem mihi obiecit Cl. IACQUINIUS adgnosco in synonymis, non in descriptione; sed cur idem Vir Doctiss. ponit in definitione huius plantae racemos oblongos, cum unicum perpetuo gerat? quomodo dubitare potuit esse *Anthericum calycatum* LINN. cum figura SEGUIERII id adeo clare demonstret.

158. TRIGLOCHIN.

C. BAUH. LINN. Gen. Plant. 409.

Germina terminata plumosis stigmatibus, coronam efformantibus. Capsula basi dehiscens. LINN hinc planta media inter IUNCUM et SCHEUCHZERIAM.

446. TRIGLOCHIN *palustre*.

Triglochin capsulis trilocularibus, sublinearibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 256. *Spec. Plant.* p. 338.

n. 1. *Fl. Suec.* 2. 321. HALL. *Hist.* 1308.

Triglochin fructu tenui. LINN. ROYEN. HALL.

Hist. p. 255. n. 1.

Gramen Triglochin. J. BAUHIN. *Hist.* II. p. 508.

DIAGN. *Capsulae, vel locula tria.*

Habitat in pratis uidis.

Spica fructifera fere semipedalis. Capsulae tenues, sca-
po adpressae, pedunculo proprio nihilo longiores.

447. TRIGLOCHIN *maritimum*.

Triglochin capsulis sexlocularibus, ovatis. LINN.

Syst. Nat. p. 256. *Spec. Plant.* p. 339. *Fl. Suec.*
2. 322.

Iuncoid. MICHEL. *Ord. II. Gen. Plant.*

DIAGN. *Capsulae vel locula quinque.*

Habitat *Tergesti alle Saline*, in pratis.

Spica brevior. Capsulae pedunculo proprio breviores
magis exstantes.

Habitus inflorescentia, staminum numerus et insertio,
styli defectus, structura fructus, adsociant *Scheuch-*
zeriae in *Ord. Naturali*.

159. COLCHICUM.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 348. Tab. 181. 182.

Corolla sexfida. A. Stamina alterna bre-
viora. Capsulae tres tumidae, pedunculatae,
cohaerentes, polyspermae. LINN. Capsula
trilocularis TOURN. E. ADANS. ut in
CROCO HALL. Semina rotunda. TOURN. F.

448. COLCHICUM *autumnale*.

Colchicum foliis planis, lanceolatis, erectis. LINN.

Syst. Nat. p. 256. *Spec. Plant.* p. 341.

n. 1. *Fl. Carniol.* p. 229. STOERCK. libell. de
Colch. cum iconē.

Colchicum flore folium longe praecedente, petalis
ovatis. HALL. *Hist.* n. 1255.

DIAGN. *Poſt caniculam flos nascitur CROCI* fati-
vi facie, *alio anno folia et fructus exēunt.*

Habitat ubique in pratis.

Bulbus solidus, subcordatus, cuticula lutea tectus, ca-
nalem habent insculptum, qui tubum floris excipit.
Flores saepe bini ex una basi, seu rudimento radici-
cis illius, quae alio anno folia productura est. Cor-
rollae tubus semiteres fistulosus, vaginatus. Macu-
la crocea prope basin singuli filamenti. Semina in
una capsula aut loculo (45).

Expellit aquas Hydropicorum, per vias urinae; si vi-
scera non laesa fuerint. OXYMELLITE *Colchico* fa-
navi Vetulam hydropicam Ao. 65; sed in duobus
aliis hydropicis nihil profuit.

POLYGYNIA.

160. ALISMA.

DIOSC. LINN. *Gen. Plant.* 418.

Calycina folia et petala tria. Siliculi plu-
res quam quinque.

449. ALISMA *Plantago*.

Alisma foliis ovatis acutis; fructibus obtuse trigo-
nis. LINN. *Syst. Nat.* p. 257. *Spec. Plant.*
p. 342. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 323. *Fl. Carniol.* p. 560.

Damasonium foliis ellipticis, lanceolatis; capitulo
rotunde triquetro. HALL. *Hist.* n. 1184.

Plantago aquatica. MATTHIOL. *Diosc.* p. 351.
I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 787.

DIAGN. *Panicula magna, laxa; racemis verticillatis. Folia ovata, acuminata.*


Habitat in stagnis.

Folia magna Plantaginea. Petala alba. Stamina non ex thalamo sed e quolibet ungue petali singuli bina. Siliculae duodecim, monospermae.

Varietatem foliis iunceis longis Lipsia misit Cl. SCHREBERUS, lectam Stettini in aqua profunda, fluente.

ALISMAE cum SAGITTATRIA adsinitas indubia est, sed utraque Gens monocotyledon a *Multifiliquis* removenda in Ordine Naturali. At ubinam collaudanda? BUTOMUM video cognatum ALISMAE, VERRATRUM SAGITTARIAE, et cum BUTOMUS SCHEUCHZERIAE proxime accedat, ita quatuor haec Genera coniungent *Iuncos* cum *Liliaceis*.





CLASSIS VII.
HEPTANDRIA.
MONOGYNIA.

161. AESCULUS.

LINN. *Gen. Plant.* 420.

450. **A**ESCULUM *Hippocastanum*. Ex fructibus Austriacis, hisce annis, Carnioliae hospis factum, sed nondum cives, Primus in *Austriam* introduxit egre-
gius CLUSIUS.

Arboris huius culturam in primis commendabo. Di-
citur Castanea Equina, cum Equos purget, et
fanet. Fructus exorticatus et pulverisatus in
aqua frigida spumescit et eam aptam reddit pur-
gandis linteis omnis generis, loco saponis. Fo-
lia inserviunt pro pabulo pecorum cornutorum.
Cortice coria praeparari possunt eadem facilitate,
ut cum *Quercu*, *Betula*, *Alno*, etc. Infusum
huius fructus adhiberi potest utiliter pro macera-
tione *Cannabis*. Hoc ipso forte melius lavari
potest sericum crudum, cum vulgaris sapo im-
pediat ne sericum sat vivide coloretur. Ex cine-
re huius plantae extrahitur Sal pro depurando se-
rico valde proficuum. Praeterea ex fructu para-
tur Amylum. Pulvis ab extractione Saponaceae
substantiae residuus, ablatus, et cum fursure
triticeo mixtus nutrit Gallinas.

CLAS-

CLASSIS VIII.

O C T A N D R I A.
MONOGYNIA.

162. ONAGRA.

DIOSC. TOURN. I. R. H. p. 302. Tab. 156.

Germen longum sustinet calycem tubulosum et quadrifidum, petala quatuor. Stylus ad basin anulo flavo cinctus, finditur in partes quatuor. Fructus quadrivalvis, continens semina nuda et cuneiformia.

451. ONAGRA Biennis.

Oenothera foliis ovato-lanceolatis, planis; caule muricato, villoso. LINN. Syst. Nat. p. 263. Spec. Plant. p. 346. n. 1. GRONOV. Virgin. p. 58. HALL. Hist. n. 994.

DIAGN. Radix biennis. Folia lanceolata, plana.
Stigmata longitudine antherarum.

Habitat circa Goriziam.

Tubercula quatuor, oblonga, flava, adnata basi calycis. Corolla calyce brevior; petalis flavis, subrotundis, obtusis. Filamenta stylo breviora. Stigma unum caeteris longius. Germen quadrifidum. Capsula sessilis asperiuscula, longitudine petalorum. Semina fusca, in uno loculo (ad 50).

Nostrates comedunt radices in acetariis.

163. CHAMAENERION.

GESN. TOURN. I. R. H. p. 302. Tab. 157.

Differit ab ONAGRA, calyce tetraphyllo, defectu anuli nectariferi, capsula petalis multoties

toties longiore, feminibus papposis, latere adfixis thalamo linearis, pappo vero adhaerente valvis, unde fit, ut separatis valvis semina a thalamo secedant pappis suis tenuissimis valvis adhuc adpensa.

452. CHAMAENERION Hirsutum.

Epilobium foliis oppositis, lanceolatis, ferratis, decurrenti amplexicaulibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 263. *Spec. Plant.* p. 347. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 328. *Fl. Carniol.* p. 257. n. 1.

Epilobium foliis amplexicaulibus, lanceolatis, hirsutis. HALL. *Hist.* n. 995.

Chamaenerion floribus ex alis sessilibus; foliis lanceolatis, dentatis, villosis. BOEHM. *Lips.* 298.

DIAGN. *Totum villosum. Folia lanceolata, dentata. Petala emarginata.*

Habitat circa fossas et sepes.

Planta humanae staturalae. Folia omnia semperque lanceolata. Corolla magna, kermesina; petalis cordatis. Stylus clavatus, declinatus. Filamentorum apices mucronem deflexum gerunt.

453. CHAMAENERION Montanum.

Epilobium foliis oppositis, ovatis, dentatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 263. *Spec. Plant.* p. 348. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 329. *Fl. Carniol.* p. 257. n. 2.

Epilobium foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis. HALL. *Hist.* n. 996.

Chamaenerion floribus ex alis sessilibus; foliis ovatis, ferratis, hirsutis. BOEHM. *Lips.* 299.

DIAGN. *Calyx corolla paulo minor. Foliorum orae argute denticulatae. Hirsuties modica.*

Habitat in udis, in hortis, imo et in Alpibus.

In Alpibus vidi folia elliptica, subsessilia; in hortis longius petiolata, angustiora et villosiora; in sylvis ovato-lanceolata, glabra. In omnibus varietatibus petala sunt bisida, non magna.

454. CHAMAENERION *Tetragonum*.

Epilobium foliis lanceolatis, denticulatis; imis oppositis; caule tetragono. LINN. *Syst. Nat.* p. 263. *Spec. Plant.* p. 348. n. 5.

Epilobium foliis lanceolatis, glabris, dentatis. HALL. *Hist.* n. 997.

Lysimachia III. TABERNAEM. p. 1237.

DIAGN. *E quolibet folio sessili et denticulato decurrent per caulem duae lineae eminentes.*

Habitat in Carniola calidore.

Diversum a priore mihi sane videtur.

455. CHAMAENERION *Angustifolium*.

Epilobium foliis sparsis, lineari lanceolatis; floribus inaequalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 263. *Spec. Plant.* p. 347. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 327.

Epilobium flore difformi; foliis lanceolatis, transversim rugosis. HALL. *Hist.* n. 1000.

Chamaenerion spicatum, foliis lanceolatis, vix dentatis. BOEHM. *Lipf.* 297.

Lysimachia speciosa, etc. I. BAUH. *Hist.* II. p. 906.

DIAGN. *Folia alterna, lanceolata, glabra. Petala elliptica, integerrima.*

Habitat in pratis montanis, ad acervos lapidum, et rupes.

Aliam principem differentiam constituunt nervuli fere horizontales, in averso pagina folii. Ego in oris foliorum ferras non invenio, sed parva tubercula iisdem insidentia.

456. CHAMAENERION *Palustre*.

Epilobium foliis alternis, linearibus; stylo declinato. *Fl. Carniol.* p. 258. n. 3. e quo loco delendum est, *Synon. Linnaeanum*.

Epilobium foliis oppositis, lanceolatis, integerrimis; petalis emarginatis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 264.

Epilobium spicatum; foliis integerrimis. linearibus, fasciculatis. HALL. *Enum.* p. 403. n. 2.

DIAGN.

DIAGN. *Folia alterna, linearia, villosula, obiter dentata: subtus sulco, nervi loco, exarata.*

Habitat circa rivos.

Caulis teres, rigidus, subruber. Calyx rubro-ferrugineus, ad basin albo densoque villo pubescens. Petala elliptica, integerrima, obtusiuscula. Germen villosulum. Stylus deflexus. Confundi non debet cum *EPIL. Angustifolio*, ob pistillum huic etiam declinatum, et petala pariter integra; tota enim strutura et diversa ac constantissima facie, omnino differt, ut bene monet *III. HALLERUS*. Folia tamen fasciculata non sunt, sed ramuli breves et foliosi, fasciculos mentiuntur.

Chamaenerii nomen aequo antiquum, et huic Generi convenientius, ac *Epilobium*.

164. VACCINIUM.

G A L E N. L I N N. *Gen. Plant.* 434.

Corolla quadrifida et quinquedentata. Filamenta e receptaculo, non vero e fundo corollae. Antherae bifidae apice dehiscentes. Bacteria quadrilocularis, globosa, umbilicata, polysperma.

457. VACCINIUM *Oxycoccus*.

Vaccinium foliis integerrimis, revolutis, ovatis; caulibus repentibus, filiformibus, nudis. L I N N.
Syst. Nat. p. 268. *Spec. Plant.* p. 351. n. II. *Fl. Suec.* 2. 335.

Vaccinium caule prostrato, foliis ovato-lanceolatis, acutis; flore quadripartito. H A L L. *Hist.* n. 1023.

Oxycoccus, H A L L. *Enum.* p. 413.

DIAGN. *Corolla profunde quadrifida, demum reflexa, ut in CYCLAMINE. Pedunculus terminalis, longus, filiformis.*

Habitat in *Paludibus Labacensibus*.

Can-

Caules repentes, ramosi, tenues. Cauliculi floriferi adscendentibus, simplices foliosi. Folia secunda, elliptica, acuminata, subtus albida; marginibus reflexis. Pedunculus plerumque unicus e squamo nido prodiens, ut in ANDROMEDA *Polyfolia*, bracteis binis instructus. Corolla rubella. Stamina porrecta. Filamenta lanuginosa. Antherae ferrugineae, filamento longiores, basi ad lentem villosae. Bacca umbilicata, rubra. Semina in uno loculo (1-2). Antherae in hac specie carent corniculis dorsalibus. TOURNEFORTIUS non bene pinxit tetrapetalam.

458. VACCINIUM *Myrtillus*.

Vaccinium pedunculis unifloris; foliis serratis, ovatis, deciduis; caule angulato. LINN. *Syst. Nat.* p. 267. *Spec. Plant.* p. 349. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 333. *Fl. Carniol.* p. 273. n. 1.

Vaccinium, florum petiolis unifloris, pendulis; foliis serratis. BOEHM. *Lipf.* 68.

Vaccinium foliis rugosis, ovato-lanceolatis, serratis; caule angulofo. HALL. *Hist.* n. 1020.

Myrthillus MATTHIOL. *Diofc.* p. 176.

DIAGN. Caules angulosi. Folia serrulata, decidua. Stigma concavum, margine denticulatum.

Habitat in Sylvis, ubique.

Gemmarum bracteae ovatae, coloratae, deciduae, binae. Flores secundi. Filamenta incurva, quandoque decem inter corollam et receptaculum prodeuntia, quod est cotyla ambitu sinuata. Stylus attenuatus, teres. Bacca nigra, incolis nostris Barau-nitza.

459. VACCINIUM *Vitis Idaea*.

Vaccinium racemis terminalibus, nutantibus; foliis obovatis, integerimis, subtus punctatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 268. *Spec. Plant.* p. 351. n. 10.

Vaccinium florum petiolis racemosis pendulis; foliis integris. BOEHM. *Lipf.* 67.

Scopoli *Flora Carn. T.I.*

S

Vac-

Vaccinium foliis perennibus, ovatis, subtus punctatis; oris contractis. HALL. Hist. n. 1022.

DIAGN. *Racemus nutans, folio oppositus. Folia subtus punctata, integra. Bacca rubra.*

Habitat in sylvis subalpinis.

Caulis teres. Folia ad apicem latiora et obtusiora, quam ad basin. Baccae locula monosperma. Semina rufa, subovata.

165. ERICA.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 602. Tab. 373:

Calyx tetraphyllus. Corolla monopetala, quadrifida. Stamina ex receptaculo genita, contra canonem in floribus monopetalis a PONTEADERA stabilitum. Capsula quadrilocularis, quadrivalvis. TOURN. E. F. polysperma. G.

460. ERICA vulgaris.

Erica antheris bicornibus, inclusis; corollis inaequalibus, campanulatis, mediocribus; foliis oppositis, sagittatis. LINN. Syst. Nat. p. 268. Spec. Plant. p. 352. n. 1. Fl. Suec. 2. 306. Fl. Carniol. p. 276.

Erica foliis imis adpresso, simplicibus; floralibus calcaratis. HALL. Hist. n. 1012.

Erica I. M A T T H. Diosc. p. 126.

DIAGN. *Folia tetragona, pone ligulas binas demittentia, in quatuor series imbricata. Flores aestivi, spicati.*

Habitat in Ericetis et herbidis collibus.

Bracteola sub flore singulo. Calyx peractis nuptiis connivet et capsulum repraesentat. Filamenta alba. Antherae ferrugineae. Germen obtuse octangulare. Stigma quadrifidum.

461. ERICA Carnea.

Erica antheris bicornibus, inclusis; corollis subglobosis, aggregatis, folio longioribus; foliis quaternis ciliatis, patentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 568. *Spec. Plant.* p. 353. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 337. *Fl. Carniol.* p. 276. n. 1.

Erica foliis patentibus, quaternis, acutis, caducis; corollis calyce longioribus; antheris eminentibus. HALL. *Hist.* n. 1013. coniungens cum E. *herbacea*. LINN.

DIAGN. *Folia patula subverticillata, sulco exarata, breviter petiolata: petiolo ad basin tuberoſo.*

Flores hyeme dormiunt clausi et albi, alio anno Martio M. evigilant, rubent.

Habitat in ficcissimis collibus.

Folia in summitatibus ramorum, hyeme strobyli in modum imbricata sunt. Pedunculi bractea tryphilala instructi. Filamenta apice nigricantia, anthers ultra corollam exserunt. Stylus peractis nuptiis, seſe e medio staminum ad latus flectit pudibundus. Antherae ad medium usque dehiscunt. Stigma coronatum pilis ferrugineis.

Flori rubro, bulbilli et pedunculi rubri, antherae fuscae.
— *albo*, bulbilli et pedunculi albi, antherae ferrugineae.

166. THYMELAEA.

MESUE. TOURN. I. R. H. p. 594. Tab. 386.

Calyx nullus, Corolla quadrifida. Stamina alterna inferiora. Stylus nullus. Bacca monosperma.

THYMELAIAE nomen DIOSC. antiquissimum, et praestantius DAPHNE, quae est LAURUS Δάφνη, eiusque baccae, Δάφνιδες DIOSC. Corollam pro calyce habet. Cl. ADANS.

462. THYMELAEA *Mezereum.*

Daphne floribus sessilibus, ternis, caulinis; foliis lanceolatis, deciduis. LINN. *Syst. Nat.* p. 271. *Spec. Plant.* p. 356. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 338. *Fl. Carniol.* p. 278. n. 1.

Thymelaea spica cylindrica, superne foliosa. HALL. *Hist.* n. 1024.

DIAGN. *Flores sessiles, terni, cauli adnati, infra folia mollia et decidua.*

Habitat in sylvis et salicetis; primo vere florens.

Gemmae floriferae enneaphyllae. Corollae segmenta cordata, tubus coloratam epidermidem facile dimitens. Filamenta stigmate breviora. Stigma rotundatum, albidum, apice depresso. Bacca ovata, rubra. Semen ovatum, acumine terminatum.

463. THYMELAEA *Laureola.*

Daphne racemis axillaribus; quinquefloris; foliis lanceolatis, glabris. LINN. *Syst. Nat.* p. 272. *Spec. Plant.* p. 357. n. 5.

Thymelaea foliis ellipticis, perennantibus; floribus ex alis nutantibus. HALL. *Hist.* n. 1025.

DIAGN. *Racemi densi inter folia persistentia, lanceolata, glabra.*

Habitat in elatioribus sylvis.

Tota planta flexilis, supra medium ramosa; ramis apice foliosis. Folia digitum longa, densa, laurinae firmitatis. Corymbi squamosi ex superioribus alis. Flores secundi, virescentes. Antherae flavae. Filamenta alba.

464. THYMELAEA *Cneorum.*

Daphne floribus fasciculatis, terminalibus, sessilibus; foliis lanceolatis, nudis. LINN. *Syst. Nat.* p. 272. *Spec. Plant.* p. 352. n. 8.

Cneorum. DU HAMEL. *Arbor.* II. Tab. 94. MATTH. *Diosc.* p. 571. I. BAUH. I. P. I. p. 520.

Thy-

Thymelaea foliis glabris, linearibus, aristatis; floribus sessilibus, umbellatis. HALL. Hist. n. 1027.

Thymelaeae ad finis. IONSTON. Dendr. L. 5.
Cap. 237. Tab. 70.

DIAGN. *Folia obtusa, glabra, rigidula, subsessilia, floribus rubris non longiora.*

Habitat in M. Istriae, rarer.

Specimina Austriaca, meaque convenienter cum *Cneoro Clusii* et MATTHIOLI.

465. THYMELAEA *Candida.*

Thymelaea alpina, saxatilis; Oleae folio minori, glauco et subhirsuto. MICHEL apud TILL. H. Pij. p. 165.

Cneorum candidum. THEOPHRASTI?

DIAGN. *Folia petiolata, acuminata, mollia, utrinque villosa, floribus longiora.*

Habitat supra Prewald, ad radicem M. Nanas, et circa Goriziam.

Differet a priore 1. cortice foetido. 2. foliis etiam summis flore duplo longioribus. 3. floribus albis. 4. Corollae segmentis ovatis.

DIGYNIA.

167. MOEHRINGIA.

LINN. Gen. Plant. 444. GLEDITSCH. ADANS.

Et haec ingreditur naturale genus *Alfines*, sed calycinorum foliorum, petalorum, valvorumque capsulae unilocularis numero quaternario.

466. MOEHRINGIA *muscosa.*

Alfine floribus octandris. Fl. Carniol. p. 497. n. 3.
Moehringia. LINN. Syst. Nat. p. 275.

S 3

Alfine

Alfine octostemon, foliis connatis, linearibus. HALL.
Hist. n. 860.

DIAGN. *Caules filiformes, debiles. Folia setacea.*

Habitat ad rupes udas frigidasque.

Petala patent. Stigmata connivent. Capsula ovalis, pallide flavescens, continent semina reniformia (8-10), primo alba, dein ferruginea, denique nigra, nitidissima receptaculo acuminato adfixa propriis pedicellis, Valvarum apices incurvi.

TRIGYNIA.

168. POLYGONUM.

LINN. *Gen. Plant.* 445.

Generis naturalis characterem essentiale constituant, calycis colorati, corollam praferentis segmenta non plura quam stamina (5-8). Semen unicum, nudum, trigonum, aut lenticulare.

467. POLYGONUM *Hydropiper.*

Polygonum floribus digynis. hexandris; foliis lanceolatis. *Fl. Carniol.* p. 420. n. 1. Var. (6).

Polygonum floribus hexandris, semidigynis; foliis lanceolatis; stipulis submuticis. LINN. *Syst. Nat.* p. 273. *Spec. Plant.* p. 361. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 343.

Perficularia foliis ovato-lanceolatis; spicis florigeris; vaginis calvis, truncatis. HALL. *Hist.* n. 1554.

Hydropiper MATTHIOL. *Diosc.* p. 404.

DIAGN. *Flores hexandri, semidigyni.*

Habitat in udis, et stagnis.

Acre, immaculatum, strigosum, et adhuc examinandum, an vere differat a sequenti.

468. POLYGONUM *Perficularia*.

Polygoni 1. *Fl. Carniol.* Var. (a).

Polygonum floribus hexandris, digynis; spicis ovatis, oblongis; foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 273. *Spec. Plant.* p. 361.
n. II. *Fl. Suec.* 2. 342.

Perficularia foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, spicis ovatis, vaginis ciliatis. HALL. *Hist.* n. 1557.

DIAGN. *Flores hexandri, digyni.*

Habitat circa hortos, et fossas.

Semen lenticulare, ut in priore.

469. POLYGONUM *Convolvulus*.

Polygonum floribus trigynis, octandris, lateraliibus, planiusculis; caule volubili; semine triquetro. *Fl. Carniol.* p. 423. n. 5.

Polygonum foliis cordatis; caule volubili, angulato; floribus obtusatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 276.
Spec. Plant. p. 364. n. 24. *Fl. Suec.* 2. 344.

Polygonum caule volubili, foliis sagittatis. HALL.
Hist. n. 1561.

DIAGN. *Flores monogyni, octandri. Caulis volubilis. Folia cordata, pone acutiuscula.*

Habitat ad sepes et in hortis.

Stylum unicum video, trilobo stigmate capitatum. Antherae rubrae. Germen breviter pedicellatum. Stipulae breves. Semen trigonum, nigrum, intra calycom, cuius segmenta margine rubella sunt.

Ergo planta haec a PERSICARIA magis differt, quam CUCUBALUS a SAPONARIA.

470. POLYGONUM *viviparum*.

Polygonum floribus trigynis, octandris, spicatis; foliis caulinis lanceolatis; semine subrotundo. *Fl. Carniol.* p. 422. n. 3.

Polygonum caule simplicissimo, monostachyo; foliis lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 275. *Spec. Plant.* p. 360. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 340.

Polygonum radice lignosa, contorta, foliis nervosis; radicalibus ovato-lanceolatis; caulinis linearibus. HALL. *Hist.* n. 1558.

DIAGN. *Flores digyni, octandri, albi, spicati; spicae axi trigona. Folia lanceolata.*

Habitat in Alpibus nostris.

Spica tenuis, biuncialis. Pedunculi solitarii, calyce breviores. Bractea ovata, acuminata persistens. Calyces albi. Filamenta alterna longiora. Antherae bicornes, fusco-rufae. Styli pellucido et ferrugineo globulo terminati.

471. POLYGONUM aviculare.

Polygonum floribus trigynis, octandris, lateralibus; foliis lanceolatis; caule procumbente, herbaceo.

LINN. *Syst. Nat.* p. 276. *Spec. Plant.* p. 362. n. 15. *Fl. Suec.* 2. 339. *Fl. Carniol.* p. 422. n. 4.

Polygonum procumbens, foliis linearibus, acutis, floribus solitariis. HALL. *Hist.* n. 1560.

Polygonum caule herbaceo, annuo. BOEHM. *Lipf.* 589.

DIAGN. *Flores trigyni, octandri, laterales. Caulis procumbens. Vaginae coloratae sub foliis lanceolatis.*

Habitat passim secus vias et hortos.

Styli tres. Stigmata tria subrotunda. Semen trigonum, nigrum, infundo calycis quinquefidi; segmentis albo-rubellis.

Genus hoc, non constituant vires, non partium numerus, non modus florendi, sed proportio numerica et harmonica partium floris et fructus.

TETRAGYNIA.

169. PARIS.

LONICER. TOURN. ADANS. *Famil. Pl.* p. 446.

Numerus in hac specie quaternarius omnium partium floris et fructus succulenti. Antherae

therae lateribus filamentorum, infra medium, adnatae.

472. PARIS quadrifolia.

Paris. MATTH. LINN. HALLER. Fl. Carniol., aliorumque.

DIAGN. *Folia sessilia, elliptica, verticillata, (4-5). Longitudo partium floris, a calyce ad ger- men decrescens.*

Habitat in sylvis.

Antherae stylis longiores. Styli et germen fusco-vio- laceo colore tincti. Bacca nigra, magna, poly- sperma.

170. MOSCHATELLA.

CORDI. ADANS. Famil. Plant. p. 243.

Calyx trifolius. HALL. bifidus. LINN. Corolla rotata 4-5-fida: Styli totidem. Baccae locula et semina tot, quot styli.

In hac specie flores non raro occurunt de- candri et pentagyni.


473. MOSCHATELLA Adoxa.

Adoxa. LINN. Syst. Nat. p. 278.

Moschatellina. RUPP. TOURNEF. HALL. LUDWIG.

DIAGN. *Pedunculus terminalis sustinet flores qui- nos in capitulum subcubicum congestos, virides, quinquefidos: terminali quadrifido.*

Habitat circa Tergestum et in Istria.



CLASSIS IX.
E N N E A N D R I A
M O N O G Y N I A .

171. LAURUS.

GALEN. TOURN. I.R.H. p. 597. Tab. 367.

Corpuscula filamentis quibusdam adnexa-
essentiale praebeant characterem. LINN.
His adde Drappam monospermam, indolem
arboream, vim aromaticam. Staminum nu-
merus in hoc Genere inconstans. (6-9).

474. *LAURUS nobilis.*

Laurus foliis lanceolatis venosis, perennantibus;
floribus quadrididis. LINN. *Syst. Nat.* p. 280.
Spec. Plant. p. 369. n. 4.

DIAGN. *Europaea, sempervirens, Daphne Po-
tica.*

Habitat in sylvis *Istriae*, et circa *Goriziam* in hortis.
Folia, baccae, et oleum Laurinum valde amant no-
strates.

HEXAGYNIA.

172. BUTOMUS.

LINN. *Gen. Plant.* 455.

Involucrum subumbella, loco calycis. Pe-
tala sex; alternis maioribus. Siliculae sex,
polyspermae, non vero capsula multilocu-
laris.

475. BU-

475. BUTOMUS *umbellatus*.

Butomus. LINN. ROYEN. HALL. BOEHM.
Fl. Carniol.

Iuncus floridus. MATTHIOL. *Dioſc.* p. 639. I.
 BAUH. *Hift.* II. p. 524.


DIAGN. *Pedunculi (ad 20) ex summo culmo umbellati; involucro monophyllo.*

Habitat circa Lacum Zirchnicensem.

Culmus nudus, teres. Folia ut in plantis *Calamariis*, triquetra, spongiosa. Pedunculi digitum longi. Petala ovata, albo-rubroque varia. Stamina petalis breviora, Stigmata bifida.

BUTOMUS a Cl. ADANSONIO refertur ad ARISTOLOCHIAM, Staminibus stylo separatis; cum vero character essentialis huius Familiae consistat in stylo, aut germine antherifero, haec vero planta ex receptaculo, stamina proferat, et unica cotyledone, petalis senis, foliis gramineis, et fructu ex pluribus siliculis facto, SCHEUCHZERIAE longe magis quam NYMPHEAE, TAMO, ac similibus adfinis sit, ad Familiam LILIACEARUM potius, aut illam, quae SAGITTARIAM, DAMASONIUM VERTICRUM, comprehendit, referenda videtur.





C L A S S I S X.
D E C A N D R I A
MONOGYNTIA.

173. **DICTAMNUS.**

BRUNFELS. TRAG. GESN. LINN.
Gen. Plant. 468.

Dalyx pentaphyllus, persistens. Petala totidem unguiculata. Germen pentagonum dividitur in Siliculas cartilagineas, quinas, fovenates semina (2—3), pyriformia TOURN. I.R. H. in charactere FRAXINELLAE. Tab. 243. Hic NATRIX PLINII, diversa a DICTAMNO. DIOSC.

476. **DICTAMNUS albus.**

Dictamnus. LINN. ROYEN. *Fl. Carniol.*
 Fraxinella TOURNEFORT. RIVIN. HALL.
 Dictamnum album. MÁTTH. *Diosc.* p. 476.

DIAGN. *Folium Fraxini. Flores racemosi; pedunculis viscidis, et rubiginosis.*

Habitat circa Vipaccum, Goriziam, Tergestum.

Fructus matus constat loculis quinis, stellae ad instar expansis, asperis, acumine terminatis, superne dehiscentibus, et ibidem in medio bidentatis. In loculo quolibet est capsula coriacea, in duo crura divaricata profunde divisa, e cuius fundo superne nascitur lamina bifida, carinata, protegens, semen unum nigrum, splendens, pyriforme. Quam singularis struetura fructus!

174. RUTA.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 257. Tab. 133.

Partium floris et fructus quaternarius, et quinarius. Stamina duplo plura. Semina angulosa.

477. RUTA graveolens.

Ruta foliis decompositis; floribus lateralibus, quadrifidis; LINN. Syst. Nat. p. 293. Spec. Plant. p. 383. n. 1. Fl. Carniol. p. 318.

Ruta foliis duplicato-pinnatis, lobulis ovatis. HALL. Hist. n. 1003.

Ruta sylvestris. MATTTHIOL. Diosc. p. 494.

DIAGN. Foliola lanceolata, sessilia: terminalibus plerumque trifidis.

Habitat in M. Nanas, circa Tergestum. In Agro Gorizieni copiosissima, adeo, ut Mons Salvatinus ea fere vestiatur. MATTTHIOL.

Frutescens; foliis pinnatis: pinnis laxe pinnatifidis. Calyx parvus, quadridentatus. Stamina (8): alternis longioribus. Germen quadrilobum, foveolis crebris scrobiculatum. Capsulae locula bivalvia.

175. HYPOPITHYS.

C. BAUH. Prodr. p. 31. n. 3. ADANS. Famil. Plant. p. 443.

Calycina folia et stamina (6-10), haec in flore terminali alterne minora. Stigma pedicellatum quinquelobum, concavum. Germen ovale. Semina plurima, Orchidea, Habitus Orobanchoides.

178. HYPOPITHYS Multiflora.

Monotropa floribus lateralibus, octandris: terminali decandro. LINN. Syst. Nat. p. 296. Spec. Plant. p. 387. n. 1. Fl. Suec. 2. 351. Fl. Carniol. p. 320.

Hypopithys spica florida, nutante. HALL. Hist.
n. 1002.

DIAGN. *Scapus squamosus, terminatus spica con-*
colore; flore summo decandro.

Habitat in sylvis frigidioribus.

Petala oblonga, et erecta. Stamina villosa. Capsula
adfinitatem cum PYROLA demonstrat.

176. RHODODENDRON.

CHAMAERHODODENDROS. TOURN. ANDROMEDA.
LINN. DULIA. ADANS.

Calyx quinquesfidus, persistens. Corolla
monopetala, quinquepartita. Capsula obtuse
pentagona, quinquelocularis. Polyferma.
Semina minuta.

479. RHODODENDRON ferrugineum.

Rhododendron foliis glabris, subtus leprosis; corollis
infundibuliformibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 299.
Spec. Plant. p. 392. n. 1. IACQUIN. *Obs. Bot.*
I. p. 26. Tab. 16. optime.

Rhododendron foliis ellipticis, glabris, subtus rubi-
ginosis. HALL. *Hist.* n. 1015.

DIAGN. *Folia subtus ferrugineo polline obducta,*
caeterum flavicantia, si haec rubigo abrasa fuerit.
Margo praeterea horum foliorum reflexus puncta-
tus, et minime ciliatus est.

Habitat in Alpibus Vochinenibus.

Flos calyce destitutus est. P. BIWALD.

480 RHODODENDRON hirsutum.

Rhododendron foliis ciliatis, nudis; corollis infundi-
buliformibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 299. *Spec.*
Plant. p. 392. n. 3.

Rhododendron foliis ovatis, ciliatis, subtus punctatis.
HALL. *Hist.* n. 1016.

DIAGN.

DIAGN. *Folia subtus punctis albis notata; marginibus modice reflexis, ciliatis, et crenulatis.*

Habitat ad radices Montium, et in subalpinis.

Foliorum figura et firmitas eadem, quae in priore; Corollae etiam uniformes; sed folia evidentius petiolata, et nulla rubigine subtus adspersa. Puncta foliorum recentium rotundae sunt lamellae, lucidiores margine praeditae. Calyx, Corolla, germen, similibus punctis, flavis, glandulosis adspersa sunt.

481 RHODODENDRON *Chamaecistus.*

Rhododendron foliis ciliatis; corollis rotatis. LINN.

Syst. Nat. p. 299. *Spec. Plant.* p. 392. n. 4.

Ledum, foliis Serpilli, ad margines cilii instar pilosiss; flore purpureo. MICHEL. *Gen. Plant.* p. 225.
Tab. 106.

Cistus M. Baldi. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 19.

DIAGN. *Folia ciliata. Corollae rotatae; segmentis ovatis.*

Habitat in summis iugis *Alpium Vochinenium.*

Frutex parvus, ramosissimus; extremis ramis foliosiss. Folia oblonga, dura; petiolo brevi, rubello. Pedunculus unus, aut plures, unciales, villosi, fusco-rubri, terminales. Calyx profunde quinquefidus, pedunculo concolor; segmentis acutis. Corolla purpurea. Stamina segmentis corollae longiora. Stylus staminibus longior.

482. RHODODENDRON *Polifolium.*

Andromeda pedunculis aggregatis; corollis ovatis; foliis alternis, lanceolatis revolutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 300. *Spec. Plant.* p. 393. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 353. HALL. *Hist.* n. 1017.

DIAGN. *Folia angusta, rigida. Pedunculi terminales, ex squamo nido prodeentes. Corollae subglobosae.*

Habitat in paludibus *Labacensibus.*

Indoles fruticosa, durities foliorum, florendi modus, fructus et alia, non concedunt, ut a Fratribus divellatur. Huic praeterea pedunculi angulati, dilatati. Semina compressa, subovata.

177. ARBUTUS.

LINN. *Gen. Plant.* 488.

Situs receptaculi, staminum numerus, bacca pentasperma, distinguunt a VACCINIO. MISLEY apud III. de HAEN. *Rat. Med.* II. p. 194. 195. Numerus seminum genera non constituit naturalia, hinc ARBUTUS et UVA URSI TOURN. in unum consluent.

483. ARBUTUS *Uva Ursi.*

Arbutus caulis procumbentibus; foliis integerimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 301. *Spec. Plant.* p. 395. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 358. *Fl. Carniol.* p. 275. HALL. *Hist.* n. 1018.

DIAGN. *Fruticulus procumbens; foliis VACCINII integris, nec subtus punctatis.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus.*

Quae ad calculos renum et vesicae, pridem ad sydera usque extollebatur, nunc obsolevit.

178. PYROLA.

BRUNFELS. C. BAUH. TOURN. I. R. H.
p. 256. *Tab. 132.*

Calyx quinquefidus, persistens. Petala quinque. Capsula quinquelocularis, angulis dehiscens. Semina multa, minutissima TOURN. l. c.

484. PYROLA *minor.*

Pyrola floribus racemosis, dispersis, staminibus pistillisque rectis. LINN. *Syst. Nat.* p. 301. *Spec. Plant.*

Plant. p. 396. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 361. *Fl. Carniol.*
p. 319. n. 3.

Pyrola foliis subrotundis, tubis erectis. HALL. *Hist.*
n. 1009.

DIAGN. *Folia subrotunda, obsolete crenulata. Flores racemosi, undique sparsi.*

Habitat in sylvis umbrosis.

Folia ovata, racemo longiora. Calyces subtrigoni; segmentis macula fusca ad apicem notatis. Petala dorso rubicundo. Stigma quadrilobum. Fructus penduli, turcico pileo similes.

485. **PYROLA secunda.**

Pyrola racemo unilaterali. LINN. *Syst. Nat.* p. 301.
Spec. Plant. p. 396. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 362. *Fl. Carniol.* p. 319. n. 2. HALL. *Hist.* n. 1008.

Pyrola ferrato folio. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 536.

DIAGN. *Folia elliptica, acuminata, ferrata. Flores secundi.*

Habitat in sylvis circa Idriam.

Scapus anceps. Folia racemo breviora. Calycini dentes immaculati. Filamenta deflexa. Antherae basi et apice dehiscentes.

486. **PYROLA uniflora.**

Pyrola scapo uniflora. LINN. *Syst. Nat.* p. 301.
Spec. Plant. p. 307. n. 6. *Fl. Suec.* 2. 364. *Flor. Carniol.* p. 318. n. 1. HALL. *Hist.* n. 1011.

DIAGN. *Scapus teres, unico flore terminatus.*

Habitat cum prioribus.

Scapus ad basin squamosus. Folia subrotunda. Calyx albus; segmentis ovatis, patulis. Petalorum margines undulati. Stylus rectus.

DIGYNIA.**179. CHRYSOSPLENIUM.**

TOURN. I. R. H. p. 146. Tab. 60.

Calyx quadrifidus; segmentis rotundatis; alternis maioribus. Corolla nulla. Styli divaricati ex umbilico receptaculi. Semina acuminata, in sinu capsulae unilocularis et bivalvis nidulantia. Tourn. l. c.

487. CHRYSOSPLENIUM alternifolium.

Chrysosplenium foliis alternis. LINN. Syst. Nat. p. 303. Spec. Plant. p. 398. Fl. Suec. 2. 365. Fl. Carniol. p. 494. HALL. Hist. n. 1548.

DIAGN. *Vernum, corymbosum, flavum; petiolis alternis, decurrentibus.*

Habitat in herbidis, et humidioribus locis.

Caulis apice ramosus: ramis bifidis, corymbosif. Stamina, quae segmentis calycinis interiacent, pollinem citius diffundunt. Semina nigra.

Si Calyx quadrifidus, tunc stamina octo sunt, non decem. Eudem numerum ponit HALLERUS.

180. SAXIFRAGA.

BOERH. LINN. Gen. Plant. 494. ADANS. Famil. Pl. p. 243.

Calyx quinquefidus. Petala quinque. Stamina persistentia; alterna longiora. Capsula birostris, bilocularis, polysperma.

(*) *Paniculatae.*

488. SAXIFRAGA rotundifolia.

Saxifraga foliis caulinis reniformibus, dentatis, petiolatis; caule paniculato. LINN. Syst. Nat. p. 304.

Tab. 13.

490. *Saxifraga Cuncifolia*. 492. *Saxifraga Stellaris*.



p. 304. *Spec. Plant.* p. 403. n. 19. *Fl. Carniol.*
p. 492. n. 1.

Saxifraga foliis reniformibus, acute ferratis, hirsutis,
petiolatis; caule ramoso. LINN. HALL. *Hist.*
n. 975.

Sanicula alpina guttula. I. BAUH. *Hist.* III. p. 707.

DIAGN. *Petala punctata*: *punctis superioribus ru-*
bris (ad 10) inferioribus flavis. Semina in uno
loculo (ad 80.) ovata.

Habitat in uidis sylvestribus et subalpinis.

Caulis pedalis, foliosus, villis capitatis pubescens. Pa-
nicula dichotoma, laxa; foliolis binis angustis, sub
qualibet ramificatione. Corolla infera. Petala alba,
lanceolata; unguibus brevibus et truncatis. An-
therae albae.

489. SAXIFRAGA *Cotyledon.*

Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, car-
tilagineo-ferratis; caule paniculato. LINN.
Syst. Nat. p. 303. *Spec. Plant.* p. 398. n. 1. *Fl.*
Suec. 2. 366. *Fl. Carniol.* p. 492. n. 2.

Saxifraga foliorum ora cartilaginea, ferrata; petiolis
paucifloris; petalis punctatis. HALL. *Hist.* n. 978.

DIAGN. *Foliorum marginibus insident scutella alba,*
ceracea, subrotunda, pedicellis brevissimis intra
porulos ibidem occultatis.

Habitat in Saxosis et apricis alpium iugis.

Scutella iuniora in medio foraminulum habent, quorum
unum in singula crena folii sedet. Folia iuniora
ovalia, adulta oblonga et lanceolata; marginibus re-
flexis. Caulis plus minus foliosus et paniculatus.
Petala alba, punctulis rubris multis variegata. Ca-
psula in hac specie omnino bilocularis; loculo quo-
libet receptaculum proprium continente, cui semina
adhaerent ultra (5).

490. SAXIFRAGA *cuneifolia.* Tab. 13.

Saxifraga foliis cuneiformibus, obtusis, repandis;
caule nudo, paniculato. LINN. *Syst. Nat.* p. 304.

Geum foliis petiolatis, obtusis; caule fragili, nudo, ramoso. HALL. Hist. 974.

DIAGN. *Folia rosacee expansa, dura, in petiolum decurrentia, subtus rubella.*

Habitat circa rupes in fylvis submontanis, in M. *Nanas* supra *Sacellum*, sub *Arce Veldensi* in M. *Grindovitz*. Foliis pagina superior, minutissimis et subargenteis squamulis, ad lentem adspersa est; inferior vero portio sensim attenuata convergit in petiolum planum. Petala obtusa maculam flavam in ungue gerunt.

491. SAXIFRAGA *Geum*.

Saxifraga foliis reniformibus, dentatis; caule nudo, paniculato. LINN. Syst. Nat. p. 304. Spec. Plant. p. 401. n. 11. nomen, non vero synon.

DIAGN. *Folia erecta, rosas non constituant, ovata, basi subcordata et aequa lata ac in apice; petiolis villosis.*

Habitat in montibus *Liburnicis*.

A specie priore omnino distinguenda, foliis ovatis nec cuneiformibus, neque adeo crassis, sed per siccitatem in margine corrugatis, subtus non rubris, nec superne squamosis, aut in petiolos decurrentibus. Caulis praeterea fere pedalis. Petala infra medium punctata.

492. SAXIFRAGA *stellaris*. Tab. 13.

Saxifraga foliis serratis; caule nudo, ramoso; petalis acuminatis. LINN. Syst. Nat. p. 303. Spec. Plant. p. 400. n. 8. Fl. Suec. 2. 367.

Saxifraga foliis rhomboideis, acute serratis, caule nudo, ramoso. HALL. Hist. n. 973.

DIAGN. *Folia apice dentata. Scapus nudus, subdichotomus. Petala alba, lanceolata, acuminata, maculis binis croceis ad unguem praedita. Antherarum pollen miniatus.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus* et in M. *Grindovitz*.
VARIET.

Tab. 14.

494. *Saxifraga Cespitosa.*



493. *Saxifraga Autumnalis.*



Rein. S. A. T.

- VARIET. 1. *Foliis ellipticis, superne hirsutis, dentatis: dentibus 3-5. ad apicem.*
Folia sessilia, luteo viridia, in rosam disposita, e cuius centro prodit caulis triuncialis. Ramii 1-2 flori.
- 2. *Foliis lanceolatis, subvillosis, petiolatis.*
Folia uncialia in petiolum decurrentia, paucioribus villis adspersa. Scapi divisi in ramos divaricatos. Petala alterna ad basin dente utrinque notata.
- 3. *Foliis lanceolatis, glabris, apice subdentatis.*

Figurae *Fl. Danicae*, PLUKENETII, MORISONII inter se quidem convenient, sed et docent hanc speciem admodum variare.

(**) *Racemosae.*

493. SAXIFRAGA *autumnalis*. Tab. 14.

Saxifraga foliis caulinis linearibus, alternis, ciliatis: radicalibus aggregatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 304.
Spec. Plant. p. 402. n. 16. *Fl. Carniol.* p. 493.
descriptio. IACQUIN. *Austr. Obs.* 37.

Saxifraga foliis ellipticis, ciliatis; caule simplici; folioso, paucifloro. HALL. *Hist.* n. 971.

DIAGN. *Caules foliosi, subdiffusi. Folia lanceolata, sessilia. Petala flava, ligulata, croceis punctis superne variegata.*

Habitat in Alpibus nostris, non rara.

Caules et pedunculi subvillosi, simplices. Folia in caulis multa, margine modo glabro, modo laxe denticulato. Pedunculi diphylli, simplices, tres lineas longi. Calyx exiguis, et capitatis villis adspersus. semiquinquesfidus. Petala patentia. Semina oblonga, fusco-rufa.

494. SAXIFRAGA *Cespitosa*. Tab. 14.

Saxifraga foliis hirsutis, ellipticis et tridentatis; caule paucifloro. HALL. *Hist.* n. 984.

Saxifraga cespitosa. ANN. II. HIST. NAT. p. 51.

DIAGN. *Vere cespitosa; foliis semitrifidis; lacinis aequalibus, ciliatis, obtusis. Petala flava.*

Habitat inter M. Greben, et Grindovitz, in valle interiecta, supra saxa maiora.

Hanc ipsam vidi in Herbariis Austriacis, sub nomine **CESPITOSAE**, quod retineo, ea conditione, ut non confundatur cum *SAXIFRAGA Pyrenaica* HALLE RI, de qua postea.

Caulis huic brevis, uncialis, aut paulo longior, nonnullis pedunculis unifloris in apice, et folio trifido ad basin primi pedunculi. Calycina segmenta ovalia. Petala lutea, venis tribus lineata, quarum laterales basi et apice unitae ellipticum spatium intercipiunt.

495. SAXIFRAGA Caesia. Tab. 15.

Saxifraga foliis linearibus, perforato-punctatis, aggregatis, recurvatis; caule multifloro. LINN.

Syl. Nat. p. 303. Spec. Plant. p. 399. n. 4

Saxifraga foliis crassis, duris, recurvis, subtus fulcatis, basi ciliatis. HALL. Hist. n. 982.

Sedum minus. IX. CLUS. Hist. L. 4. p. 41.

DIAGN. *Cespitose nascitur. Folia sunt glauca, tenuia, crassa, recurva, superne ad apicem unica foveola, in medio vero duabus, subtus plica crassa, nervi loco, instructa. Caules subnudi.*

Habitat in rupibus altissimis *Alpium Vochinenium*. Summa folia disposita in rosulam Aloiformem, glauco colore tincta, dum caetera fusca sunt et aridis similia. Caulis uncialis 3-4-florus. Petala alba, ovata obtusa, et subemarginata, lineolis tribus subviridibus striata.

Hanc ipsam pingit SEGUIERIUS in *Syn. Plant. Veron.* I. Tab. 9. fig. 2. et vocat *SAXIFRAGAM alpinam, minimam foliis caesiis, deorsum recurvis. Folia subtus punctata LINNAEI*, nondum vidi. Fo- veolae aut poruli foliorum, in adulta planta, saepe repleti sunt polline albo calciformi.

(***) *Patt-*

Tab. 15.

#96. *Saxifraga Trichodes*.



#95. *Saxifraga Cæria*. #97. *Saxifraga Bryoides*.



(***) *Pauciflorae.*

496. SAXIFRAGA *Trichodes*. Tab. 15.

Saxifraga foliis mollibus ellipticis, subhirsutis; caule paucifloro. HALL. Hist. n. 985.

DIAGN. *Caules tenues, prostrati, ramos erigunt.*

Folia lanceolata, villosula. Pedunculi filiformes, foliis longiores, saepius uniflori. Petala luteo-viridia, calycinis dentibus breviora, et angustiora.

Habitat in occidentalibus doris *Alpium Vochinenium*, circa *Iesertzo*.

Laxos cespitosos constituit. Caules prostrati gerunt arida folia et angustiora, rami vero viridia, plana, non crassa, integerrima, acuminata, laxe villosa, lineas (3—4) longa. Ex apicibus ramorum prodeunt pedunculi (1—3), unciales et longiores, villosi 1-2-flori, binis foliolis oppositi instructi. Calyx viridis, basi haemisphaericus, semiquinquesfidus; segmentis acutis, patulis. Petala acuminata. Antherae luteae. Receptaculum denique rubrum.

An *SAXIFRAGA alpina*, *Muscoides*, etc. SEGUIERII Veron. Suppl. p. 203? An *SAXIFRAGA Aizoides* LINNAEI? folia certe admodum similia sunt illis, quae in Iconibus CLUSII, et MORISONII designata sunt.

497. SAXIFRAGA *Bryoides*. Tab. 15.

Saxifraga foliis ciliatis, reflexis, imbricatis; caule nudisculo, unifloro. LINN. Syst. Nat. p. 303. Spec. Plant. p. 400. n. 6.

Saxifraga foliis lanceolatis, ciliatis, compactis; caule unifloro. HALL. Hist. n. 969.

Sedum muscosum. I. BAUHIN. Hist. III. p. 695. SCHEUCHZ. It. Alp. Tom. I. p. 142. Tab. 21. fig. 2.

DIAGN. *Folia lanceolata, rugosa, luteo-viridia, lucida, in margine spinoso - ciliata. Caules foliosi, uniflori.*

Habitat in M. Kerma.

Radix repens profert surculos plures vix semiunciales. Folia erecta, non reflexa; ciliis marginalibus planis, attenuatis, molles spinulas referentibus. Caules fusco-rubri, unciales et paulo longiores, instructi foliis (7—8) pariter ciliatis. Calyx fere ad basin usque quinquefidus, patens. Petala oblonga, acuminate, lineata pallide lutea, calyce fere duplo longiora. Stamina lucida, plana, attenuata flavantia. Capsula fuscescens, calyce duplo longior.

498. SAXIFRAGA Pyrenaica. Tab. 16.

Saxifraga foliis integris et trifidis; caule subnudo, paucifloro. HALL. Hist. n. 988.

Saxifraga alpina, subhirsuta; foliis longis, raro dentatis. HALL. Opusc. Bot. p. 293. Tab. 2. cum optima figura plantae subbiflorae.

Saxifraga foliis partim integris, partim trifidis. SEGUIER. Veron. I. p. 451. Tab. 9. fig. 4.

DIAGN. *Folia oblonga, villosa, integra, et sub apice dentata. Petala alba.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*, hinc inde.

A *Cespitosa* toto caelo diversa est. Radix unicum surculum foliosum educit, raro binos. Folia oblonga aut lanceolata, nunquam trifida aut linearia. Petalorum unguis lineolis subviridibus striati. Caulis semper rigidulus, erectus, foliosus simplex. Calyx magnus, subovatus, dentibus erectis.

VARIET. 1. *caule unifloro, unciali, triphyllum.*

— 2. — — *biunciali, foliis radicalibus plerisque integerrimi.*

— 3. — — *subbifloro, monophyllo, unciali.*

— 4. — — *diphyllum, biunciali.*

— 5. — — *trifloro, biunciali, triphyllum.*

— 6. — — *quadrifloro, triunciali; quam habet PLUKENET. Phyt. Tab. 222. fig. 2.*

499. SAXIFRAGA Hypnoides. Tab. 16.

Saxifraga foliis caulinis linearibus, integris trifidisve; stolonibus procumbentibus, caule erecto, nudiusculo.

Tab. 16.

*99. *Saxifraga Hypnoides*. 498. *Saxifraga Pyrenaica*.



culo. LINN. *Syst. Nat.* p. 305. *Spec. Plant.* p. 405. n. 31. Definitionem istam, quae nostrae plantae minime convenit, nunquam hic citassem, nisi LINNAEUS in *Spec. Plant.* adduxisset HALLERI Synonymum, quod SAXIFRAGAM nostram omnino demonstrat.

Saxifraga foliis petiolatis, trifidis, caule subfolioso, viscido. HALL. *Hist.* n. 989.

DIAGN. *Caules simplices, viscidi. Folia cuneiformia, tridentata. Pedunculi ramosi.*

Habitat in Vochein, in M. Rangor.

Radix multicaulis. Folia ima integra, obtusa, in petiolum brevem decurrentia. Caulis triuncialis, villis glandulosis adspersus, unde gluten exsudat. Folia caulina sessilia, alterna fursum latescentia, apice trifida; segmento medio maiore. Pedunculi e summo caule, viscidi, folioli, 2-3-flori, Calyx villosus; dentibus erectis et obtusis. Petala alba obtusa aut emarginata, suberecta; unguibus flavis. Stamina flava. Receptaculum albidum.

500. SAXIFRAGA tridactylites.

Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus, trifidis, alternis; caule erecto, ramoso. LINN. *Syst. Nat.* p. 305. *Spec. Plant.* p. 404. n. 25. *Fl. Suec.* 2. 375. *Fl. Carniol.* p. 494. n. 4.

Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis; caule erecto, ramoso et folioso. HALL. *Hist.* n. 986.

DIAGN. *Differet a priore pedunculis unifloris, alaris, et foliis ad basin usque laciniatis.*

Habitat ad muros et in Tectis.

Iuniora folia lanceolata. Caulis ramosus. Pedunculi nudi, uniflori.

181. KNAVEL.

RAII. TRAGI DODON. RUPP. ADANS.
Famil. Plant. p. 506.

Calyx quinquefidus. Corolla nulla. Semina bina, calycis imo loco adnata.

501. KNAVEL *Annum.*

Scleranthus calycibus fructus patulis. LINN. Syst. Nat. p. 306. Spec. Plant. p. 406. n. 1.

Scleranthus floribus patulis. HALL. Hist. n. 1551.

DIAGN. Radix annua. Calyces fructiferi patentēs.

Habitat in Arvis.

Adfinitas cum THESIO maior, quam cum ALCHEMILLA, hinc removendus a *Calycifloris*, in ordine naturali.

182. TUNICA.

LONIC. HALL. ADANS. Famil. Plant. p. 252.

Calyx coriaceus, monophyllus, squamis adpressis ad basin vallatus. Petala (5). Capsula coriacea, unilocularis, quadrivalvis, polysperma.

502. TUNICA *barbata.*

Dianthus floribus aggregatis, fasciculatis; squamis calycinis ovato - subulatis, tubum aequantibus; foliis lanceolatis. LINN. Syst. Nat. p. 307. Spec. Plant. p. 409.

Tunica floribus umbellatis, squamis calycinis hirsutis, mucronatis, tubum aequantibus. HALL. Hist. n. 900.

DIAGN. Folia SAPONARIAE officinal. Laminae petalorum longitudine calycis, infra medium punctis albis variegatae.

Habitat circa Pellant, Goriziae, et alibi.

Squa-

Squamae calycinae (ad 6) ex ovata basi eduentes acumen, quo calycis longitudinem fere adaequant.

503. TUNICA prolifera.

Dianthus floribus aggregatis, capitatis; squamis calycinis ovatis, obtusis, muticis, tubum superantibus. LINN: *Syst. Nat.* p. 307. *Spec. Plant.* p. 410. n. 4.

Tunica capitulo compacto, ovali; calyce universali, quadrifolio. HALL. *Hist.* n. 901.

Caryophyllus sylvestris, prolifer. C. BAUH. SEGUIER. *Veron.* I. p. 433. Tab. 7. fig. 1.

DIAGN. *Flos unus vel alter prospicit ultra squamas calycinas, qui arescens retrahitur intra easdem, moxque alius denuo prodit, tanto numero, ut alvus sobolis multitudine rumpatur.* I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 335. Cap. IX. *Scapi tetragoni.*

Habitat inter segetes agri *Gorizienis*, et in colle *Medeensi*. P. WULFEN.

Aridae, apice dentatae, ovatae aut oblongae squamae, perianthium commune faciunt. Calyx aridus, brevissime quinquedentatus, binis squamulis lanceolatis ad basin auctus. Petala parva, rubra; unguibus angustis et albis. Semina rufa, alata.

504. TUNICA carthusianorum.

Dianthus floribus subaggregatis; squamis calycinis ovatis, aristatis, tubum subaequantibus; foliis trinerviis. LINN. *Syst. Nat.* p. 307. *Spec. Plant.* p. 409. n. 2.

Tunica fasciculis trifloris, ramos aequantibus; stipulis aristatis, maximis. HALL. *Hist.* n. 899.

Caryophyllus sylvestris; flore rubro, plurimo diffusso caule prodeunte. PONTED. SEGUIER. *Veron.* I. p. 434. Tab. 7. fig. 2.

DIAGN. *Calyces colorati. Petalorum laminae sature-rubrae, ovatae, quinquedentatae.*

Habitat in *Agro Vipaccensi*, et montanis ibidem.

Squamae calycinae (ad 7), aristatae.

In fertili solo flores in uno caule (ad 15); in sterili vero pauciores, imo et uniflori caules. Ergo planta media inter DIANTHOS aggregatos, et unifloros.

505. TUNICA plumaria.

Dianthus floribus solitariis, corollis lacero-partitis; squamis calycinis ovatis, acutis. LINN. *Fl. Suec.* I. 344. *Fl. Carniol.* p. 506. n. 2.

Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis subovatis, brevissimis; corollis multifidis, fauce pubescentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 308. *Spec. Plant.* p. 411. n. 9.

Tunica petalis minutissime laciniatis. HALL. *Hist.* n. 898. BOEHM. *Lips.* 365.

DIAGN. *Laminae petalorum profunde laciniatae: Calyx in nulla alia specie nostrate adeo longus, et tamen capsula brevior.*

Habitat in rupibus, aridisque sylvarum locis.

Caulis uniflorus, biflorus, raro triflorus. Petala magna.

506. TUNICA saxifraga.

Gypsophylla foliis linearibus; calycibus angulatis; squamis quatuor; corollis emarginatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 306.

Tunica calycibus pelviformibus. HALL. *Hist.* n. 902. eadem cum DIANTHO *saxifrago* LINN. teste CL. WILLICHIO.

DIAGN. *Tenuifolius, ramosissimus; Calycibus pentagonis; Petalis emarginatis, staminibus etiam octo et paucioribus.*

Habitat in muris, passim.

Squamae calycinae ovales, acuminatae, quatuor. Capsula quadrivalvis. Semina compressa, nigra. Ergo

go Character DIANTHI, non GYPSOPHYLLAE. Synonyma huius plantae certa, etiamnum desunt; TUNICAM *minimam* LUGDUN, cum nostra planta non bene coniunxit. I. BAUHINUS. RAYUS non distinguit a SAXIFRAGA veterum, quae SILENES species est. Vitiosa est SEGUIERI synonymia; hisque confusionibus anfam forte dedit I. BAUHINUS, dum TUNICAS *duas murales* adduxit, et ita descripsit, ut statuere non licet, quaenam ex his sit DIANTHUS *saxifragus* LINN. Ita crescent difficultates, quia res naturales, aut non satis examinantur, aut male describuntur.

507. TUNICA *Caryophyllus*.

Dianthus floribus solitariis; squamis calycinis subovatis, brevissimis; corollis crenatis. LINN.
Syst. Nat. p. 307. *Spec. Plant.* p. 410. n. 5.

Tunica ramis unifloris et bifloris; petalis levibus; stipulis calycinis brevissimis. HALL. *Hist.* n. 896. Caryophyllus sylvestris flore rubro inodoro; calyce oblongo cum brevibus unguibus. PONTE D. SEGUIER. *Veron.* I. p. 435. n. 3. Tab. 7. fig. 3. omnino.

DIAGN. *Calycinae squamae ovatae. Petalorum laminae serratae, iisdemque squamis longiores.*

Habitat in aridis locis, Carnioliae calidioris.

Caulis angulatus. Folia linearia; oris obiter, ad lenticem, denticulatis.

508. TUNICA *arenaria*.

Dianthus caulis subunifloris; squamis calycinis ovatis, obtusis; petalis multifidis; foliis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 308. *Spec. Plant.* p. 412. n. 10.

DIAGN. *Folia denticulata. Calycinae squamae lanceolatae, quatuor: duabus lamina petali lacinia-ta longioribus.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Spe-

Specimina quae coram habeo, et omnino convenientia
cum CARYOPHILLO *Sylvestri* I. CLUSII, squa-
mas calycinis ovatas LINN. non habent, sed lan-
ceolatas et petala multifida.

509. TUNICA virginea.

Dianthus caule subunifloro; corollis crenatis; squa-
mas calycinis brevissimis; foliis subulatis. LINN.
Syst. Nat. p. 308. *Spec. Plant.* p. 412. n. 12.

DIAGN. *Squamae calycinæ ovatae. Petala emar-
ginata, crenata.*

Habitat cum priore.

Caules uniflori, folia brevia, angusta, denticulata.

Descriptio LINNAEI bona est, sed figura DILLE-
NII ab eo citata, folia iusto latiora gerit.

183. LYCHNIS.

HALLER. *Enum.* p. 373.

Calyx monophyllus, quinquedentatus. Peta-
la quinque; unguibus longis gracilibus, sae-
pius staminiferis. Stamina alterna longiora.
Capsula, apice, dehiscens, in medio
crassior.

Calyx basi rotundatus, in CUCUBALO *Acauli*,
AGROSTEMMA *Githagine*, SILENE *Quadrifida*.

— — inflexus, SILENIBUS plerisque.
SAPONARIAE Officin.

Germen sessile. *SAPONARIAE Vaccariae. LYCH-
NIDI Dioicae.*

— pedunculatum. *SAPONARIAE Officin. SI-
LENIBUS plerisque.*

Capsula unilocularis. *SILENES Quadrifidae.*

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| — trilocularis. | — | Saxifragae. |
| — sexvalvis. | — | Quadrifidae. |
| — octovalvis. | — | Ceraeoidis. |

Ergo

Ergo solus supereft numerus stylorum, qui Ordines tantum, non vero Genera diversa constituit.

(*) SAPONARIAE. *Digynae; Capsulis unilocularibus.*

510. LYCHNIS *officinalis*.

Lychnis floribus digynis, corymbosif; capsulis quadrivalvibus. *Fl. Carniol.* p. 501. n. 2.

Saponaria calycibus cylindricis; foliis ovato-lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 307. *Spec. Plant.* p. 408. n. 1.

Saponaria foliis ovato-lanceolatis, trinerviis; floribus tubulosif, umbellatis. HALL. *Hist.* n. 908.

DIAGN. *Calyx cylindricus, glaberrimus. Germen transversim rugosum.*

Habitat ad muros, sepes, vias. Julio florens.

Calyx basi intropressus, petalorum unguibus brevior. Petala bifida; auriculis setaceis. Germen nitidum, cylindraceum, receptaculo columnari infidens.

511. LYCHNIS *Vaccaria*.

Saponaria calycibus pyramidatis, quinqueangularibus; foliis ovatis, acuminatis, sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 307. *Spec. Plant.* p. 409. n. 2. HALL. *Hist.* n. 907.

DIAGN. *Calyx florifer pentapterus, ut in GEN-TIANA Utriculosa, fructifer pentagonus.*

Habitat in agro Tergestino, Vipaccensi, Gorizieni.

Glaberrima, tereticaulis, cubitalis, pallide virens, ex summis alis ramosa, Folia basi connata. Calyx semiunciam longus. Petala rosea; laminis crenulatis, emarginatis, planis, horizontaliter patentibus, saturatioribus venis lineatis. Capsula ovata et tunc calyx inter virides angulos albicat. Semina rotunda.

— *Digynae; Capsulis bilocularibus.*

512. LYCHNIS orientalis.

Saponaria calycibus cylindricis, villosis; caule dichotomo, erecto, patulo. LINN. *Syst. Nat.* p. 307. *Spec. Plant.* p. 409. n. 4.

DIAGN. *Calyces et pedunculi tuberculosi. Petala non unguiculata. Duo seminum ordines in singulo capsulae loculo.*

Nata in horto ex seminibus *Gorizia* adlatis, civibus cum dubio adnumeranda.

Caulis dichotomi rami patentes. Folia lanceolata, glabra, glauco-viridia, subsessilia carnosa. Calyces cylindrici, inaequaliter quinquedentati, tres lineas longi, unam crassi. Petala angusta; laminis roseis, bifidis; segmentis rotundatis. Styli interno latere villosi. Germen oblongum.

(**) *Cucubali. Trigyni; Petalis non coronatis.*

513. LYCHNIS pumilio.

Cucubalus caulis unifloris, flore brevioribus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 309. *Mantiss.* p. 71.

Caryophyllus alpinus, etc. MORISON. *Hist. I.* S. 5. Tab. 25. fig. 18.

Betonica coronaria, etc. I. BAUH. *Hist. III.* p. 337.

Caryophyllus montanus. III. TABERN. CLUS.

Hist. omnino diversus ab alpino VII. EIUSD. ut conferenti figuram *MUSCI alpini*. I. BAUHIN. cum illa, quae *BETONICAM coronariam* exprimit, clare patebit.

DIAGN. *Calyx hirsutulus, pedunculo longior, non angulatus.*

Habitat in Alpibus *Carinthiae* vicinis. Ex *Styria* misit etiam P. BIWALD.

Caules simplices et ramosi, unciales et paulo longiores. Folia linea non latiora, obtusiuscula. Calyx (6-9) lineas longus, cylindricus; sub quo par unum foliorum lanceolatorum. Petala rubra; laminis ellipticis. Germen sessile. Styli breves.

III. LIN.

III. LINNAEI determinatio bona est, sed ex synonymia EIUSD vix agnovissem, nisi. I. BAUHINUS moneret BETONICAM suam *coronarium esse omnino CARYOPHYLLUM, alpinum calyce oblongo hirsutum. CASP. Fratris.*

514. LYCHNIS Behen.

Lychnis floribus trigynis, pendulis; calycibus ovatis, inflatis, venosis; capsula semitriloculari.

Fl. Carniol. p. 502. n. 4.

Lychnis tristyla, trilocularis; calyce inflato.

BOEHM. *Lips. 394.* Definitio haec etiam convenit CUCUBALO battifero LINN.

Cucubalus calycibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis; capsulis trilocularibus, corollis subnudis. LINN. *Syst. Nat. p. 309. Spec. Plant. p. 414. n. 2. Fl. Suec. 2. 394.*

Viscago calyce brachiato, nodofo; calycibus inflatis, venosis. HALL. *Hist. n. 913.*

DIAGN. *Calyx ovatus, venosus: venis (20) ramosis; ramis anastomosantibus. Capsulae solabasis trilocularis; eaque sexvalvis.*

Habitat in pratis.

Columna decagona sustinet germen.

515. LYCHNIS Otites.

Cucubalus floribus dioicis; petalis linearibus indivisis. LINN. *Syst. Nat. p. 309. Spec. Plant. p. 415. n. 10.*

Viscago floribus verticillatis, spicatis, sexu distinctis; petalis linearibus. HALL. *Hist. n. 920.*

DIAGN. *Flores dioici; masculis apetalis.*

Habitat circa Tergestum et Duinum, in pratis, non rara.

Caulis paniculatus, racemis verticillatis. Calycinorum dentium margines membranacei et albi. Capsula elliptica, sexvalvis. In floribus masculis video rudimentum germinis trigyni.

(***) *Silenes. Trigynae; Petalis coronatis.*

516. *LYCHNIS acaulis.*

Lychnis acaulis. Fl. Carniol. p. 501. n. 1.

Cucubalus acaulis. LINN. Syst. Nat. p. 1031. Spec. Plant. p. 415. n. 11. Fl. Suec. 2. 387. nunc de-

novo SILENE. Syst. Nat. Edit. 12. p. 311.

Silene acaulis. LINN. Fl. Lapp. 184.

Viscago foliis gramineis, caule brevissimo, uniloculari. HALL. Hist. n. 919.

Ocymoides muscosus. PON. M. Bald.

DIAGN. *Folia vix dimidiata lineam lata, tenuissime spinulosa. Calyces decagoni, glabri.*

Habitat in alpibus, cespitosa.

Pedunculi diphyllici. Calyx fusco-ruber, obtuse quinque-dentatus. Capsula calyce duplo longior, lucida, sexvalvis. Semina rufa, pauca.

Petalorum auriculas ruditer exprimit etiam figura PONAE.

517. *LYCHNIS baccifera.*

Cucubalus calycibus campanulatis, petalis distantiibus; pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. LINN. Syst. Nat. p. 308. Spec. Plant. p. 414. n. 2. Fl. Suec. 2. 385.

Viscago baccifera, petalis ferratis. HALL. Hist. n. 912.

DIAGN. *Capsula ovata, nigra.*

Habitat ad sepes.

Folia ovata, villosula. Calyx semiquinquesfidus, *Carpolo MICHELII* aperto similis. Capsula in medio unilocularis. Semina (35-40), pedicellata, splendida, rugulosa, reniformia, nigricantia.

518. *LYCHNIS viscosa.*

Cucubalus floribus lateralibus, undique decumbentibus; caule indiviso; foliis basi reflexis. LINN. Syst. Nat. p. 309. Spec. Plant. p. 414. n. 4.

DIAGN.

DIAGN. *Tota viscosa. Calyces decagoni: angulis alternis brevioribus ramosisque, Petalorum laminae semibifidae.*

Habitat in Carniolia interiore.

Caulis villosulus, ramosus. Folia sessilia, basi non reflexa, villosula; oris modice undulatis. Calycini dentes duo longiores. Petalorum segmenta apicibus crenulatis. Capsula apice unilocularis.

519. LYCHNIS quadrifida.

Lychnis floribus trigynis; petalis quadrilobis; foliis linearibus. Fl. Carniol. p. 504. n. 7.

Silene petalis quadrifidis; caule dichotomo, floribus pedunculatis; foliis glabris, recurvis. LINN. Syst. Nat. p. 311.

Viscago foliis teneris, recurvis; petalis quadrifidis. HALL. Hist. n. 918.

Lychnis alpina, foliis angustis, reflexis; petalis quadripartitis. SEGUIER. Veron. Suppl. p. 186. Tab. 5. fig. 1.

Lychnis sylvestris X. CLUS. Hist. 3. p. 291.

DIAGN. *Petala alba, emarginata, supra medium dente utrinque instruita. Capsula unilocularis, sexualvis; receptaculo linearis.*

Habitat in Alpibus nostris, et ad earum radices. Gorizia quoque misit. P. WULFEN.

Caulis spithamei; geniculis superioribus viscosis. Folia uncialia, lanceolata. Calyx viscidus, tres lineas longus, villis capitatis adspersus, obiter decemstriatus, obtuse dentatus. Petalorum laminae quadrilaterae, patulae; lobis mediis maioribus et rotundatis, laterilibus acutis. Auricularum laciniae obtusae, ovatae. Germen receptaculo columnari impositum. Semina compressa, reniformia (ad 50), rufa; marginibus lacero-ciliatis.

Flores stylis (4-5) praeditos vidi in Horto Academicus Vindobonensi Ao. 1763. In figura CLUSII, quam

LOBELIUS mutuavit, laminarum lobi medii nimis acuminati sunt. Figura SEGUIERII melior.

520. LYCHNIS Saxifraga.

Lychnis floribus trigynis, erectis; capsulis trilocularibus; foliis linearibus. *Fl. Carniol.* p. 503. n. 6. descriptio.

Silene caulis subunifloris; pedunculis longitudine caulis; floribus hermaphroditis feminineisque petalis bifidis. *Linn. Syst. Nat.* p. 311. *Spec. Plant.* p. 421. n. 26.

Lychnis minor saxifraga. PLUKENET. SEGUIER. *Veron. I.* p. 431. Tab. 6. fig. 1.

DIAGN. *Caules subuniflori. Calyx clavatus. Petala bifida. Capsula basi trilocularis, receptaculi longitudine.*

Habitat in rupibus M. Nanas, et *Alpibus Vochinenibus.*

Caules tenues, saepius uniflori, spithamei. Margines foliorum linearium exiguis veluti denticulis ad lentem scabri. Calyx decemstriatus, fructum gerit albicanter. Auriculae integrae, ovales, albidae. Germen basi sexlobum. Capsula flavescens, trivalvis. Semina (ad 50), rufa, in singulo loculo in duos ordines distributa.

521. LYCHNIS conica.

Silene calycibus fructiferis conicis, striis triginta; foliis mollibus; petalis bifidis. *Linn. Syst. Nat.* p. 310. *Spec. Plant.* p. 418. n. 12. *1 A C. QUIN. Austr.* p. 77. Obs. 38.

DIAGN. *Folia lanceolata, Calyces conici, striis (30). Petalarum laminae roseae et crenulatae.*

In horto nata, ex seminibus indigenis dictis.

Caulis genicula suprema modice viscosa. Folia sessilia, digitum longa. Calycinæ striae villosæ, dentes conniventes et ultra faucem corollæ elati. Interna calycis superficies adspersa glandulis flavis, stipitatis.

tis. Auriculae albae, bifidae, quadrifidae. IAC-
QUIN.

522. LYCHNIS cerasoides.

Silene hirsuta: petalis emarginatis; fructibus ere-
ctis; calycibus subsessilibus, subpilosis. LINN.
Syst. Nat. p. 310. *Spec. Plant.* p. 417. n. 6.

DIAGN. *Tota hirsuta. Calyces alterni, subsessiles;*
striis longitudinalibus fusco-viridibus lineati.

Habitat circa *Tergestum et Goriziam.*

Caulis spithameus. Folia lanceolata. Filamentorum
bases villosae. Capsula octovalvis.

523. LYCHNIS inaperta.

Silene caule dichotomo, paniculato; calycibus lae-
vibus, petalis brevissimis, emarginatis, foliis
glabris, lanceolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 511.
Spec. Plant. p. 419. n. 19.

DIAGN. *Caulis dichotomus. Folia lanceolata. Ca-*
lyces decem striati. Petala albida, emarginata.

Habitat circa *Tergestum.*

Planta glabra, semipedalis. Pedunculus axillae primae
uncialis. Calyx dilatatus, glaber.

524. LYCHNIS Vulnerata.

Silene (*quinquevulnera*), LINN. *Syst. Nat.* p. 309.

DIAGN. *Folia lanceolata, subtus punctis impressis*
obscuris notata. Pedunculi lineares, alares, so-
litarii. Petala rubra; marginibus albis.

Nata ex semenibus, inter indigena, communicatis.

Caulis petalis, teres, ramosus, villosus. Folia lan-
ceolata, villosula. Calyces decemangulati; angu-
lis, rubris. Petalorum laminae subrotundae, inte-
grae et emarginatae; auriculis albis.

525. LYCHNIS nutans.

Lychnis petalis bifidis, floribus lateralibus, secun-
dis, cernuis; panicula nutante. LINN. *Syst.*

Nat. p. 1031. *Spec. Plant.* p. 417. n. 7. *Fl. Suec.*

2. 388. nunc *SILENE Syst. Nat.* Edit. 12. p. 310.

*Lychnis floribus trigynis, secundis, paniculatis,
pendulis; petalis convolutis, bifidis.* *Fl. Carniol.* p. 503. n. 5.

*Viscago foliis lanceolatis, hirsutis; floribus panicula-
tis, nutantibus.* *HALL. Hist.* n. 915.

DIAGN. *Petala semibifida; segmentis ubique lineam
latis, se convolventibus. Receptaculum seminale
acumine terminatum.*

Habitat ad vias et loca sicca.

Pedunculi et calyces capitatis villis pubescentes, unde
gluten exfudat. Calyces decemangulati. Petala
fubtus certe rubella, Auriculae indivisae, acuminatae,
antheris duplo longiores. Styli longi, dilatati.
Capsulae apex unilocularis, a I. BAUHINO iam
dudum observatus. Semina (45-50).

526. LYCHNIS Armoraria.

Lychnis viscosa VI. C. BAUH. *Pin.* p. 205.

Centaurium adulterinum. I. BAUH. *Hist.* p. 355.

Viscaria sativa. TABERNEM. *Hist.* p. 680.

DIAGN. *Flores corymbosi. Calyces clavati, decen-
striati. Petala integra.*

Habitat Tergestii.

Caulis apice dichotomus. Folia ovato-oblonga, gla-
bra, glauco-viridia. Petala rubra. Capsula oblon-
ga, longe pedunculata, trilocularis, sexvalvis.

(****) *Agrostemmae. Pentagynae.*

527. LYCHNIS Githago.

*Lychnis floribus pentagynis; petalis nudis, calyce
brevioribus.* *Fl. Carniol.* p. 505. n. 9.

Agrostemma hirsuta; calycibus corollam aequanti-
bus; petalis integris, nudis. LIN N. *Syst. Nat.*

p. 319. *Spec. Plant.* p. 435. n. 1. *Fl. Suec.* 2.

47.

Lych-

Lychnis calycibus longissime caudatis. HALL. Hist. n. 926.

Pseudo-Melanthium. MATTHIOL. Diosc. p. 529.

DIAGN. *Dentes calycinii corolla longiores. Petala obtusa, subitus splendentia.*

Habitat in arvis fecalinis.

Calyx coriaceus, decagonus, pilosus. Germen sessile.

Capsula coriacea decemstriata, interne subargenteo nitore fulgens. Semina nigra.

528. LYCHNIS Flos-Cuculi.

Lychnis floribus pentagynis; petalis laciniatis. Fl. Carniol. p. 504. n. 8.

Lychnis petalis quadrifidis; fructu subrotundo. LINN. Syst. Nat. p. 319. Spec. Plant. p. 436. n. 2. Fl. Suec. 2. 408. HALL. Hist. n. 921.

DIAGN. *Caulis sulcati basis nodique rubri. Petala rosea, quadrifida; laciniis lateralibus brevioribus, et angustioribus.*

Habitat in pratis uidis.

Foliorum apices rubelli, latera reflexa. Calyx petalorum unguibus brevior. Petalarum laminae patulae. Auriculae cordiformes. Germen sessile. Styli divaricati, longitudine germinis.

529. LYCHNIS Viscaria.

Lychnis petalis subintegris. LINN. Syst. Nat. p. 319. Spec. Plant. p. 436. n. 3. Fl. Suec. 2. 409.

DIAGN. *Paniculata, viscositatem etiam mortua diu retinens; petalis integris; Capsula 5-loculari.*

Habitat Goriziae et Tergesti.

Racemi oppositi, corymbosi. Calyx fructui aequalis. Petala rubra. Capsula apice unilocularis.

530. LYCHNIS dioica.

Lychnis floribus dioicis. LINN. Syst. Nat. p. 319.

Spec. Plant. p. 437. n. 6. Fl. Suec. 2. 411. Fl.

Carniol. p. 505. n. 10. HALL. Hist. n. 922.

DIAGN. Flores in una planta MASCULI, glandula nectarifera ad basin staminis cuiusque brevioris. In alia FEMINEI; squamis (5) nectariferis, germini circumpositis, emarginatis, petala sustinentibus; Capsula uniloculari.

Habitat in sylvestribus locis.

VAR. I. *Albo flore.*

Ex emarginatura squamarum nectariferarum Feminei floris, nascitur acumen. Auriculae bifidae. *Masculi floris* auriculae 4-fidae filamenta villosa.

— **2. Rubro flore.**

Mas auriculis 3-4-fidis; Antheris albis. *Femina* calyce turgidiore.

184. CHERLERIA.

HALL. Hist. p. 591.

Calyx pentaphyllus. Petala nulla. Nectaria quinque, emarginata, antherifera. Capsula trivalvis; valvis dispermiis. Semina pedicellata.

531. CHERLERIA *Sedioides.*

Cherleria HALL. LINN. SEGUIER. Fl. Carniol. JACQUIN. ADANS.

DIAGN. *Cespitosa*; gemmis caulinis; calycinis foliis tri-striatis.

Habitat ad Alpium femitas.

Petala a nectariis distincta nondum vidi. Facilis de-lapsus antherarum inponere potest, ac si filamenta aliqua forent sterilia.

Culta planta produxit nectaria decem, integra, nec non filamenta omnia ex receptaculo.

185. STELLARIA.

ALSINES genus naturale comprehendit SAGINAM, ALSINEM, MOEHRINGIAM, STELLARIAM, ARENARIAM, SPERGULAM. LINN. omnibus enim idem numerus foliorum calycis et pétalorum, stamna petalis non pauciora, styli non plures quam petala, capsula coriacea unilocularis apice dehiscens in valvas tot saltem, quot sunt petala. Praeterea glandulae nectariferae coniungunt SAGINAM Procumbentem, ALSINEM Medium, STELLARIAM Holosteam, ARENARIAM Rubram. Capsula quadrivalvis communis est SAGINAE Procumbenti et MOEHRINGIAE. Cum vero leges methodi sexualis separaverint SAGINAM, ALSINEM et MOEHRINGIAM, ob stamna (4-5-8), ita reliquos Fratres, quibus stamna decem sunt, simul omnes relinquere, et sub Nominе STELLARIAE proponere visum est, LYCHNIDIS exemplo, quae species trigynas et pentagynas, nec non peta- la bifida et integra comprehendit.

(*) Legitima. Trigynae; Petalis bifidis.

532. STELLARIA nemorum.

Stellaria foliis cordatis, petiolatis; panicula pedunculis ramosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 311. *Spec. Plant.* 421. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 391.

Al sine foliis petiolatis, ovato-lanceolatis; petalis bipartitis. HALL. *Hist.* n. 880.

DIAGN. *Folia cordata, petiolata.*

Habitat in sylvis,

Duplex varietas occurrit, et quidem una erecta, pedalis, internodiis rubellis. Huic folia utrinque villosula, inferius petiolata, sub ramis floribusque sessilia; petiolis villosis, canaliculatis. Calyx erectus

villosum; marginibus albidis. Petala fere ad basin usque bifida. Glandula inter stamina longiora et calycem.

Altera, longos, filiformes, multosque caules per terram spargit; foliis omnibus petiolatis, quae est **ALSINES maior, repens, perennis.** I. BAUHINI, et **ALSINE montana hederacea COLUMNAE.**

533. STELLARIA dichotoma.

Stellaria foliis ovatis, sessilibus; caule dichotomo; floribus solitariis; pedunculis fructiferis reflexis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 311. *Spec. Plant.* p. 421. n. 2.
Myosotis foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis.
HALL. *Hist.* n. 886.

DIAGN. *Folia ovata. Pedunculi uncia longiores, recti, deflexi.*

Circa Goriziam, P. WULFEN.

Omnia subvillosa. Styli hirsuti, apice deflexi. Semina rufa, compressa.

534. STELLARIA Holostea.

Alsine floribus decandris, trigynis; foliis lanceolatis; petalis bifidis. *Fl. Carniol.* p. 497. n. 4.

Stellaria foliis lanceolatis, ferrulatis; petalis bifidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 311. *Spec. Plant.* p. 422. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 392. nota petalorum bifidorum superflua videtur, cum essentiam Generis constitutat.

Alsine foliis gramineis, ciliatis. HALL. *Hist.* n. 884.

DIAGN. *Folia graminea; marginibus tenuissime ferrulatis. Petala semibifida.*

Habitat ad sepes circa Lokopolim, Pellant, Seirach, Labacum. &c.

Petala calyce fere duplo longiora. Glandulae nectariferae cohaerentes, coronae adinstar, germen ambiunt.

536. *Stellaria Ciliata*.



Tab. 17.

538. *Stellaria Rubra*.

537. *Stellaria Aculeata*.



535. STELLARIA graminea.

Alfine floribus decandris, trigynis, paniculatis, foliis linearibus. *Fl. Carniol.* p. 498. n. 5.

Stellaria foliis linearibus, integerrimis; floribus paniculatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 312. *Spec. Plant.* p. 422. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 393.

Alfine foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramosis. HALL. *Hist.* n. 882.

DIAGN. *Folia graminea, integerrima. Petala ad basin usque bifida.*

Habitat circa hortos.

Caulis quadratus. Corolla calyce paulo longior. Germen pallide luteum.

(**) *Arenariae Trigynae; Petalis integris.*

Fere insuperabiles difficultates occurunt in extrincandis **AL SINIBUS tenuifoliis**, quae hactenus, aut male determinatae, aut non bene distinctae sunt. Ill. HALLERUS in his multum laboris impendit, et tamen discrimina, saepe nimis minuta dedit, quae non sufficere videntur distinguendis speciebus. LINNAEUS alioquin incomparabilis, in tenebris hisce, lucem aliquam vix supeditavit, ut Authorum figuris omnino indigeat ille, qui eius differentias rite capere voluerit. Ego vero meorum specimina differentias constantes et repetitis observationibus inventas, in medium profaram, aliis iure relichto, species statuendi, aut aptius denominandi.

536. STELLARIA Ciliata. Tab. 17.

DIAGN. *Folia imbricata, semicylindrica; marginibus infra medium ciliatis.*

Habitat in summis *Alpibus Vochinenibus.*

Cau-

Caules diffusi, filiformes, teretes, molles, dichotomi, foliis aridis vestiti. Rami erectiusculi. Folia laete viridia, duas lineas longa, acuminata, nullo aculeo terminata. Pedunculi uniflori, villosuli, vix semicircumflexi, longi. Calycina folia oblonga, glabra, acuminata, absque spina dorsali. Petala alba, elliptica, integerrima, obtusa, calyce duplo longiora. Stamina alba; antheris pallide luteis. Styli tres erecti, breves. Capsula sexvalvis, tetrasperma. Semina reniformia, splendentia, nigerrima, hilo albo instructa.

An haec ALSINE foliis linearibus, obtusis; petalis integris. HALL. Emend. I. n. 70.

537. STELLARIA Aculeata. Tab. 17.

Alsine foliis fulcatis, aculeatis, petiolis unifloris; petalis integris. HALL. Enum. p. 388. n. 1.

DIAGN. *Folia in spinulam mollem desinentia. Petala calyce duplo longiora.*

Habitat in montibus circa Goriziam, P. WULFEN. Caules villosuli. Folia triquetro - carinata, infra medium ciliata, in acutissimum mucronem sensim attenuata. Calyx villosulus; foliis oblongis, pariter spinula terminatis. Petala obtusa et alba.

538. STELLARIA Rubra. Tab. 17.

Alsine foliis fasciculatis, tenuissimis durisque; petalis integris. HALL. Hist. p. 389. sic certus ait WILLICH. in litt.

DIAGN. *Caulis rigidus. Folia trinervia, basi conata et spathacei coloris, in acutum et longum mucronem attenuata. Ex qualibet ala brevis ramus. Capsula tenuis, trivalvis.*

Habitat in collibus apricis, circa Vipaccum.

Rigiditas totius plantae et fructus, huic essentialis. Semina reniformia, tuberculosa, non ultra (6).

Tab. 18.

541. *Stellaria Laricifolia*.



540. *Stellaria Rupicola*.



Rein. Sc. A.V.

539. STELLARIA *saxatilis*.

Arenaria foliis subulatis; caulis paniculatis; caly-
cum foliolis ovatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 313.

Spec. Plant. p. 424. n. 7.

Alsine foliis linearibus, petalis calyce longioribus.
HALL. *Hist.* n. 867.

Alsine *saxatilis* et *multiflora* capillaceo folio. VAIL-
LANT. *Paris* p. 7. Tab. 2. fig. 3.

DIAGN. *Folia plana, unica dorsali linea subtus in-
strutta. Petala calyce longiora.*

Habitat in *Alpibus Vochinensis*.

Radix multicaulis. Caules tenues plerumque biflori.
Folia glabra. Pedunculi villosi. Calycina folia ob-
longa, glabra, trilineata; marginibus albidis. Pe-
tala calyce fere duplo longiora, ad basin modice la-
nuginosa. Capsula oblonga. Semina fulva (ad 8),
reniformia, in margine denticulata, compressa.

ALSINE *tenuifolia muscosa* SEGUIERII, huc potius
referenda, ob petala calyce longiora.

540. STELLARIA *Rupestris*. Tab. 18.

DIAGN. *Folia plana, subtus trinervia. Petala ca-
lyce breviora.*

Habitat in rupibus alpinis.

Radix multicaulis. Caules villosuli, digitum longi,
pauciflori. Petala ovata, acuminata.

An haec ARENARIA *friata*. LINN. ALSINE *tenuifo-
lia* VAILLANT. Tab. 3. fig. 1. huic proxima, ob
petala calyce minora; sed flores in meis specimini-
bus duplo maiores, nec petala obtusa.

541. STELLARIA *laricifolia*. Tab. 18.

Arenaria foliis fetaceis, caule superne nudiusculo;
calycibus subhirsutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 313.

Spec. Plant. p. 424. n. 9.

Alsine foliis linearibus angustissimis, calycibus tubu-
losis, villosis, HALL. *Hist.* n. 869.

DIAGN.

DIAGN. *Folia teretiuscula, rigida, pallide viridia.
Pedunculi longi, pauciflori.*

Habitat in Alpibus.

Radix perennis, multicaulis. Ex alis foliorum oriuntur alia foliola, quae sunt rudimenta ramorum, et ita fit foliorum veluti fasciculus. Calyces modice villosi, tenues, acuti, capsula longiores.

(***) *Spergulae. Pentagynae; Petalis integris.*

542. STELLARIA arvensis.

Alfine floribus decandris, pentagynis; foliis verticillatis. *Fl. Carniol.* p. 499. n. 8.

Spergula foliis verticillatis; floribus decandris. LINN.

Syst. Nat. p. 321. *Spec. Plant.* p. 440. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 410. GLEDITSCH. *Diff. P. 2. V.*

Alfine foliis verticillatis; seminibus rotundis. HALL.
Hist. n. 873.

DIAGN. *Folia nitida, teretiuscula, verticillata. Panicula laxa, dichotoma.*

Habitat in agris *Carnioliae montanae*.

Folia superne subcanaliculata. Capsula quinquevalvis, continens semina (12—16). Stamina 5. 7. 8. 10. Semina nigra, aspera, angusto annulo cincta. GLEDITSCH. *I. c.* p. 293.

543. STELLARIA pentandra.

Spergula foliis verticillatis; floribus pentandris. LINN. *Syst. Nat.* p. 321. *Spec. Plant.* p. 440. n. 2.

DIAGN. *Sub singulo verticillo stipulae ovatae et membranaceae. Semina nigricantia albo et membranaceo margine cincta.*

Habitat *Tergestii*.

Caules spithamei, rigiduli, erecti. Folia brevia, linearia. Folia calycina alterna ovata. Pedunculi villosuli. Capsula cartilaginea, calyce longior, trivalvis. Receptaculum, dum adhuc semina sustinet, figuram habet coni, aut strobili alicuius.

544. STELLARIA *Serpillifolia*.

Al sine foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis; petalis calyce brevioribus. HALL. Hist. n. 875.

DIAGN. *Tota villis hispida, ramosissima; foliis ovatis aut oblongis; Petalis calyce minoribus; capsulae basi decagona.*

Habitat in aridis et sylvestribus locis.

Folia sessilia, acuminata. Calyces acuti, petalis longiores. Capsula in Carniola raro calyce longior est, nec styli tres, sed quinque. In specimine a Cl. GRONOVIO misso, habitus idem, ut in nostris, sed capsula calyce longior, et etiam sexvalvis.

Est omnino ARENARIA *serpillifolia*, LINN.

545. STELLARIA *nodosa*.

Spergula foliis oppositis, subulatis, laevibus; caulis simplicibus. LINN. Syst. Nat. p. 321.

Al sine foliis superioribus fasciculatis. HALL. Hist. n. 871.

DIAGN. *Plantula triuncialis; foliis linearibus; caulinis unifloris; petalis integris, et calyce non longioribus.*

In M. S. Magdalene inveni, circa Idriam.

Cespitosa est, pulchre virens, glabra, variat numero stylorum (3—4—5). Petala gerit ovata, alba, styllos albos, capsulam ovalem. Mollis spinula terminat folia. Sub his cespitulis latent saepe formicarum familiae. Floret initio Iunii.

(****) *Cerastria. Pentagyna. Petalis bifidis.*

Huc pariter revocanda CERASTIA *Sphaerocarpa*, quae constituant ordinem II. CERASTIORUM LINN.

546. STELLARIA *aquatica*.

Cerastium foliis cordatis, sessilibus; floribus solitariis; fructibus pendulis. LINN. Syst. Nat. p. 320.

p. 320. *Spec. Plant.* p. 439. n. 12. *Fl. Suec.*

2. 413.

Alpine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis; tubis quinis. HALL. *Hist.* n. 885.

Alpine II. maior. TABERNEM. p. 1086.

DIAGN. *Folia sessilia, patula, adnata anulo internodium ambiente. Summitates ramorum viscosae. Receptaculum seminale angulis obtusis septem.*

Habitat circa sepes in uidis.

Caules tripedales, prostrati, ni fulcrum habeant, subtetragoni. Folia basi cordata, longa. Calyx villosus. Petala ad basin usque bipartita, lineis longitudinalibus prominentibus simplicibus ramosisque striata. Stamina omnia fertilia. Pedunculi fructiferi deflexi. Capsula cartilaginea, pyriformis, quinquevalvis. Receptaculum seminale simile stercori larva, Insecti Lepidopteri.

547. STELLARIA repens.

Cerastium foliis lanceolatis; pedunculis ramosis; capsulis subrotundis. LINN. *Syst. Nat.* p. 320. *Spec. Plant.* p. 439. n. 8.

DIAGN. *Caulis procumbens, Petala semibifida, calyce duplo longiora.*

Habitat in sylvestribus locis.

Caulium summitates, ad genicula, viscosae. Folia lanceolata, acuminata. Stamina omnia antherifera. Germen ovale.

Stellariae praebent Bobus gratissimum pabulum.

PENTAGYNI A.

186. CENTUNCULUS.

PLIN. ADANS. *Famil. Plant.* p. 256.

Genus hoc comprehendit CERASTIA LINNAEI, quae capsulas habent ceratooides, oblongas, cartilagineas, apice decemdentatas.

548. CEN-

548. CENTUNCULUS arvensis.

Cerastium foliis linear-lanceolatis, obtusis, glabris; corollis calyce maioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 320. *Spec. Plant.* p. 438. n. 5.

Myosotis foliis linearibus, lanceolatis; petalis calyce duplo longioribus. HALL. *Hist.* n. 899.

DIAGN. *Petala lineata, fere semibifida, calyce fere duplo longiora.*

Habitat in arvis et pratis.

Stamina omnia fertilia. Stigmata flavescentia. Capsula calyce duplo longior. Semina (ad 80). Folia non sunt obtusa.

549. CENTUNCULUS semidecander.

Cerastium floribus pentandris; petalis emarginatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 320. *Spec. Plant.* p. 438. n. 3.

Myosotis caule simplici; foliis ovatis, hirsutis, tubis ternis. HALL. *Hist.* n. 894.

DIAGN. *Petala profunde emarginata, calyce breviora.*

Habitat circa hortos et vias.

Stamina quinque et tres styllos numerat III. HALLE-RUS, ego vero stamna decem, et quidem omnia antherifera, una cum stylis quinis. Filamenta exteriora antheras facile et citius dimittunt, unde nata fortis observatio LINNAEI de staminibus quinis sterilibus, totidemque fertilibus. Eandem plantam habeo a Cel. GRONOVIO, cui misit DILLENIUS. Capsula quinquevalvis: valvis bifidis. Semina rufa, rotundato-reniformia, tuberculosa.

550. CENTUNCULUS alpinus.

Cerastium foliis ovato-lanceolatis; caule diviso; capsulis oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 320. *Spec. Plant.* p. 438. n. 7. *Fl. Suec.* 2. 418.

Myosotis foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis; petalis calyce duplo longioribus. HALL. Hist. n. 888.

DIAGN. *Folia ovato-lanceolata, patula, Pedunculi tres, umbellati. Calyces obtusi, glabri.*

Habitat in alpibus ad fontium scaturigines, in *Vochtein*, loco dicto *Kointschka*.

Caules antiqui iacent, novi eriguntur triunciales, villosuli. Folia sessilia, villosula, semiunciam longa. Petala calyce duplo longiora. Capsula 5-valvis: valvis bifidis.

551. CENTUNCULUS *Augustifolius*. Tab. 19.

Myosotis caule hirsuto; foliis perangustis, glabris; flore calycem excedente. HALL. Enum. I. p. 384. n. 2.

Caryophyllus VII. C. BAUH. Prodr. p. 104.

DIAGN. *Folia linearis-lanceolata, mollia, Capsula calyce brevior.*

Habitat in *Alpibus Vochtinenibus*

Caules digitum longi foliosi et floriferi. Hi villosiores et longiores gerunt folia calycina carinata, villosa, acuminata; Petala non profunde bifida, calyce longiora; Capsula decem valvis.

552. CENTUNCULUS *Rigidus*. Tab. 19.

DIAGN. *Folia lanceolata, rigida, aspera, Caulis bis bifidus. Capsula calyce paulo longior.*

Habitat cum priore.

Caulis quadriuncialis, erectus, rigidus, reflexis densissimis villis hirtus. Folia quatuor lineas longa, unam lata, acuminata, dura, pariter aspera. Sub singula dichotomia binae bracteae, calyce breviores. Calycina foliola lanceolata, villosa. Petala calyce longiora. Capsula apice decendentata; dentibus ferrugineis.

Tab. 19.

551. *Centunculus*
Angustifolius.



552. *Centunculus*
Rigidus.

187. SEDUM.

HALL. Hist. 408. LUDW. D. G. 613. Fl. Carniol. p. 490.

Et huic generi violenta est Methodus artificialis, dispergens gentem, quam habitus, nectarium, et proportio numerica partium floris et fructus, in unam manifeste coniungunt. Huic germina et siliculae tot, quot folia calycina, quotque petala. Calyx persistens. Stamina (6-12). Capsulae polyspermae.

553. SEDUM Telephium.

Sedum foliis planis, ovatis, ferratis; cymis laterali-
bus, corymbosis. Fl. Carniol. p. 491. n. 2.

Sedum foliis planiusculis, ferratis; corymbo folioso;
caule erecto. LINN. Syst. Nat. p. 316. Spec.
Plant. p. 430. n. 2. Fl. Suec. 2. 400.

Sedum androgynum, foliis confertis ferratis, floribus
dense umbellatis. HALL. Hist. n. 954.

DIAGN. Folia plana, elliptica, obiter serrata. Co-
rymbi tres, trifido-ramificati.

Habitat circa rupes.

Stamina petalis interposita pollinem citius effundunt.
Siliculae subtetragonae sunt.

554. SEDUM Haematodes.

DIAGN. Caules unciales. Folia oblonga, obtusa,
glabra, rugosula, adnato-sessilia, flavo-punctata.

Habitat in Alpibus Tolminensis et Vochinen-
sis.

Caules sanguinei, angulati, ramosi, erecti, rigiduli, auri-
culari digito breviores. Folia carnosa, alterna, su-
perne convexa, subtus plana, postice deorsum gibba,
tres lineas longa, unam et dimidiam crassa. Cyma-
bisida, erecta, cum intermedio flore pedunculato.
Calyx rubro viridis. Petala sanguinea, acuminata.

Antherae luteae. Capsulae rubrae. Tota planta insipida.

Non est *SEDUM rubens*. LINN. cui caules palmates et agrestis patria, neque *SEDUM saxatile hirsutum purpureum*. C. BAUHINI. Videtur *SEDUM rubrum alpinum* parvum. SCHEUCHZ. *It. Alp.* Tom. I. p. 48. Tab. 6. fig. 3. 4.

555. *SEDUM dasypHYLLUM*.

Sedum foliis oppositis, ovatis, obtusis, carnosis; caule infirme; floribus sparsis. LINN. *Syst. Nat.* p. 317. *Spec. Plant.* p. 431. n. 8.

Sedum foliis conicis, obtusis, glaucis, reticulatis; caule ramoso, viscido. HALL. *Hist.* n. 961.

Sedum parvum &c. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 691.

DAIGN. *Caulis debilis. Folia ovata, crassa, obtusa, rubris punctis variegata. Styli sex.*

Habitat in muris ad *Arcem Veldes*, et alibi.

Crassities foliorum glauco-viridium deprimit caulem. Huic rubro punctata folia. Petala oblonga, intus alba, extus rubella. Filamenta petalis breviora. Germina et styli sex.

556. *SEDUM album*.

Sedum foliis teretibus, compressis acutis; cyma trifida; floribus pedunculatis. *Fl. Carniol.* p. 491.

Sedum foliis oblongis, obtusis, teretiunculis, sessiliibus, patentibus; cyma ramosa. LINN. *Syst. Nat.* p. 317. *Spec. Plant.* p. 432. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 492.

Sedum caule glabro foliis teretibus; umbellis ramosis; floribus petiolatis. HALL. *Hist.* n. 959.

DIAGN. *Folia compresso-teretia, semiuncialia angusta, patentiuscula, sessilia. Petala alba acuminate, linea rubra in medio lineata.*

Habitat in muris.

Flo-

Flores subsessiles. Antherae rubrae. Calyces acuminati, non rotundati. HALLER. Folia non obtusa. LINN. unitatem partibus quandoque addunt.

557. SEDUM rupestre.

Sedum foliis subulatis, quinquesariis, confertis, basi solutis; floribus cymosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 317. *Spec. Plant.* p. 431. n. 9.

DIAGN. *Folia attenuata, acuminata, sessilia, libram membranulam e basi demittunt, et cauli adponunt.*

Habitat Tergefli.

558. SEDUM sexangulare.

Sedum foliis teretibus, obtusis, patulis; cyma trifida; floribus solitariis. *Fl. Carniol.* p. 491. n. 4.

Sedum foliis subovatis, adnato-sessilibus, gibbis, ereticulatis, sexfariam imbricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 317. *Spec. Plant.* p. 432. n. 13. *Fl. Suec.* 2. 404.

Sedum foliis conicis, confertis; caulis ramosis; summis trifidis. HALL. *Hist.* n. 966.

DIAGN. *Folia imbricata in columnam hexagonam.*

Habitat circa hortos, in muris, apud nos saepius insipidum.

Caules antiqui decumbunt, novi adscendunt, folia hymene persistunt, flores sessiles et flavi sunt.

559. SEDUM Tectorum.

Sedum foliis planis ciliatis; propaginibus patentibus. *Fl. Carniol.* p. 490 *Sempervivum* LINN. *Syst. Nat.* p. 335. *Fl. Suec.* 2. 428.

Sedum rosulis glabris, ciliatis; petalis conglutinatis, lanceolatis, hirsutis, &c. HALL. *Hist.* n. 949.

DIAGN. Flores dodecandri. Folia ciliata. Scapus foliosus, apice ramosus; ramis patulis; floribus secundis.

Habitat ad rupes, et muros.

Eradicatum vegetat ut alia *Seda*.

560. SEDUM Roseum.

Rhodiola. LINN. *Syst. Nat.* p. 657. *Fl. Suec.* 2. 912.

Sedum sexu distinctum; foliis serratis; floribus densissime umbellatis. HALL. *Hist.* n. 953.

DIAGN. Radix suaveolens. Caules simplices. Folia lanceolata, superne dentata. Flores dioici, tetrapetali.

Habitat in M. Grindovitz, non vero supra Vipaccum, ut ait MATTHIOLUS.

Radix ramosa, crassa, reptans. Caules teretes, glabri. Folia cultae plantae apice tantum dentata.

Si numerus staminum et stylorum, nec non sexus, in multis aliis Generibus Linnaeanis non attenditur, poterunt et haec *Seda*, cum aliis sub uno Genere militare.

Vidi flores masculos cum rudimento feminei sexus, cui circumstabant squamulae quatuor nectareae. Stamina non semper octo, sed (6—10). Siliculae (3—6).

188. OXYS.

PLIN. FUCHS. TOURN. I. R. H. p. 88. Tab. 19.

Calycina folia et petala (5). Stamina quinque breviora. Capsula angulis elastice disiliens.

561. OXYS Acetosella.

Oxalis scapo unifloro; foliis ternatis; radice squamoso-articulata. LINN. *Syst. Nat.* p. 318. *Spec. Plant.*

Plant. p. 433. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 406. *Fl. Carniol.* p. 486. HALL. *Hist.* n. 928.

Trifolium acetosum. MATTH. *Diosc.* p. 555.

DIAGN. *Pedunculi uniflori e radice squammosa et dentata.*

Habitat in humo umbrosis in locis.

Petala naturaliter alba, maculam flavam in ungue gerunt.

562. *Oxys corniculata.*


Oxalis caule ramoso, diffuso; pedunculis umbelliferis. LINN. *Syst. Nat.* p. 318. *Spec. Plant.* p. 435. n. II.

DIAGN. *Caulis prostratus. Folia et umbelliferi pedunculi e caule oriuntur.*

Habitat *Tergesti et Goriziae*, in fiscis.

Caules teretes, villosuli, rubelli. Folia utrinque viridia. Petala flava, rotundata. Stamina basi coalita. Antherae flavae. Stigmata bifida. Pellicula rubra, semina tegens.





CLASSIS XI.
D O D E C A N D R I A
MONOGYNTIA.

189. **A S A R U M.**

LINN. *Gen. Plant.* 522.

Europaea proles non est *Monogynia*, sed *Hexagynia*, nam licet styli primo connati, unicum prae se ferant, apice tamen sunt liberi, et dum capsula in sex locula dividitur, tunc styli separantur, et quilibet suum loculum seorsim terminat; cuius basi adfixa sunt semina quatuor cuneiformia. Hanc capsulae fabricam vidit etiam Cl. WILlich. Singulum loculum septo longitudinali in duas partes dividitur, eidemque utrinque bina semina adhaerent.

Numerus segmentorum Calycis quadruplo minor staminum numero, et duplo loculorum capsulae, constituit genus naturale.

§63. ASARUM *Europaeum*.

Asarum foliis reniformibus, obtusis, binis. LINN.
Syst. Nat. p. 325. *Spec. Plant.* p. 442. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 421. *Fl. Carniol.* p. 265.

Asarum foliis reniformibus, subhirsutis. HALL. *Hij.* n. 1547.

DIAGN. *Stipes radicalis, petiolos binos sustinet, inter quae pedunculus uniflorus et nudus. Folia hastisperphaericò-cordata.*

Habitat in sylvestribus, umbrisque locis, circa Idriam. Antherae unco terminatae.

190. POR-

190. PORTULACA.

TOURN. *Inst. R. H.* p. 263. *Tab. 118.*

Neque haec species *Monogynia*, sed *Pentagynia*, ut iam pridem vidit HALLERUS. Calyx bifolius. Petala quinque, et Capsula circumcisso, essentiam constituant.

194. PORTULACA oleracea.

Portulaça foliis cuneiformibus; floribus sessilibus,
LINN. *Syst. Nat.* p. 328. *Spec. Plant.* p. 445.
n. 1. HALL. *Hist.* n. 968.

DIAGN. *Glabra*, *ramosissima*, *procumbens*, *succulenta*; floribus sessilibus, *glomeratis*, alaribus.

Habitat in, et circa hortos.

191. LYTHRUM.

LINN. *Gen. Plant.* 532.

Petala et stamina calyci duodecimfido inserata. Capsula bilocularis, polysperma.

195. LYTHRUM Salicaria.

Lythrum foliis oppositis, lanceolatis; floribus spicatis, dodecandris. LINN. *Syst. Nat.* p. 1045.
Spec. Plant. p. 446. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 422. *Fl. Carniol.* p. 577.

Salicaria foliis lanceolatis, subhirsutis; floribus spicatis. HALL. *Hist.* n. 854.

DIAGN. *Oppositifolia*, *verticillata*: *verticillis 18-floris*; *foliis sessilibus*.

Habitat in udis, et circa rivos.

Calyces sessiles, decagoni; dentibus minoribus, rubellis. Capsula fusca, a calyce separabilis, duo et tria locula possidens. Semina cuneiformia, rufescientia.

Tota planta in senio ruborem induit. Pulverisata magnam copiam aquae absorbet antequam glutinositatem suam amittat, et sumi queat.

566. LYTHRUM *Hyssoppifolia*.

Lythrum foliis alternis, linearibus; floribus hexan-
dris. LINN. *Syst. Nat.* p. 329. *Spec. Plant.*
p. 447. n. 5.

Salicaria foliis linearibus, floribus per alas sessilibus.
HALL. *Hift.* n. 855.

DIAGN. *Folia alterna. Flores solitarii, hexandri.*

Habitat circa Tergestum.

Caulis durus, semipedalis, ramosus. Rami angulosi.
Calyx cylindricus, striatus, glaber, 12-dentatus;
dentibus alternis minoribus et erectis. Capsula,
quam coram habeo; quadrilocularis, quadrifulca,
obtusa, calyce inclusa, rufescens, cylindracea. Se-
mina subrotunda, in uno loculo (ad 56). Eam
ipsam Plantam coram habeo, quae a RUPPIO pi-
cta est in *Fl. Ien.* p. 295. Tab. 6, Calyces fructife-
ri scapo adprimuntur.

SALICARIA GESN. est [LYSIMACHIA maior, nec
LYTHRUM semper inter Salices vegetat.

DIGYNIA.

192. AGRIMONIA.

BRUNFELS. DODON. TOURN. I. H. R. p. 301.
Tab. 155. LINN. *Gen. Plant.* 534.

Germina sub receptaculo nectarifero la-
tentia, ex huius centro stylos emitunt, et
mutantur in semina bina, calyce inclusa,
cuius substantia sensim indurata capsulam re-
praesentat.

567. AGRIMONIA *Eupatoria*.

Agrimonia foliis caulinis pinnatis: impari petiolato; fructibus hispidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 329. *Spec. Plant.* p. 448. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 423. *Fl. Carniol.* p. 578. n. 1.

Agrimonia foliis pinnatis, pinnulis alterne minimis. HALL. *Hist.* n. 991.

Eupatorium. MATT. *Diosc.* p. 648.

DIAGN. *Fructus decemfalcatus, pilosus, setis uncinatis erectis, et marginalibus hirtus.*

Habitat in sylvestribus *Carnioliae frigidioris*.

Caulis modo simplex, modo romosus et humanae quoque staturalae. Semina duo et unum. Flores longe racemosi.

568. AGRIMONIA *Agrimonoides*.

Agrimonia foliis caulinis ternatis; fructibus glabris. LINN. *Syst. Nat.* p. 329. *Spec. Plant.* p. 448. n. 2. *Fl. Carniol.* p. 578. n. 2.

DIAGN. *Flores corymbosi. Calyx 10-12-fidus. Stamina octo. Fructus glabri.*

Folia radicalia pinnata, cauli subaequalia; pinnarum paribus (2-3): terminali foliolo maiore, minoribus pinnulis intermixtis. Pinnae ovatae, villosae, dentatae. Folia caulina ternata. Bracteae ovatae, acuminatae. Flores parvi, flavi; raro sex. Stamina tenera, flava. Petala ovata et obtusa.

TRIGYNIA.

193. R E S E D A.

LINN. *Gen. Plant.* 535.

Calyx monophyllus. Petala inaequalia: aliquibus semitrifidis. Stamina plura petalis. Lamina nectarifera, et semina non proprio recepta-

ceptaculo, sed angulis capsulae unilocularis adfixa, evidentem adfinitatem cum **VIOLA**, demonstrant.

569. RESEDA lutea.

ARDUIN, *Memor.* I. p. 84. Tab. 16.

Reseda foliis omnibus trifidis; inferioribus pinnatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 330. *Spec. Plant.* p. 449. n. 7. *Fl. Carniol.* p. 547.

Reseda hexapetala; foliis pinnatis, undulatis; calyce sexfido. HALL. *Hift.* n. 1056.

DIAGN. *Folia trifida: inferiora pinnata.* LINN.

Habitat ad vias.

Stamina (ad 20).

570. RESEDA Phyteuma.

Reseda foliis integris trilobisque; calycibus maximis, sexpartitis. LINN. *Syst. Nat.* p. 330. *Spec. Plant.* p. 449. n. 8.

Reseda foliis radicalibus integris, caulinis integris et semitrilobis, calycibus sexfidis florem superantibus. HALL. *Hift.* n. 1057.

DIAGN. *Folia ima integra, lanceolata. Capsula laevis.*

Habitat in *Austriaco Littorali*.

Folia superiora trifida. Pedunculi patentēs. Semina reniformia, albida, foveolis scrobiculata.

194. TITHYMALUS.

DIOSC. THEOPH. PLIN. C. BAUH. HALL.
Hift. p. 189. EUPHORBIA LINN. LUDW.
GLEDITSCH.

Difficillimi Generis species nostrae gerunt Calycem subrotundum, coloratum, persistente, cui infident scuta lunulata, aut haemisphaerica quatuor aut quinque. Stamina (9-18) ex

ex imo calycis sede prodeunt, modo fertilia, modo vero castrata. Haec sola, aut una cum germine apparent trilobo pedunculato, et tribus stylis bifidis terminato. Germen hoc transit in capsulam subrotundam, trilobam, trilocularem: loculis monospermis.

571. TITHYMALUS *Lathyris*.

Euphorbia umbella quadrifida, dichotoma; foliis oppositis, integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 332. *Spec. Plant.* p. 457. n. 31.

Tithymalus foliis ellipticis, stipulis umbellaribus quaternis, petalis bicornibus succiferis. HALL. *Hist.* n. 1044.

Lathyris. MATTTHIOL. *Diosc.* p. 777.

DIAGN. *Umbellae radii quatuor, dichotomi. Folia opposita, lanceolata. Radix biennis.*

Habitat *Idriae* in cultis. *Goriziae alla Rocca di Cormons.* P. WULFEN.

Involucra omnia basi cordata. Flos inter radios masculus, caeteri hermaphroditi, sessiles, glabri. Filamenta (ad 30), tertia parte saepius castrata. Receptaculum villosum, scuta late cordata: Segmentis obtusis et magis flavicantibus. Germen lineis senis fusco-rubris longitudinaliter striatum. Capsulae erectae, glabrae.

572. TITHYMALUS *Sylvaticus*.

Euphorbia umbella quinquefida, dichotoma; involucellis perfoliatis. *Fl. Carniol.* p. 431. 1-2.

Euphorbia quinquefida: bifida; involucellis perfoliatis, subcordatis; foliis lanceolatis, integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 334. *Spec. Plant.* p. 463. n. 55. Umbella non multifida, sed perpetuo quinquefida.

Tithymalus foliis ellipticis, hirsutis; stipulis umbellaribus, obscuris; floralibus connatis; petalis lunatis. HALL. *Hist.* n. 1045.

Tithy-

Tithymalus toto anno folia retinens. I. BAUH.
Hist. III. p. 671. aptissimo charactere.

DIAGN. *Primiflora*, *frutescens*, *hyeme* *folia conservans*, *Aprili florens*; *involucellis perfoliatis*.

Habitat in asperioribus sylvis.

Caules villoso. Folia lanceolata, utrinque villosa, ad apicem tenuiter ferrulata. Umbellae quinquefidae involucrum constans foliis ovatis, subemarginatis. Ex alis foliorum radii bifidi, qualis etiam est divisio radiorum umbellae. Involucella perfoliata, bis semibifida. Flores inter radios ramosque masculi, sessiles; staminibus plerisque castratis; scutis quinis lunalatis; calycibus eriophoros. Flores alii fertiles tetrapetali. Germen neque villosum, nec verrucosum.

573. TITHYMALUS dulcis.

Euphorbia umbella quinquefida: bifida; involucellis cordatis, ferratis; foliis lanceolatis, obtusis; floribus sessilibus; capsulis tuberculosis. *Fl. Carniol.* p. 431. n. 3.

Euphorbia umbella quinquefida; bifida; involucellis subovatis, foliis lanceolatis, obtusis, integerimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 333. *Spec. Plant.* p. 457. n. 34.

Tithymalus foliis ellipticis, ferratis, stipulis umbellaribus, quinis; floralibus cordatis; fructu peraspero. HALL. *Hist.* n. 1051.

DIAGN. *Involucella cordata*, *ferrulata*. *Flores* *sessiles*; *petalis rubris*. *Capula* *villosa*, *infra medium* *verrucosa*. *Lac mite*.

Habitat circa Idriam passim, sub finem M. Aprilis florens.

Caulis vilosus, basi ruber. Folia lanceolata, utrinque villosa; oris cartilagineis, dentatisque. Involucrum simile foliis. Radii quini et pauciores. Flores inter ramos et radios, decidui, tetrapetali; petalis rotundat-

Tab. 20.



574. *Tithymalus Seguierii*.

tundatis et rubris; staminibus (2-5). Flores fertiles etiam tetrapetali. Styli semibifidi, virides. Stigmata ovata, obtusa, flavescentia.

574. TITHYMALUS Seguierii Tab. 20.

Tithymalus foliis brevibus aculeatis. C. B. SEGUIER. Veron. I. p. 154. Tab. 3. fig. 1. sed cum *Pithyusa* minime confundenda.

DIAGN. *Involucella reniformia, e nervo acumen effarentia. Petala lunata. Capsulae glabrae.*

Habitat circa Goriziam et in Istria.

Folia lanceolata, integerrima, acuminata, subtus glauca, non villosa. Umbellae laterales, ad apicem caulis ita coacervatae, et cum primaria confusae sunt, ut ea difficulter discernatur. Radii semipedem longi, angulati, bis bifidi. Involucella integerrima, bifolia, diametro longitudinali. Linea duplo longiore. Flores inter ramos steriles et decidui; caeteri fertiles, pedunculati. Petala quaterna lunata, rubra. Capsula absque verrucis et pilis, in dorso tamen lobi singuli modice corrugata.

575. TITHYMALUS Pithyusa.

Euphorbia umbella quinquefida, bifida, involucellis ovatis, mucronatis, foliis lanceolatis: infinis involutis, retorsum imbricatis. LINN. Syst. Nat. p. 333.

DIAGN. Caules villoso. Folia integerrima, acuminata, sessilia, lanceolata. Involucella elliptica. Capsulae echinatae spinulis mollibus, rubellis.

Habitat circa Tergestum et Duinum.

Suffrutescens profert caules simplices, multos, pedales: Umbellae 4-5-fidae. Flos e prima radiorum divisione fertilis, pedunculatus. Petala fusco-rubra, hemisphaerica. Capsulae sunt capitula, pisi magnitudine, et echinata.

576. *TITHYMALUS Pilosus*. Tab. 21.

Euphorbia umbella quinquefida: trifida; bifida; involucellis ovatis; petalis integris; foliis lanceolatis, subpilosis, apice ferrulatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 334. *Spec. Plant.* p. 460. n. 45. sed in his terris radii ubique bifidi sunt, et folia integerrima.

DIAGN. *Radii quini, debiles, dichotomi. Involucella ovata. Petala quinque rotundata, nitida, flava. Capsula verrucosa.*

Habitat in pratis umbrosis circa Idriam.

Propria huic sunt 1. Folia integerrima, patentia, sessilia, acuminata; oris pellucidis et rubris. 2. Foliorum et radiorum singularis laxitas. 3. Color luteo viridis. 4. Flores omnes pedunculati, steriles plerique, terminalibus exceptis. 5. Lac mite. 6. Florescentia post medium Aprilis.

577. *TITHYMALUS verrucosus*.

Euphorbia umbella quinquefida: bifida; involucellis supra medium ferratis, ovatis; caulis diffusis. *Fl. Carniol.* p. 432. n. 5.

Euphorbia umbella quinquefida; subtrifida; bifida; involucellis subovatis, foliis lanceolatis ferratis, capsulis verrucosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 333. *Spec. Plant.* p. 459. n. 42.

Tithymalus foliis ellipticis, serratis, stipulis umbellariibus quinis; floralibus obtuse quadrangulis; capsulis undique exasperatis. HALL. *Hist.* n. 1052.

DIAGN. *Cespitosa, diffusa, flavescens; gemmis caulinis; radiis lateralibus nullis, terminalis quinis, dichotomis et involucro sensim longioribus fatis.*

Habitat in pratis siccioribus.

Caules multi, teretes, simplices. Folia lanceolata, supra basin denticulata sessilia, deorsum flexa, superne

576. *Tithymalus Pilosus.*

Tab. 21.



ne glabra, albo nervo donata, subtus tenuissimo tomento adspersa. Umbella flava. Involucri folia oblonga, obtusiuscula, supra medium denticulata. Involucella ovata, flavescentia, supra medium denticulata. Radii bis bifidi, nunquam trifidi. LINN. Flores inter primas dichotomias masculi; petalis (2-3) rotundatis. Flores alii fertiles saepius dipetali; staminibus omnibus antheriferis. Germina verrucosa, non pilosa. Lac. mite.

Pustulae miliares flavae foliorum, sterilem plantam saepe faciunt.

578. TITHYMALUS *platyphyllos*.

Euphorbia umbella quinquefida; trifida; dichotoma; involucellis carina pilosis, foliis ferratis lanceolatis; capsulis verrucosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 334. *Spec. Plant.* p. 460. n. 47.

Tithymalus foliis glabris, ferratis, ad caulem breviter acuminatis, sub floribus binis; cordatis; fructu verrucoso. HALL. *Enum.* p. 191. n. 5.

DIAGN. *Umbellae radii (4-9), trifidi, dein bifidi. Involucri primi folia lanceolata, secundi ovata, aliorum subcordata. Flores omnes hermaproditi, pedunculati, tetrapedali. Capsula verrucosa.*

Habitat circa Idriam.

Folia ima deflexa, superiora patentia, lanceolata, serrulata, subtus villosa. Radii alares bifidi; unica ala florifera. Radii umbellae semel trifidi; bis bifidi. Pedunculi tres lineas longi. Petala flava, rotunda. Eadem plantam misit Amicissimus SCHREBERUS.

579. TITHYMALUS *helioscopius*.

Euphorbia umbella quinquefida, trifida; dichotoma, involucellis ovatis petalis subrotundis; Capsulis glabris. *Fl. Carniol.* p. 434. n. 9.

Scopoli *Flora Carn.* T.I.

X

Eu-

Euphorbia umbella quinquefida, trifida; dichotoma; involucellis obovatis; foliis cuneiformibus, ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 333. *Spec. Plant.* p. 459. n. 40. *Fl. Suec.* 2. 425.

Tithymalus non acris; foliis ferratis, rotunde terminatis; radiis umbellae quinis latifissimis. HALL. *Enum.* p. 194. n. 14.

DIAGN. *Radii umbellae quini, longi trifidi, dein bifidi. Petala rotundata, folia et involucra apice dilatata, rotundata et serrulata.*

Habitat in cultis frequens.

Flores omnes fertiles. Petala fusco-viridia, quaterna. Involucella ovata.

580. TITHYMALUS *Efsula*.

Euphorbia umbella multifida; dichotoma; involucellis cordatis; foliis lanceolatis. *Fl. Carniol.* p. 435. n. 10.

Euphorbia umbella multifida: dichotoma; involucellis subcordatis; petalis subbicornibus, ramis sterilibus; foliis uniformibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 334. *Spec. Plant.* p. 461. n. 48.

DIAGN. *Umbellae radii plures, dichotomi. Involucella cordata. Folia lanceolata, glabra.*

Habitat circa Lacum Zirchnizensem.

Caulis glaber, bipedalis. Folia multa. Radii laterales bifidi. Flores in primis dichotomis masculi, caeteri fertiles. Capsula glabra. Calyces sessiles. Lac acerrimum.

581. TITHYMALUS *Paralias*.

Euphorbia umbella multifida: dichotoma; involucellis cordatis; foliis linearibus; capsulis glabris. *Fl. Carniol.* p. 435. n. 11.

Euphorbia umbella subquinquefida: bifida; involucellis cordato-reniformibus; foliis fursum imbricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 333. *Spec. Plant.* p. 458.

p. 458. n. 37. Sed nemo fere quae siturus erit hanc speciem inter EUPHORBIAS quinquefidas.

Tithymalus foliis linearibus, aristatis, imbricatis, stipulis umbellaribus ovato-lanceolatis, floralibus cordatis. HALL. Hist. n. 1055.

DIAGN. Umbellae radii multi. Folia angusta et glauca. Involucella cordata. Capsulae glabrae et erectae.

Habitat ad vias.

Folia patentiuscula, acuminata. Involuci primi folia multa et lanceolata. Folia vero caulina linearia.

§82. TITHYMALUS Cyprissias.

Euphorbia umbella multifida, dichotoma; involucellis cordatis; foliis linearibus; capsulis verrucosis. Fl. Carniol. p. 435. n. 12.

Euphorbia umbella multifida: dichotoma; involucellis subcordatis; ramis sterilibus; foliis setaceis, caulinis lanceolatis. LINN. Synt. Nat. p. 334. Spec. Plant. p. 461. n. 49.

Tithymalus foliis linearibus, stipulis numerosis, floralibus cordiformibus; petalis unatis. HALL. Hist. n. 1047.

DIAGN. Umbellae radii multi, dichotomi. Folia linearia. Involucella cordata. Capsulae verrucosae.

Habitat in siccis et incultis.

Caulis ramosus: ramis patulis, sterilibus, foliosis. Folia obtusa, decidua dum fructus perfecti sunt. Radii bis bifidi. Flores summi hermaphroditi. Petala quaterna, lunata, flavescentia. Capsulae verrucosae.

583. TITHYMALUS *Peplis*.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis, semicordatis, floribus solitariis axillaribus; caulis procumbentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 331. *Sp. Plant.* p. 455. n. 23.

Peplis. CLUS. *Hist.* 6. p. 187.

DIAGN. *Flores solitarii axillares. Caulis procumbens. Folia integerrima, semicordata.* LINN.

Habitat in maritimis Carnioliae.

Caulis teres, rubellus. Folia ovata, basi in uno tantum latere semicordata; oris rubellis. Petala rubra, subrotunda. Capsula glabra; lobis macula nigra verticali. Semina alba.

Ἐυφόρβιον DIOSC. EUPHORBIA PLIN. est ANT-EUPHORBIUM DODON. C. BAUH. CACALIAE Species. LINN.





CLASSIS XII.
ICOSANDRIA.
MONOGYNIA.

195. MYRTUS.

LATIN. LONIC. GESN. TOURN. I. R. H.
p. 640. Tab. 409.

Calyx quinquefidus. Petala quinque. Bacca trilocularis, olivaeformis, coronata: Semina reniformia. TOURN. l. c.

584. MYRTUS *communis*.

Myrtus floribus solitariis; involucro diphyllo. LINN.

Syst. Nat. p. 340. Spec. Plant. p. 471. n. 1.

Myrtus. DU HAMEL. Arbor. II. p. 44. Tab. 9.

DIAGN. *Dicta a LINNAEO.*

Habitat in montibus, non procul Tergesto.

196. PUNICA.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 636. Tab. 407.

Calyx campaniformis. Pomum novem loculare; loculis bipartitis, polyspermiis; seminibus succo, membrana cohercito tectis, solitariis; hinc Pomum seu receptaculum fovenſ baccas tot, quot semina.

585. PUNICA *Granatum*.

Punica. LINN. TOURNEF. CAESALP.

GRONOVI. Comment. Bonon. II. P. 2. p. 39.

Tab. 1—5. DU HAMEL. Arbor. II. p. 193.

Tab. 44.

DIAGN. *Frutex spinosus, floribus magnis elegantiibus Iunio M. ornatus.*

Habitat in montibus Tergeftinis.

Debuisset vocari *Sidas* cum HIPPOCRATE, aut *Granatum*, vocabulo tam Veteribus, quam nunc etiam Gallis, Italos, Germanis, aliisque Europae Gentibus usitato.

197. PRUNUS.

LINN. Gen. Plant. 546.

Calyx quinquefidus, deciduus; Drupa, seu fructus Carnosus, continens nucleum osseum; futuris prominulis marginatum, in PADO et CERASO sphaericum, in PRUNO TOURN. compressum.

586. PRUNUS *spinosa*.

Prunus pedunculis solitariis; foliis lanceolatis, glabris; ramis spinosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 342.

Spec. Plant. p. 475. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 432. *Fl. Carniol.* p. 582. n. 1.

Prunus spinosa; foliis glabris, ferratis, ovato-lanceolatis, floribus breviter petiolatis. HALL. *Hift.* n. 1080.

Prunus sylvestris. MATTH. *Diosc.* p. 196.

Prunus. DU HAMEL. *Arbor.* II. Tab. 40.

DIAGN. *Spinae validae. Pedunculi solitarii, infra gemmas prodeuntes.*

Habitat in sylvis et montibus nostris, non rara.

Segmenta calycina corollis triplo fere breviora. Squamulae tres ovatae, deciduae rufescentes, ad basin pedunculi singuli. Stamina (ad 22). Stylus longitudine staminum. Stigma rotundatum, pulvinatum, flavicans.

Vidi flores masculos hermaphroditis immixtos.

Fur alieni thalami *Cucullus*
Niveis plaudit petalis, at idem
Silet dum *Drupa* sordeſcit atra
polline glauco.

587. PRUNUS *Cerasus*.

Prunus umbellis subpedunculatis; foliis ovato-lanceolatis, conduplicatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 342. *Spec. Plant.* p. 474. n. 8. *Fl. Carniol.* p. 582. n. 2.

Cerasus foliis ovato-lanceolatis, ferratis, inferne subhirsutis; mucrone producto. HALL. *Hist.* n. 1082.

Cerasus. DU HAMEL. *Arbor.* II. Tab. 56.

DIAGN. *Folia oblonga, conduplicata, superne nitida, subtus villosula. Gemma floralis triflora saepius et a foliaceis distincta.*

Habitat in sylvis, propagata a TURDIS et LOXIA Caccotr.

Unguis petali singuli, in uno latere, ferrugineam manlam gerit. Stamina (ad 40). Petioli biglandulosi.

588. PRUNUS *Mahaleb*.

Prunus floribus corymbosis terminalibus; foliis ovatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 341. *Spec. Plant.* p. 474. n. 5.

Cerasus foliis subrotundis, serratis; petiolis multifloris. HALL. *Hist.* n. 1084.

DIAGN. *Flores corymbosi. Calyx plicato-scaber.*

Habitat circa Tergestum et Goriziam.

Petioli sine glandulis. Pedunculi fructiferi, patuli. Flos albus. Antherae luteae.

589. PRUNUS *Padus*.

Prunus floribus racemosis; foliis deciduis, basi subtus biglandulosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 341. *Sp. Plant.*

Plant. p. 473. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 431. *Fl. Carniol.* p. 583. n. 3.

Padus foliis ovato-lanceolatis, ferratis. HALL. *Hist.* n. 1086.

DIAGN. *Flores racemosi. Petioli glandulosi.*

Habitat ad sepes, hinc inde.

DI- et PENTAGYNIA.

198. MESPILUS.

Fl. Carniol. p. 583.

Numerus seminarum, in hoc Genere, luberica nata est. *MESPILUS Chamae Mespilus LINNAEO pentagynus*, mihi cum HALLERO et IACQUINIO digynus. *CRA-TAEGUS Oxycantha LINNAEO digynus*, mihi monogynus. In *MESPILO Cotoneastro LINN.* sunt styli (3 - 5). In *Aucuparia* (3 - 4). Ergo MESPILI characterem naturalem constituent Calycini dentes et petala quinque, stamina quadruplo plura; styli tot, quot locula. *Bacca* infera umbilicata calyce filamentis et stylis persistentibus terminata.

(*) *Spinae; Monogyniae.*

590. MESPILUS Oxyacantha.

Mespilus floribus digynis; foliis obtusis, bitrifidis, ferratis. *Fl. Carniol.* p. 585. n. 5.

Crataegus foliis obtusis, subtrifidis, ferratis. LIND. *Syst. Nat.* p. 342. *Spec. Plant.* p. 477. n. 8. *Fl. Suec.* 2. 434.

Mespilus spinosa, foliis glabris, ferratis, retusis, trifidis. HALL. *Hist.* n. 1087.

Cra-

Crataegus. DU HAMEL. *Arbor.* II. p. 193.

Tab. 79.

Oxyacantha. ROESEL. *Papil. Diurn.* Tab. 3.
fig. 7.

DIAGN. *Arbuscula spinosa. Folia pleraque incisa
et acute lobata.*

Habitat paessim.

Millenos fructus fertiles examinavi, et omnes vidi terminatos unico stylo, unoque officulo foetos. Flores aliqui steriles sunt, et tunc etiam digyni, aut semidigyni.

(***) *Crataegi; digyni.*

591. MESPILUS Aria.

Mespilus floribus digynis; foliis ovatis, subtus tomentosis. *Fl. Carniol.* p. 584. n. 4.

Crataegus foliis ovatis, incisis, ferratis, subtus tomentosis.) LINN. *Syst. Nat.* p. 342. *Spec. Plant.* p. 475. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 433.

Mespilus foliis ovatis, ferratis. subtus tomentosis. HALL. *Hist.* n. 1089.

DIAGN. *Folia ovata, inaequaliter ferrata, subtus tomentosa.* LINN.

Habitat in sylvis.

Bacca bilocularis: loculis monospermis, aut unico dispermio.

592. MESPILUS Chamae Mespilus.

Mespilus inermis; foliis ovalibus, ferratis, glabris; floribus capitatis; bracteis deciduis, linearibus.

LINN. *Syst. Nat.* p. 343. *Spec. Plant.* p. 479. n. 7.

Mespilus foliis ovatis, ferratis, glabris. HALL. *Hist.* n. 1090.

Crataegus foliis ovalibus, acute ferratis, glabris; caule inermi. IACQUIN. *Austr.* p. 86. Obs. 41.

DIAGN. *Folia ovata, serrata, subtus tomentosa, acumine terminata.*

Habitat in sylvestribus *Carnioliae calidioris.*

(***) *Sorbi. Trigyni. et Tetragyni.*

593. MESPILOUS aucuparia.

Mespilus foliis trigynis; foliis pinnatis, glabris. *Fl. Carniol.* p. 584. n. 3. *HALL. Hist.* n. 1091.

Sorbus foliis pinnatis, utrinque glabris. *LINN. Syst. Nat.* p. 343. *Spec. Plant.* p. 477. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 435.

DIAGN. *Folia pinnata; pinnis semisessilibus, lanceolatis, serratis, basi integerrinjs.*

Habitat in sylvis elatioribus.

Bacca rotunda, cinnaberina; umbilico stellato, fovea locula quatuor, prout totidem sunt styli. Ex his loculis saepius unum aut duo vacua sunt, raro tria. In uno loculo quandoque duo semina, nec alia in aliis loculis. Semina crescendo contiguum baccae parietem indurant, et subcartilagineum tandem faciunt, quemadmodum in *Pyro*; ex quo Generum horum limites difficillimi evadunt.

Baccae nutrimentum Pecora et Gallinas, dant etiam succum, e quo Spiritus Vini parari potest.

(****) *Mespili. LINN. Pentagyni.*

594. MESPILOUS Cotoneaster.

Mespilus inermis; foliis ovatis integerrimis, subtus tomentosis. *LINN. Syst. Nat.* p. 343. *Spec. Plant.* p. 479. n. 6. *HALL. Hist.* n. 1093.

DIAGN. *Folia ovata. Subtus lanuginosa. Bacca rubra.*

Habitat in *M. Nanas.*

Variat bacca tripyrena et pentapyrena, hinc stylis tribus et quinque.

595. MESPILUS *Amelanchier.*

Mespilus floribus pentagynis; racemis terminalibus;
foliis ovatis, obtusis, ferratis; caule inermi.
Fl. Carniol. p. 584. n. 2.

Mespilus inermis foliis ovalibus, ferratis; caulinis
hirsutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 343. *Spec. Plant.*
p. 478. n. 4. HALL. *Enum.* p. 352. n. 3.

DIAGN. *Folia ovata, obtusa, ferrata. Bacca caeruleo-nigricans.*

Habitat in montibus nostris.

Bacca coronata dentibus calycinis erectis, rubellis, gla-
bris, 3-5-locularis; loculis dispermiis; semine singulo ope septuli alicuius a socio diviso ita, ut fru-
ctus tot locula habere videatur, quot sunt semina.

596. MESPILUS *Pyracantha.*

Mespilus spinosa, foliis lanceolato-ovatis, crenatis;
calycibus fructus obtusis. LINN. *Syst. Nat.*
p. 343. *Spec. Plant.* p. 478. n. 2.

DIAGN. *Spinosa; fructu punctis ferrugineis pro-
minulis scabro.*

Habitat in sylvis circa Idriam, rara tamen.

Fructus aequae magnus ac in MESPILO *Germanica*.
Semina subovata, compressa. Calycina folia acuta,
non obtusa.

199. PYRUS.

LINN. *Gen. Plant.* 550.

Fructus carnosus, in medio continens lo-
cula quina coriacea, interne polita, in quibus
semen unum aut plura.

597. PYRUS *Azarolus.*

Crataegus foliis obtusis, subtrifidis, subdentatis.
LINN. *Syst. Nat.* p. 342. *Spec. Plant.* p. 477. n. 9.

DIAGN.

DIAGN. *Pomum rotundum. Folia triloba; lobo supremo trilobo.*

Habitat *Tergesti.*

Quicumque fructum examinare voluerit, facile videbit,
in eo locula quina, omnino ut in PYRO.

598. PYRUS communis.

Pyrus foliis ferratis; floribus corymbosifl. LINN.

Syst. Nat. p. 344. Fl. Carniol. p. 580. n. 1.

*Pyrus foliis ovato-lanceolatis, ferratis, glabris.
HALL. Hist. n. 1096.*

DIAGN. *Racemus floralis. Calyx lanuginosus.
Pomum antice dilatum.*

Habitat in sylvis, initio M. Maii florens.

Pedunculi alterni. Calyx ferruginea lana indutus. Folia superne glabra, subtus villosula. Stipulis setaceis,
deciduis, albis.

599. PYRUS Malus.

Pyrus foliis ferratis; umbellis sessilibus. LINN.

Syst. Nat. p. 344. Fl. Carniol. p. 581. n. 2.

Pyrus foliis ovatis, acuminatis, subtus hirsutis; petiolis florigeris brevissimis. HALL. Hist. n. 1097.

DIAGN. *Pedunculi umbellati, tomentosi. Calyces extus glabri, intus lanuginosi, Pomum subrotundum.*

Habitat in sylvis.

Pedunculi ramosi, e foliacea et terminali gemma. Calyx basi rugosus. Antherae ochroleucae. Stylus est columna quinque stylis terminata.

200. SPIRÆA.

LINN. Gen. Plant. 553.

Calyx quinquefidus et persistens sustinet
petala quinque et stamina. Styli et germina
non

600. *Spirea Ulmifolia*.

Tab. 22.*



non in omnibus quina, sed (4-14). Siliculae bivalves.

600. SPIRAEA *Ulmifolia*. Tab. 22. *

DIAGN. *Fruticosa; foliis ovatis, acutis, planis, duplicato-dentatis; corymbis florum terminilibus.*

Habitat circa Idriam, auf den Kobauischen Almen, in dorso septentrionali. Gorizia quoque misit P. WULFEN. in M. Sancto lectam.

Radix repens, longa, lignosa, caulis tres aut quatuor cubitos altus. Petioli alterni, villosuli, modice canaliculati, lineas quinque vix longi. Folia ima minora, subrotunda, obtusiuscula; superiora vero longiora, acutiora; dentata; dentibus denticulatis. Longitudo folii circiter biuncialis, latitudo uncialis, superficies supera glabra, inferna villosula, praesertim circa nervum: Dentes terminat spinula herbacea, parva. Corymbi terminales. Pedunculi uniflori. Calyx glaber, reflexus; segmentis acutis, lineam longis. Petala quina subrotunda, alba obtusa et obiter emarginata, tres lineas fere longa. Stamina inflexa explicantur nuptiarum tempore. Filamenta alba, lineas (3—4) longa, ultra quadraginta in duos ordines distributa, prodeunt inter calycem ut receptaculum, ita ut exterior ordo ex calyce, interior vero hunc inter et receptaculum oriatur. Squamae ad (10) nectariferae, flavescentes, obtusae, erectae, receptaculum ambient. In ima fide calycis iacent germina quinque collecta in capitulum subrotundum. Styli albi, apice dilatati, duas fere lineas longi. Stigmata nulla, sed horum loco papillae. Siliculae apice dehiscentes, uniloculares, bivalves. Semina oblonga teretiuscula (ad 12) in una Silicula. Floret initio Iunii.

Distinctissima species a SPIRAEA *Chamaedrifolia*, aliisque.

601. SPIRAEA *Aruncus.*

Spiraea foliis supra decompositis; spicis paniculatis;
floribus dioicis. LINN. *Syst. Nat.* p. 347. *Spec.*

Plant. p. 490. n. 8. *Flor. Carniol.* p. 552. n. 1.

Filipendula dioica, foliis duplicato-pinnatis; pinnis
quinquefoliis, trifoliis et simplicibus. HALL.
Hist. n. 1134.

Ulmaria floribus in longas spicas digestis. ROYEN.
Lugdb. p. 295.

DIAGN. *Folia supra decomposita. Panicula ma-*
gna, facta spicis longis et albis. Flores dioici.

Habitat in sylvestribus humidisque locis, et ad sepes.

Mas. Infra segmenta calycis gerit coronam glandularum cohaerentium, e quibus stamina prodeunt
(20—22). Germinum et stylorum rudera etiam hic adsunt.

Femina. Possidet Germina (4—5.) stigmata obtusa et extrorsum versa. Capsulas ferrugineas, glabras, retas, nec spirales. Sem. oblonga, rufa utroque apice et uno latere alata, quatuor.

602. SPIRAEA *Filipendula.*

Spiraea foliis pinnatis: foliolis uniformibus, ferratis; caule herbaceo; floribus cymosis. LINN.
Syst. Nat. p. 347. *Spec. Plant.* p. 490. *Fl. Carniol.* p. 552. n. 2.

Filipendula foliis pinnatis, minimis intermixtis, extremitate trilobato. HALL. *Hist.* n. 1136.

Filipendula MATTTH. *Diosc.* p. 571.

DIAGN. *Calyx reflexus etiam antequam petala*
explicantur. Stamina (ad 50). Germina (10-14),
hirsutie scabra.

Habitat in pratis.

Huic calycini dentes et Petala (6). Siliculae non contortae in spiram.

603. SPIRAEA *Ulmaria*.

Spiraea foliis pinnatis; impare maiore, lobato; floribus cymolis. LINN. *Syst. Nat.* p. 347. *Spec. Plant.* p. 490. n. 10. *Fl. Suec.* 2. 440. *Fl. Carniol.* p. 553. n. 3.

Filipendula foliis pinnatis, acute serratis, minimis intermixtis, extrema trilobata, maxima. HALL. *Hift.* n. 1135.

DIAGN. *Stamina* (30). *Germina* (8-10), *spiralia*.

Habitat circa fossas.

Caulis striatus. Folia stipulata: stipulis haemisphaericis, dentatis.

POLYGINIA.

201. ROSA.

THEOPH. PLIN. TOURN. I. R. H. p. 636.
Tab. 408.

Frutex siccus, sterilis soli cupidus, flores elegantes et odoratos Iunio M. proferens, quorum calyx tandem carnofus et ruber evadit, et semina multa, hirsuta, oblonga, angulata, flavescens, ac tuberculo proprio imposita, continet, inferno villosoque parieti adfixa.

FUNGUM et ROSAM quisque noscit, species vero genuinas utriusque generis ne Botanici quidem consummati. Quid calyx, quid figura fructus, quid hirsuties aut glabrities, quid denique spinae valeant in determinandis ROSARUM speciebus, qui plura specimina, eaque in variis regionibus collecta possidet, et invicem conferre voluerit, facile poterit iudicare.

Mihi

Mihi sane Recentiorum observationes minime satisfaciunt, LINNAEANIS ne quidem exceptis, iuxta quas meas ROSAS et si non multas determinare nullo modo licuit. Nihil ergo supererat, nisi Pinax BAUHINI, ex quo nomina desumam, et quae ROSARUM mearum, speciminibus convenire deprehendi, ea etiam adducam, melius esse ratus fateri quod nesciam, quam sententiae subscribere a veritate adhuc alienae.

604. *Rosa (canina) sylvestris vulgatior, flore odorato.* C. BAUH. *Pin.* p. 483. n. 1.

Rosa germinibus ovatis pedunculisque glabris; canale petiolisque aculeatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 348. Petioli inermes erant in *Spec. Plant.* n. 4. Spinosi dein facti, sed neque pedunculi perpetuo glabri sunt, quin potius rigidis villis saepius adspersi, quales etiam basin fructus occupant.

Rosa calycibus semipinnatis; caule aculeato, erecto; ramis multifloris. *Fl. Carniol.* p. 587. n. 4.

Rosa spinis aduncis; foliis septenis; calycibus tomentosis, segmentis pinnatis et semipinnatis; tubis brevissimis. HALL. *Hist.* n. 1101.

DIAGN. *Caules erecti, aculeati, parum ramosi. Folia biuga, duplicato-dentata. Pedunculi multiflori. Calycina segmenta subpinnata. Hispidae spongiae (nidi larvarum Cynipsis) in caulibus aut ramis.*

Habitat ad sepes.

VARIAT. Pedunculis bifloris, trifloris, quinquefloris, in eadem planta.

Fructu ovato, glabro.

ovato, et subrotundo, in eadem planta.
ovato, et ad basin villis rarissimis adsperso.

605. ROSA (*simplex*), odore cinamomi. C. BAUH.
Pin. p. 483. n. 7.

Rosa Cinamomaea; floribus subrubentibus, spinosa.
I. BAUHIN. Hist. II. p. 39.

DIAGN. *Caules ramique aculeati: Petioli et pedunculi inermes. Folia sexiuga, simpliciter dentata: Calycina segmenta alterna, subpinnata. Germen ovatum.*

Habitat in sylvis.

Caules rubri. Folia sature viridia, subtus glabra. Petala rubra; unguibus albis. Calycina folia subtus crassis et capitatis villis adspersa, in margine lanuginosa. Pedunculi glabri. Fructus glabri.

ILL. LINNAEUS vel non habet, vel confundit cum *Pimpinellifolia*, quae est sequens.

606. ROSA (*spinosissima*), campestris, flore albo odorato. C. BAUH. Pin. p. 482. n. 13.

Rosa (*Pimpinellifolia*), germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis, rectis; petiolis scabris. LINN. Syst. Nat. p. 348. sed germina nostra non sunt rotunda.

Rosa spinis rectis, consertis; foliis novenis, glabris; pomis et petiolis subspinosis. HALL. Hist. n. 1106.

DIAGN. *Caulis, rami, petioli, et pedunculi aculeati. Folia sexiuga. Calyces non pinnati.*

Habitat in sylvis.

607. ROSA (*Pumila*) sylvestris, rubens. C. BAUH.
Pin. p. 483. n. 14.

ROSA quarta CLUSII, et pumila EIUSDEM, in *Histor.* hoc commode reduci potest, cum Virgas multis spinis ringentes CLUSIUS appellet. Hanc HALLERUS fine nomine tradidit, cum asterisco, ac si foret varietas alterius speciei.

DIAGN. *Caulis, petioli, et pedunculi spinulis tenuibus hirti. Calyx indivisis. Germen ovatum.*

Habitat in montanis *Carnioliae* calidioris.

Anulus flavus ad basin spinae singulae caulinae. Foliorum paria. (3—4). Petala rubra.

608. ROSA (*Odoratissima*), *sylvestris*, *flore rubro.*
C. BAUH. Pin. p. 483. n. 5.

Rosa (*Cinamomea*), inermis, calycis foliis indivisis, fructu oblongo. LINN. Spec. Plant. p. 491. ex HALLERO; in Syst. Nat. autem, ROSA germinibus globosis, pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinerminibus. Quae determinatio non convenit ROSAE nostrae.

DIAGN. *Caulis inermis. Rami spinosi. Petioli villoso. Fructus subcylindrici.*

Habitat circa *Idriam*, in sylvis.

Caulis ramique rubelli. Foliorum paria (3—4), eaque simpliciter dentata. Bracteae et petioli adspersi villosi rubra glandula terminatis. Foliorum nervi villosuli; villis non capitatis. Pedunculi plerumque uniflori. Petala sature rubra, odorata. Fructus ex rubro viridique varius et admodum longus, pondere proprio demum deflexus.

609. ROSA (*Candida*), *arvensis*. C. BAUH. Pin. p. 484. n. 17.

Rosa (*alba*), caule aculeato; pedunculis laevibus, calycibus semipinnatis, glabris. LINN. Spec. Plant. p. 492. sed cum synonymo BAUHINI improppio.

Rosa foliis et rotundo fructu laevibus; calycis foliis divisib; albo flore. HALL. Enum. p. 349. n. 6. breviter descripta. Sed si fructus rotundi, quare ergo ovati dicuntur a LINNAEO in Syst. Nat.?

DIAGN. *Rami diffusi et stolonibus similes.*

Habitat ad montium radices. Petala magna et alba.
Fructus

Fructus ovati et subrotundi. Pedunculi uniflori et biflori.

610. ROSA (*Repens*), *campestris*, *alba*. C. BAUH.
Pin. p. 484. n. 18.

Cum priore coniungit. I. BAUHINUS.

DIAGN. *Funiculi longi, repentes, foliosi. Calycina folia alterna, subpinnata. Fructus subrotundus.*

Habitat circa Idriam.

Folia triuga; impare aequali. Pedunculi 1-3-flori, villosi; villis rubellis, capitatis. Petala alba. Fructus glaber.

ROSAE in horto transferendae, cicurandae, ut innocentiant notae constantes, nec solo, aut cultura mutabiles, quae e differentiis specificis eliminandae.

Calycis fabrica constantior est figura fructus.

Quae loca a sole minus illustrata sunt, eo Rosae mitiores, et e contra.

Florent omnes eodem tempore.

An unica species a D E O creata, ex qua reliquae omnes dein natae?

202. RUBUS.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 614. Tab. 385.

Calyx quinquefidus, patens. Petala (5), calyce minora. Styli tot, quot germina, quae transeunt in Drupas ovatas, receptaculo communis adfixas et foventes nucem ovalem, scrobiculatam.

611. RUBUS idaeus.

Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque; caule aculeato; petiolis canaliculatis. LINN. Syst. Nat. p. 349. Spec. Plant. p. 492. n. 1. Fl. Suec. p. 445. Fl. Carniol. p. 591. n. 3.

Rubus caule spinoso, subrecto, foliis quinatis, et ternatis, subtus tomentosis, fructibus hirsutis.
HALL. Hist. n. 1108.

Rubus Idaeus. MATTH. Diosc. p. 646. DUHAMEL. Arbor. II. Tab. 56. p. 234.

DIAGN. *Bacca rubra; acinis tenui lanugine pubescentibus.*

Habitat in sylvis.

Apud nos semper inermis. Folia duplicito-dentata, breviter petiolata, oblonga subtus albida; impare maiore. Stamina (ad 60). Receptaculum villosum.

612. RUBUS caefius.

Rubus foliis ternatis, subnudis; lateralibus bilobis; caule aculeato, tereti. LINN. Syst. Nat. p. 349.

Rubus caule aculeato, prostrato; foliis ternatis, subtus hirsutis. HALL. Hist. n. 1110.

DIAGN. *Folia subtus nitidiora. Acini (2-7), ova-les, succo rubro turgidi, plumbeo polline adspersi, ut fructus PRUNI spinosi.*

Habitat ad macerias et sepes.

Caules viminei, debiles. Folia superiora ternata, subracemis triloba; nervis pubescentibus. Petioli aculeati. Pedunculi 1-3-flori, aculeati, villoso; villis rigidis, rubris, capitatis. Nux compressa, subcuneiformis, scrobiculata.

613. RUBUS fruticosus.

Rubus foliis quinato-digitatis, ternatisque; caule petiolisque aculeatis. LINN. Syst. Nat. p. 349. Spec. Plant. p. 493. n. 5. Fl. Suec. 2. 444. Fl. Carniol. p. 591. n. 4.

Rubus caule spinoso, serpente, foliis quinatis et ternatis, subtus tomentosis; bacca laevi. HALL. Hist. n. 1109.

Rubus. MATTHIOL. Diosc. p. 645. DUHAMEL. Arbor. II. Tab. 55. p. 234.

DIAGN.

DIAGN. *Spinosissimus; floribus racemosis: pedunculis patentibus. Calyx fructifer reflexus. Bacca nigra, nitida, glabra; acinis (ad 14).*

Habitat ad sepes et macerias.

Folia inferiora quinata, superiora ternata, suprema simplicia, subtus albo tenuique villo canescens. Bacca primo rubra, dein atra; acinis subrotundis. Nux ovata.

Larvae PHAL. *Bombycis*, defectu *Mori* nutriri possunt huius plantae foliis, sed vilius sericum obtinetur.

614. RUBUS saxatilis.

Rubus foliis ternatis, nudis, flagellis reptantibus, herbaceis. LINN. *Syst. Nat.* p. 349. *Spec. Plant.* p. 494 *Fl. Suec.* 2. 447. *Fl. Carniol.* p. 591. n. 2. IACQUIN. *Austr. Obs.* 42.

Rubus caule herbaceo; foliis ternatis, glabris; acinis baccarum distinctis, paucissimis. HALL. *Hist.* n. IIII.

DIAGN. *Acini rubri, pauci, distincti.*

Habitat in M. *Nanas*. et sylvis *Idriensisibus*.

Stamina (30—40).

203. POTENTILLA.

LUDWIG. *Defin. Gen.* 621. BOEHM. *Fl. Carniol.*

Petioli polyphylli. Calycis persistentis segmenta duplo plura petalis, alterne maiora petala calyci inserta. Stamina calyci imposta (ad 20). Semina triplo certe plura quam stamina, eaque insidentia receptaculo proprio, sicco in *QUINQUEFOLIO* et *TORMENTILLA*, carnosum autem in *FRAGARIA* et *COMARO*. In tanto consensu, proportione, structura, numero, tot partium floris et fructus, quibus natura genera haec mere artificialia in unum

naturale coniungit, quis poterit absque injuria devellere? Si BREYNIA est CAPPARIS, tunc et FRAGARIA erit POTENTILLA.

(*) *Pinnatae.*

615. POTENTILLA Anserina.

Potentilla foliis pinnatis, ferratis; caule repente; pendunculis unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 350. *Spec. Plant.* p. 495. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 452. *Fl. Carniol.* p. 573. n. 2.

Potentilla repens; scapo nudo, unifloro; pinnis plurimis confertis, minoribus intermixtis. HALL. *Enum.* p. 338. n. 2.

Fragaria caule repente, foliis pinnatis, ferratis, subtus tomentosis, petiolis unifloris. HALL. *Hist.* n. 1126.

Potentilla. MATTHIOL. *Diosc.* p. 649.

DIAGN. *Caulis repens. Folia pinnata. Pedunculi uniflori, nudi.*

Habitat iuxta vias humidiores, circa Loitsch, Schenischetz. &c.

616. POTENTILLA rupestris.

Potentilla foliis pinnatis, alternis: folialis quinque, ovatis, crenatis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 350. *Spec. Plant.* p. 496. n. 6. *Fl. Carniol.* p. 573. n. 3.

Potentilla caule erecto, multifloro; foliis septenis, coniugatis, subrotundis, ferratis. HALL. *Enum.* p. 338. n. 1.

Fragaria foliis pinnatis; pinnis septenis, subrotundis, ferratis. HALL. *Hist.* n. 1127.

DIAGN. *Caulis erectus dichotomus. Pinnae ovatae, incisae, Petala alba.*

Habitat inter Lak, et Pellant.

(**) *Pen-*

(**) *Pentaphyllae.*

617. *POTENTILLA Palustris.*

Potentilla calyce colorato, petalis maiori. BOEHM.

Lipf. 425.

Comarum. LINN. *Syst. Nat.* p. 353. *Spec. Plant.* p. 502. *Fl. Suec.* 2. 463. HALL. *Enum.* p. 337. n. 1.

Fragaria foliis pinnatis; petalis lingulatis, minimis. HALL. *Hist.* n. 1128.

DIAGN. *Caules prostrati. Petala ligulata, calyce colorato breviora.*

Habitat in paludibus Labacensibus.

Decumbens, rubra, palustris, gerit calycis lacinias 5-7 maiores, totidemque minores. Petala parva, rubra. Stamina rubra (ad 20). Antheras luteas. Receptaculum carnosum.

618. *POTENTILLA recta.*

Potentilla foliis sexternatis, lanceolatis, ferratis, utrinque subpilosis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 350. *Spec. Plant.* p. 457. n. 10.

Fragaria caule erecto, foliis quinis et septenis, acute ferratis. HALL. *Hist.* n. 1121.

DIAGN. *Erecta, pilosa; foliis profunde dentatis, lanceolatis; petalis amplis aureis.*

Habitat Tergestii, et in Kartschia.

Caulis rubens, albis pilis barbatus. Folia utrinque pilosa, minus tamen quam caulis. Rami e summo caule producent, ac flores in corymbum quasi disponunt.

Alia facies erat POTENTILLAE alterius, pariter rectae, pilosae et flavis petalis instructae, quam vidi in Horto Academicus Vindobonensi, caule plusquam cubitali; foliis inciso-dentatis, et obscuro virore tinctis, qui pallidior est in POTENTILLA nostra; Pedunculis lateralibus, solitariis, longis, unifloris; calycinis follis corolla longioribus dentatisque, quam ideo diversam esse censeo, nec cum nostra specie

confundendam, quae est QUINQUEFOLIUM montanum erectum, hirsutum, luteum GARIDEL. Tab. 83. et PENTAPHYLLUM restringum maius I. BAUHINI.

619. POTENTILLA argentea.

Potentilla foliis quinatis, cuneiformibus, incisis, subtus tomentosis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 350. *Spec. Plant.* p. 497. n. II. *Fl. Suec.* 2. 464. *Fl. Carniol.* p. 575. n. 7.

Potentilla foliis quinatis, angustissimis, subtus tomentosis; caule erecto. HALL. *Enum.* p. 341. n. 19. BOEHM. *Lipf.* 430.

Fragaria caule erecto; foliis quinatis, apice ferratis, subtus tomentosis. HALL. *Hist.* n. 1124.

DIAGN. *Folia subtus, una cum calycibus, tomentosa.*

Habitat in muris circa *Lokopolim*.

Petala sulphurea.

620. POTENTILLA Tormentilla erecta.

Fragaria tetrapetala; foliis caulinis, sessilibus, quinatis. HALL. *Hist.* n. 1117.

Potentilla foliis quinatis; flore tetrapetallo; caule erecto. HALL. *Enum.* p. 341. n. II. *Fl. Carniol.* p. 575. n. 5.

Tomentilla caule erectiusculo; foliis sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 352. *Spec. Plant.* p. 500. n. II. *Fl. Suec.* 2. 459.

DIAGN. *Calyx octofidus. Petala quatuor.*

Habitat in montanis et sylvestribus.

Caulis debilis, plus minus erectus. Petala subcordata; unguibus croceis. Stamina (16). Semina reniformia, thalamo piloso adfixa.

TORMENTILLA differt a **POTENTILLA**, ut **GENTIANA Ciliata**, ab **ASCLEPIADEA**. Monoculum Hominem ab humano genere quis separabit?

621. POTENTILLA verna.

Potentilla foliis radicalibus quinatis, acute ferratis,
caulinis ternatis; caule declinato. LINN. *Syst. Nat.* p. 351. *Spec. Plant.* p. 498. n. 14. *Fl. Carniol.* p. 574. n. 4.

Potentilla foliis quinatis, obtuse in apice ferratis;
petalis cordatis. HALL. *Enum.* p. 340. n. 6.

Fragaria caule decumbente; foliis quinatis, ferratis,
subhirsutis. HALL. *Hist.* n. 1119.

DIAGN. *Folia supra medium dentata. Petala cor data, ad basin crocea macula instructa.*

Habitat in siccis herbidis, et in collibus.

POTENTILLAM *Auream*, HALLERO duce, a *Verna* separat LINNAEUS, ego vero tantam differentiam non invenio, nec dentes foliorum plus minus acuti, aut petalorum magnitudo, vel caulis magis minusve erectus, sufficere mihi videntur, cum habitu, loco natali sicco, figura petalorum, radice et foliis utraque conveniat.

622. POTENTILLA reptans.

Potentilla foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 351. *Spec. Plant.* p. 499. n. 17. *Fl. Suec.* 2. 456. *Fl. Carniol.* p. 574. n. 5.

Potentilla foliis quinatis longe petiolatis, caule repente. HALL. *Enum.* p. 340. n. 9.

Fragaria foliis quinatis, ferratis, petiolis unifloris,
caule reptante. HALL. *Hist.* n. 1118.

Quinquesfolium. MATTH. *Dioct.* p. 650.

DIAGN. *Reptat stolonifera; segmentis calycinis alternis ovato-lanceolatis.*

Habitat circa hortos et vias.

Filamenta (20), in duas series distributa. Interna series stamina alterna longiora possidet.

623. POTENTILLA caulescens.

Potentilla foliis quinatis, apice conniventi-ferratis;

caulibus multifloris, procumbentibus; receptaculis hirsutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 351. 1 AG
QUIN. *Austr.* Obs. 44.

DIAGN. *Caulis erectus, foliosus; foliis apice dentatis.*

Habitat in rupibus.

An vere sit QUINQUEFOLIUM secundum, minus, albo-flore. CLUSII, dubito; cum CLUSIUS ipse fateatur, se ignota describere PENTAPHYLLA, dein QUINQUEFOLIUM Clusianum, teste HALLE-RO, folia gerit apice tridentata, quae in nostro multos dentes habent,

624. POTENTILLA Nitida.

An hanc LINNAEUS intelligat in *Syst. Nat.*, sub nomine POTENTILLAE Nitidae, statuere nequeo.

Quinquefolium primum album. HALL. *Op. Bot.* p. 257. n. 46. esse idem cum nostro certius licet pronunciare, cum Germaniae sylvarum indigenum faciat? An haec etiam POTENTILLA foliis quinatis, palmatis, serratis, sericeis. H. Goettingens, p. 197.?

Quinquefolium album. MATTHIOLI hic pertinere videtur, ob caules petiolis breviores.

Nomen QUINQUEFOLII Lupini folio, argentei, flore albo, RUPPII, nostrae plantae omnino convenit, ob evidentem cum Lupino foliorum similitudinem.

An *Quinquefolium primum, maius, alba flore.* CLUSII? sic mihi videtur.

Differentiam a specie priore constituant.

1. Petioli radicales, longi.
2. Folia apice tridentata, superne fature viridia, et glabra, per siccitatem obscuriora facta, subtus albo denso et sericeo villo fulgida.
3. Caulis debilis, petiolis brevior.
4. Folia caulina integerrima.
5. Petala minora.
6. Receptaculum minus villosum.
7. Lo-

626. *Potentilla Grandiflora*

Tab. 22.



7. Locus natalis in herbidis et sylvestribus locis,
non vero faxosis,

(***) *Triphyllae.*

625. POTENTILLA Vesca.

Potentilla flagellis reptans; foliis ternatis. BOEHM.

Lips. 423. Fl. Carniol. p. 572, n. 1.

Fragaria flagellis reptantibus. LINN. Syst. Nat.

p. 349. Spec. Plant. p. 494. Fl. Suec. 2. 459.

HALL. Enum. p. 343.

Fragaria foliis ternatis, flagellis reptans. HALL.

Hist. n. 1112.

Fragaria, MATTHIOL. Diosc. p. 651.

DIAGN. *Flagella longa, filiformia. Receptaculum carnosum, esculentum.*

Habitat passim in sylvis.

A POTENTILLIS duae notae separant, nempe unusū staminum ordo, et receptaculum carnosum; sex vero coniungunt unanimes; ergo standū pluralitati vocum in foro naturae.

Fructus aquosus, refrigerans.

626. POTENTILLA Grandiflora. Tab. 22.

DIAGN. *Caules diffusi. Folia ternata, utrinque villosa, dentata, oblonga. Petala flava, emarginata.*

Habitat ad radices M. Dull, inter Heidenschafft et Prardt, prope viam publicam, Octobri M. florens.

Planta quinque aut sex digitos transversos longa, non erecta, sed decumbens villis ubique pubescens; foliis ternatis, oblongis; petalis emarginatis, flavis.

Synonyma nulla potius, quam dubia allegare visum est. A POTENTILLA *Grandiflora* LINN. differt petalis, tres lineas longis. A *Norvegica* caulibus diffusis. Dein specimina nostra magis accedunt *Fragariae sterili* VAILLANTIANAE, quam AMMANNIANAE. Nec certus sum esse *Fragariam* foliis ternatis sericeis, etc. Ill. HALLERI cum caulem

caulem huic tribuat erectum, et petala calycem longe superantia. Interim tamen cum Idem *Vir Celeberr.* nullam caulis rationem habeat, eumque in differentia specifica declinatum, in synonymo *Linnaeano* decumbentem, in descriptione vero erectum dicat, et petala ratione loci natalis magnitudine variare possint, non multum errabit, qui ex hac et *Halleriana Fragaria* unicam speciem constitueret.

627. POTENTILLA *subacaulis*.

Potentilla foliis ternatis, dentatis, utrinque tomentosis; scapo decumbente. LINN. *Syst. Nat.* p. 352.

Heptaphyllum alpinum, trifoliatum, fabaudum. BOCON. *Mus.* p. 20. Tab. 9.

DIAGN. *Folia ternata oblonga, apice tridentata, utrinque tomentosa. Caules diffusi.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Folia omnia ternata, conduplicata, ovalia et oblonga. Caules vix biunciales.

204. CARYOPHYLLATA.

FUCHS. CLUS. BAUHIN. TOURN. I. R. H.

p. 294. Tab. 151.

HERMAN. LUDWIG. ADANS.

Calyx et Petala *POTENTILLAE*, sed semina stylo villoso, uncinato caudata; unci apice brevem alium stylum denuo elevante.

628. CARYOPHYLLATA *Urbana*.

Geum floribus erectis; fructu globoso; aristatis uncinatis, nudis; foliis lyratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 332. *Spec. Plant.* p. 501. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 460.

Fl. Carniol. p. 571. n. 1. Folium lyratum; est integrum; oris profunde sinuatis, quale in hac planta non est, sed vere pinnatum.

Caryophyllata pinnis paucioribus rhomboideis; tubarum fine uncinato. HALL. *Enum.* p. 335.

Geum

Geum foliis pinnatis, pinna ultima trilobata; floribus patulis, tubis aduncis. HALL. *Hist.* n. 1130.
Caryophyllata. MATTHIOL. *Diosc.* p. 632.

DIAGN. *A basi folii singuli decurrit per caulem angulus. Flores eretti, flavi, stamina non longiora segmentis calycinis minoribus.*

Habitat circa sepes.

Antherae ad lentem pilis marginalibus instructae. Stylos ruber, glaber.

629. CARYOPHYLLATA *Rivalis.*

Geum floribus nutantibus; fructu oblongo; aristis plumosis, tortis. LINN. *Syst. Nat.* p. 352.
Spec. Plant. p. 501. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 461.

Caryophyllata pinnis frequentioribus, extrema semi-trifida; flore connivente, nutante. HALL.
Enum. p. 336. n. 4.

Geum foliis pinnatis; pinnis acutis, extrema maxima trilobata; floribus conniventibus, nutantibus. HALL. *Hist.* n. 1129.

DIAGN. *Flores penduli. Calyces cylindrici. Petala ereta, emarginata, rubra. Fructus eretti.*

Habitat in pratis humidoribus, montanis.

Calyx villosus, obscure ruber. Petala longitudine calycis, venosa, dilatata. Stamina glabra (95). Antherae luteae. Receptaculum intra calycem pedunculatum. Stylus villosus, cauda longior.

Geum. 2. 3. *Fl. Carniol.* hic pertinet.

630. CARYOPHYLLATA *Montana.*

Geum flore solitario; fructu oblongo; aristatis villosis, rectis. LINN. *Syst. Nat.* p. 352. *Spec. Plant.* p. 501. n. 4.

Caryophyllata pinnis confertioribus; extrema subrotunda; tubis rectis. HALL. *Enum.* p. 337. n. 2.

Geum foliis pinnatis, extrema maxima, rotunde cordata. HALL. *Hist.* n. 1131.

Caryophyllata montana. MATTH. *Diosc.* p. 362.

DIAGN.

DIAGN. *Hirsutum, uniflorum, folii pinna extrema basi cordata, incisa, obtusa, crenata, ovali.*

Habitat in *Alpibus Tolminensibus.*

Flos magnus, erectus, flavus. Stamina dentibus calycinis non longiora.

Melius diceretur *Alpina*, quam *Montana*.

205. DRYAS.

LINN. Gen. Plant. 562.

Calycina segmenta aequalia; et tot, quot Petala. Semina stylo piloso, recto, non uncinato caudata.

631. DRYAS octopetala.

Dryas octopetala; foliis simplicibus. LINN. Syst.

Nat. p. 352. Spec. Plant. p. 501. n. 2. Fl. Suec.

2. 462. Fl. Carniol. p. 570. HALL. Hist. n. 1133.

Fl. Dan. I. Tab. 31. bene.

Chamaedrys montana. CLUS. Hist. p. 551.

DIAGN. *Semperfirens., tespitosa; foliis oblongis, duris, crenatis, basi cordatis, subtus tomentosis; pedunculis unifloris, nudis; flore octopetalo.*

Habitat in Alpibus nostris, non rara.

Pedunculi fructiferi floriferis longiores. Diameter flor. ris uncialis. Seminum caude foliis longiores. Pe- tala alba.



CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.
MONOGYNIA.

206. CAPPARIS.

DIOSC. GESN. TOURN. I. R. H. p. 261. Tab. 139.

Numerus quaternarius foliorum calycis et petalorum. Stylus filiformis. Nostrae fructus carnosus, unilocularis, continens semina multa, reniformia. TOURN. A. C. D. E. F. G.

632. CAPPARIS *spinosa*.

Capparis stipulis spinosis; foliis annuis; pedunculis unifloris, solitariis; capsulis ovalibus. LINN. Syst. Nat. p. 358. Spec. Plant. p. 503. n. 1. GRO-NOV. Orient. 154. HALL. Hist. n. 1077.

Capparis. MATTHIOL. Diosc. p. 417. foliis non bene orbiculatis.

DIAGN. *Stipulae plerumque spinosae. Pedunculi laterales, solitarii, nudi, uniflori, folio longiores.*

Habitat ad muros in Vipultano, Gradiscuta, et Grandisca. P. WULFEN. In muro horti, ad arcem Excell. Comitum Turrianorum Duini.

Rami prostrati, teretes. Folia alterna, integerrima, ovata, petiolis quadruplo longiora, obtusa. Pedunculi teretes, rufescentes, fere horizontales, tandem penduli. Calycina folia ovata, coriacea, integra; in marginibus rufescentibus. Petala rotunda, magna, obtusa, albo-rubella. Stamina rubra (60), petalis longiora, inaequalia. Antherae flavae; polline albido.

bido. Stylus ruber, staminibus longior. Germen ovale, pedunculatum. Stigma parvum, obtusum, claveforme, rubellum.

Iuniora folia rubra sunt.

207. ACTÆA.

PLIN. LINN. *Gen. Plant.* 568.

Differt a CAPPARI stylo nullo; cur ergo removet a familia CAPPARIDUM. Cl. ADANSONIUS nonne et RESEDA disco caret staminifero, etsi cum CAPPARI longe minus adfinis sit, quam *Actaea*?

633. ACTAEA *spicata*.

Actaea racemo ovato; fructibus baccatis. LINN. *Syst.*

Nat. p. 359. *Spec. Plant.* p. 504. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 464. *Fl. Carniol.* p. 317.

Christophoriana. HALL. *Enum.* p. 306.

Actaea foliis circumferratis, duplicato-pinnatis; pin-
nula extrema trilobata. HALL. *Hist.* n. 1076.

Aconitum racemosum. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 660.

DIAGN. *Inter petiolos prodit scapus gerens folia ternata, et racemum ovalem.*

Habitat in sylvis umbrosis.

Pedunculi simplices bractea linearis. Stamina (ad 30)
petalis longiora. Bacca ovata, nigra, unilocularis,
fovens semina (12) in duas series disposita, lineis bi-
nis longitudinalibus albis adfixa. Semina media se-
miorbicularis figurae, dorso plana.

208. CHELIDONIUM.

DIOSC. TOURN. *I. R. H.* p. 231. *Tab.* 116.

Stamina libera; filamentis dilatatis; anthe-
ris pedicellatis. Stigma cordiforme. Siliqua
unilocularis. Semina valvis adpensa.

CHELIDONII adfinitas cum BREYNIA, et SINAPISTRO. TOURN. manifesta est.

634. *CHELIDONIUM maius.*

Chelidonium pedunculis umbellatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 359. *Spec. Plant.* p. 505. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 465. *Fl. Carniol.* p. 314.

Chelidonium lobis foliorum subrotundis. HALL. *Hist. n.* 1059. BOEHM. *Lips.* 305.

DIAGN. *Pedunculi umbellati.*

Habitat passim ad vias et rupes.

Decocto, a nostratis, necantur vermes, qui putridis equorum ulceribus, innascuntur.

209. *GLAUCIUM.*

TOURN. *I. R. H.* p. 254. *Tab. 130.* ADANS. *Fam. Plant.* p. 432.

Siliqua bilocularis; septo spongioso, cui immersa sunt femina ovato-reniformia. Hanc terminat stigma quadrilobum, scyphiforme, quod prius erat lamina stylo adplicata.

Si flos in hoc genere, non vero fructus attendendus est; tunc nec PAPAVER a CHELIDONIO separandum.

635. *GLAUCIUM luteum.*

Chelidonium pedunculis unifloris; foliis amplexicaulis, sinuatis; caule glabro. LINN. *Syst. Nat.* p. 360. *Spec. Plant.* p. 506. n. 2. caulis ad basin glaber est, alibi vero in omni aetate hispidus.

Glaucium foliis tomentosis, imis pinnatis, superioribus ferratis, amplexicaulibus. HALL. *Enum. Plant.* p. 304.

Glaucium foliis radicalibus, semipinnatis, caulinis amplexicaulibus. HALL. *Hist.* n. 1060.

Glaucium flore luteo. TOURN. *Inst.* p. 254.

Papaver corniculatum. CLUSII, MATTHIOLI,
I. BAUHINI &c.

DIAGN. *Folia pinnatifida; segmentis sinuatis et dentatis. Petala colore MERULII CHANTARELLI. Tota planta hispida.*

Habitat Tergesti circa mare. In Adriatici maris littore, non longe a Timavi fonte MATT. H.

Cotyledones glabrae, lanceolatae, has sequuntur duo foliola tridentata petiolata, glabra, dein folia alia sensim hirsutiora et magis dentata, donec pinnatifida appareant; pennis inferiore latere magis sinuatis. Radix rubra, perennis. Caulis teres, dichotomus. Pedunculi laterales, solitarii, foliosi, calyce breviores. Calyx scaber; petalis subaequalibus. Petala subrotunda; unguibus rubellis. Stamina ultra (60). Antherae sessiles, erectae. Stylus foliis concolor. Stigma luteum. Siliqua semipedalis, incurva, aspera.

Calyces nutantes eriguntur die antecedente petalorum explicationem. Petala altera die decidunt.

210. PAPAVER.

LATIN. BRUNFELS. GESN. TOURN. I. R. H.
p. 237. Tab. 119. 120.

Differt a GLAUCIO, stylo nullo, capsula sub stigmate foraminulis dehiscente, et polysperma.

636. PAPAVER Argemone.

Papaver capsulis clavatis, hispidis; caule folioso, multifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 360. Spec. *Plant.* p. 506. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 466.

Papaver foliis hispidis, pinnatis, pennis lobatis, capitulis ellipticis, hispidis. HALL. *Hist.* n. 1061. Papaver erraticum; capitulo hispido. TOURN. *Hist.* p. 238.

Anemone capitulo spinoso. I. BAUH. *Hist.* III. p. 396.

DIAGN.

DIAGN. *Caulis ramosus. Folia pinnata; pinnis inaequaliter bifidis et trifidis. Capsula oblonga, pilis rigidis erectis hispida.*

Habitat in *Agro Gorizieni*. P. WULFEN.

Caulis pilosus. Rami foliosi, multiflori. Foliorum segmenta acuminata. Calyces fere glabri. Petala obsolete rubra. Capsulares pili albo-lutei.

637. PAPAVER *alpinum*.

Papaver capsula hispida; scapo unifloro, nudo, hispido; foliis bipinnatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 360, *Spec. Plant.* p. 507. n. 3.

Papaver nudicaule, foliis pinnatis, pinnis integris et divisis, capitulis subrotundis hispidis. HALL. *Hist.* n. 1062.

DIAGN. *Scapi uniflori, subradicales, nudi. Folia pinnata; pinnis pinnatifidis. Capsula pilosa, stigma pentagono coronata.*

Habitat in *Alpibus*.

VAR. 1. *Flore flavo.*

Papaver perenne, pilis rigidissimis; foliis pinnatis, flore luteo, hirsuto. HALL. *Enum.* p. 304.

Papaver alpinum. SEGUIER. *Veron.* I. p. 416. Tab. 4. fig. 4.

Papaver erraticum, nudicaule; flore flavo, odorato. DILLEN. *H. Elth.* Tab. 224.

Habitat in ruiris M. Greben.

Huic hirsuties non tanta. Segmenta foliorum tenuiora et longiora; ultimo trifido. Stamina (60-70).

2. *Flore albo.*

Varietatis huius meminit. Ill. HALLE-RUS in *H. Goetting.* p. 88.

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*, prope Pastorum casas.

Maior et villosior planta; foliis pallidioribus;

pinnis omnibus trifidis et latioribus; petalorum unguibus virescentibus.

Figura SEGUIERII, hanc potius indicat; nam lutea varietas pinnas sessiles et incisas non habet.

638. PAPAVER *Rhaeas.*

Papaver capsulis glabris, globosis; caule piloso, multifloro; foliis pinnatifidis, incisis. LINN. *Syst. Nat.* p. 360. *Spec. Plant.* p. 507. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 468. *Fl. Carniol.* p. 314.

Papaver foliis hispidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato, laevi. HALL. *Hist.* n. 1063.

Papaver erraticum. MATTTHIOL. *Diosc.* p. 670.

DIAGN. *Caulis ramosus, una cum foliis pinnatifidis pilosus. Capsulae glabrae, oblongae potius, quam sphaericae.*

Habitat in arvis.

Petala magna, pulchre rubentia.

211. NYMPHAEA.

LINN. *Gen. Plant.* 579.

Calyx persistens. Petala multa. Styli nulli. Fructus coronatus stigmate plano, radiato: radiis tot, quot locula, ut in PAPAVERE. Cur ergo adfinis nunc fit ASARO, TAMO etc.?

639. NYMPHAEA *lutea.*

Nymphaea foliis cordatis, integerimis; calyce magno, pentaphyllo. LINN. *Syst. Nat.* p. 361. *Spec. Plant.* p. 510, n. 1. *Fl. Suec.* 2. 469. *Fl. Carniol.* p. 315. n. 1.

Nymphaea calyce pentaphyllo, petalis maiori, fructu conico. HALL. *Hist.* n. 1066.

DIAGN. *Calyx pentaphyllus. Petala flava. Fructus pyriformis.*

Habitat in Lacu Zirchnicensi, Veldensi, et in fossis maioribus Labacensisibus.

Stigma

Stigma Agaricino pileo concavo simile, et decem radiatum.

Lacus Zirchnizenis, antiquis *Lugeus*, *Lugeaque palus*, qualibet aestate exsiccatur refluenteribus aquis in antra octodecim subterranea, et denuo brevi renascitur inde denuo erumpentibus undis ex cryptis praecipue *Sekadulze*, *Urainaiamma* et *Oberch*, e quibus simul ingens copia piscium et anatum exit. Hinc in eodem loco piscatura, venatio, messis, natura mirante.

640. NYMPHAEA alba.

Nymphaea foliis cordatis, integerrimis; calyce quadrifido. LINN. *Syst. Nat.* p. 361. *Spec. Plant.* p. 510. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 470. *Fl. Carniol.* p. 316. n. 2.

Nymphaea calyce tetraphyllo, petalis minori, fructu rotundo. HALL. *Hift.* n. 1267.

Nymphaea alba. MATTH. *Diosc.* p. 584.

DIAGN. *Calyx ad basin usque quadrifidus. Fructus globosus.*

Habitat cum priore.

Plenitudo floris naturalis.

212. TILIA.

PLIN. BRUNFELS. TRAG. DODON. TOURN.
I. R. H. p. 611. *Tab. 381.*

Calyx pentaphyllus, deciduus. *Capsula quinquelocularis*, basi dehiscens. LINN. *unicularis* LUDW. *Semina solitaria* LINN. 1-2. in uno loculo ADANS. *Ligula foliacea* ad pedunculum LUDWIG.

641. TILIA platyphyllos.

Tilia floribus nectario destitutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 363. *Spec. Plant.* p. 514. *Fl. Suec.* 2. 471. *Fl. Carniol.* p. 313. differentia comprehendens utramque speciem.

Tilia foliis amplioribus, mollibus, subhirsutis. HALL.
Enum. p. 357. n. 1.

DIAGN. *Folia magna, subhirsuta.*

Habitat in sylvis.

Citius floret, et folia perpetuo magna, molliora, et
subvillosa profert.

642. TILIA *Ulmifolia.*

Tilia folio glabro, duriori, minori. HALL. Enum.
p. 358. n. 2.

DIAGN. *Folia duriora, minora, nullibi villosa.*

Habitat cum priore, sed rarer.

Serius floret, duabus et tribus hebdomadis; ut diversa
omnino videatur.

Tiliae flores apibus grati. Cortex praebet pallia pasto-
ribus nostris, et tegumenta mercium Ruthenicis.
Ligno pictores carbonem parant pro delineationibus.
Eodem utuntur artifices libentissime, cum vermes
non facile admittat. Folia inserviunt pabulo peco-
rum. Vis antiepileptica florum et horum aquae ima-
ginaria.

213. CISTUS.

LINN. Gen. Plant. 598.

Calyx persistens, pentaphyllus; foliis duo-
bus maioribus. Petala flaccida, papaveracea.
Capsula trigona, trivalvis. Semina rotundata,
pedicellata, angulis adfixa.

Solus numerus loculorum capsulae, na-
turale genus non constituit, nec lacerari debet.

643. CISTUS *salvifolia.*

Cistus arborescens, exstipulatus, foliis ovatis, pe-
tiolatis, utrinque hirsutis. LINN. Syst. Nat.
p. 366. Spec. Plant. p. 524. n. 7. GRONO V.
Orient. 167.

Cistus

Tab. 23.

645. *Cistus Alpestris.*

Rein Sc. A. V.

Cistus fructicosus, foliis petiolatis, ovatis, rugosis, serratis. HALL. *Hist.* n. 1031.

Cistus folio salviae. C. BAUH. *Pin.* p. 464.

Cistus femina. CLUS. *Hist.* I. p. 60. MATTI. *Diosc.* p. 141. ramus sine flore. I. BAUHIN. *Hist.* II. p. 4.

DIAGN. *Frutex; pedunculis unifloris, bis bibracteatis; capsulis quinquelocularibus.*

Habitat circa *Tergestum*, Maio florens.

Lignum durissimum. Folia elliptica, subtus magis hirsuta. Rami lanuginosi, rubelli. Folia calycina tria exteriora cordata. Petala alba, unguibus luteis. Par unum bractearum ad basin pedunculi, aliud infra medium. Stamina (140). Capsula subrotunda, pentagona, villosa, terminata ferrugineo fungosoque stigmate. Semina in uno loculo (ad 16), hinc gibba, inde planiuscula, subovata.

644. *CISTUS Fumana.*

Cistus suffruticosus, procumbens, exstipulatus; foliis alternis, linearibus; margine scabris; pedunculis unifloris. LINN. *Syst. Nat.* p. 367. *Spec. Plant.* p. 525. n. 11. *Fl. Suec.* 2. 474.

Helianthemum, foliis alternis, angustissimis. HALL. *Enum.* p. 359. n. 5.

Cistus foliis duris, consertis, linearibus, petiolis unifloris; calycibus glabris. HALL. *Hist.* n. 1032.

Helianthemum tenuifolium. I. BAUH. *Hist.* II. p. 18.

DIAGN. *Folia linearia, alterna, fine stipulis. Pedunculi uniflori. Calyces villosuli.*

Habitat in montibus *Vipaccensis* et *Goriziensis*.

Suffrutex procumbens. Caules semipede raro longiores. Pedunculus prope apicem caulis. Petala flava. Stamina castrata non invenio, nec capsulam sexlocularem.

645. *CISTUS Alpestris.* Tab. 23.

Cistus suffruticosus, procumbens, exstipulatus; foliis

liis oppositis, pilosis, ciliatis; floribus racemosis. IACQUIN. Austr. p. 93. Obs. 45.

Cistus caulis duris, procumbentibus, foliis subhirsutis, ellipticis, coniugatis; petiolis unifloris, confertis, calycibus tomentosis. HALL. Hist. n. 1034.

DIAGN. *Exstipulatus, alpinus, pilosus; foliis obtusis, ellipticis.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus.*

Confundi non debet cum CISTO cano, quem bene nosco, ob folia lanceolata, acuminata, utrinque cana. Dubitabam an CISTUS iste sit vere *alpestris* Cl. IACQUINII, sed viis speciminibus nostris, omne dubium abstersit *Doctissimus Amicus.*

646. CISTUS Tomentosus. Tab. 24.

Helianthemum foliis superne pilosis, inferne tomentosis. HALL. Enum. p. 359. n. 3. 4.?

Cistus caulis duris procumbentibus, foliis ellipticis hirsutis, inferne tomentosis; petiolis confertis unifloris; calycibus tomentosis. HALL. Hist. n. 1035.

Helianthemum alpinum; foliis Pilosellae minoris. FUCHSII. I. BAUH. TOURNEF. SEGUIERII. Veron. Suppl. p. 196. n. 5. sed minor plantam alpinam et aridi soli cupidam crescere in fossis Veronensibus.

DIAGN. *Folia superne villosa, subtus tomentosa; stipulis longitudine calycis.*

Habitat in Alpibus nostris.

Suffruticosus, erectus, caules habet semipedales simplices. Folia ima elliptica, superiora lanceolata, acuminata. In summo caule flores (4-5), magni, flavi.

Eandem plantam vidi in *Alpibus Tyrolensis.* Ann. II. Hist. Nat. p. 53.

Tab. 24.

646. *Cistus Tomentosus.*



Tab. 25.

648. *Cistus Grandiflorus.*



Rein Sc. A. V.

647. CISTUS canus.

Cistus suffruticosus, procumbens, exstipulatus; foliis oppositis, villosis subtus tomentosis; floribus subumbellatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 367. *Spec. Plant.* p. 525. n. II. IACQUIN. *Austr.* p. 93.

DIAGN. *Stipulae nullae. Folia lanceolata, utrinque tomentosa, superne albis raris et prostratis pilis adspersa.*

Ex montanis Carnioliae calidioris, ad me delatus.

Caules antiqui procumbunt, nudi, foliosi vero et floriferi eriguntur. Calyces tomentosi. Pedunculi effummis, iisque subnudis ramis (1—3), umbellati, quatuor linearum longitudinem raro superantes.

CISTUS Marifolius a Cl. SCHREBERO communicatus folia gerit *CISTI cani*, subtus magis tomentosa, oblonga, corollas vero *CISTI alpestris*. An ergo *CISTUS alpestris*, *canus*, *marifolius*, unica species?

648. CISTUS Grandiflorus. Tab. 25.

Helianthemum alpinum, *vulgari simile*; foliis latioribus. SE GUIER. *Veron. Suppl.* p. 193. Tab. 6. fig. 1.

DIAGN. *Folia lanceolata, utrinque villosa, acuminata; stipulis calyce longioribus.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis suffruticosus, villosus, semipedalis circiter. Folia uncialia. Flores racemosi. Pedunculi et Calyces villosi. Folia calycina minora, linearia, alia duplo longiora. Petala flava rotundata, semiunciam fere longa.

Spiculae in figura SEGUIERII nimis parvae. Difert ab *Helianthemo* tota facie, flore, spicularium longitudine, duritie foliorum.

649. CISTUS *Helianthemum*.

Cistus suffruticosus, procumbens; stipulis lanceolatis; foliis oblongis, revolutis, subpilosis. LINN.
Syst. Nat. p. 368. *Spec. Plant.* p. 528. n. 26. *Fl. Suec.* 2. 473. *Fl. Carniol.* p. 312. n. 2.

Helianthemum foliis subhirsutis, omnibus longe ellipticis. HALL. *Enum.* p. 358. n. 1.

DIAGN. *Folia subhirsuta, oblonga, revoluta; stipulis calyce brevioribus.*

Habitat in saxosis et aridis.

Ergo vere diversus a specie priore.

DIGYNIA.

214. POEONIA.

PLIN. TOURN. *I. R. H.* p. 273. *Tab. 146.*

Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Styli nulli. Siliquae hirsutae binae et ternae, longitudinaliter dehiscentes, polyspermae. Semina nigerrima, nitida. HALL. fere globosa. TOURN. Radix tuberosa. LUDW.

650. POEONIA *officinalis*.

Poeonia foliolis oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 370.
Spec. Plant. p. 530.

Poeonia radice glandulosa; foliis duplicato-pinnatis; pinnis ellipticis, et trilobis. HALL. *Hij.* n. 1187.

DIAGN. *Folia decomposita: foliolis lanceolatis, acuminatis, sessilibus, decurrentibus, acuminatis, lobatis et simplicibus.*

Habitat circa Prardt, in M. Nanas.

Folia prima educunt tres petiolas, quorum unus gerit unicum folium, alii vero bina; omnia ovata et obtusa.

tusa. Sub calyce est folium unum et duo. Petala (6—7). Filamenta purpurea. Antherae flavae. Stigmata sunt unguis fusci, flavo margine instructi.

TRIGYNIA.

215. DELPHINIUM.

DIOSC. TOURN. I. R. H. p. 426. Tab. 241.

Nectarium floris bifidum, caudam demittens vaginatam calcare petali supremi. ADANS. Nectarium hoc corollam et petala, caetera calycem vocat.

651. DELPHINIUM *Consolida*.

Delphinium nectariis monophyllis; caule subdiviso.

LINN. *Syst. Nat.* p. 370. *Spec. Plant.* p. 530.

n. 1. *Fl. Suec.* 2. 475. *Fl. Carniol.* p. 548.

Delphinium radice fibrosa; foliis tenuissime divisis.

HALL. *Enum.* p. 314. n. 1.

Delphinium unifiliuum, caule brachiato diffuso, floribus sparsis. HALL. *Hist.* n. 1203.

DIAGN. *Nectarium monophyllum, caulis subdivisus.* LINN.

Habitat in agris et hortis.

652. DELPHINIUM *Staphisagria*.

Delphinium nectariis tetraphyllis, petalo brevioribus;

foliis palmatis, lobis obtusis. LINN. *Syst.*

Nat. p. 371. *Spec. Plant.* p. 531. n. 6.

Habitat in *Istria*. MATTHIOL. Ego nondum inveni, quae tamen, sub hoc nomine in *Horto Academico Vindobonensi*, a me visa fuit planta, foliorum lobos acuminatos habebat, nec obtusos.

216. ACONITUM.

DIOSC. TOURN. I.R.H. p. 424. Tab. 239. 240.

Corolla nuda, ut in DELPHINIO, sed petalum supremum galeae simile, nectaria bina fistulosa et pedunculata.

653. ACONITUM *lycoctonum*.

Aconitum foliis palmatis, multifidis, villosis. LINN.

Syst. Nat. p. 371. *Spec. Plant.* p. 532. n. 1. *Fl.*

Suet. 2. 476. *Fl. Carniol.* p. 549. n. 1. HALL.
Enum. p. 312. n. 1.

DIAGN. *Galea apice dilatata, caeteris petalis duplo longior. Stamina (ad 26.)*

Habitat ad sepes et prata.

Corollae galea recta, rugosa, Nectarium obtusum, integrimum, decurrens per tortilem pedunculum. Germina glabra, tria.

654. ACONITUM *Napellus*.

Aconitum foliorum laciniis linearibus, superne latioribus, linea exaratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 371.

Spec. Plant. p. 532. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 477. *Fl. Carniol.* p. 550. HALL. *Enum.* p. 312. n. 2.

Napellus MATTHIOL. *Diosc.* p. 690.

DIAGN. *Nectarium galeaeforme, basi bifidum. Capsulae cylindricae, venis reticulatae.*

Habitat in sylvis Alpestribus, circa rivos.

Folia ad basin usque trifida: lobo medio bis trifido; laciniis linear - lanceolatis. Galea falcata, rostrata. Stamina (ad 30). Nectaria apicibus non spiraliter convolutis. Capsulae tres facciformes, viridibus, ramosisque venis reticulatae. Seminum series binae. In qualibet serie semina (5 — 6), cuneiformia, epidermide plicata tecta.

Stupenda huius aevi metamorphosis huius plantae est, ex infami veneno in optimam medicinam.

655. ACONITUM *Anthora*.

Aconitum floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 371. *Spec. Plant.* p. 532. n. 5.

Aconitum foliorum laciniis linearibus, ubique eiusdem latitudinis. HALL. *Enum.* p. 313. n. 4.

Anthora. RIVINI. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 660.

DIAGN. *Corolla hirsuta*. *Galea rostrata*. *Stamina ultra* (50). *Germina* (5) *villoso*.

Habitat in montanis *Kartschiae*.

Galea arcuata. *Corolla pallide lutea*.

PENTAGYNIA.

217. AQUILEGIA.

TRAG. TOURN. I. R. H. p. 428. Tab. 242.

Petala decem; alterna infundibuliformia et pone in coecum cornu attenuata. Paleae totidem canaliculatae, quarum singula excipit stamina (5-6). Capsulae uniloculares, bifidae.

656. AQUILEGIA *vulgaris*.

Aquilegia nectariis incurvis. LINN. *Syst. Nat.* p. 372.

Spec. Plant. p. 533. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 478. *Fl. Carniol.* p. 550.

Aquilegia foliis trilobatis, lobis petiolatis, tripartitis, obtuse dentatis. HALL. *Hist.* n. 1195.

DIAGN. *Foliola rotunde lobata*, *Thalictroidaea*. *Petala alterna incurvo cornu praedita*.

Habitat in montanis et sylvestribus, non rara.

Cornu obtusum, sub capitulum. Palea una continet stamina quinque, altera sex stamina eo longiora, quo germinibus propiora. Filamentorum orae membranaceae et corrugatae.

Flores Carniolici plerumque hexagyni.

218. NIGELLA.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 258. Tab. 134.

Petala quinque. Nectaria trifida totidem. Capsulae introrsum connexae. Nectaria octo, LUDWIG. bilabiata intra corollam. Capsulae 5-10 connexae. GLEDITSCH.

657. NIGELLA *arvensis*.

Nigella pistillis quinis; petalis integris; capsulis turbinatis. LINN. Syst. Nat. p. 372. Spec. Plant. p. 534. n. 3.

Nigella flore nudo; siliquarum cornubus longissimis. HALL. Hist. n. 1194.

Melanthium sylv. II. MATTHIOL. Diosc. p. 528.

DIAGN. Flores pentagyni. Petala integra. Capitulum foliaceum subflore nullum.

Habitat in agris Tergestinis, et Goriziensibus.

Petala albo-viridia.

POLYGYNIA.

219. ANEMONE.

LINN. Gen. Plant. 614.

Involucrum triphyllum erigit pedunculum unum aut plures. Corolla nuda. Nectaria nulla. Semina nuda, receptaculo adfixa, multica in HEPATICA GALEN. et ANEMONE TOURN.; caudata in PULSATILLA TOURN.

(*) Seminibus ecaudatis.

658. ANEMONE *Hepatica*.

Anemone foliis trilobis, integerrimis. LINN. Syst. Nat. p. 374. Spec. Plant. p. 538. n. 1. Fl. Suec. 2. 480. HALL. Hist. n. 1156.

He-

Hepatica. LINN. *Fl. Carniol.* p. 567.

DIAGN. *Folia aequitribola. Pedunculi folia praecedentes. Involucrum triphyllum.*

Habitat in *Humo sylvarum.*

Folia subcoriacea ACERIS Monspecculani. Stamina (46).

Antherae septum coloratum, locula lateralia. Germina (ad 31). Receptaculum hemisphaericum, villosum.

659. ANEMONE *trifolia.*

Anemone foliis ternatis, ovatis, integris, ferratis; caule unifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 375. *Spec. Plant.* p. 540. n. 13. *folia, in his terris, nunquam ovata sunt.*

DIAGN. *Folia terna: ternata, ut in DENTARIA enneaphylla. Pedunculus uniflorus, hexapetalo alboque flore terminatus.*

Habitat in *sylvestribus, non rara, florens sub finem Aprilis.*

Caulis teres. Petioli ad basin sanguinei. Folia oblonga, concava, subtus nitidula et rubore aliquo tincta, dentata. Petala elliptica. Germina (22), albo villo pubescentia. Stamina alba, ultra centum.

660. ANEMONE *nemorosa.*

Anemone seminibus acutis, petalis ellipticis, foliis ferratis. *Fl. Carniol.* p. 567. n. 1.

Anemone seminibus acutis; foliolis incisis, caule unifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 375. *Spec. Plant.* p. 541. n. 15. *Fl. Suec.* 2. 485.

Anemone seminibus nudis, caule unifloro, foliis radicalibus nullis, caulinis quinque partitis, lobis tripartitis, incisis. HALL. *Hist.* n. 1154.

Ranunculus sylvarum. CLUS. *Hist.* p. 247.

DIAGN. *A priore differt staminibus (60-65.) antheris flavis, foliis incisis et crenatis.*

Habitat in pratis sterilioribus et muscosis, circa medium Martii florens.

Foliolum medium trilobum, lateralia biloba, nullum decurrens per petiolum. Petala sena et alba. Antherae, effuso polline, tetragonae. Germina (ad 40). Styli recti. Stigmata pellucida, globosa. Receptaculum ovatum, villosum.

661. ANEMONE ranunculoides.

Anemone feminibus acutis; petalis subrotundis, foliis crenatis. *Fl. Carniol.* p. 568. n. 2.

Anemone feminibus acutis; foliolis incisis; petalis subrotundis; caule subbifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 375. *Spec. Plant.* p. 541. n. 17. *Fl. Suec.* 2. 486.

Anemone biflora, feminibus nudis; foliis radicalibus nullis; caulinis quinquepartitis; lobis tripartitis, incisis. HALL. *Hist.* n. 1153.

DIAGN. *Petala ovata, flava. Germina glabra. Styli reflexi.*

Habitat cum priore.

Involucrum 1-3-florum. Petala, apud nos, saepe sena.

662. ANEMONE Alpina. Tab. 26.

Anemone feminibus lanatis, foliis caulinis ternatis, triplicato-trifidis, lobulis lanceolatis, acute trifidis et bifidis. HALL. *Hist.* n. 1151.

Anemone IV. C. BAUH. *Prodrom.* p. 94? sed inter *Anemones caudatas* ponitur a LINN.

DIAGN. *Folia radicalia, composita; pinnis sessiliibus, incisis: segmentis lanceolatis. Germina latata, glabro stylo terminata.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Petioli prodeunt e vaginis striatis; striis tribus ferrugineis, et in tres ramos dividuntur denuo divisos: ramo quolibet ultimo sustinente folia tria, semiuncialia, laciniata, subtus villosula. Caulis vix semipedalis, villosus, teres. Foliola involuci prodeunt evagina foliacea, triphylla. Petala sena, albo-luteola, oblonga. Stamina lutea. Styli fuisci, non villosi, germinibus breviores.

(**) Se

Tab. 26.

662. *Anemone Alpina*.



(**) *Seminibus caudatis.*

663. *ANEMONE Apiifolia.*

Anemone tubis caudatis; foliis omnibus duplicato-pinnatis; pinnulis confertis; luteo flore. HALL.
Enum. p. 332. n. 6.

DIAGN. *Folia radicalia decomposita, tria. Semina longis et plumosis tubis caudata.*

Habitat in *Alpibus Vochinenibus.*

Specimen quod coram habeo, radicem in duos ramos divisam habet, quorum unus gemmam foliaceam, alter caulem floriferum effert. Folia prodeunt ex vaginis striatis, sanguineis, villosis, petiolis basi pariter sanguineis. Petiolus medius dividitur in tres ramos, denuo trifidos: pinnis sessilibus, ternis: terminali profunde trifido; segmentis acutis. Caulis semipedalis, alba lanugine pubescens, teres, basi ruber. Petala oblonga, sena, flava, venulis dichotomis obscurioribus lineata. Seminum caudae unciales, plumosae.

664. *ANEMONE burseriana.*

Anemone foliis caulinis ternis, connatis, supradecompositis, multifidis; seminibus hirsutis, caudatis.

LINN. *Syst. Nat. p. 375. Spec. Plant. p. 539. n. 8.* sed haec differentia priorem etiam indicat.

Anemone foliis triplicato-pinnatis, acute circumser- ratis, caulinis ternatis, tubis caudatis. HALL.
Hist. n. 1149.

Pulsatilla IV, TABERNEM. p. 81.

DIAGN. *A priore diversa est. 1. Caule et foliis supradecompositis ex eodem loco radicis. 2. Horum basibus lanuginosis. 3. Vaginis foliorum involucri non emarginatis. 4. Caudarum apicibus reditis et imberbibus, qui in priore incurvi et villo-suli sunt.*

Habitat in Alpibus cum priore, sed rarior.

Scopoli Flora Carn. T. I.

Bb

Optime

Optime distinxit HALLERUS, divisiones vero foliorum ad MYRHIDIS *sylvestris* folia accedere bene monuit I. BAUHINUS, et si ibidem figuram LYCHNIDIS *cuculi* supposuerit incautus Editor.

665. ANEMONE *Pulsatilla*.

Anemone seminibus caudatis; petalis lanceolatis, rectis; foliis bipinnatis. *Fl. Carniol.* p. 568.

Anemone pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 375. *Spec. Plant.* p. 539. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 481.

Anemone tubis caudatis, involucris unifoliis, multifidis, foliis linearibus, hirsutis, duplicato pinnatis; pinnis tripartitis, et quadripartitis. HALL. *Hist.* n. 1146.

DIAGN. *Involucri laciniae lineares, lanuginosae. Pedunculus lanuginosus. Petala violacea, erecta, subtus lanata.*

Habitat in montanis *Carnioliae* calidioris.

CERAMBYX Fur LINN. in hortis siccis, **ANEMONEM** et **CLEMATIDEM**, non facile aggreditur.

220. ATRAGENE.

LINN. *Gen. Plant.* 615.

NARAVEL. HERMAN. ADANS. *Famil. Plant.* p. 460.

Genus arbitrarium est; differt enim a CLEMATIDE staminibus exterioribus in nectaria lanceolata triloba emarginata et integra degenerantibus, qualem metamorphosin etiam observo in CLEMATIDE *vitalba*. Monstra haec staminea LINNAEUS petala vocat, corollam vero pro calyce sumit. Stamina in petala degenerare demonstrat etiam NYMPHAEA.

666. ATRA-

666. ATRAGENE *Austriaca*.

Atragene foliis duplicato-ternatis; caule fruticoso, scandente. IACQUIN. *Austr.* p. 98. Obs. 46.

DIAGN. *Sarmentosa* PON. *foliolis ternis, inciso-dentatis, ovato-lanceolatis, semisessilibus.*

Habitat in montanis nostris non rara.

Confundi non debet cum ATRAGENE altera, cubitali, herbacea, quam vidi in Comitatu Tyroliensi, nec cum CLEMATI *cruciata alpina* CLUSII. Character et habitus huius plantae est omnino CLEMATIS. Melius vero diceretur *Pannonica*, cum non solam *Austriam*, sed et alias regiones inhabitet.

221. CLEMATIS.

DIOSC. PLIN. TOURN. I. R. H. p. 291. Tab. 150.

Corolla nuda, tetrapetala. Semina nuda, caudata. Involucrum nullum.

667. CLEMATIS *recta*.

Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis; caule erecto; floribus pentapetalis, tetrapetalisque. LINN. *Syst. Nat.* p. 377. *Spec. Plant.* p. 544. n. 8. *Fl. Carniol.* p. 569. n. 1. Clematis caule erecto, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 1144.

DIAGN. *Folia pinnata, oblonga, integerrima; acuminata terminata. Pedunculi triflori.*

Habitat in locis sterilibus et apicis.

Petala alba, lanceolata, obtusa, lanuginosa. Stamina non ultra (30). Antherae glabrae. Germina (6-8).

668. CLEMATIS *inclinata*.

Clematis (*integrifolia*) foliis simplicibus, ovato-lanceolatis; floribus cernuis. LINN. *Syst. Nat.* p. 377. *Spec. Plant.* p. 544. n. 9.

Clematis Pannonica. CL U.S. Hist. p. 123. I. BAUHIN. Hist. II. p. 229.

DIAGN. *Erecta; foliis sessilibus, oblongis, integris; corollis nutantibus.*

Habitat circa Duinum et in Aquileiensi solo.

Folia duo suprema, antequam corolla explicata fuerit, erecta, carinata, sese contingentia, oblongam vesicam repraesentant. Stamina pilosissima, petalis caeruleis et lanceolatis duplo breviora.

669. CLEMATIS *Vitalba.*

Clematis foliis pinnatis; foliolis cordatis, integris, scandentibus. LINN. Syst. Nat. p. 376. Spec. Plant. p. 544. n. 5. Fl. Carniol. p. 569. n. 2.

Clematis caule scandente, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis, petalis coriaceis. HALL. Hist. n. II⁴².

DIAGN. *Folia pinnata, triunga; foliolis subcordatis. Racemi florales foliosi, basi tuberosi, subpetiolis nascentes. Semina in seram hyemem persistentia.*

Habitat in montibus et ad sepes.

Caulis octangulus. Racemi patentes; ramis trifloris. Stamina (60 — 65). Flos albus. Semen ellipticum, lateralibus minime obtusis.

670. CLEMATIS *Viticella.*

Clematis foliis compositis, decompositisque; foliolis ovatis, sublobatis, integerrimis. LINN. Syst. Nat. p. 376.

DIAGN. *Folia integerrima, ternata; terminali undente utrinque instructo; lateralibus bilobis. Petala cuneiformia, e rotundato fine acumen educta.*

Habitat ad sepes agri Medeensis.

Sola absentia nectariorum petaliformium genere diversa est haec planta ab ATRAGENE alpina LINNAEI. Florentem inveni in dicto loco sub finem Septembris.

bris. Haec omnino est CLEMATIS sive *Flammula*,
flore caeruleo scandens. I. BAUHIN. Hist. II. p. 128.

671. CLEMATIS cespitosa.

Crescit haec CLEMATIS ad sepes *Duinenses*, non procul ab arce, iuxta viam publicam. Alias scandit arbores, et valde ramosa densos cespites facit; Differt a congeneribus, foliolis vix semiuncialibus, integris, ellipticis, quandoque et profunde bilobis. Ex alis prodeunt ramuli foliosi, e quorum alis nascuntur flores racemosi, parvi, quos ego tunc non vidi. His succedunt semina (2—5) rotundata, compressa, caudata; cauda plumosa, alba, longa, recurva.

222. THALICTRUM.

DIOSC. CLUS. TOURN. I. R. H. p. 270.
Tab. 143.

Petalorum numero et praecoci delapsu ACTAEAM imitatur; differt vero siliculis nudis, monospermis, non dehiscentibus. Semina nuda ponit LINN. sed iam pridem TOURN. l. c. H. L. et nunc etiam HALLER. et ADANS. capsulas esse notarunt, in quibus semen unum TOURN. HALL. plura ADANS.

672. THALICTRUM aquilegifolium.

Thalictrum fructibus pendulis, triangularibus, rectis;
caule tereti. LINN. Syst. Nat. p. 377. Spec.
Plant. p. 547. n. 12. Fl. Suec. 2. 487. Fl. Carniol.
p. 554. n. 2.

Thalictrum foliis triplicato-pinnatis, patulis, obtuse trilobis; stipulis ovatis; paniculis umbellatis. HALL. Hist. n. 1141.

DIAGN. Nulla alia species indigena maiora folia gerit, supra medium aequa lata, ac longa, trifida:

Bb 3 segmento

segmento medio trilobo; lateralibus bilobis: lobis rotundatis.

Habitat in sylvis.

Caulis teres, obsolete striatus. Stipulae perfoliatae, subhemisphaericæ, pelvim ellipticam faciunt. Petala striata obtusa. Stamina (65—85), rubella, dilatata, sed etiam violacea et alba. Antheræ obtusæ, erectæ, viridi-luteæ. Germina circa *Idriam* (7-9), circa *Goriziam* (ad 16), circa *Vipaccum* (ad 12); Ergo non semper (16) LINN. Folliculi angulosi. I. BAUHIN. triangulares, penduli.

673. THALICTRUM flavum.

Thalictrum caule folioso, sulcato, panicula multiplici, erecta. LINN. *Syst. Nat.* p. 377. *Spec. Plant.* p. 546. *Fl. Suec.* 2. 488.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, spica adscendente. HALL. *Hist.* n. 1138.

DIAGN. Caulis striatus, terminatus brevi panicula flava. Folia acute divisa, subitus nervosa.

Habitat in Carniola, hinc inde.

Planta nostra durioribus et sature viridibus foliis instrueta, non videtur commode iungi posse cum THALICTRO maiore flavo, glaucifolio. C. BAUH. quod longe certius ad *Aquilegisolium* referri posset, ob tenera glauca et rotunde lobata foliola.

674. THALICTRUM minus.

Thalictrum foliis sexpartitis; floribus cernuis. LINN. *Syst. Nat.* p. 377. *Spec. Plant.* p. 546. *Fl. Suec.* 2. 489.

Thalictrum foliis patulis, imis obtuse trilobis, supermis acutis, paniculis diffusis, floribus nutantibus. HALL. *Hist.* n. 1139.

DIAGN. Caulis et vaginae striatae. Folia plerumque trifida. Panicula laxa. Flores lutei, nuntantes.

Habitat in pratis submontanis.

Fo-

Foliorum longitudo unciam non superat, segmenta modo subrotunda et obtusa, modo vero acutiora, divisionem sexpartitam nondum vidi.

675. *THALICTRUM nigricans.*

Thalictrum foliis erectis; lobulis acute trilobis; spica adscendente. HALL. *Hist.* n. 1138.

Thalictrum caule folioso sulcato; panicula multipli- ci, erecta. LINN. *Syst. Nat.* p. 377.

DIAGN. *Caulis sulcatus. Folia lanceolata, simplia et incisa, ex siccitate nigricantia.*

Habitat in montibus nostris.

Stamina (ad 16), flava. Germina (4—5), inflexo acumine instructa.

Huic convenit figura *THALICTRI nigrioris, caule et semine striate.* I. BAUHINI, et RUTAE pratenfis, maioris. I. TABERNAEMONT. Sed has plantas ad *THALICTRUM suum tertium seu flavum LINNAEI*, refert HALLERUS, quid ergo statuendum? an *flavum et nigricans* idem sunt?

676. *THALICTRUM angustifolium.*

Thalictrum foliis adscendentibus, linearibus; panicula erecta. HALL. *Hist.* n. 1137.

Thalictrum I. C. BAUH. *Prodr.* p. 146. cum icone. *Ruta angustifolia* V. TABERNAEM. *Hist.* p. 121. cum eadem figura.

DIAGN. *Folia linearia, obtusa. Stamina (10-12).*

Habitat Idriae, prope stagnum, sub fornace tegulina. Caulis angulatus; angulis scabris. Folia fere uncialia, lineam vix lata.

Est *THALICTRUM* foliis decompositis: pinnis sessilibus, linearibus, sulcatis rugosis: marginibus reflexis. Fl. Carniol. p. 554. n. 4. quod Cl. WILLICHIUS, una cum *THALLUCIDO* in *flavum* degenerare suspicatur. *Illustr.* An. 1766. XXII.

223. ADONIS.

MATTHIOL. DILLEN. BOERH. LINN. Gen.
Plant. 618. ADANS. Fam. Plant. p. 459.

RANUNCULUM inter et ANEMONEM ambigit, huius enim petala, eius autem fructum habet, sed caret squamulis nectariferis, et involucro triphylo.

677. ADONIS *autumnalis*.

Adonis floribus octopetalis; fructibus subcylindricis.
LINN. Syst. Nat. p. 377. Spec. Plant. p. 547.
n. 1. nunc *autumnalis* dicta.

Adonis radice annua, flore octopetalo. HALL. Hist.
n. 1158.

DIAGN. Petala octo, fructus longus.

Habitat inter segetes.

VARIAT. Corollis phoeniceis, antheris nigricantibus.
— flavo-rubris, maioribus; antheris
flavo-fuscis.

678. ADONIS *vernalis*.

Adonis flore dodecapetalo; fructu ovato. LINN.
Syst. Nat. p. 377. Spec. Plant. p. 547. n. 2.

Adonis radice perenni, flore dodecapetalo HALL.
Hist. n. 1157.

DIAGN. Petala duodecim, fructus ovalis.

Habitat cum priore in Istria.

Foliorum segmenta molli spinula terminata. Flos multo maior, ac in priore. Petala citrina, lanceolata, lineata.

224. RANUNCULUS.

LINN. Gen. Plant. 619.

Characterem essentialem, quo differt ab
ADONI constituit porus aut squamula nectarifera ad basin singuli petali.

(*) Co-

(*) *Corollis albis.*

679. RANUNCULUS *alpestris.*

Ranunculus foliis trilobis: lobis acutis; caule unifloro. *Fl. Carniol.* p. 563. n. 4.

Ranunculus foliis radicalibus subcordatis, obtusis, tripartitis; lobis trilobatis, caulino lanceolato, integerrimo; caule subunifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 553. n. 22.

Ranunculus uniflorus; foliis laevibus, semitrilobis, rotunde ferratis, caulinis lingulatis. HALL. *Hist.* n. 1167.

DIAGN. *Caulis uniflorus. Calyx glaber, apice flavicans. Petala obcordata.*

Habitat in *Alpibus nostris* frequens.

Folia radicalia ad basin usque in tres partes divisa; media semitrifida: segmentis lateralibus bifidis; lobis laterales ultra medium bipartiti: segmentis semibifidis. Floris diameter superat foliorum longitudinem. Stamina flava.

Caulis uniflorus bene dicitur, est etenim; sed foliorum lobi et segmenta acuminata non vero obtusa. Caulis quoque nudus dici nequit, cum duo foliola ligulata gerat; primo non raro trifido. Petala obcordata, in Diagnosi, ideo posui, ut eo certius distinguatur a RANUNCULO *glaciali*, cui petala integerima et elliptica, nec caulis uniflorus, qualis in *alpestris* perpetuo occurrit.

680. RANUNCULUS *aconitifolius.*

Ranunculus foliis omnibus quinatis, lanceolatis, inciso-ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 376. *Spec. Plant.* p. 551. n. 16. *Fl. Carniol.* p. 565. n. 7.

Ranunculus caule ramoso, multifloro, foliis venosis, quinquelobis, lobis rhomboideis acutis, acute ferratis. HALL. *Hist.* n. 1164.

DIAGN. *Caulis erectus, ramosus. Folia ad basin usque trifida; lobis lateralibus profunde bifidis.*

Habitat in *M. Nanas, Dull, Ortea, Alpibus Tolminensibus et Vochinenibus.*

Folia non quinata, sed tripartita; et licet forent quinquepartita, non tamen quinata dici possent. Species haec germina raro plura, quam (12) habet.

681. RANUNCULUS aquatilis.

Ranunculus foliis submersis, capillaceis, emersis peltatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 380, *Spec. Plant.* p. 556. n. 37. *Fl. Suec.* 2. 509. *Fl. Carniol.* p. 566. n. 10.

Ranuncul. Ord. I. HALL. *Hist.* n. 1161-1163.

DIAGN. *Folia saltē submersa capillacea.*

Habitat in aquis et fossis, non rarus,
Petalorum unguis luteoli.

(**) *Corollis flavis.*

682. RANUNCULUS Flammula.

RANUNCULUM *Flammulam*, et *repentem* LINNAEI, in unam speciem coniungunt. 1. Folia angusta; petiolis alatis, alba et amplexicaule membrana. 2. Calyx patens, corollae concolor. 3. Petala calyce duplo longiora, integra; unguibus lucidis. 4. Squamula nectarifera parva et obtusa. 5. Semina in capitulum collecta. 6. Locus natalis. 7. Glabrities. 8. Specimina quae possideo, a RANUNCULO *repente* in *Flammulam* sensim degenerantia humus mollis, inundata, bituminosa, incrementum plantae promovet, sed radix debili nixa fundamento, eam erigere et sustinere non potest, hinc decumbit, et radices e geniculis emittit. Si vero solum natale durius, arenosum, siccum, tunc radix firmata, sensim crescentem plantam sustinet.

683. RANUNCULUS *Lingua*.

Ranunculus foliis lanceolatis; caule erecto. LINN.

Syst. Nat. p. 378. *Spec. Plant.* p. 549. n. 3. *Fl.*

Suec. 2. 493. *Fl. Carniol.* p. 562. n. 2.

Ranunculus caule erecto, ramoso; foliis ensiformibus subserratis. HALL. *Hist.* n. 1181.

DIAGN. *Caulis erectus. Folia lanceolata, sessilia, serrata.*

Habitat circa fossas.

Flos magnus. Siliculae ovatae.

684. RANUNCULUS *Ficaria*.

Ranunculus foliis cordatis, angulatis, petiolatis; caule unifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 378. *Sp. Plant.* p. 550. n. 9. *Fl. Suec.* 2. 496. *Fl. Carniol.* p. 563. n. 3.

Ficaria. DILLEN, HALL. *Hist.* n. 1160.

DIAGN. *Polyorchirhizos vernus, repens, suboleraceus, polypetalos.*

Habitat in cultis, abunde.

Scapi angulati. Petala lanceolata, obtusa, superne splendentia. Squamula nectarifera bidentata. Stamina (18—36). Germina (16—24).

Flos obdormit hora quinta vespertina, evigilat nona matutina. Acrimoniam sui generis in hac specie pingue solum obtundit.

685. RANUNCULUS *Thora*.

Ranunculus foliis reniformibus, subtrilobis, crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis; caule subbifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 378. *Spec. Plant.* p. 550. n. 10. IACQUIN, *Austr. Obs.* 47. *Obs. Botan.* I. Tab. 13. bene.

Ranunculus foliis duris venosis, reniformibus, rotunde-crenatis, convexitate retusa, acute ferrata. HALL. *Hist.* n. 1178.

Pthora Valdensium. CLUS. *Hist.* 2. p. 239.

Aconi-

Aconitum Pardalianches. MATTHIOL. *Diosc.*
p. 686.

DIAGN. *Fasciculus napulorum radicem constituens.*
Folia coriacea; radicali reniformi, trilobo: lobo
medio minore et integerrimo; lateralibus crenatis.

Habitat in Alpibus.

Radiculae napisiformes, pone attenuatae, antice coniunctae et fasciculatae educunt caulem spithameum. Folium radicale unum, longe petiolatum. Folium caulinum primum radicali latius, breviter petiolatum, quinquelobum; lobis tribus mediis integerrimis. Ex ala huius folii prodit ramus triphyllus, uniflorus; foliis duobus primis trifidis, altero simplici et lanceolato. Folium caulinum secundum profunde trifidum, sessile, ex ala ramum alium educit, pariter uniflorum, et duobus lanceolatis foliis instructum. Ultimum folium caulinum subiacet duobus pedunculis, quorum unus terminalis et nudus, alter vero diphyllus. Petala obtusa. Siliculae glabrae (7-9) in capitulum subrotundum collectae.

VARIAT. *Folio radicali nullo, uno, aut pluribus;*
folio caulino primo trilobo, pedunculis (1—4).

Statura maiore aut minore.

Ex data descriptione plantae, cuius varia specimina coram habeo, clare patet, non bene haec tenus determinatam fuisse, et solam fere CLUSII figuram tolerabilem esse, in reliquis autem aut omitti folium radicale, aut caulina male depingi, aut petala quatuor esse; unde bene novam iconem nobis dedit Dociss.
IACQUIN.

686. RANUNCULUS nivalis.

DIAGN. *Caulis hirsutus. Folia radicalia profunde triloba: lobo medio cuneiformi et trifido: segmentis lanceolatis. Petala subrotunda, integerrima,*
subitus venulis obscurioribus lineata.

Habitat in *Alpibus nostris non rarus.*

V A R.

VAR. I. *Caule unifloro.*

Ranunculus calyce hirsuto, caule unifloro; foliis radicalibus palmatis, caulinis multipartitis, sessilibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 553. n. 21. *Fl. Suec.* 2. 502.

Ranunculus caule unifloro; foliis glabris, reniformibus, semiquinquelobis. HALL. *Hist.* n. 1168.

Ranunculi minimi figura interior. I. BAUH. *Hist.* III. p. 861.

Folia in caule bina, sessilia; imo quadrifido, altero trifido.

Quomodo differunt ab hac Planta RANUNCULUS *Monspeliacus* et *Lapponicus* LINN.? certe HALLERUS non distinguit, imo SEGUIERIUS et MAGNOLIUS, eum *Monspelii*, ne quidem invenerunt. De *Lapponico* pariter dubitare liceret, postquam eum ILL. HALLERUS coniunxit cum RANUNCULO *Alpestris*.

— 2. *Caule multifloro.*

Ranunculus tenuifolius.. I. BAUH. *Hist.* III. p. 416.

Caule ramoso differt a priore.

687. RANUNCULUS *auricomus*.

Ranunculus foliis radicalibus reniformibus, crenatis, incisis; caulinis digitatis. linearibus; caule multifloro. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 551. n. 13. *Fl. Suec.* 2. 498.

Ranunculus foliis radicalibus integris, et semitrilocellatis, rotunde crenatis caulinis multipartitis, linearibus integerrimis. HALL. *Hist.* n. 1177.

DIAGN. *Folia radicalia longe petiolata, reniformia, crenata; caulina superiora sessilia et digitata.*

Habitat in sylvis circa Schenofschetz, et Goriziam. Folia radicalia quandoque triloba. Petala ovata, obtusa.

688. RANUNCULUS *sceleratus*.

Ranunculus foliis inferioribus palmatis; summis digitatis; fructibus oblongis. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 551. n. 15. *Fl. Suec.* 2. 499.

Ranunculus foliis laevibus, semitrilobatis, rotundate ferratis, fructu ovato. HALL. *Hist.* n. 1175.

DIAGN. *Folia ima triloba: lobis lateralibus trifidis: segmentis crenatis. Calyx reflexus, glaber. Stamina (12).*

Habitat in fossis Tergestinis.

Palmata folia non invenio. Calyx flavescens. Petala ovata, nitida. Squamula nectarifera subrotunda et concava.

689. RANUNCULUS *repens*.

Ranunculus calycibus patulis; pedunculis sulcatis; stolonibus repertibus; foliis compositis. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 554. n. 26. *Fl. Suec.* 2. 506. *Fl. Carniol.* p. 565. n. 8.

Ranunculus caule reptante, radicato, foliis semitrilobatis, circum ferratis lobis petiolatis. HALL. *Hist.* n. 1173.

DIAGN. *Caulis repens e geniculis radicatus. Pedunculi quinque lineis elevatis angulati.*

Habitat in hortorum areis, udisque locis.

Apud nos glaber. Foliorum bases alatae membrana albida, amplexicaule. Caulis subtrigonous. Calycinæ folia marginata, flavescens, subtus villosula. Petala obtusa lucida. Squamula nectarifera truncata. Stamina (40—50). Germina glabra.

690. RANUNCULUS *acris*.

Ranunculus calycibus patulis; pedunculis teretibus; foliis tripartito-multifidis; summis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 554. n. 28. *Fl. Suec.* 2. 507. *Fl. Carniol.* p. 564. n. 6.

Ranun-

Ranunculus foliis hirsutis, semitrilobatis, lobis lateralibus bipartitis, foliis caulinis semitrilobis.
HALL. Hist. n. 1169.

DIAGN. *Ereditus, acris, ramosus admodum; ramis corymbum fere efficientibus.*

Habitat in pratis humidioribus.

Caulis teres fistulosus, bipedalis. Folia ad basin usque tripartita; lobo medio trifido; lateralibus bilobis; lobis bipartitis. Calyces patuli, glabri. Stamina (48—56). Germina (ad 56). Ergo diversissimus a *Varietate secunda RANUNCULI nivalis.*

Abscessus intercutaneos causat in Bobus.

691. RANUNCULUS lanuginosus.

Ranunculus foliis trilobis, hispidis; calycibus patulis, caule multifloro, tereti. *Fl. Carniol.* p. 564. n. 5.

Ranunculus calycibus patulis; pedunculis teretibus; caule petiolisque hirsutis foliis trifidis, lobatis, crenatis, holosericeis. LINN. *Syst. Nat.* p. 379. *Spec. Plant.* p. 554. n. 28. nostra folia sunt lobata et hirsuta, non vero sinuata et tomentosa.

Ranunculus caule folioso, ramoso, erecto, foliis semitrilobatis, ferratis, hirsutissimis, vaginis sericeis. HALL. *Hist.* n. 1172.

Huc spectat RANUNCULUS montanus subhirsutus, latifolius. C. BAUH. *Prodri.* p. 96. cum icona non mala. Nec diversus videtur RANUNCULUS montanus lanuginosus etc. EIUSD. l. c. n. 7. RANUNCULUS magnus, valde hirsutus flore luteo. I. BAUHINI, et RANUNCULUS nemorosus, hirsutus, foliis Caryophyllatae LOESELII, ob hirsutem, qua carent caeterae species. Differt a RANUNCULO acri, in eo, quod acris floreat initio Maii, in pratis, quod totus glaber aut raris villis adspersus sit, quod ramos corymbosos, et pedunculos solidos gerat; Hic vero floreat sub finem Aprilis in uidis, umbrosis, sylvo-

sylvosisque locis, hirsutissimus, magnus, floribus sparsis; pedunculis fistulosis.

DIAGN. *Valde hirsutus, ramosus, calycinis foliis marginatis; stylis reflexis.*

Habitat circa Aquaeductus Idrienses, et in sylvis.

Statura, hirsutes, et locus natalis, speciem indicat.

692. RANUNCULUS bulbosus.

Ranunculus calycibus retroflexis; pedunculis sulcatis; caule erecto; foliis compositis. LINN. *Syst. Nat.* p. 379, *Spec. Plant.* p. 554. n. 25. *Fl. Suec.* 2. 504. *Fl. Carniol.* p. 565. n. 9.

Ranunculus radice subglobosa, foliis hirsutis, semi-trilobis, lobis petiolatis acute ferratis. HALL. *Hist.* n. 1174.

DIAGN. *Radix globosa. Calyces reflexi. Squamula nectarifera obtuse trigona.*

Habitat in collibus siccioribus, et pratis subincultis.

Foliorum lobi medii petiolati, semitrifidi: segmenti villosis incisis, dentatisque. Petala ovata, splendentia. Stamina (ad 60). Antherae acuminatae.

693. RANUNCULUS arvensis.

Ranunculus feminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 380. *Spec. Plant.* p. 555. n. 31. *Fl. Suec.* 2. 508. *Fl. Carniol.* p. 566. n. 11.

Ranunculus feminibus aculeatis, foliis tripartitis lobis longe petiolatis bi- et tripartitis, acute incisis. HALL. *Hist.* n. 1176.

DIAGN. *Annuus, in cultis crescens; capsulis semi-rotundis, margine et plana facie echinatis.*

Habitat in arvis.

Squamula nectarifera supra medium rotundata, et margine inflexo praedita. Stamina (14). Siliculae vero (6), aculeis marginalibus longioribus et patenteribus echinatae.

Ranun-

Ranunculorum acrimoniam, ut obtundet varia tentavit. CL. KRAPFIUS.

225. TROLLIUS.

GESN. BUXBAUM. LINN. Gen. Plant. 620.
ADANS. Famil. Pl. p. 458.

Petala multa, decidua subrotundam corollam constituunt. Nectaria plana, linearia, caduca, canaliculata. Siliculae multae, in capitulum collectae, polyspermae in nostra Planta.

694. TROLLIUS *Europaeus*.

Trollius corollis conniventibus; nectariis longitudine staminum. LINN. Syst. Nat. p. 380. Spec. Plant. p. 556. n. 1. Fl. Suec. 2. 510. Fl. Carniol. p. 558.

Helleborus uniflorus, petalis et siliquis pluribus.
HALL. Enum. p. 318. n. 4.

Trollius. HALL. Hist. n. 1189.

Helleboro-ranunculus. BOEHM. Lips. 549. bene;
nam facies, petala et fructus RANUNCULI, ne-
ctaria vero HELLEBORI.

DIAGN. Folia quinquefida: segmentis lobatis: lobis
acutis, incisis. Flos unicus, flavus, globosus,
elegans.

Habitat in pratis subalpinis.

Si petala subrotunda invertantur, pulchram rosulam fa-
ciunt. Siliculae transversim rugosae. Semina nitida,
trigona; facie una convexa.

226. ISOPYRUM.

LINN. Gen. Plant. 621.

Petala mollia quinque. Nectaria totidem
sessilia, cochleariformia. Siliculae in nostro
Scopoli Flora Carn. T.I. Cc (2-3),

(2-3), trispermae, nec Capsulas 10-15. adhuc dum vidi.

Genus hoc OLFAM vocat Cl. ADANSON: cum ANEMONEM Hepaticam: cum DIOSC. ISOPYRUM dixerit.

695. ISOPYRUM thalictroides.

Isopyrum stipulis ovatis; petalis obtusis. LINN.
Syst. Nat. p. 380. Spec. Plant. p. 557. n. 2. Fl.
Carniol. p. 555.

Ranunculus praecox II. CLUS. Hist. 2. p. 233.

DIAGN. Radices conicae, fasciculatae, desinunt in densum fibrarum capillitium. Folium radicale, decompositum: folioli terminalis figura eadem, quae in THALICTRO Aquilegioide.

Habitat inter corylos et frutices, Aprili florens, et etiam circa finem Martii.

Radicum fasciculus unus educit folium, alter caulem. Petiolas basi villosus, bis trifidus, foliolis trilobis et bilobis. Caulis spithameus, foliosus, ramosus. Ad basin singuli petioli iacent stipulae duae, albae, subrotundae, patulae; oris crispatis et revolutis. Pedunculi uniflori, nudi, unciales. Petala alba, ovata, tenera. Nectaria lineam longa, alba, lineis quinis obsoletis longitudinaliter striata. Stamina (30-36), petalis breviora, nectariis duplo longiora. Filamenta apice dilatata. Antherae erectae, obtusae, flavae. Germina (2-3), compressa, elliptica, acuminata, stylo evidentissimo terminata.

Ergo trigyna planta non polygyna Helleboro adfinis.

227. HELLEBORUS.

TOURN. I. R. H. p. 271. Tab. 144.

Petala persistentia. Nectaria subbilabiata, decidua, duplo plura, quam Germina. Styli et Germina naturaliter (5).

696. HELLEBORUS *niger*.

Helleborus nectariis obsubulatis, filamentis staminum duplo brevioribus. *Fl. Carniol.* p. 556. n. 2.

Helleborus scapo subbifloro, subnudo; foliis pedatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 381. *Spec. Plant.* p. 558.

Helleborus foliis multipartitis, ferratis, caule paucifloro. HALL. *Hist.* n. 1192.

Elleborum nigrum. MATTH. *Diosc.* p. 755.

DIAGN. *Caulis saepius uniflorus. Folia duo elliptica, sessilia, integerrima, subalbo; aut roseo flore.*

Habitat in montibus *Idriensibus*, aliisque frequens. Nectaria (13) bilabiata; labio superiore longiore et subemarginato, inferiore crenulato. Stamina ultra (70): Antherae septum prominet. Styli attenuati. Extractum purgans, emmenagogum.

697. HELLEBORUS *viridis*.

Helleborus nectariis obconicis, filamentis staminum triplo brevioribus. *Fl. Carniol.* p. 556. n. 1.

Helleborus caule multifloro, folioso; foliis digitatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 381. *Spec. Plant.* p. 558. n. 3.

Helleborus caule ramoso, multifloro, foliis multipartitis, ferratis, stipulis, ovato-lanceolatis, coloratis. HALL. *Hist.* n. 1193.

DIAGN. *Caulis dichotomus. Flos foliis concolor. Vagina digitato-foliacea sub singulis ramis.*

Habitat in apricis et herbidis collibus.

Antherae ante nuptias ordinatae in quindecim series, et in globum coadunatae. Nectaria stylorum longitudine; labio superiore truncato, et subbidentato; oris inflexis. Antherae absque acumine.

228. POPULAGO.

TABERNAEM. TOURN. I. R. H. p. 273.
Tab. 245.

Petala quinque. Stamina ultra (100).
Germina (10 — 14). Siliquae radiatim pa-
tentest.

698. POPULAGO palustris.

Caltha. LINN. Fl. Carniol. p. 562. HALL. Hist.
n. 1188.

Farfugium. MATTHIOL. Diosc. p. 561.

DIAGN. *Verna, rivularis, dichotoma; pedunculis
fulcatis.*

Habitat in aquosis.

Caulis ad basin teres. Squamae breves, aridae, ad
originem ramorum et pedunculorum.



CLAS-

CLASSIS XIV.

D I D Y N A M I A.

VERTICILLATAE et GALEATAE. MORISON. RAI. LABIATAE et PERSONATAE TOURN. PONTEDER. ADANS. RINGENTES ROYEN. DEMEZOSTEMONES. HALL. DIMOCRASTEMONES. WACHEND. PETALOSTEMONES, *tetrandrae*. GLEDITSCH.

Characterem essentiale constituant stamna quatuor, quorum duo breviora, et stylus unicus LINN. insertus in quibusdam receptaculo, in aliis vero apici germinis.

GYMNOSPERMIA.

Semina quatuor, nuda, in fundo calycis persistentis. Stylus e centro receptaculi prodens, et germina contingens; excepta *Verbena*.

I. GERMINIBUS TECTIS CORONA VILLORUM
E COROLLAE TUBO NASCENTIUM.

Aliam horum Generum divisionem insti-
tuo, cum calyces quinquefidi, per gradus in-
fensibiles degenerent in labiatos.

229. LAMIUM.

TOURN. I. R. H. p. 183. Tab. 85.

Margo labii inferioris prope faucem utrin-
que producit dentes planos (1-3). Galea in-
Cc 3 tegra.

tegra. TOURN. longa ADANS. Semina triquetra LINN.

699. LAMIUM *Pannonicum*. Tab. 27.

Lamium foliis cordatis petiolatis, corollae galea ferrata, tubo longiore. *Fl. Carniol.* p. 467. n. 4.

Lamium foliis subrotundo-cordatis, acuminatis, corollis fauce inflata. LINN. *Syst. Nat.* p. 393.

Laminum maximum, sylvaticum. MORISON. *Hist. II. S. 2. Tab. II. fig. 7.*

Galeoplis maxima; flore magno, rubra. I. BAUH. *Hist. III. p. 853.* SEGUIER. *Veron. Suppl. p. 133. n. 2.*

Galeoplis maxima pannonica. CLUS. *Hist. p. 36.*

Lamium maximum, sylvaticum, alternum. C. BAUH. *Pin. p. 231, n. 4.* HERMANN. *Lugd. p. 351.*

DIAGN. *Folia URTICAE. Corollae magnae; galea ferrata, et tubo longiore.*


Habitat in collibus herbidis circa Idriam et alibi.

Radix perennis, multicaulis. Caules cubitales, quadrati fistulosi, glabri, ramosi, ad basin et sub verticillis sanguineo colore tincti. Folia recentia subtus rubella, cordata, petiolata, ferrata, acuminata, venosa. Primi verticilli 14-flori. Calyx sessilis, tubo corollae amplior, bractea linearis suffultus; marginibus nervisque villosis, nectar diu fovet, quod libant *Formicae*, non vero *Apes*, ob ingratum plantae odorem. Corolla uncialis, rubra. Galea villosa, arcuata, apice ferrata et incisa. Labium trifidum, segmentis lateralibus deflexis; medio emarginato, maculato, et ferrulato; Faux ampla, saturatioribus lineis picta; dentibus marginalibus utrinque tribus. Tubus pallidior, cylindraceus rectus. Filamenta villosa; villis plerisque capitatis. Antherae non ciliatae, in eodem plano convenientes, oblongae, biloculares, non didymae, polline flavo plenae. Semina trigona, apice rotundata, basi albida et excavata. Gestatio menstrua.

Inven-

Tab. 27.

699. *Lamium Pannonicum*



Inventor est CLUSIUS; a quo alii modo descriptionem, modo iconem, mutuarunt. TOURN. separata a *Lamiis*, sed alteri generi id addere oblitus est. LINN. *Orvalam* vocat, Ego vero cum CLUSIO, *Pannonicum*.

700. LAMIUM *album*.

Lamium foliis cordatis, petiolatis; corollae galea crenulata, tubi longitudine. *Fl. Carniol.* p. 466. n. 2.

Lamium foliis cordatis, acuminatis, ferratis, petiolatis, verticillis 20-floris. LINN. *Syst. Nat.* p. 393. *Spec. Plant.* p. 579. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 520. sed definitio haec cum priori quoque LAMIO convenit.

Lamium foliis cordatis, acutis, ferratis, verticillis multifloris. HALL. *Hist.* n. 271.

DIAGN. *Corollae tubus curvus, basi attenuatus, galea brevior; fauce utrinque unico et marginali dente instrudta.*

Habitat ad sepes.

Basis petioli singuli subtus vesiculam habet. Corollae tubus calycem replens. Antherae ciliatae, inaequaliter elevatae. Galea antice fulco exarata.

701. LAMIUM *purpureum*.

Lamium foliis cordatis, petiolatis; corollae galea integerrima, tubo breviore. *Fl. Carniol.* p. 466, n. 1.

Lamium foliis cordatis obtusis petiolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 393. *Spec. Plant.* p. 579. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 521.

Lamium foliis cordatis, obtusis, in summo ramo congestis. HALL. *Hist.* n. 272.

DIAGN. *Corollae faux utrinque bidentata. Labii inferioris. Segmenta lateralia patentia.*

Habitat in hortis.

Folia obtusiuscula. Antherae albis pilis barbatae, fulvo polline plenae.

702. LAMIUM *amplexicaule*.

Lamium foliis imis petiolatis; superioribus sessilibus, *amplexicaulibus*. *Fl. Carniol.* p. 467. n. 3.

Lamium foliis floralibus sessilibus, *amplexicaulibus*, obtusis. LINN. *Syst. Nat.* p. 393. *Spec. Plant.* p. 579. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 522.

Lamium foliis radicalibus petiolatis, lobatis, superioribus caulem ambientibus, rotunde incisis. HALL. *Hist.* n. 273.

DIAGN. *Calyx semiquinquefidus. Galea ovata, corollae tubo triplo brevior.*

Habitat in hortis.

Calyx galea *corollae longior. Antherae ciliatae, fulvo-rubro polline plenae.*

230. LEONURUS.

Essentia generis etiamnum dubia. Dentes calycini patuli CARDIACAE TOURNEF. non adsunt in LEONURO *Marrubiastro* LINN. Calyx labiatus HALLERI, frustra quaeritur in CARDIACIS eiusdem. Antherae adpresae glandulis nitidis, non occurunt in LEONURO *Cardiaca*, et sunt particulae semifinales, urgentes attenuatam Antherae tunicam. GALEOBOLON DILLENII CARDIACIS adiungit HALLERUS. GALEOPSI vero LINNAEUS, etsi careat denticulis concavis GALEOPSI propriis. Stamina exteriora deflora-ta, discedentia LEONURI *Cardiacae*, STACHYDIS speciem faciunt. Quid ergo statuendum? Sola corolla videtur apta constituendae effentiae generis; nempe galea integra et elliptica. Labium trifidum; segmentis omnibus, aut

aut lateralibus acuminatis. Stamina villis adspersa.

703. LEONURUS *Cardiaca*.

Leonurus foliis trilobis, lobis acutis. *Fl. Carniol.*
p. 469. n. 1.

Leonurus foliis caulinis lanceolatis, trilobis. LINN.
Syst. Nat. p. 396. *Spec. Plant.* p. 584. n. 1. *Fl.*
Suec. 2. 532.

Cardiaca foliis tripartitis, lanceolatis. HALL. *Hist.*
n. 274.

DIAGN. *Folia caulinata triloba; lobis acuminatis.*
Galea floris hirsuta.

Habitat in ruderatis, et circa hortos.

Verticilli primi 18-flori. Bractea setacea, sub quolibet
exteriore calyce. Calyx lineis viridibus quinis angu-
latus; dentibus aristatis; duobus infimis longiori-
bus et patentissimis. Plica transversa ad basin ga-
leae. Labii segmenta lateralia, deflexa, medium ve-
ro sursum elevatum.

704. LEONURUS *Marrubiastrum*.

Leonurus foliis ovatis, lanceolatisque, ferratis; ca-
lycibus sessilibus, spinosis. LINN. *Syst. Nat.*
p. 396. *Spec. Plant.* p. 584. n. 2.

DIAGN. *Folia PARIETARIAE Officin. glabra,*
supra medium dentata.

Habitat circa Goriziam P. WULFEN.

Bracteae calycibus interiectae, spinosae.

705. LEONURUS *Galeobdolon*.

Leonurus foliis cordatis. *Fl. Carniol.* p. 469. n. 2.
Galeopsis verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo.
LINN. *Syst. Nat.* p. 394. *Spec. Plant.* p. 580.
n. 4. *Fl. Suec.* 2. 525. Nihil horum, nec chara-
cter GALEOPSIDIS.

Cardiaca foliis petiolatis, cordatis, verticillis foliosis.
HALL. *Hist.* n. 275.

DIAGN. *Folia ovata et oblonga, duplicito-dentata. Corollae flavae.*

Habitat in sylvestribus locis.

Verticillus imus etiam 18-florus. Calyces omnes, medio excepto, bracteati; dentibus muticis: supremo maiore. Galea obtusa, labio longior, apice crenulata. Labii segmentum medium saturatius et punctis croceis in lineas digestis, variegatum. Filamenta albida, paucis et capitatis villis pubescentia, minoribus stylo adhaerentibus. Antherae flavo pollinae plenae, stylus rubellus.

231. STACHYS.

LINN. *Gen. Plant.* 638.

Stamina exteriora deflorata, lateraliter exserta, una cum lobii lacinia media emarginata, essentiam constituunt.

706. STACHYS *sylvatica*.

Stachys verticillis sexfloris; foliis cordatis, petiolatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 394. *Spec. Plant.* p. 580.

n. 1. *Fl. Suec.* 2. 526. *Flor. Carniol.* p. 463. n. 2.

Cardiaca foliis cordatis, ferratis, verticillis nudis, spicatis. HALL. *Hist.* n. 216.

DIAGN. *Verticilli sexflori. Folia cordata. Corollae rubrae, galea labio tuboque brevior, capitatis villis pubescens.*

Habitat in hortis et circa sepes.

Villi in caule et foliis articulati. Calycini dentes aristati, pedunculo longiores. Corollae sature rubrae, galea ovalis obtusa. Labii laciniae laterales haemisphaericae, depressae; pectus lineolis albis repandis variegatum; Tubus longitudine labii, pone albus, strumosus. Filamenta in medio villosiora, basi imberbia. Antherae basi et apice albidae, alibi flavescentes. Stigma inferius albidum, superius rubrum.

Hanc

Hanc pinxit TOURNEFORTIUS pro STACHYDIS
charactere. Eadem est URTICAE V. TABER-
NAEM. GALEOPSIS f. *Urtica iners, magna, foeti-*
dissima I. BAUHIN. cum addita nota linearum pe-
ctoralium. GALEOPSIS *legitima* CLUSII, et
STACHYS *sylvatica* RIVINI bonaæ figuræ uter-
que largitur.

707. STACHYS palustris

Stachys verticillaris sexfloris, foliis lanceolatis. *Fl. Car-*
niol. p. 463. n. 1.

Stachys verticillaris sexfloris; foliis linear-lanceola-
tis, semiamplexicaulibus. LINN. *Syst. Nat.*

p. 394. *Spec. Plant.* p. 580. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 528.

Stachys foliis hirsutis, elliptico-lanceolatis, breviter
petiolatis, verticillis spicatis. HALL. *Hist.* n. 257.
folia elliptica nondum vidi.

DIAGN. *Verticilli sexflori. Folia lanceolata, den-*
tata, sessilia. Calyces sessiles, bracteis duabus.

Habitat circa aquas, hortos et vias.

Calyces subaristati. Corollae labium maculis satura-
tioribus variegatum. Filamentorum bases compres-
sae et obtusis villis adspersae. In fauce corollae utrin-
que puncta duo alba.

Varietatem posse video verticillaris decemfloris, quam vidi
etiam in Hungaria.

608. STACHYS Betonica.

Sideritis verticillaris decemfloris; galea crenulata. *Fl.*
Carniol. p. 463. n. 1.

Betonica verticillata, villosa; calycibus subspinosis.
LINN. *Syst. Nat.* XI. p. 1097. A.

Betonica foliis inter verticillos diffitos brevibus, in
aristam terminatis. HALL. *Enum.* p. 646. n. 2.

DIAGN. *Verticilli decemflori, remoti: Calycinæ*
dentes aristati. Calyces pentagoni; bracteis binis.

Habitat in collibus apricis, sub finem Maii florens.

Corolla pallide lutea. Galea integra et bifida, tubi longitudine, basi rubens. Labium galea longius, rubro-punctatum. Filamenta villosa, interiore latere baseos rubella. Semina apice argenteis squamulis ad lentem nitida.

Ad hoc genus pertinere docent stamina deflorata lateraliter exserta, calyces aristati, labium antice emarginatum, stylus staminibus interioribus brevior, ut in *STACHYDE palustri*.

709. *STACHYS alpina*.

Stachys verticillaris multiflora; foliorum serraturis apice cartilagineis; corollis labio plano. LINN.

Syst. Nat. p. 394. Spec. Plant. p. 581. n. 3. Fl. Suec. 2. 527. Fl. Carniol. p. 464. n. 3.

Stachys foliis hirsutis, cordatis, verticillaris subtomentosis. HALL. *Hist. n. 256.*

DIAGN. *Verticilli 14-flori. Folia dentata; dentibus glandula terminatis. Calyces nervosi, rigidi, pedunculati.*

Habitat in sylvis asperis circa Idriam.

Folia ima cordata, suprema oblonga.

710. *STACHYS germanica*.

Stachys verticillaris multiflora, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato. LINN. *Syst. Nat. p. 394. Spec. Plant. p. 581. n. 4. Fl. Carniol. p. 464. n. 4.*

Stachys caule tomentoso, foliis imis cordatis, superioribus elliptico-lanceolatis, verticillaris densissimis tomentosis. HALL. *Hist. n. 255.*

DIAGN. *Folia crenata. Verticilli 40-flori; summis contiguis. Calices sessiles, molles.*

Habitat Tergesti et Goriziae ad vias.

Tota albo villo lanata. Crenae foliorum absque glandulis. Calycini dentes ferruginea et brevi spinula terminati. Corollae ferrugineae, quando siccae. Stylus staminibus brevior.

Tab. 28.

711. *Sideritis Alopecuros*.



BETONICA *Officinalis* habet omnes notas STACHYDIS, sed caret corona villorum germina protegentium.

232. SIDERITIS.

LINN. *Gen. Plant.* 632.

Corollae galea incisa, labium trifidum; segmento medio rotundato, lateralibus acutioribus. Stamina omnia, omni tempore sub galea latentia.

71. SIDERITIS *alopecuros*. Tab. 28.

Betonica alis multifloris; foliis petiolatis, cordatis, crenatis. *Fl. Carniol.* p. 462. n. 3.

Betonica spicata; labii superioris apice bisido, acuto. IACQUIN. *Austr.* p. 104. Obs. 49.

Betonica spica basi foliofa; galea bifida. LINN. *Syst. Nat.* p. 394. *Spec. Plant.* p. 373. n. 3.

DIAGN. *Folia cordata, hirsuta, dentata. Verticilli 16-20-flori, in spicam foliis breviorem congesti. Corollae ochroleucae odor Sambucinus.*

Habitat in montibus circa Idriam, frequens.

Facies BETONICAE *Officinalis*, sed folia omnino cordata. Caulis tribus aut duobus paribus foliorum instructus, pedalis, hirsutus, obtuse tetragonus. Folia sub verticillis integra, lata; apicibus deflexis. Ala singula suprema gerit glomerem floralem, a socio distinctum. Calyx sessilis, villosus, pentagonus; dentibus aequalibus, aristatis. Bracteola lanceolata sub singulo calyce. Corollae galea ovalis, attenuata in acumen bifidum, labium trifidum; segmento medio integerrimo et sursum flexo; tubo compresso, longitudine calycis. Filamenta lanuginosa. Germina glabra, nitida. Floret initio Iunii M.

Eandem plantam vidi in Horto sicco Cl. IACQUINII, et in *Academico Vindobonensi*, sed BETONICAM vocare non possum, cum germina tecta sint corona villorum.

233. MARRUBIUM.

TOURN. I. R. H. p. 192. Tab. 91.

Calycini dentes rigido acumine terminati.
Corollae galea angusta, bifida.

712. MARRUBIUM *vulgare*.

Marrubium dentibus calycinis setaceis, uncinatis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 396. *Spec. Plant.* p. 583.
n. 5. *Fl. Suec.* 2. 531. *Fl. Carniol.* p. 470. HALL.
Hist. n. 258. BOEHM. *Lips.* 127.

Marrubium. MATTHIOL. *Diosc.* p. 551.

DIAGN. Dentes calycinii longiores retrorsum uncinati. Calyx villis fasciculatis pubescens.

Habitat in *Agro Vipaccensi*, in *Istria*, et alibi in *Carniola* calidiore.

Verticilli primi flores gerunt (ad 52). Sub calyce bractea linearis. Corolla alba, marcescens intra calycem. Filamenta breviora superne villosa, longiora vero glabra.

713. MARRUBIUM *supinum*.

Marrubium dentibus calycinis setaceis, rectis, villosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 396.

Marrubium *Hispanicum*, *supinum*, foliis sericeis, argenteis. DILLEN. *Elth.* p. 219. T. 174. bene.

DIAGN. Calyces quinquedentati. Tota planta incarnata. Folia oblonga, crenata, obtusa.

Habitat prope vias, a *S. Giovanni di Duino*.

Caules pedales. Folia subtus magis incana, ut in ALTHAEA. Dentes calycinii acutissimi et subaristati. Corollae albae. Galea bicornis, labio longior, longitudine tubi. Labii segmentum medium cordiforme, brevius lateralibus stamina latent in tubo corollae.

MARRUBIUM *album* angustiore folio. I. BAUHIN. differt foliis ferratis, acutis, nec non floribus parvis. Planta

Planta nostra supina non est, hinc media inter MAR-RUBIUM peregrinum ac supinum.

234. BALLOTA.

MATTH. TOURN. I. R. H. p. 184. Tab. 85.

Pedunculi ramosi, secundi. Calyces de-cem striati. Corollae galea bifida, labii seg-mentum medium emarginatum.

714. BALLOTA nigra.

Ballota foliis cordatis, indivisis, ferratis, calycibus acuminatis. LINN. Syst. Nat. p. 395. Spec. Plant. p. 582. Fl. Suec. 2. 529.

Ballote foliis cordatis, ferratis, verticillis nudis. HALL. Hist. n. 259.

Ballote. MATTHIOL. Dioptr.

DIAGN. Folia ovata, serrata, villosula. Calyces acuminati.

Habitat ad oppida, pagos et circa domos rusticas.

Cordata folia non invenio. Ramificatio pedunculi fin-guli corymbosa. Calycini dentes aequales et aristati. Corollae galea hirsuta; segmentis adscendentibus. Barbae laciniae laterales acuminatae et alba li-neae notatae; media vero crenulata tribusque lineis albis variegata. Filamenta villosa. Calyces bra-cteati.

235. BRUNELLA.

BRUNFELS. DODON. TOURN. I. R. H.
p. 182. Tab. 84.

Filamenta apice bifida; segmento breviore antherifero. Stigmata spiraliter convoluta.

715. BRUNELLA vulgaris.

Brunella foliis ovato-lanceolatis, petiolatis. LINN.
Syst. Nat. p. 404. Spec. Plant. p. 600. n. 1. Fl.
Suec. 2. 540.

Bru-

Brunellae HALLERI *Hist.* n. 278-279. nunc de-
nuo consideratae non videntur species distinctae.

DIAGN. *Braetiae subverticillis, cordatae. Galeae*
dorsum acutum. Calycis labium superius margi-
ne laterali deflexo.

Habitat modo in uidis, modo vero in siccis, Argillam
imprimis appetens.

Si corollae rubrae, tunc folia magis dissecta, et e con-
tra. Stamina breviora prodeunt e basi galeae.

Labia calycis, delapsa corolla, connivent, et tubum
claudunt,

236. BUGULA.

DODON. TOURN. *I. R. H.* p. 208. *Tab. 98.*
HALL. LUDWIG. BOEHM. ADANS.

Dentes duo loco Galeae, Corollae tubus
basi dilatatus.

716. BUGULA reptans.

Bugula foliis ovatis, dentatis, flagellis reptans.
HALL. *Hist.* n. 282, *Fl. Carniol.* p. 447. n. 1.
BOEHM. *Lips.* 102.

Aiuga glabra, stolonibus, reptantibus. LINN. *Syl.*
Nat. p. 387. *Spec. Plant.* p. 561.

DIAGN. *Stolones repentes.*

Habitat ad vias et colles.

Pedunculi caerulescentes, calycibus breviores. Calyx
ultra medium quinquefidus. Corollae tubus curvus.
Antherae flavo polline plenae. Germina villosula,
a numero quaternario facile recedentia.

Variat, Flore Carneo, rarius albo.

717. BUGULA genevensis.

Bugula foliis angulosis, hirsutis, calycibus villosis.
HALL. *Hist.* n. 283.

Bugula montana. RIVIN. *Monop.*

Bugula

Bugula caerulea alpina. PLUKENET. *Phyt.*
Tab. 7. foliis non bene lanceolatis.

Consolida media Genevensis. I. BAUH. *Hist.* III.
p. 432.

DIAGN. *Stolones non habet, folia vero dentata, in petiolum decurrentia, remota.*

Habitat in montanis, fuscisque.

Species haec diversa videtur ab altera vere *Pyramidalis*, quam vidi saepius in Comitatu Tyroliensi, seu BUGULA foliis ovatis, hirsutis, calycibus villosis. HALL. *Hist.* n. 283. β . Genevensis enim folia ima remota, et supra medium dendata, verticilos paucifloros, ideoque habitum prorsus aliud habet; *Pyramidalis* autem semipedalis, folia cruciformiter collocata, patula, obtusa, integerrima, sessilia approximata, et in quatuor series ita disposita, ut verissimam tetragonam pyramidem repraesentent. Folia ima maiora et obiter sinuata sunt, alia vero sensim minora integrata et demum caerulecentia. Ex horum alis lanugiosis oriuntur flores numerosi, parvi, caerulei, et intra lanam foliorum et calycum serre sepulti. Dein in Suecia, referente Cl. FERBER, non BUGULA Genevensis, sed *Pyramidalis* unice nascitur. Vide et *Ann. Hist. Nat.* II. p. 54.

718. BUGULA Chamaepeitys.

Bugula foliis imis linearibus, caulinis tripartitis.
HALL. *Hist.* n. 284.

Teucrium foliis trifidis, linearibus, integerrimis;
floribus sessilibus, lateralibus solitariis, caule diffuso. LINN. *Syst. Nat.* p. 387. *Spec. Plant.*
p. 562. n. 5.

DIAGN. Flores solitarii, axillares, flavi. Folia trifida; laciniis angustis.

Habitat circa Vipaccum, et Tergestum.

Calyx labiatus $\frac{3}{2}$. Corollae barba trifida; lacinia media obcordata rubro-punctata, lateralibus longitudo dentium calycinorum. Filamentorum apices villosi. Semina oblonga, utrinque obtusa.

Scopoli *Flora Carn.* T.I. Dd A TEU-

A TEUCRIO separat imprimis corona villorum germina tegentium; a BUGULA vero TOURNEF. solus stylus non bifido, sed simplici capitato et sursum curvato stigmate terminatus; sed basis tubi corollae dilatata, et capsula adinstar semenibus circumposita Genus ostendit.

**II. GERMINIBUS NULLA CORONA
VILLOSA TECTIS.**

237. TEUCRIUM.

LINN. *Gen. Plant.* 625. excepta *Chamaepiti.*

Corolla Bugulae, sed labii segmentum medium subrotundum, non obcordatum.

(*) *Trixagine;* *Calycibus basi non gibbosis.*

719. TEUCRIUM scordium.

Teucrium foliis oblongis, sessilibus, dentato-ferratis; floribus geminis axillaribus, pedunculatis; caule diffuso. LINN. *Syst. Nat.* p. 388. *Spec. Plant.* p. 565. n. 18. *Fl. Carniol.* p. 448. n. 1.

Chamaedrys foliis mollibus, hirsutis, ellipticis, crenatis, verticillis paucifloris. HALL. *Hist.* n. 288. Scordium MATTTH. *Diosc.* p. 559.

DIAGN. *Verticilli sexflori. Folia elliptica, dentata,
breviter petiolata. Odor ALLII.*

Habitat in humidioribus pratis. Iulio M. florens.

Labii laciniae laterales ovatae.

720. TEUCRIUM Chamaedrys.

Teucrium foliis cuneiformi-ovatis, incisis, crenatis, petiolatis; floribus ternis caulibus procumbentibus, subpilosis. LINN. *Syst. Nat.* p. 388. *Spec. Plant.* p. 565. n. 19. *Fl. Carniol.* p. 449. n. 2.

Chamaedrys foliis firmis, ovatis, crenatis; verticillis paucifloris. HALL. *Hist.* n. 286.

DIAGN. *Alae plerumque biflorae. Calyx pedunculo longior. Folia oblonga, villosa, inciso-crenata, subtus pallidiora.*

Habitat in siccis et in cultis.

Dentes,

Dentes, qui galeae locum occupant, tenuiores sunt et erectiores illis, qui labii segmenta lateralia constituent.

Decoctum in Arthritide vaga utiliter adhibetur.

721. TEUCRIUM *Scorodonia*.

Teucrum foliis cordatis, ferratis, petiolatis, racemis lateralibus, secundis; caule erecto. LINN. *Syst. Nat.* p. 388. *Spec. Plant.* p. 564. *Fl. Carniol.* p. 450. n. 4.

Chamaedrys foliis cordatis, productis, spicis longissimis, nudis, heteromallis. HALL. *Hist.* n. 287.

DIAGN. *Racemi secundi. Corollae tubus calyce duplo longior. Folia ovalia.*

Habitat circa Idriam, Seirach, Pellant, in montibus, circa medium Iulii florens.

Folia ima basi emarginata, superiore ovata et dentata. Bractea pedunculo longior, calyce brevior. Calyx ramosis venis nervosus, dentibus aristatis. Corolla ochroleuca, villosula; dentibus obtusis, qui galeae locum occupant. Calyx $\frac{1}{2}$ labiatus; segmento supremo subcordato. Stamina rubra.

722. TEUCRIUM *flavum*.

Teucrum foliis cordatis, obtuse serratis; bracteis integrerrimis, concavis; caule fruticoso; floribus racemosis, ternis. LINN. *Syst. Nat.* p. 388. *Spec. Plant.* p. 565. n. 20.

DIAGN. *Folia ovata, crenata, dura, subtus incana. Caulis mollis villo pubescens, fruticosus.*

Habitat Tergestii.

Verticilli sexflori. Pedunculi calyce non longiores. Calyx aequaliter quinquedentatus. Corollae flavae; segmentis galeae longitudine calycis, obtusis, ciliatis.

723. TEUCRIUM *montanum*.

Teucrum corymbo terminali; foliis lanceolatis, integrerrimis, subtus tomentosis LINN. *Syst. Nat.* p. 388. *Spec. Plant.* p. 565. n. 21.

Chamaedrys foliis integris; angustis, ellipticis, subtus incanis. HALL. *Enum.* p. 632. n. 4.

DIAGN. *Caulis fruticosus. Folia integerrima, lanceolata, subtus tomentosa. Capitula florum terminalia.*

Habitat in lapidosis, et apricis collibus.

Calycini dentes subaequales. Corollae albidae. Stamina rubella. Geminæ ex stipitibus antiquis.

724. **TEUCRIUM Polium.**

Teucrium spicis subrotundis, foliis oblongis, obtusis, crenatis, tomentosis sessilibus caule prostrato.

LINN. *Syst. Nat.* p. 389. *Spec. Plant.* p. 566.

Chamaedrys foliis ellipticis, integerrimis, contractis, subtus incanis, floribus capitatis. HALL. *Hist.* n. 285.

Polium III. TABERNAEM.

DIAGN. *Caulis fruticosus. Tota planta tomentosa. Folia lanceolata, crenata, sessilia, obtusa.*

Habitat circa *Tergestum*, ad *tres Cruces*, et in Possef-
fione L. Bar. DEFIN.

Caulis erectus, rigidus, ramosus, semipedalis. Flores imbricati, racemosi. Bractea longitudine calycis. Corollae flavae segmentum medium concavum, integrum.

(**) *Ivae; Calycibus basi strumosis.*

725. **TEUCRIUM Botrys.**

Teucrium foliis multifidis; floribus lateralibus, ternis, pedunculatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 387. *Spec. Plant.* p. 562. n. 3.

Chamaedrys foliis pinnatis; pinnis obtuse trifidis. HALLER. *Enum.* p. 633. n. 5.

DIAGN. *Folia pinnatifida; laciinis imis trifidis, dein bifidis et simplicibus. Labii pectus album, rubro-punctatum.*

Habitat in faxolis sylvestribusque locis.

Foliorum segmenta subtus villosa, margines reflectunt.

Pe-

Petioli pedunculis longiores. Calyx basi striatus. Villi, qui germina tegunt, citrini, semina fusca, subreniformia, foveolis scrobiculata.

238. MELLITIS.

LINN. *Gen. Plant.* 650. LUDW. BOEHM.
GLEDITSCHE &c.

Calyx labiatus $\frac{1}{2}$. Corollae galea integra, labii segmenta plana et subrotunda. Semina villosa, receptaculo orbiculato imposita.

726. MELLITIS *Melisophyllum*.

Mellitis. LINN. *Fl. Carniol.* p. 459.

Melisophyllum. RIVIN. *Monop.* HALL. *Hist.* n. 244.

DIAGN. *Folia cordata, dentata. Flores secundi.*

Glandulae binae rubellae ad basin singuli penduculi.

Habitat in *Carnioliae* sylvestribus, non rara, Maio florens. Ramosum specimen vidi circa *Duinum*.

Folia cordata aut ovalia, vel utraque in eadem planta.

Verticilli imi sexflori. Pedunculi calyce breviores.

Corollae albae, aut rubello labio instructae, galea ovata, obtusa, planiuscula, quinque lineas longa;

Barbae segmenta rotundata; medio maiore; tubus rectus, uncialis, crassitie calami scriptorii. Filamenta villosa, parallela, dilatata, non cruciformia. Antherae ochroleuco polline plenae. Stylus dilatatus,

bifidus, staminibus longioribus brevior.

239. GALEOPSIS.

LINN. *Gen. Plant.* 637.

Ad basin labii corollae prominet utrinque denticulus cavus, marginalis.

727. GALEOPSIS *Ladanum*.

Galeopsis internodiis caulinis aequalibus; verticillis omnibus remotis; calycibus inertibus. LINN.

Syst. Nat. p. 393, *Spec. Plant.* p. 579. n. 1.

Galeopsis foliis linearibus, ferratis; verticillis diffusi. HALL. Hist. n. 266.

DIAGN. *Caulis sub petiolis foliorum non incrassatus. Corollae limbus ruber.*

Habitat in *Agra Gorizieni, Tergestino, Vipaccensi, &c.* Folia lanceolata, nunc omnia et undique dentata, nunc integra et apice solo dentata.

728. **GALEOPSIS Tetrahit.**

Galeopsis internodis caulinis superne incrassatis; verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus. LINN. Syst. Nat. p. 393. Spec. Plant. p. 579. n. 2. Fl. Suec. 2. 523. Fl. Carniol. p. 467.

DIAGN. *Caulis sub petiolis foliorum incrassatus. Corollae limbus flavus et ruber.*

Habitat in *Agris etiam montanis, frequens.*

Corollae calyce duplo longiores, albae; galea bifida, labii lacinis truncatis: media ad basin signata macula rubro violacea.

— *calyce quadruplo longiores, flavescentes, maiores. Galea integra; apice ferrulata.*

240. **BETONICA.**

LINN. Gen. Plant. 631.

Calyx quinquedentatus; dentibus aequalibus, aristatis. Corollae galea obtusa, labii segmenta obtusa; medio emarginato et crenato, tubus curvus. Stamina exteriora deflorta exseruntur, ut in STACHYDE.

729. **BETONICA officinalis.**

Betonica alis septemfloris; foliis imis petiolatis, rugosis, ovatis, crenatis. Fl. Carniol. p. 462. n. 2.

Betonica spica interrupta; corollarum lacinia labii intermedia emarginata. LINN. Syst. Nat. p. 394. Spec. Plant. p. 573. n. 1. Fl. Suec. 2. 515.

Betonica foliis petiolatis, imis cordatis, superioribus ovatis, crenatis; spica brevifoliis insidente. HALL. Hist. n. 264.

Be-

Betonica MATTHIOL. *Diosc.* p. 611.

DIAGN. *Verticilli 14-flori. Corollae horizonta-*
liter patentibus, sed calyces adscendentibus.

Habitat in pratis siccioribus, et in sylvis.

Calyx sessilis villosulus, bractea oblonga et aristata suffultus. Corollae rubrae galea apicem elevans et modice reflectens. Tubus calyce duplo longior. Filamenta villosa.

241. CALAMINTHA.

TOURN. *I. R. H.* p. 194. *Tab. 92.* et ADANS.
Fam. Pl. p. 192. ea tantum quae Hedera terrestris.

Calyx 15-striatus. Corollae galea plicam dorsalem gerit, quae ex divisura ad calycem usque extenditur. Tubus supra basin lateraliiter intropressus, et hisce tumoribus germina protegens, loco villorum.

730. CALAMINTHA *Hederacea.*

Glechoma foliis reniformibus, crenatis. LINN. *Syst.*
Nat. p. 393. *Spec. Plant.* p. 578. n. 1. *Fl. Suec.*
2. 518. *Fl. Carniol.* p. 465.

Chamaelema caulibus procumbentibus radicatis, foliis cordiformibus, petiolatis. HALL. *Hist.* n. 652.

Hedera terrestris. MATTH. *Diosc.* p. 427.

DIAGN. *Internodia annulo ciliato distincta. Pedunculi ramosi, secundi, involucro communi et partiali diphyllo.*

Habitat circa hortos, sepes, ruderata. Initio Aprilis florens.

Petioli femicylindrici. Folia orbiculata, rugosa, basi cordata, ampliter crenata. Calycis margo rubellus; dentibus subaristatis; nec filamenta, nec Antherae, cruciformem situm habent.

242. CLINOPodium.

TOURN. I. R. H. p. 194. Tab. 92.

Calyx bilabiatus $\frac{3}{2}$. Corollae galea emarginata; labii lacinia media pariter emarginata. Foliola setacea, calycibus interposita.

731. CLINOPodium *vulgare*.

Clinopodium capitulis subrotundis, hispidis; bracteis setaceis. LINN. Syst. Nat. p. 398. Spec. Plant. p. 587. n. 1. Fl. Suec. 2. 533. Fl. Carniol. p. 458.

Chamaelema caule procumbente, radicato; foliis reniformibus, rotunde crenatis. HALL. Hist. n. 245.

Clinopodium vulgare. MATH. Diosc. p. 542.

DIAGN. Pedunculi ramosi densissimum verticillum confitunt. Tota planta molliter hirsuta. Folia ovata.

Habitat in dumis et ad sepes.

Ex ala qualibet suprema prodeunt pedunculi basi ramosi, qui numerosos flores cauli undique circumponunt.

243. THYMUS.

LINN. Gen. Plant. 646. ADANS. Fam. Pl. p. 194.

Calycis bilabiati $\frac{3}{2}$. faux clausa villis. LINN. Syst. Nat. p. 399.

(*) Calamintha; Pedunculis ramosis.

732. THYMUS grandiflorus.

Thymus racemis lateralibus, sparsis; corollis calyce triplo longioribus. Fl. Carniol. p. 457. n. 3.

Melissa pedunculis axillaribus, dichotomis, longitudine florum. LINN. Syst. Nat. p. 400. Spec. Plant. p. 592. n. 2.

Calamintha flore magno. RIVIN. Monopet.

Calamintha montana. &c. I. BAUH. Hist. III. p. 229. Eadem est Calamintha. MORISON. Hist. II. S. II.

Tab. 18. fig. 8. GARIDEL. Hist. Tab. 16.

DIAGN.

DIAGN. *Corolla uncialis. Antherae locula ita disiuncta, ut binae videantur, lunatam figuram constituentes.*

Habitat in axis et sylvestribus locis, *districtus Idriensis.*
Radix debilis. Caulis villosus. Folia ovata, dentata, villosa. Corollae labii duas plicas villosas in pectore gerit, inter quas rubrae maculae.

Calycis fructiferi faucem villis coniventibus clausam habent, quam THYMI character exigit.

733. THYMUS Calamintha.

Thymus racemis lateralibus, secundis, foliis ovatis, ferratis. Fl. Carniol. p. 457. n. 4. descriptio, non synonyma.

Melissa pedunculis axillaribus, dichotomis, longidine foliorum. LINN. Syst. Nat. p. 400. Sp. Plant. p. 593. n. 3.

Calamintha vulgaris. I. BAUH. Hist. III. p. 228.

DIAGN. *Folia pleraque racemis floralibus longiora. Corolla calyce duplo longior.*

Habitat in siccis et aridis locis.

Dissert a priore foliis e lata basi sensim convergentibus, minusque ferratis. Pedunculis gerentibus flores (ad 24), calyce 15-striato. Corollis albis aut subrubris. Seminibus ferrugineis, ovatis, glabris, supra medium triquetris,

VARIAT. *Corollis calyce paulo longioribus, rigido et magis hirsuto caule.*

(**) *Serpylla; Pedunculis unifloris.*

734. THYMUS alpinus.

Thymus verticillis sexfloris; foliis obtusiusculis, concavis, subserratis. LINN. Syst. Nat. p. 399. Spec. Plant. p. 591. n. 5.

Clinopodium foliis ovatis, acutis ferratis; flore folio maiori. HALL. Hist. n. 238.

DIAGN. *Verticilli sexflori. Pedunculi calycibus; calyces corolla breviores.*

Habitat in montanis et alpestribus nostris; non rarus.

Folia ovata, supra medium obiter dentata; petiolis villosis. Pedunculi villosi, duas lineas longi, Calyces striati, pilosi, plus minus violacei. Corolla rubra; segmento medio emarginato.

735. THYMUS Acinos.

Thymus floribus verticillatis; pedunculis unifloris; caulis erectis, subramosis, foliis acutis, serratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 399. *Spec. Plant.* p. 591. n. 4.

DIAGN. *Folia oblonga, acuminata, dura, supra medium dentata. Calyx basi subtus strumosus, striis undecim hispidis elevatis lineatus.*

Habitat passim in aridis locis. Vidi etiam in Scala Templi in *Insula Werth* in medio *Lacus Veldensis*.

Caulis rigidus, ramosus. Foliorum margines reflexi. Calyces patuli. Corollae galea brevis, rotundata. Labii segmentum medium, prope faucem, albidum et villosum.

736. THYMUS Serpyllum.

Thymus foliis ovatis, ad basin ciliatis. HALL. *Hist.* n. 235.

DIAGN. *Folia utrinque punctata: punctis impressis.*

VAR. I. *Foliis ovatis, obtusis, basi ciliatis, superne subvillosis.*

Habitat in *Alpibus*.

Calyces violacei; dentium marginibus ciliatis.

Corollae rubrae. Stamina exserta.

— 2. — *ovatis, obtusiusculis, glabris, basi et infra medium ciliatis.*

Habitat in *Vochinenibus* subalpinis.

Altior et erectior priore. Calyces excolores; dentibus ciliatis. Stamina exserta.

— 3. — *ovatis, obtusiusculis, plerisque minime ciliatis.*

Habitat circa muros.

Anguli caulini villosuli. Corollae magnae.

Stamina exserta.

VAR. 4. *Foliis ovatis, villosis, acuminatis.*

Habitat circa Quelb.

Caulis etiam villosus.

— 5. — *ovatis; supremis in capitulum lanuginosum, coadunatis.*

Habitat in apricis.

CYNIPS, summa folia vitiat, convolvit, ova ibidem ponit.

— 6. — *ovatis, basi ciliatis, verticillis 12-floris.*

Habitat in aridis

Stamina exserta; Corollae parvae.

— 7. — *ovatis non ciliatis; verticillis 12-floris.*

Habitat in montanis.

Stamina non exserta. Corollae pallidae.

— 8. — *ovatis, basi ciliatis: verticillis 12-floris; antheris didymis.*

Habitat prope muros.

Stamina extra galeam divergentia. Stylus post nuptias elongatus.

— 9. — *lanceolatis, obtusiusculis, basi ciliatis.*

Habitat in Alpibus.

— 10. — *lanceolatis, acuminatis; caulis erectis.*

Habitat in collibus Carnioliae interioris.

Folia concava, integra, acuminata. Verticilli 6-flori.

— 11. — *lanceolatis; secundis; caulis repentibus et filiformibus.*

Habitat in Alpibus.

Flores nondum vidi.

Determinatio Linnaeana convenit *Varietatibus 1 — 3.*
nec aliis.

244. SATUREIA.

LINN. *Gen. Plant.* 626. MASTICHINA.

ADANS. *Fam. Pl.* p. 194.

Differt a THYMO calyce non labiato, nec villis superne clauso; ab HYSSOPO corolla minus ringente et staminibus omnibus rectis; exterioribus galea longioribus.

737. SATUREIA *Thymifolia*. Tab. 29.

Satureia racemis lateralibus, solitariis; foliis ovatis, dentatis. *Fl. Carniol.* p. 460. n. 1.

Satureia *Thymifolio*. C. BAUH. *Pin.* p. 219.

Satureia *Dioscoridis*. MATTHIOL. *Diosc.* p. 485.

DIAGN. *Folia ovata, rariter dentata. Pedunculi ramosi; floribus corynibosis. Calyces obtuse dentati, et 15-striati.*

Habitat in muris, *Idriae*.

Folia ramea angustiora et subsessilia sunt.

Authores citati de culta planta loquuntur; attamen **THYMIFOLIA**, et spicatus verticillorum habitus in figura MATTHIOLI, nostram indicant.

738. SATUREIA *Montana*. Tab. 30.

Satureia racemis lateralibus, solitariis; foliis linearilanceolatis, punctatis, duris. *Fl. Carniol.* p. 461. n. 2.

DIAGN. *Folia lanceolata, integerrima, subitus punctata. Calyces 10-striati, acute dentati.*

Habitat copiofa in *Kartschia*, et circa *Quelb.*

Omnino est **HYSSOPUS Goriziensis**. I. BAUHINI, et

SATUREIA montana LINN. nam **SATUREIAM pendunculis lateralibus solitariis, trifloris, foliis carinatis, punctatis, ciliatis ZINN.** ad **Montanam LINN.** retulit Cl. WILLICH. Sed quare in *Horsto Upsaliens*, confunditur cum **SATUREIA duriore?** An diversa ab hac specie est **SATUREIA Perennis RIVINI**, et **SATUREIA Orientalis tenuior ad singulos nodos florifera MORISONII?** Duplex in *Kartschia* montibus occurrit varietas; una minor; floribus rubris, magisque aggregatis, alia maior nec non floribus remotioribus ac pallidioribus. Collae quoque modo maiores sunt, modo vero minores. Omnes convenient radice firma, perenni; Foliis carinatis, duris, punctatis, lanceolatis; Pendunculis 2-5-floris, calycibus non labiatis, inter segmenta patula breves villos marginales eduentibus; Florescentia Semptembri M. Loco natali arido, calcario, montano.

Tab. 29.

737. *Satureia Thymifolia*.



Retsi. Lindley.

Tab. 30.

738. *Satureia Montana*.



245. MELISSA.

PLIN. TOURN. I. R. H. p. 193. Tab. 91.

Calyx labiatus ut in CALAMINTHIS, sed
fauce non clausa villis. Semina ovata.

739. MELISSA *officinalis*.

Melissa racemis axillaribus, verticillatis; pedicellis
simplicibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 400. *Spec.
Plant.* p. 592. n. 1. *Fl. Carniol.* p. 454.

Melissa petalis unifloris, folio brevioribus, foliis cor-
datis, ferratis. HALL. *Hist.* n. 242.

DIAGN. *Ex una basi prodeunt pedunculi uniflori
(ad 5).* Calyx quinquefiliatus.

Habitat spontanea circa Quelb et Tergestum.

Folia ovata, villosa, dentata. Calycis labium superius
breviter tridentatum.

246. ORIGANUM.

TOURN. I. R. H. Tab. 94. LINN. *Gen. Plant.* 645.

Flores distincti squama foliacea spicam con-
stituunt. Calyx quinquedentatus: fauce clau-
sa villis.

740. ORIGANUM *vulgare*.

Origanum spicis subrotundis, paniculatis, con glo-
meratis etc. LINN. *Syst. Nat.* p. 399. *Fl. Suec.*

2. 534.

Origanum foliis ovatis, umbellis coloratis; stamini-
bus exsertis. HALL. *Hist.* n. 233.

DIAGN. Folia subovata, punctata, obtusifuscula.

Spicae terminales. Bracteae ovatae, calyci aut
corollae concolores.

Habitat in montanis et fiscis.

Spicae modo longae et tetragonae, modo subrotundae,
modo vero oblongae sunt; hinc omnis definitio hu-
usque data, claudicans. Flores nunc rubri, nunc al-
bi. Semen ovatum, fuscum.

247. CASSIDA.

COLUMN. TOURN. I. R. H. p. 181. Tab. 84.

Calyx demum clausus, galeae similis.

741. CASSIDA galericulata.

Scutellaria foliis cordato-lanceolatis, crenatis; floribus axillaribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 403. *Sp. Pl.* p. 599. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 538. *Fl. Carniol.* p. 454.

Cassida foliis oblonge cordatis, crenatis, verticillis nudis, bifloris, HALL. *Hist.* n. 280.

DIAGN. *Folia lanceolata, crenata, basi cordata.*

Flores gemini.

Habitat secus aquas.

Folia subtus albidiora; ora reflexa, crenata. Calyx petiolo longior. Stam. 2. minora longitudine styli. Antherae cordatae, apice pilosae.

742. CASSIDA hastifolia.

Scutellaria foliis integerrimis; inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 1106. *Spec. Plant.* p. 599. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 539.

DIAGN. *Folia pone angulata.*

Goritia misit P. WULFEN.

Corollae maiores. Folia obtusa, caeterum priori similis.

248. NEPETA.

TRAG. LINN. *Gen. Plant.* 629. GLEDITSCH.

Calycis dentes tres superiores ab inferioribus rectisque remoti. Corollae labii inferioribus lacinia media concava et ferrata.

743. NEPETA Cataria.

Nepeta floribus spicatis; verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis, cordatis, dentato-ferratis. LINN. *Syst. Nat.* p. 396. *Spec. Plant.* p. 570. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 514. *Fl. Carniol.* p. 470.

Cataria foliis cordatis, petiolatis; verticillis spicatis. HALL. *Hist.* n. 246.

Cataria. MATTHIOL. *Diosc.* p. 482.

DIAGN.

DIAGN. *Folia cordata; petiolata, ferrata, incana.*
Habitat in ruderatis.

Flores albi. Labii lacinia media rubris maculis variegata, decem dentibus ad oram instructa. Racemulus floralis e qualibet ala.

744. NEPETA *violacea*.

Nepeta verticillis pedunculatis, corymbosis; foliis petiolatis, cordato-oblongis, dentatis. LINN.

Syst. Nat. p. 390. *Spec. Plant.* p. 570. n. 3.

Cataria Hispanica. I. BAUH. *Hist.* III. p. 226.

DIAGN. *Folia cordato-oblonga, dentata, obtusa;*
superioribus sessilibus. Verticilli diffiti, racemosi;
racemis dichotomis.

Habitat circa *Cramburgum, Tergestum, et Vipaccum,*
in aridis et apricis.

Caulis humanae quoque statureae, glaber, tetragonus;
angulis caerulecentibus. Racemuli alares bis terque dichotomi; nudo flore singulae divisioni interecto.
Calyx hirtus, decemstriatus, subbilabiatus. Corolla
galea bifida; segmentis rotundatis. Labium punctatum,
pallidum. Tubus pone latior, et ferrugineus.
Filamenta glabra. Calyx fructifer ovatus; dentibus
conniventibus, et amethystinis. Semina fusca, hinc
convexa, inde angulata, ad lentem aspera et alba li-
neola transversa ad basin notata.

249. MENTHA.

TOURN, *I. H. R.* p. 188. *Tab. 89.*

Calycini dentes aequales. Corolla quadrifida;
lacinia superiore emarginata.

745. MENTHA *spicata*.

Mentha floribus spicatis; foliis oblongis, ferratis.

LINN. *Syst. Nat.* p. 392. *Spec. Plant.* p. 576.
n. 2. *Fl. Carniol.* p. 471. n. 1.

Menthastrum. MATTH. *Diosc.* p. 480.

DIAGN. *Folia oblonga, ferrata. Flores spicati.*

Habitat in udis.

Huc pertinent MENTHAE *Ill.* HALLERI 226-228.

746. *MENTHA arvensis.*

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis, acutis, ferratis; staminibus corollam aequantibus. LINN.

Syst. Nat. p. 392. *Sp. Pl.* p. 577. n 6. *Fl. Suec.* 2. 516.

Mentha floribus verticillatis, foliis hirsutis, ovato-lanceolatis, verticillis tomentosis, HALL. *Hist.* n. 223.

DIAGN. *Folia ovata, acute ferrata. Flores verticillati.*
Habitat in agris.

Species haec a *MENTHA Gentili* LINN. differt non aliter, ac *SERPILLA* staminibus exsertis, ab illis, quae stamina inclusa gerunt.

747. *MENTHA Pulegium.*

Mentha floribus verticillatis; foliis ovatis, obtusis, subcrenatis; caulis subteretibus, repentibus, staminibus corolla longioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 392. *Sp. Pl.* p. 577. n. 8. *Fl. Carniol.* p. 471. n. 2.

Mentha caule prostrato; foliis subrotundis, obiter dentatis, staminibus exertis. HALL. *Hist.* n. 221.

Pulegium. MATTH. *Diosc.* p. 475.

DIAGN. *Caules prostrati. Folia subrotunda, obtusa, obsoleta dentata. Flores verticillati.*

Habitat in paludosis et inundatis *Agri Labacensis*, et circa *Hipperlabacum*.

Verticilli densi et nudi.

748. *MENTHA aquatica.*

Mentha floribus lateralibus, glomeratis; foliis ovatis, ferratis; staminibus corolla longioribus. *Fl. Carniol.* p. 472. n. 3.

Mentha floribus capitatis; foliis ovatis, ferratis, petiolatis; staminibus corolla longioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 392. *Sp. Pl.* p. 576. n 3. *Fl. Suec.* 2. 517.

Mentha foliis ovato-lanceolatis; verticillis paucissimis, supremo maximo. HALL. *Hist.* n. 225.

DIAGN. *In verticillis flores adeo multi, ut petioli intra eosdem saepe sepulti sint. Corollae faux villoso.*
Habitat in aquosis.

Calyx subdecagonus. Semina a quaternario numero facile recessentia.

250. VERBENA.

PLIN. MORISON. TOURN. I.R.H. p. 200. Tab. 94.

Corolla infundibuliformis, mentacea, curva. Stamina in hac specie quatuor, obscure didynamia. Stylus apici fructus insidens. Semina stria-ta, oblonga. Ergo planta coniungens LABIATAS et PERSONATAS, in unam classem naturalem.

749. VERBENA officinalis.

Verbena tetrandra; spicis filiformibus, paniculatis; foliis multifido-laciinati; caule solitario. LINN.

Syst. Nat. p. 852. *Spec. Plant.* p. 20. n. 13.

Verbena spicis lateralibus, pedunculatis, foliis oppositi; caule procumbente. LINN. *Syst. Nat.* XII. p. 56.

DIAGN. *Flores in longas spicas laxe dispositi. Folia incisa. Caulis rigidus, apud nos erectus.*

Habitat secus domos et vias in Pagis et Oppidis.

Folia calycis in acumen demum attenuata, villosa; stylus ut in ANGIOSPERMIIS. Habetur pro specifico in Cephalaea, sed experimenta non consentiunt.

ANGIOSPERMIA.

PERSONATAE a VERTICILLATIS diversae, fructu capsulari, stylo terminato, ut in VERBENA. Flora nostra BONAROTAM MICH. suppeditat, quae numero staminum proxima VERBENIS diandris, coniungit easdem cum PERSONATIS.

251. BARTSIA.

LINN. *Gen. Plant.* 657. LUDW. GLEBITSCH. ADANS.

Genus dubium; nostra enim species habet faciem VERONICAE; calycom RHINANTHI, corollam MELAMPYRI, et fructum PEDICULARIS Verticillatae, cuius generis semina quoque possidet, ut, absque magno errore, pro altera specie PEDICULARIS, cum MORISONIO et TOURNEFORTIO haberit possit.

Scopoli Flora Carn. T.I.

E e

750.

750. BARTSIA *alpina*.

Bartsia foliis oppositis, cordatis, obtuse serratis. LINN.

Syst. Nat. p. 405. *Spec. Plant.* p. 602. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 541. *Fl. Dan.* Tab. 43. optime.

Staehelinia foliis cordatis, amplexicaulibus, ferratis,
floralibus coloratis. HALL. *Hist.* n. 312.

Clinopodium alpinum. PON. *M. Bald.* p. 343.

Clinopodium alpinum, hirsutum. PLUK. *Phyt. Tab.* 163.

DIAGN. *Caulis simplex. Flores racemosi. Folia secata,*
sessilia, opposita, cordata, obtuse ferrata. Calyx
quadrididus.

Habitat in *Alpibus Vochinenibus*.

Caulis spithameus, durus, villosus, obtuse tetragonus. Fo-
lia subhirsuta, fusco virore tincta, ex siccitate nigricantia.
Ex summis alis prodeunt flores solitarii, ex rubro caeru-
rulei. Pedunculi glabri, subcaerulei. Galea villosa, sub-
bifida, labio longior. Stamina barbata. Capsula acu-
minata, stylo terminata. Semina subtrigona, in uno
loculo (ad 26).

252. MIMULUS.

PLIN. ADANS. *Famil. Plant.* p. 211.

Cotyla nectarifera, antice basi germinis ad-

sidens. Galea sub apice auriculata. Antherae pi-

lis marginalibus connexae. Semina alata.

MIMULUS PLIN. quamvis alii NUMMU-

LUM legant. C. BAUH. *Pin.* p. 163.

751. MIMULUS *Crista galli*.

Rhinanthus corollarum labio superiore breviore, com-

presso, calyce glabro. *Fl. Carn.* p. 480. Var. (a).

Rhinanthus corollis labio superiore comprepresso, brevi-

ore. LINN. *Syst. Nat.* p. 405. *Sp. Pl.* p. 603. n. 3. *Fl.*
Suec. 2. 542. *Fl. Carn.* p. 480. GRON. *Orient.* 187.

Alectorolophus calycibus glabris. HALL. *Hist.* n. 313.
BOEHM. *Lipf.* 138.

DIAGN. *Galea auriculis bifidis. Nectarium acumi-*
natum. Calyces glabri.

Habitat in pratis sterilioribus.

Folia subtus tuberculosa. Corollae tubus plicatus, deco-

lor.

lor. Galeae auriculae caerulescentes. Stigma obtusum, integrum. Stylus villosus, basi inberbis.

752. *MIMULUS Alectorolophus.*

Rhinanthus corollarum labio superiore breviore, compresso; calyce villoso. *Fl. Carn.* p. 481. Var. (b). *Alectorolophus calycibus hirsutis.* HALL. *Hist.* n. 314. BOEHM. *Lips.* 139.

Pedicularis pratensis, lutea, erectior; calyce floris hirsuto. TOURNEF. *Inst.* p. 172.

DIAGN. *Galea auriculis truncatis. Nectarium rotundatum. Calyces villosi.*

Habitat cum priore.

Differentia haec constantissima, et sufficiens, ut propriam speciem constituat.

253. *EUPHRASIA.*

COLUMN. C. BAUH. TOURN. I. R. H. p. 147. Tab. 78.

Antherae bifidae; segmentis aristatis, vel acuminatis. Capsula oblonga, obtusa, bivalvis bilocularis, calyce quadrifido excepta. Semina elliptica, striata, pedicello uncinato instructa, quo septo adfiguntur 2 - 14. in uno loculo.

753. *EUPHRASIA officinalis.*

Euphrasia foliis ovatis, lineatis, argute dentatis. LINN. *Syst. N.* p. 405. *Sp. Pl.* p. 604. n. 2. *Fl. Suec.* 2. 543. *Fl. Carn.* p. 482. HALL. *Hist.* n. 303. BOEHM *Lips.* 184.

Euphrasia. MATTHIOL. *Diosc.* p. 652.

DIAGN. *Folia sessilia, ovata, dentata; dentibus acutissimis.*

Habitat in pratis.

Stamina non prominent ultra galeam, ut in speciebus sequentibus. Unum par antherarum segmenta in uno latere pilosiora gerit; alterum vero pilos pauciores habet, et segmentum unum aristatum. Capsula emarginata; loculis plerumque dispermiis. Semina rufa.

754. *EUPHRASIA Odontites.*

Euphrasia foliis linearis lanceolatis, ferratis. *Fl. Carn.* p. 483. n. 2.

Odontites, foliis oppositis, lanceolatis; flore purpureo-rascente. SEGUIER. *Veron.* I. p. 269.

Euphrasia foliis linearibus, omnibus ferratis. LINN.

Syst. Nat. p. 405. *Sp. Pl.* p. 406. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 544.

Odontites bracteis ferratis, hirsutis. HALL. *Hist.* n. 304. BOEHM. *Lips.* 142.

DIAGN. *Folia lanceolata. Flores secundi, rubri. Antherae ferrugineae; lobis omnibus aequaliter acuminatis.*

Habitat secus vias, et in agris.

Maior et ramosior. Antherae semibifidae; segmentis non eodem modo acuminatis, ut in priore. Stylus villosulus, longior. Flores uno versu certius dispositi, ac in *E. officinali*.

755. EUPHRASIA lutea.

Euphrasia foliis linearibus, ferratis: superioribus integerrimis. LINN. *Syst. Nat.* p. 405, *Spec. Plant.* p. 604. n. 5. KRAM. *Austr.* p. 181.

Odontites bracteis glabris, integerrimis. HALL. *Hist.* n. 305.

Coris Monspessulana. I. BAUH. *Hist.* III. p. 433.

DIAGN. *Folia linearia, villosula. Corollae flavat. Stamina calyce duplo longiora.*

Habitat circa Goriziam, in montanis Idriensibus, et in colle Medeae.

Caulis obtuse tetragonus. Folia non dentata; ea tamen, quae floribus interiacent, ad lentem denticulata sunt. Calyx quadridentatus. Corollae galea ovata et integra, una cum margine labii villosa. Antherae imberbes. Filamenta rubella. Stylus staminibus longior. Capsula supra medium atro-rubra et pilosa, inferius viridis et glabra. Sem. (ad 10), oblonga, rufa.

Quomodo differt EUPHRASIA *Linifolia* LINN.?

254. MELAMPYRUM.

DIOSC. DODON. TOURN. *I.R.H.* p. 173. *Tab. 78.*

Quadrifidus calyx fustinet corollam longam et bilabiata; labio super indiviso, et concavo, inferiore vero trifido. Antherae cohaerentes; uno pari latiore. Capsulae locula disperma. Semina magna, teretiuscula, tritici seminibus similia. TOURN. Folia coniugata. HALL.

756. MELAMPYRUM nemorosum.

Melampyrum bracteis unifloris coloratis, cordatis; calycibus hirsutis. *Fl. Carniol.* p. 481.

Melampyrum floribus secundis, lateralibus; bracteis dentatis; summis coloratis, sterilibus; calycibus lanatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 406. *Spec. Plant.* p. 695. n. 3. *Fl. Suec.* 2. 547.

Melampyrum foliis ovato-lanceolatis, floralibus hamatis, acute dentatis, patulis; calycibus hirsutis. HALL. *Hist.* n. 309.

Melampyro affinis etc. I. B A U H. *Hist.* III. p. 440.

DIAGN. *Bases foliorum et bracteae laciniatae, coloratae, colore sensim exuentes.*

Habitat circa Goriziam, Cramburgum, Hochdedroutzka etc.

Folia lanceolata. Calycini dentes aequales. Corollae rubrae, ad basin barbae flavescentes.

757. MELAMPYRUM cristaatum.

Melampyrum spicis quadrangularibus; bracteis cordatis, compactis, denticulatis imbricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 406. *Spec. Pl.* p. 605. n. 1. *Fl. Suec.* 2. 545.

Melampyrum foliis integerrimis; floribus spicatis; bracteis duplicatis, cristatis, imbricatis. HALL. *Hist.* n. 311.

DIAGN. *Bracteae conduplicatae; apicibus recurvis; marginibus tenuiter incisis, in quatuor series dispositae spicam tetragonam faciunt.*

Habitat Vipacci, et Tergesti.

Cal. solitarius, sessilis, 4 dentatus: segmentis 2. superioribus longioribus. Corolla rubra; labio et galeae margine flavo, fauce clausa. Stamina duo longiora, e basi barbae; breviora e basi galeae. Stylus simplex, extorsum crassior, apice uncinato. Bractea rubra, recurva, conduplicata, dentata, e cuius sinu calix. Germen glabrum, virens, ovale, acutum, compressum modice.

758. MELAMPYRUM pratense.

Melampyrum floribus secundis lateralibus; foliorum coiugationibus remotis, corollis clausis. LINN. *Syst. Nat.* p. 406. *Sp. Pl.* p. 605. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 348.

Melampyrum foliis imis integerrimis, mediis dentatis,
floralibus hastatis. HALL. *Hist.* n. 308.

DIAGN. *Corollae secundae, clausae. Bracteae basi
dentatae; dente uno maiore.*

Habitat in sylvestribus, non rarum.

Caulis ramosus; ramis diffusis, longis, quandoque caulem
deprimentibus. Folia lanceolata, aut angustiora.

759. MELAMPYRUM *sylvaticum.*

Melampyrum floribus secundis lateralibus; foliorum
coniugationibus remotis; corollis hiantibus. LINN.

Syst. Nat. p. 406. *Sp. Pl.* p. 605. n. 5. *Fl. Suec.* 2. 549.

Melampyrum foliis integerrimis; floribus hiantibus.
HALL. *Hist.* n. 307.

DIAGN. *Folia ovata, integerrima. Corollae hiantes.*
Habitat ad sepes.

Calyx subsefilis. Corolla flava, subclausa. Folia summa
basi dentata, violacea.

255. SQUAMARIA,

LONIC. RIVIN. HALL. *Enum.* p. 611.

Calyx semiquadrifidus. Corollae labium superius
indivisum. Capsula unilocularis, polysperma. Semina rotunda, duabus placentis adfixa.

760. SQUAMARIA *Orobanche.*

Lathraea caule simplicissimo; corollis pendulis; la-
bio inferiore trifido. LINN. *Syst. Nat.* p. 406.
Spec. Plant. p. 606. n. 4. *Fl. Suec.* 2. 550.

Squamaria. RIVIN. HALL. *Hist.* n. 297.

Dentaria major. MATTH. *Diosc.* p. 621.

DIAGN. *Radix alba squamosa. Scapus aphyllus,
simplex. Corollae carneae, pendulae; labio infer.
Albo et trifido.*

Habitat in sylvestribus, umbris locis, circa *Vipacum*,
et in *Carniola* inferiore.

256. PEDICULARIS.

TOURN. I. H. R. p. 171. Tab. 77.

Corollae galea rostriformis ex apice stylum
emittens, faux patula, labium rotunde trifidum;
lacinia

Tab. 31.

761. *Pedicularis Acaulis*.



lacinia media minore. Capsula modice compreffa, apice saepius obliqua, angulosa aut subrotunda, et tunc semina tunicata continens. Generis Illustrator HALLERUS.

(*) *Calycibus cristatis.*

761. *PEDICULARIS Acaulis.* Tab. 31.

Pedicularis alpina, acaulis, floro magno. SEGUIER.
Veron. Suppl. p. 127.

DIAGN. *Pedunculi radicales longitudine calycis.*

Habitat in Alpibus Tolmienibus, circa Ottaleisch. Maior florens.

Radix fusca fibrofa, perpendicularis, perennis. Folia radicalia, duas et tres uncias longa, semiunciam fere lata, pinnata; pinnis pinnatifidis: segmentis dentatis; petiolis semicylindricis. E radice prodeunt pedunculi (4-6), villosum, quatuor lineas longi, simplices, calyce non longiores. Calyx pentagonus et quinquefidus; dentibus foliolo terminatis. Corolla pallide rubra, fere uncialis. Galea conduplicata, obtusa; marginibus villosis. Labium fere aequaliter trifidum; segmentis plica in faucem descendente distinctis. Filamenta infra medium marginibus repando rugosis et membranaceis instructa. Antherae flavae. Stylus longus, apice dilatatus. Stigma rotundatum, e galea prominens. Germen sessile, glabrum, viride, ad basin crassius. Capsulam nondum vidi.

762. *PEDICULARIS palustris.*

Pedicularis caule ramofo, foliis pinnatis; pinnis pinnatis; calyce bifido. HALL. *Hist.* n. 320.

BOEHM. *Lips.* 136. *Fl. Carniol.* p. 480. n. 2.

Pedicularis caule ramofo; calycibus calloso-punctatis; corollis labio obliquis. LINN. *Syst. Nat.* p. 407. *Spec. Plant.* p. 607. n. 1.

DIAGN. *Caulis infra medium ramosus, angulatus. Calyx bifidus, rubens, dein colorem exuens.*

Habitat in pratis paludosis, *Hipperlabacum* inter et *Trifolium* viae novae Domum.

Planta pedalis. Flores purpurei, breviter pedicellati. Calycina segmenta adlicantur latere tubi corollae. Ca-

psula

psula nitens, compressa, acuminata, apice deflexa, et unilocularis; futura superiore acutiore. Loculum unum octo, aliud duplo plura semina continet. Septum valvis contrarium. Semina ovata, acuminata.

763. PEDICULARIS tuberosa.

Pedicularis caule simplici; calycibus crenatis; corollis galea rostrato-adunca. LINN. *Syst. Nat.* p. 408. *Sp. Plant.* p. 610. n. 14. *Fl. Carniol.* p. 480. n. 1.

Pedicularis caule simplici, floribus spicatis, rostratis; calycibus glabris. HALL. *Hist.* n. 323. Tab. X.

DIAGN. Corollae ochroleucae galea nitidula, saturatior, longe rostrata, ad laevum latus, flectitur et incumbit segmento medio labii inferioris.

Habitat in Alpibus Vochinenibus et Tolmiensibus.

Radicem bulbosam non invenio. Folia radicalia pinnata: pinnis alternis, utrinque (17), pinnatifidis; laciniis dentatis et margines deflectentibus. Scapus spithameus, simplex, foliosus; foliis (7-8), e quorum singula basi decurrent per caulem duae lineae elevatae. Flores in densam spicam dispositi. Galeae rostrum truncatum, sub calyce quolibet bractea multifida; laciniis incisis. Pedunculus duas lineas vix longus. Calyx glaber. Filamenta duo supra medium barbata, alia imberbia. Antherae flavae.

764. PEDICULARIS rostrata.

Pedicularis caule declinato subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus cristatis, subhirsutis. LINN. *Syst. Nat.* p. 407. *Spec. Pl.* p. 607. n. 3.

Pedicularis caule procumbente ramoso; floribus rostratis, sparsis. HALL. *Hist.* n. 322. Tab. VIII. fig. 3.

DIAGN. Corollae purpureae galea rostrata; rostro sinistrorum flecto.

Habitat in Alpibus non rara.

Caulem subramosum nondum vidi. Folia alterna, pinnata; pinnis pinnatifidis. Racemus laxior ac in priore.

(**) Calycinis dentibus nullo ornamento foliaceo terminatis.

765. PEDICULARIS comosa.

Pedicularis caule simplici, spica foliosa, corollis galea obtusa.

obtusissimis, integris; calycibus quinquedentatis.
IACQUIN. *Austr.* p. 112. Obs. 51.

Pedicularis caule simplici; spica foliosa; corollis galea acuta, emarginata, calycibus quinquedentatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 407. *Spec. Pl.* p. 609. n. 13. sed quare galea acuta dicitur, cum tamen obtusam ostendat HALLERI figura, et descriptio SEGUIERII *Veron. Suppl.* p. 124. dum ait — *spica densa floribus ochroleucis, quorum galea valde obtusa est.*

Pedicularis spica foliosa. HALL. *Hist.* n. 317. Tab. IX. f. 1.

DIAGN. *Longa inter flores folia comosam spicam constituant. Calyces pentagoni glabri; Corollae ochroleucae, tubo duplo breviores.*

Inveni supra Schenoschetz, in Monte Gora.

Calycini dentes breves. Corollae tubus interne villosus. Filamenta, sub antheris, villosa, basi attenuata. Receptaculum latum, sustinens germen viride, compressum, pyriforme.

766. PEDICULARIS verticillata.

Pedicularis caule simplici; foliis quaternis. LINN. *Syst. Nat.* p. 407. *Spec. Plant.* p. 608. n. 5.

Pedicularis foliis pinnatis; quaternis; floribus purpureis, spicatis. HALL. *Hist.* n. 319. Tab. VIII. fig. 2.

DIAGN. *Folia quaterna. Calyx ovatus, inflatus, 10-striatus; striis supra medium villosis et verrucosis.*

Habitat in Alpibus nostris, non rara.

Folia pinnata; pinnis ovatis, obtusis, dentatis, sessilibus; petiolis canaliculatis. Calyx breviter quinquedentatus; dentibus superioribus maioribus. Galea ad apicem latior quam in medio. Antherae fuliginosae. Galea obtusa, medio labii loco perpendicularis. Capsula apice unilocularis. Receptaculum seminum in uno loculo majori parte degens. Semina rufa, oblonga, rugulosa, (10).

257. ANTIRRHINUM.

LINN. *Gen. Plant.* 668.

Calyx quinquefolius irregularis. Corolla labium superius bifidum. Stamina in imo flore latentia. Capsula varie dehiscens.

(*) *Calcarata.*

LINARIA. TOURN. ADANS.

767. *ANTIRRHINUM alpinum.*

Antirrhinum racemis terminalibus; foliis verticillatis;
caule diffuso. *Fl. Carniol.* p. 475. n. 1.

Antirrhinum foliis quaternis, linearis-lanceolatis, glau-
cis; caule diffuso; floribus racemosis; calcari re-
cto. LINN. *Syst. Nat.* p. 410. *Spec. Pl.* p. 615. n. 16.
KRAM. *Austr.* p. 184. n. 2. IACQUIN. *Austr.* p. III.

Antirrhinum caule procumbente, breviter spicato; fo-
liis verticillatis. HALL. *Hist.* n. 338.

Linaria stiriaca. CLUS. *Hist.* 3. p. 322.

DIAGN. *Folia quaterna, glauco-viridia, linearia.*

Flores in summis caulis racemosi, corollae rubrae
mentum aurantium, calcar subulatum acuminatum
longitudine galeae.

Habitat in ruinis Alpium, unde semina a nivibus et aquis
abrepta, quandoque in planitiem deseruntur, et ger-
minant circa torrentes.

Radix multicaulis, debilis, saepe non sufficit sustinendis
caulis, qui basi procumbunt. Elegans densusque flo-
rum racemus caulem singulum terminat, quorum unita
gravitate planta saepe deprimitur. Lineae duae, mento
concolores, parallelae, in fauce corollae, quibus stamina
maiora incumbunt. Antherae cohaerentes, luteo polli-
ne plenae.

768. *ANTIRRHINUM Linaria.*

Anthirrhinum racemis terminalibus; floribus imbrica-
tis, foliis linearibus confertis. *Fl. Carn.* p. 475. n. 2.

Antirrhinum foliis linearibus, adscendentibus, conge-
ftis, caule erecto, spicato. HALL. *Hist.* n. 336.
BOEHM. *Lips.* 143.

Antirrhinum foliis lanceolato linearibus, confertis, cau-
le erecto; spicis terminalibus, sessilibus, floribus im-
bricatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 411. *Spec. Plant.*
p. 616. n. 21. *Fl. Suec.* 2. 557.

DIAGN. *Folia angusta, longa, multa. Flores flavi*
in summis ramis imbricati, spicati.

Habitat in cultis, et incultis.

769. AN-

769. ANTIRRHINUM minus.

Antirrhinum floribus solitariis; foliis sublinearibus, alternis, obtusis. *Fl. Carniol.* p. 476. n. 3.

Antirrhinum foliis plerisque alternis, lanceolatis, obtusis; caule ramosissimo diffuso. *Linn. Syst. Nat.* p. 411. *Spec. Plant.* p. 617. n. 24. *Fl. Suec.* 2. 558.

Antirrhinum viscidum, foliis inferioribus coniugatis, ellipticis, obtusis, hirsutis, calcare dimidii floris longitudine. *HALL. Hist.* n. 335.

Antirrhinum III. MATTTHIOI. *Diosc.* p. 742.

DIAGN. *Viscidulum, ramosissimum, villosum; foliis lanceolatis et calycibus obtusis.*

Habitat in fccis et arenosis,

Capsula ovata, apice dehiscentia; loculis trivalvibus; valva media maiore.

770. ANTIRRHINUM Cymballaria.

Antirrhinum floribus solitariis, foliis quinquelobis, alternis, cordatis. *Fl. Carniol.* p. 476. n. 4.

Antirrhinum foliis cordatis, quinquelobis, alternis; caulis procumbentibus. *Linn. Syst. Nat.* p. 409. *Spec. Plant.* p. 612. n. 2.

Antirrhinum caule repente; foliis reniformibus, quinque lobatis. *HALL. Hist.* n. 339.

Cymballaria MATT. *Diosc.* p. 706.

DIAGN. *E muris propendens planta foliis alternis, quinquelobis, basi cordatis; pedunculis alaris solitariis.*

Habitat Vipacci, tergesti, Goriziae, &c.

Foliorum inferiorum lobi obtusiores. Labii super segmenta subtus lineam fuscum habent, inferioris labii mentum flavo-croceum. Calcar calyce non longius. Capsula subrotunda. Semina ferruginea, in uno loculo (ad 9). Variat corollis albidis, mento fine macula crocea, seminibus albis (15) in uno loculo.

771. ANTIRRHINUM spurium.

Antirrhinum foliis ovatis, alternis; caulis procumbentibus. *Linn. Syst. Nat.* p. 409. *Sp. Pl.* p. 613 n. 4.

Antirrhinum caule probumbente foliis villosis, ovatis, imis coniugatis, superioribus alternis. *HALL. Hist.* n. 341.

DIAGN.

DIAGN. *Caulis prostratus. Folia ovata. Flores solitarii.*

Habitat in arvis.

Facies VERONICAE Hederifoliae. Superficies villosa.

Folia imma opposita. Calcar longitudine labii. Stylus basi ruber. Semina in uno loculo (ad 10).

772. ANTIRRHINUM Elatine.

Antirrhinum foliis hastatis, alternis; caulis procumbentibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 409. *Sp. Pl.* p. 612. n. 3.

Antirrhinum caule procumbente; foliis hastatis, imis coniugatis, superioribus alternis. HALL. *Hist.* n. 340.

DIAGN. *Habitus prioris, sed folia hastata.*

Habitat in arvis *Gorizienibus* et *Tergestinis*.

Folia caulinis ovata, dentata, ad ramos integra et subhastata. Differt ab ANTIRRH. *spurio* ut SCUTELLARIA *Hastifolia* a *Galericulata*.

(**) *Inermia.*

ANTIRRHINVM. TOURN. ADANS.

773. ANTIRRHINUM maius.

Antirrhinum corollis ecaudatis; floribus spicatis, calycibus rotundatis. LINN. *Syst. Nat.* p. 411. *Spec. Plant.* p. 617. n. 25.

Antirrhinum foliis ellipticis, obtusis, floribus spicatis, calycibus obtusis, calcare brevissimo. HALL. *Hist.* n. 333.

Antirrhinum I? II. MATH. *Diosc.* p. 742.

DIAGN. *Calycina folia ovata. Flores spicati, speciosi.*

Habitat *Goriziae*, super muros horti *Capucinorum*. Grandiflorum et bienne. Capsula lateraliter fenestratum dehiscent. Semina nigra, angulosa et aspera.

774. ANTIRRHINUM orontium.

Antirrhinum corollis ecaudatis; floribus subspicatis; calycibus corolla longioribus. LINN. *Syst. Nat.* p. 411. *Spec. Plant.* p. 617. n. 26.

Antirrhinum foliis ellipticis, obtusis, floribus sparsis; calycibus subulatis, longissimis; calcare brevissimo. HALL. *Hist.* n. 334.

Antirrhinum angustifolium, sylv. I. BAUHIN. *Hist.* III. p. 464.

DIAGN.

DIAGN. Flores remoti, laterales. Calyces lineares, corolla longiores.

Gorizia misit. P. WULFEN, et Ego Duini reperi, nec non in agris circa *S. Martinum. Cranburgi.*

Folia linearia, deflexa. Calycinæ folia omnia flore longiora, inaequalia; medio longissimo. Flores non sessiles, sed pedunculati: pedunculis fructu brevioribus. Corolla rubra, mutica. Germen villosum; apice tuberibus tribus. Stylus capsula brevior, pedunculo longior.

258. SCROPHULARIA.

BRUNFELS. GESN. TOURN. I. R. H. p. 166. Tab. 74.

Calyx quinquefidus subhaemisphaericus. Corollæ tubus subrotundus. Filamenta explicanda dispensatis nuptiis. Scutella nectarifera sustinens germen. Capsula bivalvis, bilocularis, sed in medio loco septi est receptaculum crassum. Valva singula marginem inflectit, eaque flexura septum constituit, ut in VERBASCO.

775. SCROPHULARIA nodosa.

Scrophularia foliis cordatis, transversis; caule obtusangulo. LINN. Syst. Nat. p. 413. Spec. Plant. p. 619.

n. 2. Fl. Suec. 2. 560. Fl. Carniol. p. 477. n. 1.

Scrophularia caule quadrangulari, paniculato, foliis cordato oblongis. HALL. Hist. n. 326.

Scrophularia M A T T H. Diosc. p. 709.

DIAGN. Folia basi cordata; segmentis subtruncatis. Racemi florales superiores alterni, dichotomi.

Habitat ad vias et hortorum reiectanea.

Calycinæ segmenta rotundata, ad lentem denticulata. Corollæ rectus subtetragonus. Filamenta interiora basi incurva. Receptaculum rubellum, utrinque elevat dentem et adplicat sulco germinis. E basi nectarii nascitur ligula, adnata tubo corollæ et demum divergens in laminam truncatam crenulatam, sub labio superiore positam. Capsula ad septum ita inflexa, ut duae distinctæ videantur.

776. SCROPHULARIA aquatica.

Scrophularia foliis cordatis, obtusis, petiolatis, decurrenti-

rentibus; caule membranis angulato; racemis terminalibus. LINN. *Syst. Nat.* p. 413. *Sp. Pl.* p. 620. n. 3.

Scrophularia caule quadrangulo alato, paniculato; foliis ovato lanceolatis. HALL. *Hist.* n. 325.

DIAGN. *Caulis quadratus; angulis alatis. Folia cordata.*
Habitat in aquofis.

Folia subracemis lanceolata. Calyces non dentati. Pedunculi angulati.

777. SCROPHULARIA Auriculata. Tab. 32.

Scrophularia foliis cordatis, subtus tomentosis, oblongis, basi appendiculatis; racemis terminalibus.
LINN. *Syst. Nat.* p. 413?

Scrophularia aquatica montana, mollior. BARRELLIER. Tab. 274.

DIAGN. *Folia cordata, dentata, sub racemis lanceolata. Calycina segmenta ovata; oris ferrugineis.*

Inveni in Alpibus Vochinenibus.

Radix multicaulis. Caules simplices cubitales, tetragoni, villosuli erecti. Folia ima opposita, petiolis propriis triplo longiora. Racemi pauciflori. Pedunculi villosi vallis capitatis. Corollae flavae, labium unum bifidum, alterum trifidum: segmento medio haemisphaericō et inflexo. Filamenta recta, plana, glabra. Capsula ad basin duas lineas lata, glabra. Semina in uno loculo (ad 70).

Specimina mea omnino convenienter cum iconē BARRELLIERII, et si folia longiora et acutiora possideat. Hanc ipsam Plantam vidi in Herbario Cl. IACQUINII, quam Vir. Cl. cum iconē mea collatam, eandem esse iudicavit. An vero sit SCROPH. auriculata LINNAEI, tuto dicere non possum. Linnaeana enim planta habet caules non pilosos, ramosos. Folia subtus tomentosa, fere ternata, et corollas purpureas, quae notae defunt in mea planta.

778. SCROPHULARIA canina.

Scrophularia foliis pinnatis; caule paniculato. *Fl. Carniol.* p. 478. n. 4.

Scrophularia foliis pinnatis; racemo terminali, nudo; pedunculis bifidis. LINN. *Syst. Nat.* p. 414. *Spec. Plant.* p. 621. n. 9.

Scro-

Tab. 32.

777. *Scrophularia Auriculata*.



Scrophularia foliis pinnatis; pinnis lobatis, circumser-
ratis, caule paniculato. HALL. Hist. n. 328.

DIAGN. *Folia pinnata; pinnae pinnatifidae. Caly-
cis margo albicans.*

Habitat passim ad vias.

Racemi alterni, trifidi; flore ramis interiecto. Corolla ob-
scure rubra; segmentorum marginibus albidis. Stylus
deflexus, teres, attenuatus, albidus, glaber. Germen
pyriforme. Semina in una capsula (ad 30) nigra, rugo-
sa, subtetragona.

259. DIGITALIS.

GESN. C. BAUH. TOURN. I. R. H. p. 165. Tab. 73.

Corolla campanulata, ventricosa, quinquefi-
da. Filamenta longiora basi incurva, adfinitatem
cum SCROPHULARIA demonstrant. Antherae
obliquae, obtusae, basi semibifidae. His addit sta-
men quintum sterile ADANS.

779. DIGITALIS *lutea*.

Digitalis calycinis foliolis lanceolatis; corollis acutis;
labio superiore bifido. LINN. Syst. Nat. p. 414.

Spec. Plant. p. 622. n. 2. Fl. Carniol. p. 478.

Digitalis foliis calycinis lanceolatis, galea bifida; fau-
cibus immaculatis. HALL Hist. n. 332.

DIAGN. *Flores lutei, secundi; segmentis acuminatis.*
Habitat passim in montibus nostris, initio M. Iuli florens.
Folia lanceolata, semipedalia, nervosa, sessilia; nervis sub-
tus villosis. Calycinum folium superius brevius. Ca-
lyx, stylas, germen, capitatis villis pubescunt.

780. DIGITALIS *purpurea*. LINN. Syst. Nat. p. 414.
In Monte sancto P. WULFEN.

781. DIGITALIS *ferruginea* LINN. Syst. Nat. p. 414.
In Istria Ill. a MYGIND. Mihi utraque adhuc ignota.

260. OROBANCHE.

DIOSC. CLUS. TOURN. I. R. H. p. 175. Tab. 81.

Calyx bifidus. Antherae cohaerentes, locu-
lis acumine terminatis. Stigma obcordatum tu-
berculum flavum, corollam inter et basin singuli-
sta-

staminis. Capsula unilocularis. Ill. HALL. ponit calycem quadrifidum, tubam proboscidi similem. Receptacula seminum bina.

782. OROBANCHE *maior*.

Orobanche caule simplicissimo, pubescente; staminibus suberectis. LINN. *Syst. Nat.* p. 422.

Orobanche caule simplici; stipula unica; calyce quadrifido. HALL. *Hist.* n. 295.

Orobanche. MATTTH. *Diosc.* p. 379.

DIAGN. *Scapus simplex, carnosus, floribus concolor.*
Habitat in pratis.

Galeae et labii laciniae dentatae.

OROBANCHE, LATHRAEA, MONOTROPA, NIDUS AVIS, facie convenient.

261. VITEX.

TRAG. TOURN. I. R. H. p. 603. Tab. 373.

Corolla labiata $\frac{3}{4}$. Stigmata duo. Bacca globosa, quadrilocularis; loculis monospermis.

Obscura generis adfinitas; inflorescentia et corolla VERTICILLATARUM; fructus et filamenta inaequalia, ut in DAPHNE. Folia lanceolata, et vires medicae SALICIS. Cl. ADANS. VERBENIS adnumerat, sed, meo iudicio, planta haec, una cum Avicennia LINN. alteri familiae adiungi posset.

783. VITEX *Agnus castus*.

Vitex foliis digitatis, serratis; spicis verticillatis. LINN.

Syst. Nat. p. 426. *Spec. Plant.* p. 938. n. 1.

Agnus folio non serrato. I. BAUH. *Hist.* I. p. 205.

Vitex MATTHIOL. *Diosc.* p. 155. IONSTON. *Dendr.*

L. 5. P. VI. Tab. 73. GRONOVI. *Orient.* 191.

DIAGN. *Folia quinata, lanceolata. Capitula floralia verticillata.*

Habitat circa Tergestum et in Istria.

Petiolus unus sustinet folia quinque, superne fuscenscia, subtus tomentosa. Calyces tomentosi. Stylus staminibus et corolla longior. Stigmata bina, divaricata.



卷之三

