



129





S Y N O P S I S
NOSOLOGIÆ METHODICÆ,
EXHIBENS
CLARISS. VIRORUM
SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII, SAGARI, ET
MACBRIDII,
SYSTEMATA NOSOLOGICA.

E D I D I T
SUUMQUE PROPRIUM SYSTEMA NOSOLOGICUM

A D J E C I T
GULIELMUS CULLEN,

MED. D. ET IN ACAD. EDINB. MED. PRACT. PROF.
MEDICUS REGIUS APUD SCOTOS PRIMARIUS,
ET COLL. REG. MED. EDINB. SOCIUS;
NEC NON SOCIETATUM REG. LOND. REG. EDINB.
PHILOS. PHILADELPH. MED. REG. PARIS.
MED. HAUNIENS. ET REG. MED. EDINB.
SODALIS.

EDITIO QUARTA,
EMENDATA ET PLURIMUM AUCTA,
DUOBUS TOMIS
T Q M II.

EDINBURGI:
Prostant venales apud GULIELMUM CREECH; et J.
MURRAY, No. 32, FLEET STREET, LONDON.

567402

2.



13.4.2005

200506183

P A R S S E X T A,

G E N E R A

M O R B O R U M

P R Ä C I P U A

D E F I N I T A,

A D D I T I S S P E C I E B U S

C U M H A R U M E X S A U V A G E S I O S Y N O N Y M I S ,

A

G U L I E L M O C U L L E N ,

Edinburgi 1785.

А Т Х Е З Я А

А Я Б И Д Г

М У Я О Я О М

В Е Т С И Я У

А Т И И Г Е С

С П Р А Г А Т А

О М А Н А С К А В А У А О Р С О С У М О Н Т М И С

А Т И И Г Е С

А Т И И Г Е С

Л е г и с т и чес к и

PROLEGOMENA.

RES est inter medicos satis nota, morbos quosdam natura sive causa proxima diversos, externa tamen facie, sive symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

DUM medici vero, in ipso artis usu versati, de morbis distinguendis saepe incerti fint, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quae hanc ambiguitatem solvere valeant. Saepe quidem observatum est, descriptiones, sive historias,

A

quas

quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiendas, plerumque mancas et imperfectas esse; et nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

PUTARUNT quidem multi, medicos veteres Graecos et Romanos, in observandis et notandis morborum phaenomenis, diligentibus et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quae nobis utilles esse possint extare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitionem antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re aestimationem nimiam conciliaisse. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quaedam quae morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quae autem ejusmodi ibi occurunt, quantumcunque a recentioribus aestimata, parum profecto nos docuissent,

docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum autoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum plerasque, quae in scriptis veterum jam inventiuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversae pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum faltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

NEC nisi fero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces,

in instauranda veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

NEC ejusdem aevi medici chemici, Galeniconum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertebant.

HINC quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullae fere morborum historiae plenae vel accuratae conscriptae sint. SYDENHAMUS vero, sagacitate et iudicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phaenomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit, et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem et

et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

AD hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius reddendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis haec vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabilendas, alii ad fidem remediis ab ipsis five inventis five multum laudatis conciliandam; vel veritatem, praeconceptis occaecati, non percipiebant, vel etiam fictis

et

et falsis corrumpebant. Plures, re omni quovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem praeter modum amplificarunt. Plures denique, ut observationibus hodie adeo expeditis, famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Haec omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta haetenus morborum historia satis clare constaret; sed haec omnia impraesentiarum praetermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

MULTI optimae etiam fidei medici, in morbis observandis diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cuiusvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quo-vis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia

ventitia et fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quae ad distinctionem cuiusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorum reddiderunt.

DE hacce in historiis morborum redundantia saepe conquesti medicinam facientes, pathognomonica quae dicuntur desiderarunt; hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quae cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico et certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomonica in scriptis medicis nondum data, neque unicuique morbo assignata sunt; nec quantum video nisi per Nosologiam methodicam, rite institutam, assignari queunt.

DUDUM quidem SYDENHAMUS et solers BAGLIVIUS, quo facilius et certius morbi distingue-

distinguenterunt, morbos omnes, per normam methodi botanicae, ad genera et species, appositis characteribus idoneis, referri voluerunt: Id est, ut institueretur Nosophoria methodica. Hoc etiam consilium alii summae famae medici comprobarunt, et quisque, ni fallor, in artis usu occupatus factum fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi protinus tentatum fuit; an quidem ex fructu inde capiendo parum perspecto, an vero ex difficultate operis praevisa, non constat; sed revera nihil omnino tentatum fuit, donec celeberrimus FRANCISCUS BOISSIER DE SAUVAGES, circa annum 1732, rem aggressus sit.

Quæ quidem, exeunte seculo decimo sexto, FELIX PLATERUS in morbis secundum symptomata ordinandis conatus est quodammodo huc referri possunt; conatus autem isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut quenquam eosdem prosecuturum esse vix expectandum fuit; et revera ante SAUVAGE-

SIUM nemo, quantum novimus, ulla ex parte prosecutus est. Haud dissimulandum quidem, PLATERUM SAUVAGESIO quaedam suggeſſiſſe; pauca tamen, nec fausta admodum, et quae nemini uſui fuiffent, niſi SAUVAGESIUS, cum meliore ſpe, opus multo longius provexiſſet.

IPSE quidem SAUVAGESIUS primum len-te et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non niſi post multam lectionem, et affiduam per triginta annos meditationem, Nosologiam methodicam ſuam, anno 1762 editam, protulit.

INTEREA, duo alia, in Nosologia methodica, tentamina facta ſunt; alterum a celeberrimo viro, et in distributione rerum methodica plurimum exercitato, CAROLO A LINNE; alterum ab erudito Professore Gottingensi, RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL. A neutro tamen, utpote vestigiis SAUVAGESII preſſe nimis iſſtente, opus multum promotum fuiffe videtur.

B

CUM

CUM de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinae praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiae methodicae studium alicere; et, quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere SAUVAGESII, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quae ad genera et species morborum distingendas pertinerent excerpti, et cum his LINNÆI et VOGELII libellos integros conjunctos edidi.

AUCTORES hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

DIFFICILE

DIFFICILE quidem erit, hanc rem protinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promovere arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc, et si nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

Qui ante nos huic studio operam dederrunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species pa- rum perspectas habentes, ad suprema clas- sium et ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero, species so- lum datae sunt; et generum constitutio est mentis humanae excogitatio, quae, donec species omnes bene notae et perspectae fue- rint, fallax et incerta erit; et in generibus quidem constituendis, nisi ad species sem-

per respiciamus, labor noster vanus et futilis evadet.

CONSTITUTIO generum supremorum, in quovis rerum systemate, neutquam adhuc absoluta est. Clases enim vel etiam ordinēs, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali, nondum ubique constitutae sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possumus.

CUM res distinguendae, numero quam plurimae sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quaedam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosae sint, et quarum sigillatim recensitarum reminisci, memoriae in plerisque hominibus vires non excedat, eas, summa sollicitudine, ad classes et ordinēs referre vix opus esse videtur.

ITA Illustris DE BUFFON quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quae in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

ILLUSTRI tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad majorem accurationem diligenter perducendam esse, puto.

ENIMVERO, si ab illusione quae ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et, ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad pleniores et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendeo. Etsi enim ejusmodi institutionem,

tutionem, ubique certam et accuratam semper assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, saepe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per symptoma cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quaecunque in rerum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et hujusmodi distinctio generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

QUANTACUNQUE tamen ex instituendis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei praecipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex hujus studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despixerint, alii vero impossibilem judicaverint.

Qui

Qui impossibilem putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficultem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Haec autem indicia nulla alia esse possunt, quam quae morbum quemque per genus et speciem definiant, quae rursus per methodum Nosophorica, rite institutam, solummodo exponi queant.

DISTINCTIONEM itaque morborum, hactenus saepe dubiam, per Nosophoriam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum expondere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facilime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius

curatius considerandas, vel ad observatio-
nes postea diligentius faciendas, ducent;
quin et plurimum valebunt, tum ad Noso-
logiam methodicam, tum ad distinctionem
morborum, tandem perfectiorem redden-
dam.

QUAMVIS morborum characteres hacte-
nus propositi saepe erronei, saepe deficien-
tes sunt; tentamina tamen omnia jam fac-
ta exhibere cupiens, in tertia Synopsis edi-
tione ex systemate symptomatico CL. MI-
CHAELIS SAGAR, quae ad genera morbo-
rum definienda pertineant, excerpti, et in
hac quarta editione, Ingeniosi Davidis Mac-
bride, Tabulas Nosophicas addidi, et caete-
ris supra memoratis subjunxi. Haec au-
tem tentamina omnia simul edita sunt, ut
juxta posita facilius conferri possint, et ut
collata vel optimos et maxime idoneos cha-
racteres indicent, vel ad erroneous corrigen-
dos, et ad distinctiones magis exactas obti-
nendas, lectores ducant.

HUJUSMODI

HUJUSMODI studium plurimis medicis necessarium fore facile credo; nam morborum titulis inherentes, notiones parum accuratas et determinatas habent; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiae methodicae studio, duci vix possunt.

Ex iis quae jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiae Methodicae manifestam fore spero; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

PRIMA et praecipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis aegris praesentes detergerentur et diagnoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definiri possint; et cum genera plura a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus praefertim distinguens,

dis, impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus; et ad eas dignoscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles fore speramus.

IN generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui; quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiamsi enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo; cum enim discipuli nostri genera facile et satij certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

GENERALIA morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt; et hujus rationes postea locis idoneis tradendae venient. In-
terea

terea notandum, plura genera, quae primo intuitu omissa videantur, nequaquam ex oculis studiosorum sublata esse, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti synonyma recenseantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

DEINDE, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathicā et primaria notanda esse duximus; dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, sive symptomata nusquam per se existentia; et neutiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita *Carphologia*, *Pandiculatio*, *Rigor*, *Sternutatio*, *Oscedo*, *Singultus*, *Stertor*, *Anxietas*, *Lassitudo*, *Stupor*, *Pruritus*, *Algor*, et *Ardor*, a SAUVAGESIO, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

DENIQUE, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus VITIORUM et

et DEFORMITATUM, plura a nobis omit-tuntur; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem et curam non me-reantur; vel quod congeniti et immutabi-les medicorum artem penitus eludant. Ita *Lentigo*, *Leuce*, *Cyasma*, *Seline*, et *Cicatrix*, ex classe VITIORUM; et *Phoxos*, *Gibber*, *Rhysemata*, *Canities*, *Coloboma*, *Naevus*, *Monstrositas*, *Rhino-sis*, *Varus*, *Valgus*, *Leio-pedes*, *Saniodes*, *Cripsorchis*, *Hermaphroditus*, *Dionysiscus*, *Galiancon*, *Galbulus*, et alia ex classe DEFORMITATUM apud VOGELIUM recensita, recte a nobis omissa putamus. Ejusmodi vitia et deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali, mutatio-num quas, quavis occasione, subit corpus humanum notari possent; Nosologiam au-tem methodicam iis adeo frivolis onerare, vel eandem tam multis novis et inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam me-rito gloriatur Cl. SAGAR, se generum nu-merum auxisse.

QUOD,

QUOD, modo memorata omiserim, venia
forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem
alii morbi, memoratu quidem digni, quos
omissos non adeo facile condonabit studi-
osus. Hujusmodi omissiones agnosco, et
quidem doleo; sed variae rationes, ut qui-
dam morbi hic omitterentur, effecerunt.
Primo, fieri potest, ut quidam observatio-
nem nostram penitus effugerint; dein, sunt
alii satis noti, quibus, in nostro systemate,
locus idoneus nusquam inventus est; deni-
que, sunt alii quorum historia apud medi-
cos adeo sit imperfecta, ut nec locus nec
character idoneus iis assignari queat. Ne
tamen ejusmodi genera penitus omitteren-
tur, ad calcem operis, omissorum, quotquot
noverim, catalogum subjunxi, ut posteri
perspicaciores, ea diligentius perpendentes,
characteres et locum iis assignent.

EODEM consilio, ne scilicet tyronibus
contemplanda praeter necessitatem multi-
plicarentur, non genera solum, sed species
morborum etiam ad minorem numerum
redegì.

fedegi. Hoc magis periculofum videri potest, cum nullam speciem, quae revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensionem specierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timidum antehac diu cohibuit ; et id tantum tentare ausus sum, ut species, a SAUVAGESIO recensitas, serie paulo luculentiore et emendatiore traderem : Re autem amplius, et curatius perpensa, species jam recensurus, numerum eorum, apud SAUVAGESIUM recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

SOLUS quidem SAUVAGESIUS, nam SAGARUM nihil moror, in recensione specierum quicquid praestitit ; et licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re medica meritus sit ; haud tamen dissimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa appellatione repetitas, pro diversis ponebat ; et praesertim dum species sympatheticas, tam saepe idiopathicis immiscebant, qua ratione earum numerum totum

tum praeter modum auxit. Hos ut tollerem errores, quod potui feci, numerosis nempe apud SAUVAGESIUM speciebus, recte, quantum ego judico, ad pauciores redactis.

QUOD ut efficerem, primo species plures, ut diversas a SAUVAGESIO recensitas, pro una eademque habui, et sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis suis idoneis posthac tradendae sunt.

DEINDE, cum species idiopathicas solum pro veris et genuinis enumerare velim, quotquot pro symptomaticis habere potui, totidem ex numero specierum apud SAUVAGESIUM sustuli. Cum autem, in recensione specierum symptomaticarum aliquis usus sit, earum recensionem, seorsum tamen, denuo apposui.

DENIQUE, alia et praecipua ratio, qua specierum, a SAUVAGESIO recensitarum, numerum minuendum esse censui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas, pro specierum

specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimis, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quae in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilius erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Eiusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhiberi ubique annis sum; quod si non in omnibus, cum aeque certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quae sequuntur pensitatis, saepe fecisse videor.

CUM morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica

racteristica omnia et solo, in unoquoque ostendit; quantumvis haec in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; et, in universum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates praebere censemus.

TUNC igitur de varietate a specie distinguenda quaestioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cuiusvis speciei symptomatis, quaedam absint, vel iisdem quaedam addita sint.

CUM ex symptomatis solitis quaedam absint, quoties inter symptomata, quae magis, et ea quae minus, essentialia sunt distingue-re liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus.

CUM vero symptomatis characteristicis alia quaedam addita sint, si addita pro symptomatis symptomatum, potius quam pro D symptomatis

symptomatis causae haberi queant, varietatem tantum constituunt.

DENUO, cum symptomata addita, in specie data, prorsus insolita sint, et simul conditiones morbi praecipuas parum vel nihil mutari videantur, haec quoque varietatem tantum praebere censenda.

CUM morbi genus quoddam, ex principiis diversis oriri queat, idem, ex diversitate principii, specie diversum evadere potest, nec semper tamen; nam, quotiescunque diversitas illa parva fuerit, et simul symptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non nisi varietatem exhibere, putamus.

MORBI genus itidem, pro diversa ejus sede, diversae speciei fieri potest; quotiescunque vero sedes diversa, neque partis structuae, neque functionis ratione differat, hujusmodi sedis diversitas etiam pro varietate tantum habenda est.

PORRO,

PORRO, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari velle n, res duas esse, quae ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

ALTERA est, quod principii quaedam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriuntur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimae naturae esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata, oriri

oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eaedem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint; eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc praesertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversae, tribui possunt.

MORBOS, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimae naturae esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicum ejusdem generis speciem, praebere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

Hæc

HÆC omnia, non solum de exanthematis contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum proferens, a gravis auctoritatis viro SYDENHAMO, hujusmodi febres specierum plurium esse statuente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul praemonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiae veritate sibi satisfacere, vel potius quas limites utrique fint ponendae, statuere.

ALTERA res, quae similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causæ eorum proximæ, qualisunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui
iisdem

iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturae esse oportet.

HUJUSMODI ratiocinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad februm intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcunque in praxi medica, aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute' admodum, adhibendam esse censeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videantur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo saepe frustranea, sanationes faltem minus perfectae sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino o-

pus esse, ut remedia, non solum generi sed speciei cuique, et saepe etiam varietatibus quibusdam, apprime sint accommodata.

AD artem medicam breviorem, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quascunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in Nosophoria methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerasque notare et recensere. Hoc itaque praestare ubique annis sum, aliis sapientioribus, qui posthac huic opere se immiscere velint, relinquens, discriminacionem magis certam statuere.

EXPOSITA jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; supereft, ut quo modo eorum, quae admisi, characteres constituendi sunt, nunc exponam.

IMPRIMIS

IMPRIMIS igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi, neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscumque. Porro, ex notis quae sensibus sunt obviae, illas medici potius quam aegri sensibus percipendas, semper praetuli; quum tamen has, ut cunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

SECUNDO, ea symptomata pro notis characteristicis praecipue feligenda putavi, quae perpetuo cum morbo praesentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succendentium, character saepe necessario petendus est.

IN hac re autem tractanda, duplex quaestio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere licet?

AD hanc responderi possit, quod, etiam si de principiis morborum apud medicos iudicium saepe fallax, et prorsus falsum sit; nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda, hujusmodi principia in Nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

ALTERA quaestio hic exoriens est, quantum ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succendentium, nullo modo dignosci queant; ut hujusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in Nosologia usurpari debent. Ita apud Ill. LINNÆUM *Febrium*

functionis cuiuslibet, quae in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? SAUVAGESIUS quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a LINNÆO sub ordine *constrictiorum*, et a VOGELIO sub classe *epischesium*, recensentur, penitus omisit.

SED, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhibere, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiamsi in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et symptomata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, saepe symptomatum causam manifestam,

manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. SAUVAGESIUS ipse in hac re parum sibi constare videtur, *Debilitatum* classem instituens, et *Amnesiam*, *Agrypniam*, *Iscchuriam*, et alia etiam tanquam genera recensens.

Quod notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis Nosologo adhuc fuerunt vitatae.

CUM, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eosdem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.

NORUNT eruditi, Ill. LINNÆUM methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod

opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

Quod ad denominationem morborum attinet, in Classium, Ordinum, et Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quae in LINNÆI *Criticis Botanicis*, et in ejusdem *Philosophia Botanica*, ab ill auctore traduntur.


Quando notiones novae sunt proferenda, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcus licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus; quod tamen Ill. LINNÆUM saepe, nulla urgente necessitate, fecisse, et VOGELIUM appellationibus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpassé, observavimus.

UT

UT clarior et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum Nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus praecipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

IN recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus SAGARUS usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit incertos, saepe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas Nosologiae methodicae optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

SYNONYMA veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.



S E R I E S

CLASSIUM et ORDINUM*.

CLASSIS I. PYREXIAE.

ORDO I. FEBRES.

II. PHLEGMASIÆ.

III. EXANTHEMATA.

IV. HÆMORRHAGIÆ.

V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.

II. ADYNAMIÆ.

III. SPASMI.

IV. VESANIÆ.

* Classium institutionem primo a SAUVAGESIO datam, LINNÆUS, VOGELIUS, et SAGARUS, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint, uti VITIORUM, ANHELATIONUM, DOLORUM, et FLUXUUM, neque naturales, nec quovis modo idoneae, ejusmodi institutionem sequi non potui. Aliam itaque simpliciorem, et in universum,

ut

F

CL. III. CACHEXIÆ.

- O. I. MARCORES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

- O. I. DYSÆSTHESIÆ.
- II. DYSOREXIÆ.
- III. DYSCINESIÆ.
- IV. APOCENOSSES.
- V. EPISCHESES.
- VI. TUMORES.
- VII. ECTOPIÆ.
- VIII. DIALYSES.

ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Haec fortasse etiam minus absoluta videri posset, quod inter morbos totius systematis, in primis tribus classibus recentitos, et illos partis singularis, five LOCALES, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, rarius licet, aliquando fieri posse concedimus. Sed nihil praestantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Prolegomenis, pag. xii. allatas, de perfecta classium institutione non admodum folliciti sumus.

CL. I. PYREXIAE.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum imminentis*.

SYNONYMA. Morbi febriles *Auctorum.*

* Quod hic, et pluribus quae sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus praecesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulae classis notae in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleraque in specie quavis adfint.

Character idoneus quisque, plurium notarum five symptomatum concursum notare debet, et male quidem

cum

ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, laffitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *Auctorum S. Cl. II. V. Cl. I. Sag. Cl. XII.*

Morbi febriles critici L. Cl. II.

cum veteribus **VOGELIUS** calorem auctum solum, et recentiores **SYLVIUS** et **Cel. BOERHAAVIUS** pulsuum velocitatem solam, pro charactere pyrexiae, sive febris ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, et si pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsuum signis febrem adesse judicant; quod etiam plurium symptomatum notationem, in quovis charactere necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsuum velocitatem solam, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sive quavis functionum laesione. Hisce de pyrexiae charactere quaestionibus, in charactere a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum characteribus adeo felicem esse vix licet; et in characteribus plerisque, si ad species plerasque charactere recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili, et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes: Paroxysmo quo-vis die unico tantum *.

Intermittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.

O. II. V. Cl. I. O. I. *Sag.* Cl. XII. O. III.

Remittentes *Auctorum* S. Cl. II. O. II. *Sag.* Cl. XII.

O. II. †.

* Qui perpenderit quae de febribus *remittentibus*, quae videntur continuae, a *continuis*, strictius dictis distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quam obrem, tum intermittentium tum continuarum characterem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† Febrium *remittentium*, quasi a febribus *intermittentibus* exquisitis prorsus differentium, ordinem separatum instituerunt *Nosologi SAUVAGESIUS*,

LIN-

46 GENERA MORBORUM

Exacerbantes L. Cl. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II. *.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.

13.

Continuae remittentes, *Boerb.* Aph. 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junk.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. Spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni,* Exerc. II.

LINNÆUS, et SAGARUS ; minus recte tamen, si mihi judicare fas sit. *Remittentes* enim, quae dicuntur, ex eodem principio, miasmate nempe paludum, ac *intermittentes*, oriuntur ; iisdem in locis, et eodem anni tempore, utraque simul epidemice graffatur ; utraque iisdem prorsus remediis sanatur ; et saepissime in eodem homine idem, qui videtur, morbus, nunc intermittentis nunc remittentis typum exhibit. Morbi idcirco, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi erant.

* Magis inconsulto adhuc VOGELIUS *remittentes* omnes cum *continuis* sociavit. *Continuae*, quas vocamus, omnes quidem remissionses et exacerbationes ostendunt ; sed a *remittentibus* ad *intermittentes* merito referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox dicetur.

GENUS. I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum : Accessionibus meridianis.

Tertiana *Auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Sag.* p. 704. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium universum manifestante, Halae 1706. Ejusd. Casual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleghorn's diseases of Minorca*, cap. III. *Senac*, de recond. febr. natura. Edinb. Med. Eff. vol. iv. art. 24.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

i. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 18. *Hoffm.* Tom. II. p. 12.

Tertiana vera, *Clegb.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

48 GENERA MORBORUM

Tertiana notha sive spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr.
L. II. c. 18. *Clegb. Min.* p. 140. *Hoffm.* Tom. II.
p. 12.

2. Variat paroxysmorum recursu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis
inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II.
c. 21. V. G. 12. *Clegb. Min.* p. 141.
Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, pa-
rooxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones,* de febr. interm.
P. II. cap. 6. *River. Cent.* IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis
altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegb. Min.* p. 142. Se-
mitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen.* *Spig.* de semiter-
tiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parēm magis, inter parem et imparem minus, notabili.

Hemitritaeus, *Celsi* L. III. cap. 3:

Semitertiana, *Clegb.* Minorc. p. 143. *;

Semitertiana secundi ordinis, *Galeni, Spig.* L. II. c. 5:

Amphimerina hemitritaeus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo hemitritaeus, S. sp. 9. *

3. Variat symptomatibus.

G. Tertiana affectibus soporosis stipata.

Tertiana carotica, S. sp. 10. *Werlhof.* de febribus, et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertiana hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pif. obs.* 175.
176.

Febris caput impetens, *Sydenh.* Ep. ad R. Brady.

H. Tertiana spasimis et motibus convulsivis stipata.

* Fortassis hemitritaea quaevis ad remittentes regari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fatcor.

- Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyath. Vol. I.
p. 250.
- Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelli* A. N. C. Dec.
I. A. II. obs. 193.
- Hysteria febricosa, S. G. 135. sp. 8. A. N. C. Dec. I.
Ann. II. obs. 193.
- Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae* Trib. med.
p. 225. *Lautter.* Histor. med. bienn. Cap. II.
cas. 2.
- Quotid. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays*, Vol. V. P.
II. art. 49.
- Eclampsia febricosa, S. G. 133. sp. 17.
- Epilepsia febricosa, S. G. 134. sp. 9.
- Tertiana tetanodes *Medici* Beobacht. I. Band. p. 24.
- Tetanus febricosus, S. G. 122. sp. 10. *Stork*, Ann.
Med. II. p. 163.

I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

- Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. HI. cap.
14. *Lautter.* Hist. Med. cap. II. cas. 10.
- Tertiana scorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II.
Obs. 193.
- Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon*, Journ. de med.
1765. *Clegh. Minorc.* p. 157.
- Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri* de med. Ger-
man. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Tertiana phlegmasia stipata.

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Valeſii* in epid. L. I.

Sect. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.

Pleuritis periodica, S. G. 103. sp. 14.

Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Lautt.* loc. cit. cas. 19.

4. Variat aliis morbis complicata.

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller,* prax. L. I.

Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.

Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidier* de morb. vener. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. *Stiffer.* in act. Helmstad. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6.

Illust. *Pringle Diseases of the army*, p. 98. *Ramazzini* const. epidem. rural. ann. 1690. Sect. XI.

Van den Bosch. Const. epid. verminos. ann. 1760, &c.

5. Variat ratione principii *.

* Nullum quidem febrium intermitterium principium sufficiens praeter miasma paludum agnoscimus; sed, cum miasma hoc non semper validum sit ad morbum arcessendum, nisi aliae potestates excitantes

simul

Tertiana accidentalis, S. sp. 12. *Sydenham*, cap. 5.
 Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker*, tab. 80. *Hoffm.*
 II. p. 12.

II. Interposita remissione tantum *.

Tritaeophysa, S. G. 85. *Sag.* p. 695.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Tertianae remittentes et continuæ *Auctorum*.

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae
Torti Therap. Special. Lib. III. cap. 1.

simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

* Tertianae Remittentes variant adeo, tum typum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit efferri possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit *TORTI*, eas scilicet quae symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut caetera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum praecipua exhibuerunt, enumeravi.

- Tertiana subcontinua, S. sp. 19.
 Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.
 Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.
 Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

Ex tertianis comitatis *Torti* loc. cit. prae-
cipuae sunt :

- A. Tertiana cholérica sive dysenterica, *Tort.* ibid.
Lautter, Hist. med. cas. 6. 16. 17. 20, *Morton*,
 App. ad Exerc. II.
- B. Tertiana subcruenta sive atrabilaris *Tort.* ibid.
 Haec a *Cleghornio* nunquam visa est.
- C. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter*, Hist. med.
 cas. 15. 18. 23.
- Amphimerina cardiaca, S. sp. 5. *.
 Tritaeophya affodes, S. sp. 6.
 Febris continua affodes, V. 27.

* Amphimerinas inter et Tritaeophyas, uti inter
 quotidianas et tertianas duplices, distinctio saepe dif-
 ficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores, et
 oeconomiam animalem in febres typi tertiani maxi-
 me proclivem esse norunt experti, hinc plures am-
 phimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judicent
 autem autoptae.

D. Tertiana diaphoretica, *Tort.* *ibid.*

Tritaeophya typhodes, S. sp. 4. *Lautter*, 1.

Tritaeophya elodes, S. sp. 5. * *Lautter*, 2.

Febris continua elodes, V. 21. *Lautter*, 3.

E. Tertiana syncopalis *Tort.* *ibid.* *Lautter*, cas. 11.

12. 13. 15. 16. *Lautter*, 4.

Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1. *Lautter*, 5.

Amphimerina syncopalis, S. sp. 4. *Lautter*, 6.

Amphimerina humorosa, S. sp. 6. *Lautter*, 7.

Febris continua syncopalis, V. 29. *Lautter*, 8.

F. Tertiana algida, *Tort.* *ibid.* *Lautter*, cas. 13.

Amphimerina epiala, S. sp. 3. *Lautter*, 9.

Amphimerina phricodes, S. sp. 7. *Lautter*, 10.

Tritaeophya leipyria, S. sp. 9. *Lautter*, 11.

Tertiana leipyria, S. sp. 23. *Valcarenghi Med.*

Ration. p. 13.

Febris continua epiala et leipyria. V. 19. et 24.

G. Tertiana lethargica, *Tort.* *ibid.*

Tritaeophya carotica, S. sp. 7. *Lautter*, 1. 7. 14.

Tertiana apoplectica *Morton*, Exerc. 1. cap. IX,

Hist. 25. *Lautter*, 15.

Tertiana soporosa *Werlhof*. de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbevetana *Lancif.* de noxis pal.

effluv. I. II. c. 3. *Lautter*, 16.

* De typo febris sudatoriae *Boyeri* *Meth.* a suivre dans les malad. epidem. quam huc retulit *Sauvagesius*, ex ipsius Boyeri descriptione mihi non liquet, et ad typhum referri mallem.

Tertianarum remittentium exempla praecipua, nobis nota, sunt sequentia.

Causos Hippocratis. De Morb. Vulg. L. III. sect. 3.

Tritaeophya causus, S. sp. 2.

Febris ardens Boerhaavii, Aph. 738?

Remittens ardens five causis, Macbride, p. 360.

Tertiana perniciosa, quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis, et mille accidentibus periculosisissimis implicata, existit. Lud. Mercatus de febribus, Lib. VI.

Tertiana pestilens, P. Sal. Diversus de febri pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens Riverii, L. XVII. Sect. II.

c. 1. et Sect. III. c. 3.

Morbus Hungaricus Lang. Lemb. L. I. Ep. 4. Senner. de febr. L. IV. cap. 14. Jordan. de pestis phaen. cap. 19.

Languor Pannonicus Cober. obf. castr. Hung. t. obf. 6. &c.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, Schenck obf. L. VI. ex Corn. Gemma.

Febres pestilentes Ægyptiorum, Alpin. de med. Ægypt. L. 1. cap. 14.

Febris tertiana epidemias, Bartholin. Hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, Willis de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664;
et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Morton.* App. ad
Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de mörb. acut:
ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad
1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* Prax. med.
app. tract. X. et oratio de affectus epidem. caufis.

Morbus epidemius Leidensis 1669, *Fanois*, Diff. apud
Haller. Disp. tom. V.

Tertianae perniciose et pestilentes et febres castren-
ses epidemiae *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.*
II. p. 38.

Febris cholérica minus acuta. *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud
Haller, Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army,
Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononiensis constitutio hiemalis 1729, *Beccari* in A:
N. C. Vol. III. Obs. 48.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Remittens biliosa *Macbride*, p. 360.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aëre ad anni:
1729.

Febris biliosa Lausanensis, Cl. *Tiffet*. de febr. bilioti-

- Tritaeophya Wratislaviensis, S. sp. 3. *Hahn.* Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.
- Tritaeophya Americana, S. sp. 12?
- Febris anomala Batava, *Grainger de febr. anomala.*
- Morbus Naronianus *Pujati de Morb. Naron.*
- Febris continua remittens, *Hillary's Diff. of Barbadoes,* variis annis, Lond. Med. Obs. IV: 24; V: 2:
- Febris A. 1772. et seq. ad urbem novam Avenionensem, Soc. Royale de Medicine I. Histoire, p. 213.
- Febris intermittens irregularis Tolosae 1772. Soc. Royale I. Mem. p. 14.
- Febris intermittens et remittens a l'Isle Jourdain, A. 1777. Soc. Royale II. Hist. p. 145.
- Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind. Med.* Edin. Diff. Inaug. 1768. Lond. Med. Obs. Vol. IV: art. 12.
- Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppre de morbus navig.*
- Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind Med.* Haslar. *Essay on the diseases of hot climates.*
- Tertiana remittens symptomatica est.
- Tritaeophya lactea, S. sp. 8.
- Febris lactea, *Etmüller Coll. consult. cas. 57.*
- G. II. QUARTANA.**
- Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum: Accessionibus pomeridianis.

Quartana Auctorum S. G. 89. L. 17. V. 3. Sag. 711.
Hoffm. II. p. 23. Junck. tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

i. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis ; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. Sydenham de morb. acut. cap. V.

B. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis ; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. Bonet.

C. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus ; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet,

paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 5. V. 14. *Barthol.* H. anat. c. 1. 95.

2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatoso, S. sp. 15. *Werthof* de febr. C. Pisonis Observ. de morbis a colluvie serof. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii Conf.* 379. 380.

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham* de morb. acut. cap. V.

Quartana splenetica, S. sp. 2. *Etmuller.* Coll. consult. cas. 25.

Quartana hepatica, *Macb.* p. 354.

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri* obs. L. III.
p. 676. *Edinb. Eff.* art. XLVII. obs. 8.

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr.* de arthr.
sympt. cap. IX. H. 4 et 5.

Arthritis febrifera, S. sp. 10.

Arthritis febricosa, S. sp. 10. *Werlhof.* de febr.
Cockburn de morbis navigantium, obs. 19.

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de med.
Dan. diss. IV, *Tim.* L. VIII, cas. 18.

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. *Sag.* 323. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

Varictates sunt,

Tetartophya simplex, S. sp. 1. *

* Quartanam continuam morbum rarissimum esse,
testantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex *Franc. Joelis* operum tomo 3. citat *SAUV.*
In loco autem citato, nihil ad rem pertinens inveni; sed tomi quinti pag. 63. haec verba profere-
runtur.

- Amphimerina semiquartana, S. sp. 23.
- Tetartophya semitertiana, S. sp. 5.
- Tetartophya maligna, S. sp. 6 *Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. L. III. cap. 14. ex M. Gatenaria. Horst. L. 1. obs. 15.*
- Tetartophya carotica, S. sp. 4: *Werlhof. de febr. Bianchi Hist. hep. pars III. const. ann. 1718. p. 751.*
- Tetartophya splenalgica, S. sp. 2. *

runtur. Febris quartanae "Species veteres duas constituunt. Quartanam continuam, (quae mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico) et Interpolatam, quae frequentissima est."

* Huc febrem Fernelianam *Raym. Fortis* refert *SAUV.* et vult febrem ita a *Forte* dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernelius: Sed quodammodo hic errasse *SAUVAGESIUS* mihi videtur. Nam febres quasdam Fernelianas vocat *Fortis*, Tom. II. cent. II. obs. 35. et 36. non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris cuiusdam, hepatis praesertim, labe comitatae sint; et mortuus quidem est Fernelius ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanae typum unquam exhibuit, non dicitur a *Plantio*, qui in vita Fernelii, operibus ejus praefixa, de eo morbo narrat.

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pif.* in
praefat. p. 33.

Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

ERRATICÆ.

Ad Tertianam vel Quartanam ERRATICAS
S. pertinere putamus*; et hic ideo ea-
rum varietates subjunximus.

* Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Forst.*
L. III. obf. 43. ex quartana ill. *Van Swieten,*
Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerh.* apud ill. *Van*
Swieten ibid. *M. Don.* L. 3. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto.*

Septimana, ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I.
Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187. 188.
365. *Valles Controv.* L. V. c. 25. *P. Sal.* *Div.*
in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut.*
Luf. P. M. L. III. obf. 34. *Schultzius* in E. N.
C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70. *Arnold.* de febr.
Stomach. epid. § IV. apud *Haller.* Diff. Pract.
Vol. V. *De Haen* de divis. febr. div. iv. p. 9.

* Vide Senacum de recondita febrium natura,
L. I. Cap. 1.

- Hemicrania lunatica, S. sp. 10.
 Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac. Luf.* *ibid.*
 Erratica decimana, S. sp. 5. *Zac. Luf.* *ibid.*
 Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don. L. III.*
 14. ex *Gentili.*
 Erratica vaga, S. sp. 6. *River. cent. III.* *obs. 32.*
Etmuller, L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum : Paroxysmis matutinis.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.
Hoffm. II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

I. Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert de febr.* cap. 18.

B. Partialis.

- Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel. E. N. C.*
D. I. A. III. obs. 205. Edinb. Med. Eff. vol. I.
art. 31. vol. II. art. 19.
- Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton Pyret.*
exerc. I. Hist. 27. Van Swieten in Boerh. p.
534. Soc. Royale, II. Mem. p. 38.
- Cephalgia intermittens, S. sp. 7.
- Cephalaea febricosa, S. sp. 4.
- Quotidiana ophthalmica, *Morton*, *ibid. hist. 17.*
Van Swiet. ibid.
- Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

2. Variat comitata.

- Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff. vol. V.*
art. 49.
- Ischias intermittens, S. sp. 1.
- Quotidiana nephralgica, S. sp. 7. *Morton*, *ibid.*
hist. 28.
- Nephralgia febricosa, S. sp. 13.
- Quotidiana uretico-sputatoria, *B. Scharf. E. N. C.*
D. II. A. II. obs. 104.
- Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff. loc.*
cit.
- Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

Vespertinae vel symptomaticae videntur sequentes.

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20. Sag. G. 321.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller Coll. conf.*
cas. 32. *River. obs. cent. I. obs. 57.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Febris continua Lyngodes, V. 26.

Amphimerinae S. caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Amphimerina variolosa, S. sp. 20.

Amphimerina miliaris, S. sp. 11.

Amphimerina arthritica, S. sp. 21.

De Amphimerina mimosa *Bontii* et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ*.

Febres, sine intermissione, nec miasmate

* Quae sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem aegritudinis perseverat, Febrem Continuam esse, dixit SAUVAGESIUS; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, *Continentes* vocat LINNÆUS. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi satis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, satis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur VOGELIUS, uti ex ejus continuarum charactere satis patebit; nec dissentit expertissimus DE HAEN, uti videre est in libro ejus de divisione febrium, Divis. IV. Schol. 1.; et apprime sententiam nostram confirmat BRENDLIUS, verbis sequentibus: “*Omnes namque febres nostrae, acutae, et inflammatoriae, et exanthematicae, et malignae, reliquaeve hujus generis, sunt continuae remittentes,*

paludum ortae, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, perstantes: Paroxysmis quovis die binis *.

tentes, et luculenta intensionum remissionumque spatia integrant." Brendel. Opuscul. P. II. Diff. XI. sect. 5.

Porro, et si in febribus quibusdam exacerbationes et remissions parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc praeferim, quod in febribus quibusunque, ex paroxysmis pluribus manifesto constantibus, paroxysmus quisque, inter nocthemerae spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus oeconomiam animalm circuitus diurni legi cuidam subjici videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hecticis quibusque ad amissim subjicitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibusunque locum habere; nec febrem quamcunque continentem revera in rerum natura dari.

* Cum continuam quamque ex paroxysmis repetitis consistere ponimus, saepe ambiguum fieri possit,

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. Sag.

666. *Macb.* p. 303. *Boerh.* 727.

Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stahl.* Cas. magn. 35.

Cas. min. 87. *Junk.* 58. *Sennert.* de febr. L.
II. cap. 2. et 10.

possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentum, ad quas omnes auctorum remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datae satis facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibusvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostrae recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuae cognosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, saepe manifesto et maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuae saepe certe cognosci possint.

G. IV. SYNOCHA*.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

* Febrium continuarum divisio, a GALENI temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior praesertim, qua praeceps usi sunt Nosologi SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et SAGARUS, manifesto inepta est. Vide *Prolegomena*, pag. XXV. et pag. XXXIII. et XXXIV. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura morborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem febrium continuarum in *Inflammatorias* et *Nervosas*. Has autem appellations, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dum recepta sunt; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, dum definitiones subiunctae ab errore quovis praecavere possint.

70 GENERA MORBORUM

Synocha, S. G. 80. L. 12. Junck. 58.

Synocha, sive febris acuta sanguinea, Hoffm. II.

105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, Boerh. 729.

Ephemera, S. G. 79. Boerh. 728. Junck. 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria Auctorum.

Varietates sunt,

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, Sennert. de febr. L. II.
cap. II.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica Ann. 1765. Sydenh. sect. V.
c. I. 5.

Synochus rheumatisans, S. sp. 7. Sydenh. sect. V.
c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8, Sydenh. in P. S. ad
tractat. de hydrope.

Symptomaticae sunt,

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. Var. D.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 1. V. E.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8. M. Tab. O. I. G. 1.

Sp. 2. V. A.

G. V. T Y P H U S.

Morbus contagiosus ; calor parum auctus ;
pulsus parvus, debilis, plerumque fre-
quens ; urina parum mutata ; sensorii
functiones plurimum turbatae ; vires
multum imminutae.

Typhus, S. G. 82. Sag. 677.

Species sunt,

i. Typhus (*petechialis*) plerumque cum
petechiis.

Variat gradu *.

* Morbos gradu solum differentes nominibus di-
versis insignire nequaquam convenit ; cum autem
nuperis

I. Typhus mitior.

Febris maligna hectica sive lues *revagans* convulsiva,
Willis de morb. convulsiv. cap. 8. *

nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentem, nomine Febris *Nervosae* appellare; huic opinioni quodammodo morem gerehs, sub titulo *Typhi mitioris*, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosas aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris *Putridae* recensere. In omni *typho* humorum in putredinem proclivitatem adeste puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo *Typhi gravioris* eas, quae praeferuntur putridae appellatae sunt, febres indigitasse, uti ex appositis variorum auctorum appellationibus fatis patebit.

* Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellatio-
 nis *Neuagans*, vel *nervosae*, febribus quibusvis datae;
 quam
 aliusque

Febris pestilens *Fracastor.* de morb. contag. L. II.

cap. 4.

Febris pestilens sine charactere veneni *Forest.* L. VI.

obs. 26.

Febris hectica pestilens *Forest.* L. VI. obs. 32.

Febris nova ann. 1685. *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa *Wintringh.* Comm. Nosolog.
ad ann. 1720, 1721.

Febris lenta nervosa. *Huxham* on fevers, chap. 8.

Ed. Med. Eff. II. 18. IV. 23. V. 48. *Macb.* p. 304.

Soc. Royale I. Mem. p. 23.

Febris contagiosa. *Lind* on fevers and infection
passim.

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Tritaeophya typhodes *Mangeti,* S. sp. 11. *Raym.*
Fort. de febribus, p. 24. M. 304.

2. Typhus gravior.

Febris pestilens, *P. Sal.* *Divers.* de febre pestilenti.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt.
L. I. cap. 14.

quam protinus Angli, non tamen nisi nuper admo-
dum aliarum regionum medici, usurpati sunt.

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Cephalitis Epidemica, ann. 1510. S. sp. 6.

Febris pestilens maligna *Sennert*, de febribus, L. IV.
cap. 10.

Febris maligna pestilens *River*. L. XVII. sect. III.
cap. 1.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis*, de fe-
bribus, cap. 14.

Febris Senegallenfis, Lond. Med. Obs. II. 21.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis *Huxham* de aëre ad ann.

1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Hux-
ham* de aëre ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. *Pringle*, Dis-
eases of the army, p. 294. Ill. *Van Swieten*, Ma-
ladies des armées, p. 136. Soc. Royale II. Mem.
p. 53. Ibid. III. Mem. p. 45. and 55.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemi-
cam vocant *Henr. Maii* et *A. Ph. Kopf*. Dis. apud
Hallerum, tom. V.

Febris Hungarica sive castrensis *Juncker*. 74. et plu-
rius Auctorum*.

* Morbum sive febrem Hungaricam ad tertianas
remittentes, cum *SAUVAGESIO* et Ill. *PRINGLE*,
supra

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742.

Scrinci. Diff. apud *Haller.* tom. V.

Febris petechialis, *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.*

prax. L. XVII. sect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p. 84.

Juncker. 73. *Huxham* on fevers, chap. 8. *Lud-*

wig. Inst. med. clin. No. 146. *Schreiber* von

erkentness, und cur der Krank heiten. p. 126.

Monro, Diseases of military hospitals, p. 1.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Juncker* 72.

Hoffm. II. 75. *Eller* de cogn. et cur. morb. Sect. VI.

Febris putrida, *Macb.* p. 305.

Febris catarrhalis putrida 1768. *De Martens* Obs. cap. I.

Febris putrida biliosa 1769. *De Martens*, cap. 2.

Febris putrida nervosa 1770. *De Martens*, cap. 3.

Exempla febrium petechialium sunt se-
quentia.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas
vocant, *Fracastorius* de morb. contag. L. II. cap. 6.

supra retuli; nec dubium est quin morbus Hunga-
ricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit;
sed simul constat febrem in castris Hungaricis primo
ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere
Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse,
(*Vide Ruland. de morbo Hungarico*, cap. VIII. quaest.
39.), et plerumque eandem esse quam nunc in Nos-
ocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad
hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

76 GENERA MORBORUM

Febris peticularis Tridenti, ann. 1591. *Roboretus*, de febr. peticul.

Febris petechialis epidemica Coloniae ann. 1672. *Donckers*, Idea febris petechialis.

Febris petechialis epidemica, Posonii 1683, *C. F. Loeu* in App. ad A. N. C. Vol. II.

Febris petechialis epidemica Mutinae, 1692. *Ramazzini*. Conſt. Mutinensis, Oper. pag. 187.

Febris maligna petechizans, ann. 1698. *Hoffm. H.* p. 80.

Febris petechialis Wratislaviae, ann. 1699. *Helwicb*, Ephem. Germ. D. III. A. VII. et VIII. obf. 132. p. 616.

Febris epidemia Lipsiae 1718. *M. Adolph. A. N. C. III. Obf. 131.* p. 296.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708, 1718, et seq. *Rogers*, Essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis ann. 1719. et seq. *M. o Connell* Observ. de morbis.

Febris petechialis epidemica, Cremonae 1734. *Valcharenghi* Med. ration. Sect. III.

Febris petechizans Petropoli 1735, *Weitbrecht*. Diff. apud Haller. tom. V.

Febris petechialis, ann. 1740, 1741, in Hassia, *Ritter*. A. N. C. vol. VII. obf. 4.

Febris petechialis epidemica Vigorniae et aliis Angliae locis. *Wall's Works*, p. 337.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau.*

A. N. C. vol. VII. obs. 5.

Febris petechialis epidemica Silegiae 1741 et seq.

Brandhorst. Diff. apud *Haller.* tom. V.

Febris petechialis epidemica Viennae 1757, *Ha-*
senohrl. Hist. med. cap. 2.

Febris petechialis epidemica Lipsiae 1757. *Luduvig.*

Adversar. tom. I. pars 1.

Febris petechialis epidemica variis Germaniae lo-
cis ab ann. 1755 ad 1761. *Strack de morbo cum*
petechiis.

Febris epidemica maligna a Coutances 1772 et
1773. Soc. Royale I. Mem. p. 23.

Febris petechialis nervosa a Dijon 1760 et 1761.
Mem. par Maret 1775.

II. Typhus (*icterodes*) cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae Occidentalis *Warren,* Malig-
nant Fever of Barbadoes. *Hillary's Diseases of*
Barbadoes. *Lining on the Yellow Fever of*
South Carolina. *Edinb. Phys. Litter. Essays,*
Vol. II. *Mackittrick de febre flava Indiae Oc-*
cidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam species esse videtur.

Ephemera sudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius de ephem.* Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronosus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Febris sudatoria, *Le Suette Gallorum, Meyserey*

Meth. aise, &c. Ejusd. Maladies des Armées 250.

*Boyer Methode à suivre dans les maladies épi-
demiques? Tessier, Soc. Royale II. Mem. p. 46.*

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9.

Nobis non liquet.

G. VI. SYNOCHUS*.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha
et typho composita, initio synocha, pro-
gressu et versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerb.* 730.

* Cum plures febres nec inflammatoriae nec
nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad-

Varietates ex Sauvagesio sunt.

Synochus sanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.*
de morb. acut.

Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667.
Sydenh. ibid.

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenh.*
ibid.

Febris continua putrida annor. variorum. *Win-*
tringham Com. *Nosologicum*.

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

Synocham vel ad Typhum facile referendae; genus
Synochi, cuius typus hisce regionibus frequens con-
spicitur, hic inferui. Inter Typhum tamen et *Synò-*
chum limites accuratos ponere non possum; et an
revera pro diversis generibus habenda, vel positis di-
versis, utri eorum *Synonyma* auctorum referenda,
sunt, dubito. Quae vero hic subjunguntur, a *SAU-*
VAGESIO species dictae, ad *Synochum* satis recte, ut
mihi videtur, referri possunt.

De synocho variolode, S. sp. 3. et

Synocha dysenteriode, S. sp. 4.

Nobis non satis liquet, et minus adhuc de

Synocha anniversaria, S. sp. 9.

Synocha spermatica, S. sp. 10.

Synocha tarantata, S. sp. 11.

Complicata est

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Et symptomatica est

Synochus a scabie, S. sp. 15.

H E C T I C A.

Febris quotidie revertens; accessionibus
meridianis et vespertinis; remissione, ra-
rius apyrexia, matutina; plerumque fu-
doribus nocturnis, et urina sedimentum
furfuraceo-lateritium deponente*.

Hectica, S. G. 83. L. 24. V. 80. Sag. 684.

Med. Transf. II. 1.

* Cum febrium in numerum, hecticam receperint.
Nosologi omnes, eam etiam cum charactere hic ap-
ponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum

Ex Sauvagesio species sunt,

Hectica chlorotica, S. sp. 3.

Hectica syphilitica, S. sp. 4.

Hectica scrophulosa, S. sp. 5.

Hectica a calculis, S. sp. 6.

Hectica hydropum, S. sp. 7.

Hectica verminosa, S. sp. 9.

Hectica cacheectarum, S. sp. 10.

Hectica fluxuum, S. sp. 11.

Hectica infantilis, S. sp. 1. Charactere caret, et
nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel vermino-
sa videtur.

Hectica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo ha-
beri potest.

De hectica lymphatica, *Baglivi* S. sp. 12. et
Hectica nervea, Cl. *Lorry*, S. sp. 13.

Nobis non liquet.

nunquam nisi symptomaticam observaverim, in nu-
merum idiopathicarum, quas solas enumerare licet,
admittere nolui. In plerisque exemplis, hecticam
revera symptomaticam esse, ex SAUVAGESII specie-
bus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum
fiat. Vide ipsius SAUVAGESII Scholium. Tom. I.
pag. 319.

L

O. II. PHLEGMASIÆ.

Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul laesa partis internae functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranofae et parenchymatosae,
S. Cl. III. O. I. II. Sag. 605. *.

* Haec phlegmasiarum in membranofas et parenchymatosas divisio prorsus inepta est; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet; dein, quod partes membranofae et parenchymatosae non satis certo distinguuntur; et hinc Metritis, quam inter membranofas recenset SAUVAGESIUS, a LINNÆO et SAGARO inter parenchymatosas collocatur; denique, quod phlegmasiae quaedam, ut hepatitis, vel membranofae vel parenchymatosae esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculofarum apud LINNÆUM et SAGARUM institutio,

Morbi febries phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuae compositae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febries, Boerb. 770.

Febres inflammatoriae, Hoffm. II. 105. Junck. 61.

G. VII. PHLOGOSIS*.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tensio dolens.

Species sunt,

I. Phlogosis (*Phlegmone*) rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, saepe in apostema abundante; dolore saepe pulsatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.
Sag. 299. Macb. p. 418.

tutio, in qua neuter quidem fatis accuratus est. Male enim phlegmone a LINNAEO musculosa dicitur, nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius musculosa, a SAGARO ad musculosas in universum refertur.

* Pro nomine generis cuius species est Erythema, minus recte in priore editione usurpatum fuit phlegmone. Novum nomen necessarium nobis videbatur, et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

Inflammatio, L. 231. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

I. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352. *Sag.* 23. *Macb.*

p. 422.

Terminthus, V. 381.

Papula, L. 275. S. p. 6.

Varus, V. 436. L. 269. S. p. 7.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosea, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

2. Variat sede*.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynja, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocerase, S. G. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerh.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

* An sequentes pro totidem speciebus recenseri possint, judicent peritiores.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunesia, V. 167.

II. Phlogosis (*Erythema*) colore rubicundo, pressione evanescente; ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctaenas vel vesiculos abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11. *Sag.* 16.

Erysipelas *Auctorum*, V. 343. *Macb.* 421.

Hieropyr, V. 344.

2. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353. *Sag.* 24.

Carbo et carbunculus *Auctorum*. *Macb.* p. 423.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

2. Variat causa remota.

Erythema a frigore.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

- Combustura, L. 245.
 Combustio, Boerb. 476.
 Encausis, V. 347.
 Erythema ab acri alieno applicato,
 Erysipelas Chinense, S. sp. 7.
 Erythema ab acri inquilino,
 Erythema intertrigo, S. sp. 5.
 Intertrigo, L. 247. V. 502.
 Erythema a compressione,
 Erythema paratrima, S. sp. 6.
 Erythema a punctura, S. sp. 9.
 Erysipelas a vespis, S. sp. 19.
 Psydracia a vespis, S. sp. 2.

3. Variat complicata.

- Erythema cum phlegmone,
 Erysipelas phlegmonodes *Auctorum.*
 Erythema cum oedemate,
 Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Phlogosis sequelae sunt,

A P O S T E M A.

Post phlogosin, remittentibus dolore et

pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. G. 39. *Sag.* 55.

Abscessus, L. 132. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

Macb. p. 414.

Pustula, L. 274.

G A N G R Æ N A.

Post phlogofin, pars livens, mollis, parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorofis.

Gangraena, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Sag.* 203.

Boerb. 388. 419. *Macb.* p. 415.

S P H A C E L U S.

Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia;
plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. Sag. 231.

~~also~~ Junck. 24. Macb. p. 423.

Chemofis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, Hoffm. II. 165.

Ophthalmiae species et varietates sunt,

I. Idiopathicae.

i. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica
adnata, et ei subjacentibus membranis,
sive tunicis oculi.

A. Variat gradu phlogofis externae.

Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.

Ophthalmia humida, S. sp. 8.

Ophthalmia chemofis, S. sp. 12.

Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.

Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.

Ophthalmia phlyctaenodes, S. sp. 21.

B. Variat affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideae, S. sp. 13.

Ophthalmia tenebriosa, S. sp. 10.

2. Ophthalmia (*Tarsi*) cum tumore, erofione, et exudatione glutinosa tarsi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.

Ophthalmia sicca, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

I. A morbo ipsius oculi.

Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.

Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.

Ophthalmia canerosa, S. sp. 15.

Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.

Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.

Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.

Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.

Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.

Ophthalmia uveae, S. sp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. C. 101. L. 25. Sag. G. 301. Boerh.

771. Hoffm. H. 131. Junck. 63. Macb. p. 432.

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109. Sag. G. 310. *.

* Cum symptomata nulla dentur quae semper phlegmasiam cerebri a phlegmasia membranarum eius, sive meningum, certo distinguere possint; neque sectiones cadaverum distinctiones a SAUVAGE-SIO, LINNÆO, et SAGARO, adhibitas confirmant,

Cepha-

Sphacelismus, L. 32.

Siriasis, V. 34.

Phrenitidis idiopathicae speciem unicam hic
ponere licet, et cuius synonyma sequen-
tia esse putamus.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis siriasis, S. sp. 4.

Siriasis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Phrenitides Symptomaticae sunt,

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.

Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.

Cephalitidem, S. G. 109. Sag. G. 310. et Sphacelismum,
L. 32. pro generibus a phrenitide diversis admittere
nolui, et ea hic ideo, uti synonyma, sub titulo Phre-
nitidis, posui.

Recte monet **VOGELIUS** signa phrenitidis, vel ut
vocat phrenismi, hoc est, inflammationis cerebri aut
membranarum ejus, admodum ambigua esse.

92 GENERA MORBORUM

- Phrenitis calentura, S. sp. 11.
Phrenitis Indica, sp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.
Cephalitis epidemica, ann. 1510, S. sp. 6.
Cephalitis verminosa, S. sp. 7.
Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.
Phrenitis variolosa, S. sp. 5.
Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.
Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.
Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.
Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.
Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

G. X. C Y N A N C H E.

Pyrexia aliquando typhodes ; rubor et dolor faucium ; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33. Sag. G. 300.

Angina, V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, Boerh. 798.

Species sunt,

I. *Cynanche (tonsillaris) membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.*

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. Boerh. 805.

II. *Cynanche (maligna) tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescens vel cineritii, serpentibus, et ulceris tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.*

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia. Hispanis Garotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. Fothergill, Account of the ulcerous sore throat Edit. 1751, Huxham on the malignant ulcerous sore throat, from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculoſa, Douglas Practical History, Boston 1736. Lond. Med. Obs. I. 20.

Angina epidemica, Russel Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenosa, Withering's Diff. Inaug. Edinb. 1766.

Angina suffocativa, Bard's Inquiry, New-York, 1771.

Angina maligna, Johnstone on the malignant angina, &c. Worcester 1779. Wall's Works. p. 58.

III. Cynanche (*trachealis*) respiratione difficulti, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore febre nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficulti, et febre synocha.

Cynanche trachealis S. sp. 5.

Cynanche laryngea Auctorum, Eller. de cogn. et curand. morb. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. Boerb. 801.

Angina latens et difficilis, Dodon. obs. 18.

Angina interna, Tulp. L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, *Greg. Horst.* Observ. L. III.
obs. 4.

N. An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad morbum characteris dati manifesto pertinere videntur.

Suffocatio stridula, *Scotis the Croup.* Cl. *Home* on the Croup.

Asthma infantum, *Millar* on the asthma and chin-cough.

Asthma infantum spasmodicum, *Rush*, Dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, *Crawford*, Diff. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* history of the weather.

Morbus strangulatorius, *Starr*, Phil. Trans. No. 495. *.

* An hic morbus ad cynanchen malignam, an ad trachealem pertinet, mihi non certo constat, et saepius de eorundem morborum apud plures auctores descriptionibus itidem incertus sum.

Morbus truculentus infantum, *Francof.* ad Viadrum et in vicinia graffans, ann. 1758. C. a Bergen. A. nova. N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel*, Oeconomia. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadensis, ann. 1758. *Hilary's Barbadoes*, p. 134.

Angina polyposa, sive membranacea *Michaelis*, Argentorati 1778, et *Auctores* ab ingenioso et erudito *Michaele* allegati.

Morbus anginae polyposae analogus, Soc. Royale II. Hist. p. 206.

IV. Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in imis praesertim fauibus; deglutitione maxime difficiili, dolentissima; respiratione satis commoda, et febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller de cogn. et cur. sect. 7.*

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta, *Boerb.* 804.

V. Cynanche (*parotidea*) cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laefis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis OREILLONS et OURLES, *Tiffot Avis au peuple*, No. 116. *Encyclopedie*, au mot OREILLONS.

Angina externa, ANGLIS the MUMPS, *Russel, Oecon. natur.* p. 114. SCOTIS, the BRANKS.

Catarrhus Bellinsulanus, S. sp. 4.

Osservazioni di *Girol. Gaspari*, Venez. 1731.

Osservazioni di *Targ. Tozzetti, Racolta ima*, p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15. vel ad malignam, S. sp. 3. vel ad Scarlatinam pertinere videtur.

Cynanchæ symptomaticæ sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.

Febris anginosa, *Huxham de aëre*.

Cynanche prunella, S. sp. 12.

Cynanche exanthematica, S. sp. 4.

Cynanche arthritica, S. sp. 10.

Cynanche hepatica, S. sp. 8.

Cynanche a dysenteria, S. sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, S. sp. 9.

Cynanche mercurialis, S. sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7. raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

G. XI. PNEUMONIA*.

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte;
respiratio difficilis; tussis.

Febris pneumonica, Hoffm. II. 136. Macb. p. 435.

* Ab omni aevo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum saepe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, saepius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod, si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per symptomata vix certo cognosci posse; et, utcunque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usus medicinae

Species sunt,

I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non
semper duro, aliquando molli; dolore
thoracis obtuso; respiratione perpetuo
difficili, saepe non nisi trunco corpo-
ris erecto exercenda; faciei tumidae
colore purpureo; tussi plerumque hu-
mida, saepe cruenta.

cinae parum omnino contulisse. Hisce igitur per-
penfis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus
unicum constituere, cum HOFFMANNO expertissi-
mo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic sub
nomine Pneumoniae posuimus. Symptomata, quae
pro characteristicis adhibuimus, cum quae in omni
phlegmasia pectoris interni semper adsint, et in qua-
libet praecipua fint, ea recte characterem genericum
constituere videntur.

An species diversae vere statuendae fint, anceps
haereo. Sed, opinionibus et consuetudini medicorum
aliquid concedere volens, peripneumoniae et
pleuritidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel
ex propria observatione, eas distinguere liceat, cha-
racteres specificas dedi. Interim tamen observari ve-
lim, inter illos morbos, utcunque aliquando distinc-
tos, limites accuratos plerumque non ponendos esse

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Sag.*
G. 311. *Boerh.* 820. *Juncker,* 67.

I. Peripneumoniae idiopathicae simplices,

Peripneumonia pura sive vera *Auctorum*, S. sp. 1.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagni* de
caus. et sed. Epist. XX. art. 30. 31. *

Variat gradu.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha †, *Sydenh.* sect. 6. cap. 4.

Boerh. 867. *Morgagni* de caus. et sed. Epist.
XXI. 11.—15.

* Ad peripneumoniam, an ad pleuritidem, potius
pertinet haec varietas, mihi non certo constat.

† Peripneumoniam *notham* a *vera* gradu tantum
differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In
eo quidem differre puto, quod in peripneumonia
notha inflammatio sit lenior, et affluxus humorum in
pulmones copiosior, quam in *vera*. Cum autem in
notha symptomata pyrexiae, doloris, dyspnoeae, et
tussis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse
possint, minime mirandum si hujus morbi apud di-
versos auctores descriptiones parum uniformes sint,
et necne morbus sub titulo peripneumoniae nothae

2. Peripneumoniae idiopathicæ complica-
tae febre *.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. †.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

a diversis auctořibus descriptus idem revera sit, du-
bia quaedam moverit doctissimus MORGAGNI. Per-
penſis tamen omnibus de hac re dictis, et cum obser-
vationibus pluribus apud ipſos aegros factis collatis,
nihil dubito quin morbus a SYDENHAMO et BOER-
HAAVIO, sub titulo *peripneumoniae nothae* descriptus,
unus idemque sit, nec ab eo morbum a VALSALVA
in FRANCISCO CORALIO, vel morbum in celebri
ANTONIO VALISNERIO, ab ipso MORGAGNI ob-
servatum, re ipsa diversum fuisse puto. Vide First
Lines of the Practice of Phyſic, edit. 1784. §
CCCLXXVI.

* Cum morbi diversi ſimul complicati fint, ſaepe,
quis illorum pro morbo primario habendus ſit dubi-
tari potest; nec in hac re me ubique recte judica-
tum iri ſpondeo. In quibusdam mei ipſius judicio
uſus ſum; in plerisque vero SAUVAGESIUM ſecutus
sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studio-
forum complicationes iſtas quomodo cunque ponere.

† SAUVAGESIUM, ut foleo, ſecutus, hanc et tres
ſequentes species quaſi diuersas recenſui, cum tamen
pro una eademque habere vellem.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

3. Peripneumoniae symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthisicorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

II. Pneumonia (*pleuritis*) pulsu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim aucto; decubitu in latus molesto; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. Sag. G. 303.

Boerb. 875. Junck. 67.

Paraphrenesis, S. G. 102. L. 26. *.

* In morbo qui vulgo *paraphrenesis* vel *paraphrenitis*, et rectius a SAGARO *diaphragmitis*, appellatur, pleurae super diaphragma extensae inflammationem adesse, et in ea morbum confisteret agnoscent medici

Paraphrenitis, V. 55. *Boerb.* 907.

Diaphragmitis, *Sag.* G. 304.

I. Pleuritides idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. *Verna* princeps morb. acut. pleuritis, L. 1. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de sed. et cauf. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45. *Wendt.* de pleuritide, apud *Sandifort.* Thes. II.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. para-pleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, perip-neumo-pleuritis *Auctorum.* *Baronius* de pleuri-pneumonia.

medici omnes; non recte igitur uti genus a pneu-monia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recen-seri potest; cum plerumque nulla alia praeter illa pleuritidis symptomata ostendit. Quae a plurimis huic morbo tributa sunt, risus nempe sardonicus, et delirium phreniticum, certe non semper adfunt. Primum, quod nunquam vidi, certe rarissimum est; et posterius, alias etiam pneumoniae species saepe co-mitatur, nec tantum a parte pleurae inflammata, quantum a gradu pyrexiae, vel diathesis phlogisti-cae, pendere videtur.

Ill. *Halleri* opuscul. patholog. ob. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epist. XX. et XXI. passim. *Cleg-*
horn. Minorca, p. 247. *Triller* de pleuritide,
 aph. 1. 2. 3. cap. I. 8. *Huxham* Dif. on pleu-
 rifies, &c. chap. I. Ill. *Pringle* Diff. of the
 army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist. hep.
 vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morgag.* de
 caus. et sed. XX. 34.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna*, P. III. cap. 8.

Pleuritis mediastini, S. sp. 4. P. *Sal.* Div. de
 affect. part. cap. 6. *Friend*, Hist. Med. de
 Avenzoare.

Mediastina, V. 52.

Pleuritis pericardii, S. sp. 5. *Verna*, P. III. cap. 9.

Parapleuritis *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, S. sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*,
 Rat. med. I. 7. III. pag. 31.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

Paraphrenesis hepatica, S. sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, et
 diaphragmatis Vide *Morgagn.* de caus.
 et sed. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV.
 16. *Van Swieten* ad *Baerh.* 913.

II. Pleuritides complicatae.

1. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatosa, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch.* Hist. hep. vol. I. p. 236.

Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hist. hep. I. p. 233.

III. Pleuritides symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. *Verna* pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. II. *Morgagni*. de sed. et cauf. XXI. 43. 44.

Pleuritis stomachalis, *Bianch.* Hist. hep. I. p. 232.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

IV. Pleuritides falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panarol.* Pentac. I.
obs. 37.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Pneumoniae sequelae sunt.

V O M I C A.

Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnoea et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum diffici, et febre hectica.

Vomica *Boerb.* 835. *Junck.* 35. *

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

* Vomicam vocamus quam vomicam clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicae apud LINNÆUM et VOGELIUM vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos autores hic non referimus.

E M P Y E M A.

Post pneumoniam suppuratione terminata, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex SAUVAGESIO, licet non semper distinguendas, hic subjungimus.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

G. XIII. C A R D I T I S *.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas;

* Recte omnino dixit VOGELIUS, *Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora, et ita etiam sensisse videtur LINNAEUS, cum apud illum*

spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. III. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac.* Traité de coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel,* Mem. de Berlin, 1756.

Erysipelas pulmonis, *Lomm.* Observ. Lib. II.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac.* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

illum neque *Carditis*, neque *Pericarditis*, inter morbos phlogisticos recensetur. Certe novimus, pericardium saepe inflatum fuisse sine aliis praeter peripneumoniae signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant sequentes, pro speciebus peritonitidis recenseri possent.

I. Peritonitis (*propria*) in peritonaeo strictius dicto, sive in peritonaeo, abdomen intus succingente.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med. L. 1.
obs. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obs. 341.
Morgagn. de sed, LVII. 20.

II. Peritonitis (*omentalis*) in peritonaeo, per omentum extenso.

Epipliotis, S. G. 106. *Sag. G.* 308. *.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerb.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Störk.* Ann. med. I. 132. *Hulme* on the puerperal fever.

* Tum epipliotis, tum Mesenteritis, ut Peritonitidis species hic recensetur, non quam quod ejusdem continuae membranae sint affectiones, quam quod nulla fere signa dari possunt, quibus a peritonite, strictius dicta, dignosci queant.

III. Peritonitis (*mesenterica*) in peritonaeo,
per mesenterium extenso.

Mesenteritis, V. 60.

Enteritis *mesenterica*, S. sp. 4.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes ; anxietas ; in epigastrio
ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus ;
vomendi cupiditas, et ingesta pro-
tinus rejecta ; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56. Sag. G. 306.

Ventriculi inflammatio, Boerb. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. II. 120.

I. Idiopathicae.

i. A causis internis.

**A. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto,
pyrexia vehementi *.**

* Tum gastritis, tum enteritis duarum esse spe-
cierum, quarum una phlegmonodea, altera erysipela-
tosa

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller*, de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller*, obs. 14. hist. 3. *Lieut.* Hist. anat. med. L. 1. 74.

Gastritis erysipelatosa, S. sp. 4. *

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles* de opio, sect. II. p. 231.

2. A causis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

B. Gastritis (*erythematica*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.

tosæ dici potest, mihi ex pluribus observationibus sat is certo constat; et ejusmodi species itaque hic recensui, et si fatendum sit, gastritidis erysipelatosæ, et magis adhuc enteritidis erysipelatosæ, signa saepe obscura et incerta esse. De his vero monere volui ut diligentius inquirant posteri.

* Quam hic gastritidem erysipelatosam dixit SAUVAGESIUS, omnino phlegmonodeam esse mihi videtur.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

Gastritis herniosa, S. sp. 7.

De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pun-
gens, tendens, circa umbilicum tor-
quens; vomitus; alvus pertinaciter ad-
stricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57. Sag. G. 307.

Intestinorum inflammatio, Boerb. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio,
Hoffm. II. 170.

I. Idiopathicae.

Species sunt,

I. Enteritis (*phlegmonodaea*) dolore acuto,
pyrexia vehementi, vomitu et alvo a-
stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1.

Enteritis colica, S. sp. 2. Boerh. 963.

2. Enteritis (*erythematica*) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Species symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus *.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. Sag. G. 312.

Boerh. 914. Hoffm. II. 14. Junck. 66. Macb. p. 446.

* Inter symptomata hepatitidis, *colorem faciei flavescentem*, posuit tum SAUVAGESIUS, tum SAGRUS, et hic etiam addit, *urinas icteritias, biliosas, et serum*

Variat.

I. Acuta signis in charactere dictis dignoscenda.

II. Chronica. Haec saepe nulla quibus dignoscatur signa praebet; aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatiditis caufis quibusdam preegressis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a presso hypochondrio dextra vel a decubitu in latus sinistrum sentito, et denique ex pyrexia leviori cum dictis signis subinde infestante.

Sauvagesii species sunt,

serum sanguinis missi et crusta subflava; sed haec symptomata bilis regurgitantis vel resorptae rectius a LINNÆO et VOGELIO omissa fuisse censeo; nam ejusmodi symptomata non tantum non perpetua, sed etiam rarissima sunt.

Hepatitis erysipelatofa, S. sp. 1. *

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianch.* Hist. hep. tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4. †

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

Pro specie male recensetur morbus secundarius.

* De erythema vel erysipelate, quod vocant, viscerum, minus recte sensisse medicos censeo; nam, me saltem judice, erythema non nisi superficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villosa, epidermidi externae continua et analoga, afficere potest. Nullum igitur erysipelas pulmonis, de quo scripsit **LOMMIUS**, Observ. lib. 2. agnosco; nec hepatitisdem quandam a **SAUVAGESIO** hic erysipelatosam recte dictam esse puto, et hepatitisdem quidem ex **AMATO** hic descriptam revera phlegmonodeam fuisse credo.

† Quin ex contusione vel aliis causis oriri possit inflammatio cystidis felleae, vel ductus choledochi, nullus dubito; sed quibus signis cognosci queat, nisi in uno casu, non novi. In ictero, scilicet, cum dolore in regione epigastrica acuto, a calculo, ut videatur, in ductu choledoco haerente, inflammationem ductus cystici saepe ortam fuisse, omnino censendum, et ne oriatur semper cavendum.

Hepatitis suppurans, S. sp. 6. *Cheston's Pathol. Inq.*
 Chap. III. Sect. 2. et app. Case 12.
 Hepatalgia apostematoso, S. sp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor,
 tumor, et dolor pressu auctus; absque
 signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67. *Sag.*

G. 313. *Macb.* p. 448.

Lienis inflammatio, *Boerb.* 958. et ill. *Van Swieten.* Comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. *Foreft,* L. XX.

Obf. 5. 6. *De Haen*, apud *Van Swieten*, p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ure-
 teris iter sequens; mictio frequens urin-
 ae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae;
 vomitus; cruris stupor; testiculi ejus-
 dem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. G. 115. L. 37. V. 65. *Sag.* G. 314.

Species

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7. *Cheston's Inq.*
Chap. II.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

G. XX. C Y S T I T I S.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66. *Sag.* G. 309.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

Species sunt,

I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor,
et dolor; os uteri tactu dolens; vomi-
tus.

Hysteritis, L. 38. V. 63.

Metritis, S. G. 107, Sag. G. 315.

Inflammatio et febris uterina, Hoffm. II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa, et plerumque evidente
causa; pyrexia; dolor circa articulos,
musculorum tractum sequens, genua et
reliquos majores, potius quam pedum
vel manuum articulos, infestans, calore
externo auctus.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.*

1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Myositis, *Sag.* G. 301.

Lumbago, S. G. 212. V. 138. *Sag.* 169.

Ischias, S. G. 213. V. 138. *Sag.* 170.

Pleurodyne, S. G. 148. V. 138. *Sag.* 254. *Macb.*

p. 511.

Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Variat sede.

A. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. G. 212. sp. 1.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

B. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. G. 213. sp. 10.

C. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. G. 148. sp. 3.

Pleuritis spuria, *Boerh.* 878.

Species symptomaticae.

Lumbago plethorica, S. sp. 3.

Ischias sanguineum, S. sp. 2.

Pleurodyne plethorica, S. sp. 1.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Ischias hystericum, S. sp. 3.

Pleurodyne hysterica, S. sp. 6.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Pleurodyne flatulenta, S. sp. 4.

Pleurodyne a spasmate, S. sp. 9.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 5.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Ischias syphiliticum, S. sp. 7.

Pleurodyne venerea, S. sp. 5.

Lumbago sympathica, S. sp. 13.

*a mesenterii glandulis induratis,
a pancreate tumido, purulento, schirroso, putri,
ab induratis pyloro, vena cava, pancreate,
a rene schirroso, putrefacto,
ab abscessu circa venae cavae bifurcationem,
a vermibus intra renes.*

Lumbago a faburra, S. sp. 8.

Pleurodyne a cacockylia, S. sp. 7.

Rheumatismus saltatorius verminosus, S. sp. 8.

Ischias verminosum, S. sp. 8.

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Lumbago a hydrothorace, S. sp. 14.

Lumbago pseudoischuria, S. sp. 16.

Lumbago ex aneurismate, S. sp. 11.

Pleurodyne ex aneurismate, S. sp. 10.

Pleurodyne a rupto oesophago, S. sp. 20.

Pleurodyne rachitica, S. sp. 13.

Ischias a sparganosi, S. sp. 5.

Pleurodyne catarrhalis, S. sp. 14.

Pleurodyne phthisica, S. sp. 8.

Rheumatismus necroseos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.

Ischias gravidarum, S. sp. 4.

Lumbago partus, S. sp. 7.

Lumbago a nisu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Lumbago a satyriasi, S. sp. 15.

Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

Rheumatismi sequela est,

ARTHRODYNIA*.

Post rheumatismum, nisum violentum, vel
subluxationem; dolores artuum vel

* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus fit, nomen simplex, ut genus omne, habere oportet, et hujusmodi nec ineptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, et cum inter utrumque morbum saepe limi-

musculorum, sub motu praesertim, aucti,
plus minusve fugaces, calore lecti vel alio
externo levati ; artus debiles, rigidi, fa-
cile, et saepe sponte frigescentes ; pyrexia
nulla ; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus *Auctorum.*

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti,
sed cum saepius chronicis sint, plerumque
ad hunc locum pertinent.

Lond. Med. Obs. IV. 5.

G. XXIII. ODONTALGIA*.

tes vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere
rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheu-
matismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natu-
ra adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam
exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri
possit; et si quis pro genere etiam diverso ponere
velit, per me profecto licet.

* In priori Nosologiae methodicae nostrae editio-
ne, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac re-
censui; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis cau-
sam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sen-
sibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a
rheu-

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum,
a carie dentium.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. Sag. G.
157. Junck. 25. Macb. 509.

Odontalgia, sive rheumatismus odontalgicus, Hoffm.
II. 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic itaque uti genus diversum posui.

Etiam si odontalgiam a frigore et aliis irritamentis aliquando fuscitari videtur, cariem dentium, diathesin phlogisticae inducentem, semper subesse puto. Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui rheumatismum exacte satis referunt; sed de iis nobis non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem Clariss. D. COTTUNNII, *Ischias nervosa*, rheumatismi ab acri nervos irritante orti exemplum aliud haberemus; sed neque phaenomena a Cottunnio relata, neque ratio medendi, neque sectiones cadaverum, ejusmodi morbum unquam extitisse mihi probant; ideoque neque hic, neque alibi, *Ischiadem nervosam Cottunnii inter rheumatismi species recensui*.

Odontalgia scorbutica, S. sp. 4.

Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

Odontalgia arthritica, S. sp. 6.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia hysterica, S. sp. 3.

Odontalgia stomachica, S. sp. 9.

G. XXIV. PODAGRA*.

Morbus haereditarius, oriens sine causa externa evidente, sed praeeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, V. 175. Boerb. 1254.

Febris podagrifica, V. 69.

* *Arthritis* nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejici, et *podagra* nomine, utpote typum morbi praecipuum notante, cum celebri BOERHAAVIO usus sum.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139. Sag. G. 142.

Mach. p. 487. *Lond. Med. Obs.* VI. 20.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II.
339.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Affectus spastico arthritici, *Junck.* 46.

Recte forsitan **SAUVAGESIUS**, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicum esse speciem affirmavit; sed varietates sequentes notari possunt.

I. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies perstante, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11. *

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

* Ut solitus sum, **SAUVAGESII** varietates, sive species quas vocat, hic appono; sed tum quod species ejus non semper bene definitae sint, tum quod po-

dagra

II. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel
alius partis internae atonia, et vel sine
expectata aut solita artuum inflamma-
tione, vel cum doloribus artuum leni-
bus tantum et fugacibus, et cum dys-
pepsia vel aliis atoniae symptomatis,
subito saepe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis asthmatica, S. sp. 9.

III. Podagra (*retrograda*) cum inflamma-
tione artuum subito recedente, et ven-
triculi vel alias partis internae atonia
mox infecuta.

IV. Podagra (*aberrans*) cum partis inter-
nae inflammatione, vel non praegressa,
vel praegressa, et subito recedente, in-
flammatione artuum.

Podagra regularis et atonica a se invicem non semper
prorsus disjungantur, in apponendis loco idoneo
SAUVAGESII speciebus, me ubique accuratum fore
non spondeo.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis scorbutica, S. sp. 7.

Arthritis syphilitica, S. sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamenfis, S. sp. 15.

G. XXV. ARTHROPUOSIS*.

Dolores artuum vel partium musculosarum, saepe post contusionem, profundi, obtusi, diuturni; tumor vel nullus, vel

* Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocase, et phlogosi, distinguendum, ubique fatis certo adhibendus, dari posset.

modicus, et diffusus; phlogosis nulla;
pyrexia primum lenis, tandem hectica,
et simul partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce, Practice of Physic, P. II. pag. 70. Cheston, App. Case 4 et 5.*

Lumbago apostematoso, S. sp. 12.

Lumbago ab arthrocase, S. sp. 17.

Ischias ex abscessu, S. sp. 6.

Morbus coxarius, *De Haen, Rat. Med. Vol. I. C. xxxii.*

VOL. II.

R

O. III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decurso vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguæ per cutem sparsae*.

Exanthemata, *Sag. Cl. X.*

* Quo charactere recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortae, solae pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendae sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendae sunt. Ita *petechia* a nobis omittitur, et forsitan *tum miliaria* tum *aphtha* omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitae aliquem affiant, omnino idoneum videtur ut haec ab eruptionibus non contagiosis, quae saepe in decursu vitæ aliquem affiant

vel

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXVI. V A R I O L A.

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastrio prepresso, dolore.

vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formae, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo comparent, an ejusmodi morbus inter exanthemata recentendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad febrium ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex charactere quem dedi satis patebit.

Cum autem ad characteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos plerosque recensui.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem, et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depresso, sive foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3. *Sag.* G. 290.

Febris variolosa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.

Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Species sunt,

I. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae discretae simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. *Helv.* sp. 2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenb.*

Sect. IV. cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead de variol.* cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead ibid.*

Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. *Friend Oper.*
p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet. obf.*
sp. 3.

II. Variola (*confluens*) pustulis numerosis,
confluentibus, circumscriptione irregu-
laribus, flaccidis, parum elevatis; febre
post eruptionem persistante.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-
denb.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet. obf.*
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pis. obf.* 149. *.

* Pro specie variolae, has vesiculas hic posuit
SAUVAGESIUS. Sed vesiculae a Pisone descriptae
potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

- Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.
 Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.
 Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenb.* Sect.
 V. cap. 4.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.
 Variola sanguinea, *Mead de variolis*, cap. 2.
 Variola confluens corymbosa, S. sp. 13.
 Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

Variola lymphatica, S. sp. 1.

Anglis, the CHICKEN-POX, *Edinb. Med. Essays*, Vol. II. Art. 2. near the end, *Heberden, Med. Transact.* Art. 17.

G. XXVIII. R U B E O L A.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntas.

Rubeola, S. G. 94. L. 4. Sag. 293.

Febris morbillosa, V. 36. Hoffm. II. 62.

Morbilli, Junck. 76.

I. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosif, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, Sydenh. Sect. IV. cap. 5.

Lond. Med. Obs. IV. 19. 20.

Variat

I. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenb.* Sect. V. cap. 3.

2. Comitante Cynanche.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays*, Vol. V.
art. 2.

3. Comitante diathesi putrida, Clar. *Watson*,
Lond. Med. Observ. Vol. IV. Art. XI.

II. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis
eminentibus.

Rubeola variolodes, S. sp. 3. *.

Scotis the NIRLES.

G. XXIX. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

* SAUVAGESIUM secutus, hunc morbum hic in-
dicavi, et si multum dubito an recte ad rubeolam re-
ferendus sit. Non solum enim forma papularum
plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse
videtur, est plerumque absque symptomatis catarrha-
libus, rubeolae adeo propriis.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein saepe anasarca.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. Sag. G. 294. Junck.

75.

Species sunt,

I. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. VI. cap. 2.

Soc. Royale I. Mem. p. 10. Macb. p. 380.

II. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa *.

* Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat SAUVAGESIUS. Nos Cynanchicam

VOL. II.

S

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. *Withering* on the
scarlet fever.

Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus
faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum
in plerisque aegris morbus cynanchem malignam
plurimum, aliquando satis exacte referebat, nec un-
quam scarlatinam epidemicam in omnibus aegris
simplicem esse viderim, saepe dubitavi annon scar-
latina omnis sit cynanchica, et semper idem fere
morbus ac cynanche maligna, supra inter Phleg-
masias relata. Plures autem rationes in hanc sen-
tentiam ire non finunt. Certe enim, testibus Sy-
DENHAMO perspicacissimo et aliis, scarlatina sim-
plex, sive nulla comitante cynanche, aliquando ob-
servata fuit, et datur, itaque contagio quaedam spe-
cifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc ab-
que affectione quadam cynanchica, gignens. Quod,
si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens,
quae plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc ni-
hil praeterea mihi probare videtur, quam quod sit
contagionum quarundam natura, ejusmodi ut si-
mul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum
tamen contagiones istae ita differre possint, ut altera
cutem, altera fauces magis et primario afficere pro-
clivis sit, hanc differentiam inter scarlatinae et cy-
nanchis malignae contagionem semper inesse puto.

In

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh.

Sect. VI. Cap. 6. et Scarlatina variolode, S. sp. 5. nobis non liquet.

G. XXX. P E S T I S.

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate *.

In morbo epidemicō, quem pro Scarlatina habui, aliquot aegrotantium sine cynanche quacunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, haec benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentia, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna aegrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et haec fere semper ulcera maligna, foeda, serpentia, gangraenosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque extialis evasit.

* De charactere pestis, lites inter medicos saepe ortae sunt, nec facile dirimendae, ita ut character quibuscumque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. Junck. 78.

Febris pestilentialis, V. 33. Hoffm. II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Maffilienis Clasf.
3. Traité de la peste, pag. 41. Ejusdem pestis,
Cl. 5ta, Traité, p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Maffil. Cl. 2.
Traité, p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité,
p. 225. &c. Waldschmidt. de peste Holsatica,
apud Halleri, Diff. pract. tom. V. Chenot de
peste Transylvanica 1755, 1759. De Haen, Rat.
med. Pars xiv. Car de Mertens de peste Mos-
couense 1771. Samoilowitz Memoire sur la
peste de Moscou 1771. Ejusd. lettre sur l'ex-
periences des frictions glaciales pour la guerison
de la peste. Ejusd. mem. sur l'inoculation de la
peste. Unterricht vors volk gegen dic pest.
Dantzig 1770. Muratoris Del Governo della
peste. Brescia 1721.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. Alpin. de med.
Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1. Traité,
p. 37. 224.

Species dubiae sunt,

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaea, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

G. XXXI. ERYSIPELAS*.

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

* Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythematē, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatū, sed recte SAUVAGESIUS vitium cutaneum; quod nullam febrem, nisi symptomaticam, fibi junctam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan Ill. LINNÆUS erysipelas pro protypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

In aliqua cutis parte, saepius in facie, phlogofisis *erythema*, G. VII. sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10. Sag. G. 296.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

Febris erysipelatosa. Macb. p. 382.

Species sunt,

I. Erysipelas (*vesiculosum*) erythematate, rubedine serpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. Sennert. de febr. L. II.

c. 15.

Febris erysipelatosa, Sydenham, sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2. *.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5. †.

* Haec non nisi varietas erysipelatis vesiculosi, gradu solum differens, esse videtur.

† Haec et sequens non nisi febres cum erythematate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas saepe aliquid putridae et gangraenosae indolis praese ferre; nec dubito quin erysipelas, quod

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

II. Erysipelas (*phlyctaenodes* *) erythemat ex papulis pluribus, trunci corporis partes praecipue occupantibus, et protinus in phlyctaenas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The SHINGLES, *Russel de tache gland.* p. 124. *Hist.* 35.

Zona ignea, *Hoffm. app. tom. III. p. 426.*

Herpes Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comittatur, aliquando, praesertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adsit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissimus; sed de posteriori nobis non satis constat.

* An haec species ad idem cum erysipelate vesiculo genit recte referatur, dubito; sed judicent periti.

Caeterae SAUVAGESII species ad erythema pertinent.

G. XXXII. MILIARIA*.

* Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatim quaeritur. Quod nunquam idiopathicus sit, praeter opinionem medicorum, a medio seculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, et contra sententiam medicorum hujus aevi quorundam spectabilium, affirmare non ausim; sed cum experientiam in hac re saepe fallacem, et medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse novirim, dubitare cogor; et, utcunque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiorem, vidi. Morbis febrilibus quibuscumque, tum inflammatoriis tum putridis, aliquando adjungitur; in nullis tamen, nisi regimine calido et sudoribus praeeuntibus, ortum, et in pluribus, regimine temperato, et sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagio-

num

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio,
sudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

num specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed saepius in vita decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materiae natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum et peritisssimum CAROLUM WHITE habere mihi gratulor. Vide *White on the Management of Lying-in Women.*

Cum autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alias simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathicō habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibusvis hanc rem certius dijudicandam relinquens.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95. Sag. G. 295.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, Hoffm.
II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, Junck. 75.

Germanis der FRIESEL. God. Welsch. Hist.
med. de novo puerparum morbo, qui der
FRIESEL dicitur, Lips. 1655.

De hoc morbo scriptores praecipui sunt.

Hamilton, de febr. miliar. 1710. *Fantonus*, de febr.
mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce*, de
febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767.
De Haen, de divis febr. 1760, et in *Ratio med.*
passim. *Matt. Collin ad Baldinger* de miliar. 1764.
Baraillon sur la fievre miliaire, Soc. Royale I.
Mem. p. 193. *ibid.* II. Hist. p. 198.

Gastellier sur la fievre miliaire des femmes en
couche Montargis 1779. Varnier sur la fievre
miliaire de Normandie, Soc. Royale III. Mem.
p. 281.

Ad Idiopathicam, si qua datur, pertinent,

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. 5.

Symptomaticae manifesto sunt,

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris nova febris, *Sydenh.* Sched. monit. S. sp. d.

Miliaris sudatoria, S. sp. e.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. l.

Miliaris critica, S. sp. b.

G. XXXIII. URTICARIA*.

Febris amphemerina †.

* Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. HEBERDEN, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et quem saepius ipse vidimus, est ab urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes*.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, Junck. 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, Sydenh. Sect. VI. cap. 6.

Febris scarlatina, et febris urticata, Meyserey,
Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXIV. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

* Ad aliorum potius quam meipsius mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

Pemphigus, S. G. 93. Sag. 291.

Morta, L. I.

Febris bullofa, V. 41.

Species ex SAUVAGESIO sunt *,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serofa, C. Pison. obs. 150.

* Cum pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenierim; quae in Nosologia nostra de eo dicenda es-
sent, omnia fere ex SAUVAGESIO necessario depro-
menda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc
morbum lubenter ipse prorsus omisissim, cum omnia
fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi vi-
dentur. Quae ex sui ipsius aut CAROLI PISONIS
observatione habet SAUVAGESIUS, omnino credere
fas est; quae autem ex CHRISTOPHORI SELIGERI,
tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, pa-
rum attentione digna mihi videntur. Quae porro ex
D. THIERRY relatione adducuntur meam fidem om-
nino superant: Nimirum, *quod in morbo admodum exi-*
tiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes
salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis com-
missus, mortem evadebat. Denique, de morbo admo-
dum ambiguo a D. LANGHANS, in Actis Helveticis
descripto,

Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII.
obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et col-
lum sparsis, *Morton.* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in Act.
Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibuug des Sie-
menthals*, Zurich 1753.

Febris Vesicatoria, *Macb.* p. 389.

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXV. A P H T H A.

descripto, donec aliae observationes rem elucidaverint,
nihil concludere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam
cynanche maligna fuit ille morbus, et, ad summum,
quod pemphigus omnis morbus symptomaticus sit,
fatis verisimile videtur. Paulo postquam haec impres-
sa sunt, Collega noster eximus Franciscus Home
mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui pri-
mum in brachiis, et successive demum in toto corpore,
vesiculae magnitudinis avellanae obortae sunt, et post
duos tresve dies effuso humoris serosi pauxillo col-
lapsae sunt. Haec febris autem nullam indolem vel
typum peculiarem monstrabat et cito disparuit nequa-
quam contagiosa.

Synochus *.

Lingua tumidiuscula; linguae et fau-
cium color purpurascens; escharae in
faucibus et ad linguae margines pri-
mum comparentes, os internum totum
demum occupantes, albidae, aliquando
discretae, saepe coalescentes, abrasae
cito renascentes, et incerto tempore
manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. Sag. 298. Boerh. 978.

Hoffm. II. 478. Junck. 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Aphtha infantum.

* An aphtha inter exanthemata recensenda sit, du-
bito. Aphtha enim quaeque fere quam ego vidi sine
febre fuit; et si quando cum aphtha infantum febris
adfuit, haec fere semper aphthae supervenerat. Aph-
tha adulorum quidem saepe febri supervenit. Sed,
febribus diversarum specierum plerumque sub earum
finem jungitur, nec, quantum novi, febris quaevi-
aphthae propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Symptomatica videntur,

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticae sunt

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

Exanthema symptomaticum est,

PURPURA, S. G. 96. Sag. G. 292. *

Petechia, L. 5.

* Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus
vel continuis, in quibusvis etiam exanthematis et pro-
fluviis, modo in iis morbis sit quaedam ad putredin-
rem proclivitas, appareant petechiae; has pro efflo-
rescentia symptomatica, potius quam pro exanthe-
mate idiopathicō, habere volui.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ*.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque
vi externa; sanguis missus ut in phleg-
matis appareat.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. Hoffm. II. 194.

Junck. 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I. Sag. Cl. V. O. I.

* Classem Fluxuum apud SAUVAGESIUM et SA-
GARUM, vel Profluviorum apud VOGELIUM, vel
morborum evacuatoriorum apud LINNÆUM, cum
illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimi-
les conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde
idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam e-
iusmodi classem admittere nolui, et morbos in ea re-
cenitos aliorum referendos esse censui. Illi quos
pyrexia quaedam semper comitatur, sub classe Py-
rexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur he-
morrhagias

G. XXXVI. EPISTAXIS*.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor;
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

morrhagias *activas* quas vocant posui. HOFFMANUM sequor, qui mox post febres de ejusmodi haemorrhagiis tractavit, et in praefatione rationem reddit; quod, scilicet, “*probe consideratis phaenomenis, et paulo peniculatius subductis rationibus, sanguinis eruptiones iisdem propemodum, utut, non satis completis mortibus quibus febres oriuntur, progignuntur.*”

* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philosophia Botanica, No. 233. monuit LINNAEUS, “*Nomina generica, cum classum et ordinum naturalium non menclaturis communis, omittenda esse.*” Contra hanc regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo haemorrhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione fatis frequenter usitata, pro nomine genericō utatur. Nee quidem, cum erraverit, ipse HIPPOCRATES imitandus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum erat, et a VOGELIO quod hic usurpatum est desumpsi.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173. Sag. G. 174.
Haemorrhagia narium, Hoffm. II. 196. Junck. 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. Hoffm. II. 198.

Variat ratione aetatis,

Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethorae arteriosae.

Epistaxis (*senum*) cum signis plethorae venosae.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. Hoffm. II. 198.

Haemorrhagia insalubris, S. sp. 5. Hoffm. ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. sp. 6.

2. A causis externis.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.
Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXVII. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe sputum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. Sag.

G. 175. Junck. 8.

Haemoptoe, Boerb. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. II. 202.

Species idiopathicae sunt,

1. Haemoptysis (*plethora*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. Haemoptysis (*violenta*) a vi externa applicata.

Haemoptysis accidentalis, S. sp. 1.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

3. Haemoptysis (*phthisica*) post tussim cum
macie et debilitate diuturnam.

Haemoptysis phthisica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptoe, Lond. Med. Obs. IV. 16. 18.1

4. Haemoptysis (*calculosa*) rejectis simul
moleculis calculosis plerumque calca-
riis.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

5. Haemoptysis (*vicaria*) post evacuationis
solitae suppressionem.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5.

Symptomaticae sunt,

Haemoptysis *pneumonica*.

Haemoptysis *catarrhalis*, S. sp. 8.

Haemoptysis *peripneumonica*, *Laelii a fonte*.

Haemoptysis *exanthematica*.

158 GENERA MORBORUM

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7.

Haemoptysis rubeolosa.

Haemoptysis hydroptica,

Haemoptysis ascitica, S. sp. 15.

Haemoptysis hydrothoracica

Haemoptysis cachectica.

Haemoptysis splenetica, S. sp. 16.

Inepta et spuriae sunt,

Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haemoptyseos sequela est

P H T H I S I S.

Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,
febre hectica, et plerumque expectora-
tione purulenta.

Phthisis, S. G. 276. L. 208. V. 319. Sag. 101.

Junck. 33.

Phthisis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthisica, sive tabes pulmonalis, *Hoffm.*

III. 284. Lond. Med. Obs. IV. 18. 23. V. 33.

Simmons on consumptions 1780.

Species sunt,

I. Phthisis (*incipiens*) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, *Morton.* Physiolog. L. II. cap. 3.

Phthisis sicca, S. sp. 1.

II. Phthisis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthisis confirmata *Auctorum.*

Phthisis humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

Ratione causae remotae.

Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.

Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.

Phthisis asthmatica, S. sp. 5.

Phthisis calculosa, S. sp. 7.

Phthisis exanthematica, S. sp. 14.

160 GENERA MORBORUM

- Phthisis a febribus, S. sp. 13.
Phthisis rheumatico-arthritica, S. sp. 12.
Phthisis chlorotica, S. sp. 10.
Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisis
icterit. 1724.
Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.
Phthisis scrophulosa, S. sp. 3.
Phthisis chylosa, S. sp. 17.
Phthisis scorbutica, S. sp. 4.
Phthisis syphilitica, S. sp. 8.
Phthisis a plica, S. sp. 19.
Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.

Variat ratione fontis purulentae.

Phthisis a vomica, S. sp. 18.

Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen,* Rat. me-
dendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid. *

G. XXXVIII. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lum-

* Utrum, de hoc fonte puris, recte an secus judi-
caverit HÆNIUS, hujusmodi species vix in Nosologia
locum habere potest, cum a signis quibusvis externis
dignosci non queat.

borum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhois, S. G. 217. L. 192. Sag. G. 182;
Macb. p. 481.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.

Haemorrhoides, *Junck.* 11. et 12.

Leucorrhois, V. 112.

Proctalgia haemorrhoidalis, *Macb.* p. 540.

Species sunt,

1. **Haemorrhois** (*tumens*) externa a mafiscis,

Marisca, S. G. 35. Sag. G. 37.

Variat,

A. Cruenta.

Haemorrhois moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.

Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.

Haemorrhois immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides excedentes, *Alberti de haemorrhoid.* pag. 179.

Haemorrhoides polyposa, S. sp. 3.

B. Mucosa.

Haemorrhoides decoloratae, albae, et mucidae,

Junck. 13. *Alberti*, pag. 248.

Proctalgia intertriginosa, *Macb.* p. 541.

2. Haemorrhoides (*procidens*) externa a procidentia ani.

Haemorrhoides ab exania, S. sp. 4. Med. Eff. Liter.

et Phys. II. 27. *Morg.* de cauf. Ep. XXXIII.

3. Haemorrhoides (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani *.

* *STAHLIUS*, et ejus sequaces, distinxerunt haemorrhoides in internas, quae sanguinem ex ramis venae portarum, et externas, quae sanguinem ex ramis venae cavae profundunt; sed, quantum video, scaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid ad distinguendam morbi naturam, vel effectum, conferre posset; nam arteriae et venae, ad inferiorem intestini recti partem pertinentes,

4. Haemorrhoidis (*caeca*) cum dolore et tumore ani, sine profusione sanguinis.

Haemorrhoides caecae, Junck. 12. Alberti, pag
274. *.

Proctalgia inflammatoria, Macb. p. 540.

G. XXXIX. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior,

pertinentes, ortu utcunque diversae, tam frequenter inter se invicem communicantur et conjungantur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, et utriusvis effectus fere idem semper esse oporteat. Non ideo haemorrhoidem internam et externam ad mentem Stahlianorum distinxii, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

* Haemorrhoidis saepe corporis universi morbus est, sive a quodam universi corporis statu pendens; sed saepe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam haemorrhoides quaevi, etiamsi initio mere localis sit, si saepius, ut solet, redierit, tandem, sicut haemorrhagia alia quaevi saepe rediens, necessario fit universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, et haemorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales recensendam esse censui.

vel sanguinis e vagina praeter ordinem
fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.

Metrorrhagia, *Sag.* G. 179.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119. *Sag.*
G. 202.

Cachexia uterina, sive fluor albus, *Hoffm.* III.
348.

Fluor albus, *Junck.* 133. *.

Abortus, S. G. 245. L. 204. *Sag.* G. 180. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, *Boerb.* 1303.

Convulsio uteri, sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

* Leucorrhœam, sive fluorem album, *auctorum*
hic ad menorrhagiae genus retuli, et leucorrhœam
sine vitio locali omnem huc omnino referendam esse
censeo. Plerumque enim, et fere semper, leucor-
rhœa vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam
mox secuta, et a temporibus quando apparet leucor-
rhœa serum sub hac effusum ab iisdem vasis, quae
menses profundunt, provenire, et saepe leucorrhœam

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non
gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a *Pasta*. Disl.
sopra i mestrui.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gra-
vidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. *Pasta* intor-
no al flusso di sangue dall'utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puer-
peris.

ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, satis
verisimile est.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. *Pasta* diff. supra
citat.

4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex
vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

5. Menorrhagia (*alba*) serosa sine vitio
locali in non gravidis *.

Leucorrhoea, G. ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

6. Menorrhagia (*Nabothi*) serosa in gra-
vidis.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod
ad clariss. medici Pariensis RAULIN, de fluore albo

librum,

Menorrhagiam ferofam, sive leucorrhœam
ex vitio locali, ad morbos locales refe-
rendam esse censeo.

Haemorrhagiae sequentes plerumque, si
non semper, symptomaticae sunt.

STOMACACE, S. G. 241. L. 175. V. 85. Sag.

G. 176.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriae
externae, symptoma est. Cum autem

librum, *Traité des fleurs blanches*, neque studiosos re-
legaverim, neque species fluoris albi varias ab illustri
auctore indicatas ipse recensuerim. Recte an secus
fecerim, peritis dijudicandum relinquo; sed quod
non fecerim haec causa fuit. Plura in libro illo in-
genioso subtilius, quam verius dicta, mihi videntur;
et vel quomodo fluor albus, ab aliarum praeter uteri
partium affectione oriri possit, non intelligo, vel quod
revera oriantur, ex meis saltem observationibus, for-
san paucioribus, mihi nequaquam constat. Lectores
itaque nostros potius ad auctorem ipsum relegare,
quam doctrinam ejus male intellectam, et forsan mi-
nus recte traditam, hic exhibere velim.

species SAUVAGESII fere omnes recente
fere idoneum duco nunc sequenti serie
recensitas velim.

Haematemesis plethorica, S. sp. 1.

catamenialis, S. sp. 5.

haemorrhoidalis,

ex splene, S. sp. 7.

ex hepate, S. sp. 13.

ex pancreate, S. sp. 6.

Haematemesis atra, S. sp. 12.

scorbutica, S. sp. 8.

ex aneurismate, S. sp. 2.

carnosis cruenta, S. sp. 11.

traumatica, S. sp. 3.

ab hirudine, S. sp. 4.

cholerica, S. sp. 9.

a veneno, S. sp. 14.

Simulata, S. sp. 10.

Apud SAUVAGESIUM species sunt;

1. Stomacace scorbutica.

2. Stomacace universalis.

3. Stomacace ab haemorrhoo.
4. Stomacace purulenta.

HÆMATEMESIS, S. G. 242. L. 184. V. 89.

G. 177.

Plerumque haemorrhagiae solitae vicaria est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi nigri, vel denique vis externae, symptoma est.

1. Haematemesis plethorica.
2. Haematemesis ex aneurismate.
3. Haematemesis traumatica.
4. Haematemesis ab hirudine.
5. Haematemesis catamenialis.
6. Haematemesis ex pancreate.
7. Haematemesis ex splenè.
8. Haematemesis scorbutica.
9. Haematemesis cholerica.
10. Haematemesis simulata.
11. Haematemesis carnoſo cruenta.
12. Haematemesis atra.
13. Haematemesis ab hepate.
14. Haematemesis a veneno.

Hæmaturia, S. G. 243. L. 198. V. 92. *Sag.*

G. 178.

Edinb. Eff. V. 72.

Plerumque calculi renalis, aliquando februm putridarum symptoma est.

Species secundum SAUVAGESIUM sunt.

Haematuria spontanea, S. sp. 1.

catamenialis, S. sp. 12.

calculosa, S. sp. 5.

nigra, S. sp. 11.

purulenta, S. sp. 4.

violenta, S. sp. 2.

traumatica, S. sp. 14.

haemorrhoidalis, S. sp. 9.

ejaculatoria, S. sp. 7.

Haematuria stillatitia, S. sp. 8.

in exanthematicis, S. sp. 6

- Spuria, S. sp. 10.
deceptiva, S. sp. 3.
a transfusione, S. sp. 13.
a verme, S. sp. 15.

CYSTIRRHAGIA, V. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alias
morbi vesicae, symptoma.

O. V. PROFLUVIA*.

Pyrexia cum excretione aucta, naturaliter
non sanguinea.

Profluvia, V. CL. II.

G. XL. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa ; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta ; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98. *Sag.* G. 145.

Coryza, L. 174. V. 100. *Sag.* G. 196.

* Ob eandem rationem qua haemorrhagias, profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathefi phlogistica, phlegmatis maxime affinis est ; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibusvis differt.

Rheuma, S. G. 149. *Sag.* G. 255.

Tuffis, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Sag.* G. 249.

Junck. 30.

Tuffis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.

Anacatharsis, S. G. 262. *Sag.* 198.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. I. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. I.

Catarrhus pectoralis, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. I.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.* obf. cent. I. 37. *Junck.* 28. *Morgagni.* de sed. XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tuffis catarrhalis, S. sp. I. *N. Rosen* Diff. apud *Haller,* disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. I.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Febris remittens catarrhalis, *Macb.* p. 359.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

Sp. 2. *Catarrhus a contagio.*

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Hujus exempla sunt.

Anno 1323. *Cronica meteorologica della Toscana*,
apud *Targioni Tozzetti Offervaz.*
Med. Raccolta I. pag. 175.

1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

Valescus de Taranta apud *Morgagni*.
de sedibus XIII. 4.

Marchesi ibid.

1510. *Valleriola* append. ad loc. com. cap. 2.

1575. *Valleriola*, ibid.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert.
obs. IX.

Foresti, L. VI. obs. 1.

1580. *Haenischius* in *Aretaeum*, pag. 315.

396.

Wieri, Obs. L. II.

Anno 1580. *P. Sal. Diversus*, de febre pestilenti,
cap. XI.

Forestus, L. VI. obs. 3.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repert.
obs. X.

Sennertus de febre, L. IV. cap. 17.

1591. *Sennertus*, ibid.

Pechlin, L. II. Obs. 17.

1658. *Willis de febribus*, cap. 16.

1675. *Sydenham*, Sect. V. cap. 5.

Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A.
VI. et VII. obs. 213.

P. de Sorbait.

1679. *Sydenham*, Ep. resp. ad *R. Brady*.

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.

1708. *Schroeckius in Ephem. Germ. Cent. I.*
et II. in append. pag. 14.

1709. *Hoffm. II. 47.*

1712. *Gamerarius in Ephem. Germ. Cent.*
III. et IV. obs. 58.

Shroeckius, ibid. in append. pag. 26.

1729. et 1730. *Hoffm. II. 109.*

C. Fr. Loew. in append. ad *A. N. C.*
vol. III.

Scheuchzer, Obs. meteorol. in app. ad
A. N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et cauf. XIII. 3. 4.

176 GENERA MORBORUM

- Anno 1729 et 1730. *Beccarius, A. N. C. III.* obs.
48. pag. 142.
Hillary on weather and diseases, pag.
35.
Winteringham, Comm. Nosolog. pag.
319.
Rutty's hist. of weather, pag. 17.
Perkin's Soc. Royale I. Hist. p. 209.
1732 et 1733. *Commere. lit. Norimb.* 1733.
pag. 6. 52. 108. 267.
Detharding de febr. Eyderostad. apud
Halleri disputat. pract. vol. V.
Edin. Med. Eff. vol. II. art. 2.
Hillary of weather, &c. pag. 47.
Winteringhau, Comm. Nosolog. p. 354.
Huxham de aëre, &c. 1733. M. Febr.
Rutty's hist. of weather, pag. 30.
1737. Jan. *Rutty*, ibid. pag. 60.
Octob. *Rutty*, ibid. pag. 60.
Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737, pag.
347.
1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag.
106. 188. 313. 336.
Juch et Zuberbuhler de febre catar-
rhali, apud *Haller.* Disp. pract.
tom. V.
Huxham de aëre, 1743. M. April.
Rutty, hist. of weather, p. 99.

Anno 1742. 1743. *Targioni Tozzetti*. Racolt. I. di
offervaz. Med. pag. 176.

1748. *Cleghorn*, Minorca, pag. 132.

Perkin's Soc. Royale I. Hist. p. 210.
et suivans.

1758. *Rutty*, hist. of weather, pag. 211.

Whytt, Lond. Med. Obs. vol. II. art. 13.

1762. *Baker de catarrho*, Lond. 1764.

Monro, Dis. of mil. hosp. pag. 137.

Macb. p. 333.

1767. *Heberden*, Med. transact. I. art. 18.

Macb. p. 334.

1775. Lond. Med. Obs. VI. 30.

1779. et 1780. *Soc. Royale III. Mem.*
p. 16.

Saillant Tableau des Epidemies ca-
tarrhales 1780.

Inter catarrhi, coryzae, et tussis species apud
SAUVAGESIUM, symptomaticae sunt,

Catarrhus rubeolosus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolosa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

- Tuffis accidentalis, S. sp. 4.
 Tuffis gutturalis, S. sp. 8.
 Tuffis xerolaryngea, S. sp. 23.
 Tuffis verminosa, S. sp. 21.
- Tuffis sicca, S. sp. 3.
 Tuffis calculosa, S. sp. 22.
 Tuffis phthisica, S. sp. 17.
 Tuffis haemoptoica, S. sp. 15.
 Tuffis a polypo, S. sp. 16.
- Tuffis a dentitione, S. sp. 12.
 Tuffis stomachalis humida, S. sp. 6.
 Tuffis stomachalis sicca, S. sp. 7.
 Tuffis hysterica, S. sp. 2.
 Tuffis gravidarum, S. sp. 14.
 Tuffis hepatica, S. sp. 9.
 Tuffis rheumatica, S. sp. 18.
 Tuffis arthritica, S. sp. 19.
 Tuffis metallicolarum, S. sp. 4.

XLI. D Y S E N T E R I A.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. Sag. 183.

Hoffm. III. 151. Junck. 76.

Non nisi speciem unicum novi cuius nomina apud SAUVAGESIUM sunt,

Dysenteria epidemicæ, S. sp. 6. *Sydenham*, sect. IV. cap. 3. *Helwich*. in hist. morb. *Wratislav*. ann. 1699. *Degner*. de Dysenteria Neomagensi 1736. *Huxham*, de aëre, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's Minorca*, chap. 5. *Grimm*. hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark*, Hist. et sectiones dysenteric. diff. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr. Zurich. 1767. Soc. Royale III. Mem. p. 32.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illust. *Pringle*, Dis. of the army, pag. 224. Cl. *Monro*, Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont*. de med. Ind. cap. 3.

Variat,

I. Vermibus comitata.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham de aëre,*
 &c. ad ann. 1743. M. *Maij.* Ill. *Pringle*, pag.
 225. *Monro*, pag. 62.

2. Rejectis moleculis carnosis, vel sebaceis.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius Ephem.*
Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner*, ibid.
D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii.*
Morgagni de sed. Ep. XXXI. 17—24. Ill.
Pringle, pag. 237. *Monro*, pag. 62.

3. Febre intermittente comitata.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in
 append. ad Exerc. II. *Cleghorn's Minorca*, pag.
 236. *Lautter. hist. med. bienn. cas.* 17. 20.

4. Sine fanguine.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis, Pharm. rat.*
P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham, Ed. Leid.*
 pag. 179. *Morgagni de sed. Ep. XXXI.* 11.
 Ill. *Pringle*, pag. 225. Cl. *Monro*, pag. 61.
Roederer de morbo mucoso, Gotting. 1762.

5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. sp. 2. Febris ex-anthematico-dysenterica Tiguri epidemica, 1747.

Symptomaticae sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.

Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.

Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.

Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.

Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria mesenterij vomica, S. sp. 11.

Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a catharticis, S. sp. 12.

CL. II. NEUROSES*.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

* A tempore celebris quondam apud Anglos medici THOMÆ WILLIS, morbos quosdam ab aliis quibusvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morbos fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum sistema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe pyrexiarum, quam a classe cachexiarum diversam, sub nomine Neurosium recte instituisse mihi videor,

O. I. C O M A T A.

Motus voluntarii imminuti cum sopore sive
sensuum feriatione.

Comata, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* Cl. IX. O. V.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XLII. A P O P L E X I A.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum
sopore*, plus minus profundo, superstite
motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.*
1007. *Junck.* 117. *Sag.* G. 288. *Wepfer.* hist.
apoplecticorum.

* Apud LINNÆUM vocabulum Sopor, tam pro
motuum, quam pro sensuum feriatione ponitur; sed
sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu som-
no simili, eodem utimur.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. Boerh. 1045.

Sag. G. 287. Macb. p. 561 *.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. Boerh.

1048. Sag. G. 286.

Coma, V. 232. Boerh. 1048.

Haemorrhagia cerebri, Hoffm. II. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G.

281. Boerh. 1036. Junck. 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, Hoffm. III.

44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333. Sag. G. 283.

Symptomatica esse videntur,

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23. Sag. G.

284.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22. Sag. G.

285.

* Cum genera *carus*, &c. hic subjuncta non nisi apoplexiae leviores esse videntur, nec vel respiratione vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad unum genus omnia referenda esse censui.

Apoplexiae idiopathicae species sunt,

I. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethorae universalis, et praecipue capitis.

Apoplexia *sanguinea*, S. sp. 1. *Morgagn. de causis, &c.* II. III. LX. *Preysinger, sp. 1.*

Carus spontaneus, S. sp. 2. *Boerh. 1045.*

Asphyxia * *spinalis*, *Du Hamel, Hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. Boerh. Praelect. ad Instit. 401.*

Morgagn. de caus. &c. III. 3.

Cataphora *coma*, S. sp. 2.

* Genus *asphyiae* ad *syncopen* olim retuli, et ejusdem species quasdam non nisi gradu a *syncope* differre, adhuc censeo. Plures vero *asphyiae* species ad *apoplexiae* genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. *Asphyxia spinalis* quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter *apoplexiae* species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his satis perspectis plures *asphyiae* species a *SAUVAGESIO* recensitas inter *apoplexiae* species

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore, plerumque senum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa, Preysinger, Sp. 4. Morg. de causis, &c. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolenta, S. sp. 1.

Lethargus literorum, S. sp. 7. Van Swieten in aph. 1010. 2 γ. et 3 α.

species enumeravi; nec huic obstat velim quod, in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstite, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; et si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplectis ante mortem accedit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conjicere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

3. Apoplexia (*hydrocephalica**) paulatim adoriens; infantes et impuberis, primum laffitudine, febricula et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

VI.

XI.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, *Whyll's Works*, pag. 725.

Lond. Med. Observ. Vol. IV. art. 3. 6. and 25.

VI. 6. 7. 8. *Gaudelius de hydrocephalo*, apud

Sandifort Thesaur. Vol. II. Ed. Med. Eff. II. 18.

III. 23. *Soc. Royale III. Mem.* p. 194.

Hydrocephalus acutus, *Quin*, *Diff. de hydrocephalo*, *Edinb.* 1779.

Asthenia a hydrocephalo, S. sp. 3.

* In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.

4. Apoplexia (*atrabilioria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabilioria, S. sp. 12. Preysinger, Sp. 6.

Carus traumaticus, S. sp. 5.

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica, capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2. Ed. Est. V. 52.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentissis fendantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.

Carus a narcoticis, S. sp. 14.

Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.

Carus a plumbagine, S. sp. 10.

Apoplexia mephitica, S. sp. 14. Ed. Est. V. 55.

Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.

Asphyxia a musto, S. sp. 3.

Catalepsis a fumo, S. sp. 3.

Asphyxia a fumis, S. sp. 2.

Asphyxia a carbone, S. sp. 16.

Asphyxia foricariorum, S. sp. 17.

Aphyxia sideratorum, S. sp. 10.

Carus ab insolatione, S. sp. 12.

Carus a frigore, S. sp. 15.

Lethargus a frigore, S. sp. 6.

Aphyxia congelatorum, S. sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Aphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Ecstasis catoche, S. sp. 1.

Ecstasis resoluta, S. sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica**) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepè prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutiquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter apoplexiæ species collocavi.

190 GENERA MORBORUM

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. Sag. G.
281. Boerh. 1036. Junck. 44.

Species apud SAUVAGESIUM sunt,

Catalepsis hysterica, S. sp. 1.

_____ verminosa, S. sp. 2.

_____ a fumo, S. sp. 3.

_____ a menostasia, S. sp. 4.

_____ melancholica, S. sp. 5.

_____ delirans, S. sp. 6.

9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia exter-
na suffocante.

Asphyxia suspensorum, S. sp. 4.

Asphyxia immersorum, S. sp. 1. *McDonel de sub-*
mersis, Edin. 1784.

Asphyxia flatulenta, S. sp. 12. ad apoplexiae ge-
nus pertinet, si a signis externis dignosci posset.

Apoplexia saepe symptomatica est,

i. Febris intermittentis.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9.

Carus febricosus, S. sp. 3.

Cataphora timor, S. sp. 8.

Typhomania febricosa, S. sp. 1.

Catalepsis quartanaria, S. sp. 7.

2. Febris continuae.

Carus febrilis, S. sp. 2.

Typhomania continua, S. sp. 2.

Typhomania agrypnocoma, S. sp. 3.

Lethargus a febre, S. sp. 1.

3. Phlegmasiae.

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13.

Lethargus cephaliticus, S. sp. 4.

Lethargus pulmonicus, S. sp. 2.

4. Exanthematis.

Carus variolosus, S. sp. 8.

Apoplexia metastatica, S. sp. 6.

Carus exanthematicus, S. sp. 18.

Cataphora exanthematica, S. sp. 5.

5. Hysteriae.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4.

192 GENERA MORBORUM

Carus hystericus, S. sp. 9.

Asphyxia hysterica, S. sp. 8.

Carus mystagus, S. sp. 17.

Carus hypochondriacus, S. sp. 13.

6. Epilepsiae.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8.

Apoplexia suspiriosa, S. sp. 10.

7. Podagracae.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5.

Carus arthriticus, S. sp. 6.

Cataphora arthritica, S. sp. 4.

Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

8. Vermium.

Apoplexia verminosa, S. sp. 15.

Carus verminosus, S. sp. 7.

Typhomania verminosa, S. sp. 4.

9. Ischuriae.

Carus Ischuriosus, S. sp. 4.

10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

G. XLIII. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, Boerb. 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. Junck. 115.

Atonia, L. 120.

I. Species idiopathicae sunt,

I. Paralyfis (*partialis*) quorundam mus-
culorum tantum.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. Junck. 115.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paralyfis serosa, S. sp. 12.

Paralyfis nervea, S. sp. 11.

Mutitas a glossolyfi, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

2. Paralysis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228. Sag.

G. 276.

Variat ratione habitus corporis.

a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. sp. 10.

Male recensetur

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11.

Quae signis externis dignosci non potest, et

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Recenserri vix meretur.

3. Paralyfis (*paraplegica*) dimidii corporis
transversim sumpti.

Paraplexia, S. G. 171. Sag. G. 277.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paraplexia sanguinea, S. sp. 2.

Paraplexia a spina bifida, S. sp. 3.

Paraplexia rheumatica, S. sp. 1.

4. Paralyfis (*venenata*) a potentiis sedan-
tibus externe vel interne adhibitis.

Paralyfis metallariorum, S. sp. 22.

Hemiplegia saturnina, S. sp. 14.

II. Species symptomaticae sunt,

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8.

Paraplegia intermittens, S. sp. 6.

Paralyfis febrilis, S. sp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. sp. 6.

Paralyfis rheumatica, S. sp. 3.

Hemiplegia arthritica, S. sp. 5.

Paralyfis rachialgica, S. sp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. sp. 5.

Paralyfis biliosa, S. sp. 9.

Hemiplegia transversa, S. sp. 1.
Paralyfis scorbutica, S. sp. 6.
Paralyfis scrophulosa, S. sp. 5.
Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.
Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.
Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.
Paralyfis Polonica, S. sp. 7.

Paralyfis a vomica, S. sp. 10.

Paralyfis traumatica, S. sp. 4.
Hemiplegia traumatica, S. sp. 9.
Paraplegia traumatica, S. sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum,
in numerum generum recipere nolle;
species autem a SAUVAGESIO recensitas,
prout mihi vel Aſtheniae vel Paralyfios,
vel convulsionis symptomata eſſe viden-
tur, hic ſubjugam.

T R E M O R.

Artus alterna per itus et reditus frequentes
motitatio.

Tremor, S. G. 129. L. 139. V. 184. Sag. 236.

1. Species asthenicae,

- Tremor a debilitate, S. sp. 1.
 Tremor senilis, S. sp. 2.
 Tremor a coffea, S. sp. 4.
 Tremor a pathemate, metu, ira, gaudio, libidine,
 S. sp. 14.
 Tremor typhodes, S. sp. 19.

2. Species paralytiae.

- Tremor paralytodes, S. sp. 11.
 Tremor vertiginosus, S. sp. 7.
 Tremor a plethora, S. sp. 13.
 Tremor a faburra, S. sp. 12.
 Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.
 Tremor scorbuticus, S. sp. 10.
 Tremor rheumatismalis, S. sp. 18.
 Tremor temulentus, S. sp. 3.
 Tremor metallurgorum, S. sp. 5.
 Tremor traumaticus, S. sp. 17.

3. Species convulsivae.

- Tremor coactus, S. sp. 6.
 Tremor tendinum, S. sp. 9.
 Tremor palpitans, S. sp. 16.

O. II. ADYNA MIÆ.

Motus involuntarii, sive vitales sive naturales, imminuti.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychiae, S. Cl. VI. O. IV. Sag. Cl. IX.
O. IV.

G. XLIV. SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. G. 174. S. 94. V. 274. Sag. 280.
Junck. 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273. Sag.
279.

Aphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275. Sag. 281.
Virium lapsus et animi deliquia, Hoffm. III. 267.

I. Idiopathicæ.

1. Syncope (*cardiaca*) sine causa manifesta saepe rediens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis: *Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.*

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac, Tr. de coeur,*
p. 540.

Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. *Senac, de coeur,*
414. *Morgagn. de sed. XXV. 2. 3. 10.*

Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac, p. 471.*

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac, 533.*
Schreiber Almag. L. III. § 196.

Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon. Op. II. p.*
462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta oriens: *Ex affectione totius systematis.*

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac, p. 544.*

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxiae a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac, p. 554.*

200 GENERA MORBORUM

- Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.
Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.
Syncope a sphacelo, S. sp. 14. *Senac*, p. 553.
Syncope ab inanitione, S. sp. 1. *Senac*, p. 536.
Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.
Syncope a dolore, S. sp. 2. *Senac*, p. 583.
Asphyxia traumatica, S. sp. 14.
Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

II. Symptomaticae, sive symptomata morborum vel totius systematis, vel aliarum praeter cor partium.

- Syncope febrilis, S. sp. 3. *Senac*, p. 548.
Syncope febricosa, S. sp. 17. *Torti Therap. spec. L. III. cap. 1.*
Syncope exanthematica, S. sp. 19.
Syncope metastatica, S. sp. 20.
Leipothymia stomachica, S. sp. 2.
Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.
Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.
Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de arthr. anomala, cap. 8.*
Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind Treat. on scurvey.*
P. II. chap. 11. Senac, p. 552.

G. XLV. DYSPEPSIA.

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynbia, pauciora saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 277. Lond. Med. Obs. VI. 11.

Apepsia, V. 276.

Diaphora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. Sag. G. 268.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157. Sag. G. 160.

Gastrodynbia, S. G. 203. Sag. G. 161.

Soda, L. 47. V. 161.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159. Sag. G. 185.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214. Sag. G. 186.

Flatulentia, S. G. 271. L. 165. V. 127. Sag. G. 207.

I. Idiopathicae.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.

Vomitus a faburra, S. sp. 2.

Vomitus a crapula, S. sp. 1.

Vomitus lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. sp. 5.

Flatulentia acida, S. sp. 1.

Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9.

Cardialgia a faburra, S. sp. 2.

Cardialgia lactantium, S. sp. 11.

Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.

Cardialgia paralytica, S. sp. 7.

Gastrodynia faburrallis, S. sp. 1.

Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.

Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.

Gastrodynia astringens, S. sp. 9.

Gastrodynia atterens, S. sp. 10.

Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

II. Symptomaticae,

I. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia schirrofa, S. sp. 6.

Vomitus a pyloro calloso, S. sp. 8.

Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11.

Nausea ab apostemate circa cardiam, S. sp. 9.

Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.

Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.

Cardialgia a veneno, S. sp. 2.

Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.

Vomitus a veneno, S. sp. 7.

Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.

Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Nausea biliosa, S. sp. 6.

Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.

Vomitus urinosus, S. sp. 27.

Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.

Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.

Cardialgia verminosa, S. sp. 10.

Nausea a taenia, S. sp. 1.

Vomitus verminosus, S. sp. 5.

Gastrodynia a xiphoide, S. sp. 12.

Gastrodynia Americana, S. sp. 6.

Nausea ex compresso ventriculo, S. sp. 5.

Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. sp. 22.

Vomitus ab oesophago obstructo, S. sp. 21.

Gastrodynia gastrocelica, S. sp. 20.

Nausea ex gastrocele, S. sp. 4.

Vomitus gastrocelicus, S. sp. 18.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13.

Nausea ex gastritide, S. sp. 10.

Vomitus gastriticus, S. sp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgiticus, S. sp. 23.

Vomitus a dentitione, S. sp. 4.

Vomitus iliacus, S. sp. 24.

Nausea ex pancreatis schirro, S. sp. 3.

Vomitus a pancreate, S. sp. 17.

Vomitus ab hepate obstructo, S. sp. 16.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Gastrodynia hypochondriaca, S. sp. 16.

Flatulentia hypochondriaca, S. sp. 3.

- Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. sp. 6.
Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.
Anorexia mirabilis, S. sp. 10.
Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.
Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.
Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.
Nausea a semine corrupto, S. sp. 8.
Nausea gravidarum, S. sp. 2.
Vomitus gravidarum, S. sp. 12.
Flatulentia lochialis, S. sp. 6.
Anorexia arthritica, S. sp. 12.
Cardialgia arthritica, S. sp. 8.
Nausea nephritic, S. sp. 7.
Vomitus nephriticus, S. sp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.
Anorexia plethorica, S. sp. 3.
Anorexia cachectarum, S. sp. 7.
Anorexia febrilis, S. sp. 4.
Cardialgia febricosa, S. sp. 4.
Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.
Vomitus febricosus, S. sp. 29.
Vomitus rabiosus, S. sp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.
Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.
Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLVI. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu,
ex causis non aequis, in temperamento
melancholico.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218. Sag.
332.

Morbus hypochondriacus, Boerb. 1098.

Malum hypochondriacum, Hoffm. III. 64. Junck.
36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi
non liquet.

Species sequentes ex FRÆCASSINO, ex
theoria parum certa confictae, mihi
videntur.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

Symptomaticae sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthisica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLVII. C H L O R O S I S.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; veneae minus plenae, corporis tumor molles; asthenia; palpitatio; menstruorum * retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. Sag. G. 135.

Boerh. 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86.

* In hoc charactere antea dixi menstruorum saepe retentio; quasi species chlorosis esset in qua menses

Chloroseos unicum speciem veram agnoscimus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. *Chlorosis amatoria.*

Caeterae SAUVAGESII species spuriae, sive decolorationes, symptomatice sunt.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

menses rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam cachexiae huc referenda. Sed nunc dubito an species cachexiae quaevis sub titulo *Chlorosis*, vel sub charactere hic dato, recte poni possit; et nullam chlorosis speciem veram, praeter illam quae retentio- nem menstruorum comitatur, agnoscere vellem. Hinc vocabulum *saepe* in charactere nunc omissum est; sed simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus recte pro genere recensitam esse, cum pro symptomate amenor- rhoeae semper haberi possit.

Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.

Chlorosis maculosa, S. sp. 8.

Chlorosis Carthaginica, S. sp. 10.

Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.

Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.

VOL. II.

D d

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes *.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. V. Sag. Cl. VII.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsivi, Hoffm. III. 9.

Spasmi et convulsiones, Junck. 45. 54.

Epilepsia, Boerh. 1071. 1088.

SECT. I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. TETANUS.

Plurium musculorum rigiditas spastica.

Variat gradu.

I. Tetanus.

Dimidium vel totum corpus spasmis affectum.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180. Sag. G. 228.

* Motus abnormes sunt qui ex causa praeternaturali oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturnitate

III Catochus *, S. G. 123. L. 128. V. 183. Sag. G. 229.

Opisthotonus, V. 181.

Episthotonus, V. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit SAUVAGESIUS; sed omnes, quae idiospathicae dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, et cujus forma praecipua apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus Indicus, S. sp. 5. de quo plura haberi possunt apud Hillary, Barbadoes, p. 219. Chalmers, Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 12. D.

Monro,

tate contractionis praeter modum fiunt; et nullus dubito quin hujusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

* Catochus apud SAUVAGESIUM genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species natura prorsus diversas; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quae a rigiditate spastica pendeant, ad tetani genus huc retuli.

Monro, Edinb. Phys. et Liter. Essays, Vol. III,
Art. 30. *A. Monro*, Art. 31. et sub nomine spasmi
apud *Bontium* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Nec aliis morbus est,

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Variat autem Tetanus ratione causae remotaæ, quatenus nimirum vel a causa interna, vel a frigore, vel a vulnere oriatur. A vulnere, varietas frequen-
tissima apud SAUVAGESIUM appellatur

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

Variat etiam quavis causa ortus Tetanus
ratione partis corporis affectae; hinc

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus holtonicus, S. sp. 4.

Catochus holtonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in E-
phem. German. D. II. A. I. Obs. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Stork.* Ann. Med.
1758. *M. Julio.*

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetani species symptomaticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Stork.* Ann. Med.

759. p. 166.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus lateralis *, S. sp. 6. *Morgagni.* de caus.
et sed. X. 2. et 3.

Pleurosthotonus Strack.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

* In exemplo Tetani lateralis quod profert **SAUVAGESIUS**, adfuit in eodem aegro alterius lateris paralysis; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui; sed si Tetani lateralis exemplum a **MORGAGNIO** allatum, sine alterius lateris paralysi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenserri potuisset. Interim, donec haec res certius determinaretur, post Tetanum lateralem posui Pleurosthoton Strackii.

2. Trismus. Praecipue maxillae inferiores Spastica rigiditas.

Trismus, S. G. 117. L. 124. Sag. G. 223.

Capistrum, V. 208.

I. Species verae sunt,

1. Trismus (*nascentium*) infantes duas primas a nativitate septimanas corripiens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Gallis Americanis mal de machoire. *Heister*, Comp. med. pract. cap. XV. § 10. *Cleghorn's Minorca*, Introd. p. 33. *Hofer*. in Act. Helvet. tom. I. p. 65. *Machb.* p. 459.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium aetatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.* Vol. I. Art. I. 7. Vol. II. 8. 34. Vol. III. 31. Vol. IV. 7. VI. 13. *Med. Transf.* II. 4.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri* act. Helvet. tom. III. p. 319.

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's Barbadoes*, 221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.

II. Sequentes apud SAUVAGESIUM Trismi species, spurias, vel falsas dicimus; vel quod non a spasmo, sed ab alio muscularum vitio pendeant, vel quod convulsivae potius quam spasmodicae sint, vel, denique, quod faciei potius quam maxillae inferioris, muscularum affectiones sint.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus sardonicus, S. sp. 18.

Trismus diastrope, S. sp. 19.

G. L. CONVULSIO.

Musculorum contractio clonica, abnormis,
citra soporem.

Convulsio, S. G. 128. L. 142. V. 191. Sag. G. 235.

I. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11.

Hieranofos, L. 144. V. 190.

Convulsio habitualis, S. sp. 12.

Convulsio intermittens, S. sp. 16.

Convulsio hemitotonos, S. sp. 15.

Convulsio abdominis, S. sp. 10.

Convulsio ab inanitione, S. sp. 1.

Convulsio ab onanismo, S. sp. 13.

Scelotyrbe festinans, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4.

Convulsio nephralgica, S. sp. 6.

Convulsio gravidarum, S. sp. 14.

Scelotyrbe verminosa, S. sp. 5.

Convulsio febrilis, S. sp. 3.

G. LI. CHOREA*.

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, histriionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. G. 136. Sag. G. 243.

Chorea, L. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contingit, quae apud SAUVAGESIUM audit

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1.

Chorea St Viti Sydenham. Sched. monitoria.

* In priore hujus libri editione, Choram pro convolutionis specie habui; cum autem ratione tum aetatis quam adoritur, tum motuum quos exhibet, a quavis alia convolutionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis,

Scelotyrbe intermittens, S. sp. 4

Hiearonosis Macb. 558.

G. LII. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum agitazione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.

Convulsivo raphania, S. sp. 7.

Germanis DER KRIEBEL KRANKHEIT.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr.

L. IV. cap. 16. *Gregor.* Horst. oper. tom. II.

L. VIII. Obs. 22. *Willis de Morb. convulf.*

Muller apud Haller, disp. tom. I. *Waltschmied* apud *Haller*, disp. tom. VII. *Wedel*, ibid. *Hoffm.* tom. I. 231. *Kannigießer*, A. N. C. tom. VII.

Brunner in Ephem. Germ. D. III. A. II. obs.

224. *Willisch.* ibid. Cent. VII. obs. 13. *Weffer* de affeet. cap. obs. 120. *Breslauver Sammlung*

1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid,

1723. Januar. A. N. C. Vol. VII. Obs. 41.

Bruckmann. Comm. Norimb. 1743, pag. 50.

Soc. Royale, I. Mem. p. 303. II. Mem. p.
587.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An *Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea* fit idem morbus?

Vide *Salerne* in *Memoires présentés à l'acad. des sciences*, tom. II.

G. LIII. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. Sag. G. 24. Boerh. 1771. Hoffm. III. 9. Junck. 54. Lond. Med. Obs. VI. 9.

Eclampisia*, S. G. 133. V. 189. Sag. G. 240.

* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab epilepsia, quam pro chronicō habent, distinguiere, et pro diverso genere ponere, voluerunt SAUVAGESIUS et VOGELIUS; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum eclampsia SAUVAGESII, tum caufis tum phænomenis plerumque cum epilepsia exacte congruat, illam genere ab epilepsia diversam esse nequaquam habere possunt.

Species idiopathicae sunt,

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel Scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1.

Eclampsia plethorica, S. sp. 7.

Epilepsia cachectica *, S. sp. 2 ?

Epilepsia a terrore, *Macb.* p. 556.

2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa ma-

possum. Ejusmodi genus prorsus omisit LINNÆUS, et quae plura ad eclampsiam ab epilepsia distinguedam protulit SAGARUS, speciem tantum non genus distinguere possunt.

* Epilepsia, apud SAUVAGESIUM *cachectica* dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc *cachecticam* cum *serosa* HOFFMANNI et PISONIS eandem esse auctor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima, nimirum *exanthematica*, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam *cachecticam* utroque loco posui, sed dubius, et aliis dijudicandum relinquens.

nifesta ; sed praegressa sensatione aurae
cujusdam a parte corporis quadam ver-
sus caput assurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

Epilepsia pedisymptomatica, S. sp. 6.

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione
manifesta oriens, et ablata irritatione
cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampisia traumatica, S. sp. 9.

A dolore.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10. Ed. Eff. V. 61.

Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.

Eclampisia a doloribus, S. sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampisia parturientium, S. sp. 3.

A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

A veneno.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11.

Eclampsia ab oenanthe, S. sp. 12.

Eclampsia a cicuta, S. sp. 13.

Eclampsia a coriaria, S. sp. 14.

**A scabie, vel alia acris humoris effusione,
et retropulsa.**

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

Epilepsia cachectica, S. sp. 2.

A cruditate ventriculi.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a faburra, S. sp. 5.

A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

Ab haemorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

A debilitate, *etiam cum ex parte debilitate* A

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

Epilepsiae symptomatice sunt, A

Epilepsia febricosa, S. sp. 9.

Eclampsia febricosa, S. sp. 17.

Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.

Epilepsia uterina, S. sp. 4.

Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.

Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 15.

Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

SECT. II. In functionibus vitalibus.

A. In actione cordis.

G. LIV. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. Sag.
257. Hoffm. III. 83. Junck. 33. Mac.. 569.

Si palpitationis causae variae externis signis dignosci possent, plures ejus species cum SAUVAGESIO pro diversitate cau-

sae statuere potuissimus ; sed, cum cau-
sae diversae nullo modo, quantum no-
vimus, distingui queant, non nisi spe-
ciem unicam idiopathicam statuere pos-
sum, et quam charactere sequenti insig-
niri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere constans, saltem
saepe rediens, sine alio morbo evidente.

Pro synonymis sequentes SAUVAGESII spe-
cies recensere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. sp. 1. *Senac,*

Mal. de coeur. p. 284. *Lancisi* de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. sp. 4. *Senac de coeur,* p.
504.

Palpitatio apostematoso, S. sp. 7. *Lancisi* de a-
neurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac de coeur,*
485.

Palpitatio a corde officato, S. sp. 2. *Senac de*
coeur, pag. 484. *Morgagni de Sed. Ep. XXIV.*
17.

Palpitatio calculosa, S. sp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac de coeur.*

lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polyposa, S. sp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. sp. 8.

Palpitatio ex aortae angustia, S. sp. 9. *Lancisi de
aneuryf. prop. 53. Senac, 484.*

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. *Storck, Ann.
med. I. p. 245.*

Palpitatio arthritica, S. sp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. sp. 12.

Palpitatio hysterica, S. sp. 13.

Palpitatio melancholica, S. sp. 14. *Lancisi de a-
neuryf. prop. 44.*

Palpitatio febricosa, S. sp. 15. *Storck Ann. med.
I. p. 75.*

B. In actione pulmonum,

G. LV. A S T H M A.

Spirandi difficultas per intervalla subiens ;
cum angustiae in pectore sensu, et re-
spiratione cum sibilo strepente ; tussis

sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla,
versus finem libera, cum sputo muci
faepe copioso.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268. Sag. G.
252.

Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum,
Hoffm. III. 94.

Asthma spasticum, *Junck.* tab. 51.

Species idiopathicae sunt,

i. Asthma (*spontaneum*) sine causa mani-
festa, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum, *Floyer*
on the asthma, chap. 1.

Asthma convulsivum, S. sp. 2. *Willis*, Pharm.
rat. p. 2. Sect. 1. cap. 12. Med. Tr. I. 7.

Asthma hystericum, S. sp. 3. *Floyer* on the asth-
ma, chap. 1.

Asthma stomachicum, S. sp. 8. *Floyer*, Scheme of
the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

Species asthmatis symptomatice sunt,

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. Junck. tab. 32.

G. LVI. D Y S P N O E A.

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. G. 144. L. 160. V. 267. Sag. 251.

Junck. 32.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269. Sag.

G. 253. M. 574.

Species idiopathicae sunt,

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

Asthma pneumonicum, *Willis*, Pharm. rat. P.

II. sect. I. cap. 12.

Asthma pituitosum, *Hoffm.* III. sect. II. cap. II.

§ 3.

Asthma pneumodes, S. sp. 17. Ed. Eff. III. 25.

2. Dyspnoea (*sicca*) cum tussi plerumque sicca.

Hujus causae variae haud facile dignoscendae sunt; sequentes autem SAUVAGEI species hoc referri possunt.

Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.

Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.

Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.

3. Dyspnoea (*aërea*) a minima quavis tempestatum mutatione aucta.

Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dyspnoea (*terrea*) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.

Dyspnoea calculosa, M. 574.

5. Dyspnoea (*aquosa*) cum urina parca et oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.

Orthopnoea ab hydrocephalum, S. sp. 12.

6. Dyspnoea (*pinguedinosa*) in hominibus valde obefisis.

Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

7. Dyspnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus laefis, vel male conformatis.

Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.

Dyspnoea Galenica, S. sp. 16.

Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

Asthma a gibbo, S. sp. 9.

8. *Dyspnoea (extrinseca) a causis exter-
nis manifestis.*

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

Orthopnoea à fungis, S. sp. 25.

Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

*Dyspnoeae species symptomaticae sunt symp-
tomata,*

1. *Morborum cordis, vel vasorum majo-
rum,*

Dyspnoea a corde, S. sp. 11.

Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.

Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.

Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.

Dyspnoea aneurysmatica, S. sp. 19.

Orthopnoea ab aneurysmate, S. sp. 8.

Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

2. *Tumoris abdominalis,*

Dyspnoea a phisconia, S. sp. 7

Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.

Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.

Dyspnoea a liene, S. sp. 14.

Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.

Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.

Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

3. Variorum morborum,

Asthma febricosum, S. sp. 18.

Orthopnoea febricosa, S. sp. 20.

Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.

Orthopnoea pseudo-peripneumonica, S. sp. 21.

Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.

Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.

Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.

Orthopnoea a hydrothorace, S. sp. 5.

Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.

Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.

Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.

Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.

G. LVII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus ; tussis convulsiva,
strangulans, cum inspiratione sonora,
iterata ; saepe vomitus.

Pertussis *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

Huxham de aëre, ad ann 1732. Lond. Med.

Obs. III. 27. 30. Soc. Royale III. Hist. p. 268.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10. *Sag.* sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11. *Sag.* sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LVIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris
aquei, plerumque insipidi, aliquando
acris eructata.

Pyrosis, S. G. 200. *Sag.* G. 158.

Soda, L. 47. V. 154.

Scotis, the WATER-BRASH.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5. *Macb.* p. 515. M

Caeterae SAUVAGESII species symptoma-
tiae sunt,

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LIX. C O L I C A.

Dolor abdominalis, praecipue circa umbili-
licum torquens; vomitus; alvus ad-
stricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Sag.* G. 162.

Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Macb. p. 519.

Rachialgia, S. G. 211. *Sag.* G. 168.

Ileus, S. G. 252. V. 162. *Sag.* G. 187.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

Species idiopathicae sunt,

I. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis muscularum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7.

Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus physodes, S. sp. 9.

Colica biliosa, S. sp. 5 *. Edin. Med. Ess. III. 27

Colica pituitosa, S. sp. 2 †.

Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.

Ileus Indicus, S. sp. 8.

Variat symptomatis superadditis; hinc,

* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, *colicam* quam, ex vomitu bilis solo, *bilosam* appellarunt medici, omnino *spasmodicam* esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasio obstruente fieri videtur; ideoque tum *colicam pituitosam*, tum *ileum*, a *colo pituita infarcto*, hic apposui.

a. Colica cum vomitu steroris, vel rerum per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3 *. Lond. Med. Obs. IV.

17. Edinb. Phys. Eff. II. 27. 28.

Ileus volvulus, S. sp. 7.

b. Colica cum inflammatione superveniente.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, S. sp. 6.

2. Colica (*pictorum*) praeeunte ponderis vel molestiae in abdomen, praecipue

* *Ileus* gradu tantum, nequaquam natura, a *colica* differre mihi videtur; ideoque *ileum* pro varietate *colicae* tantum hic recensui. Multi quidem medici *ileum* omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu steroris sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflamatio aliquando adsit, si eadem *colicae* supervenerit, *colicam phlogistica* dari recte monuit SAUVAGESIUS; nec ideo epigenomeno genus mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflamatio, morbum pro *enteritide* habere vellem. Denique, quovis modo dari *ileum* genus a *colica* diversum concedere non possum.

circa umbilicum, sensu ; accidente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto ; tandem graviore et fere perpetuo ; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralyssim demum abeunte.

Rachialgia pictorum, S. sp. 1. *

Colica pictorum *Citesii* et succedentium *Auctorum.*

Med. Trans. I. 12. 13. 14. 15. 20. Edinb.

Phyf. Eff. I. 22. *Chalmers's Carolina*, p. 187.

Colica nervosa, *Macb.* p. 524.

Variat ratione causae remotae; et hinc

a. A veneno metallico.

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

* *Rachialgiam a colica genere diversam esse nequam video.* Symptomata enim *colicae* essentialia in utroque morbo semper adsunt ; et si forte alteri quae-dam superaddita sint, haec speciem non genus diver-sum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam *rachialgiam* appellarunt **ASTRUCIUS** et **SAUVAGESIUS**, pro specie *colicae* habui ac recensui.

Colica pictonum *Tronchin.* Sp. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. *Tronchin.* sp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustia, *Tronchin.* sp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvitardae, post diuturnam alvi obftipationem.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a faecibus induratis, S. sp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. sp. 18.

Colica Japonica, S. sp. 10.

Colica lactentium, S. sp. 20.

Ileus a veneno, S. sp. 14.

Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, S. sp. 2.

5. Colica (*meconialis*) neophytorum a meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinorum parte stricturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

Ileus a callosa coli stricatura, S. sp. 11. Edin. Med.

Eff. IV. 31.

7. Colica (*calculosa*) cum duricie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15. Edinb. Med. Eff. I. 32.

Edinb. Phys. Eff. II. 26.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

Colicae symptomaticae sunt,

Colica febricosa, S. sp. 21.

Rachialgia febricosa, S. sp. 2. *Tronchin.* sp. 1.

Colica hysterica, S. sp. 17.

Colica gravidarum, S. sp. 16.

Colica verminosa, S. sp. 4.

Ileus verminosus, S. sp. 13.

Colica Lapponica, S. sp. 9.

Rachialgia arthritica, S. sp. 4. *Tronchin.* sp.

Rachialgia scorbutica, S. sp. 6.

Ileus herniosus, S. sp. 6.

Colica enterocelica, S. sp. 22.

Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4.

Colica schirrosa, S. sp. 12.

Colica pancreatica, S. sp. 13.

Colica mesenterica, S. sp. 11.

Rachialgia ab osteofarcosi, S. sp. 8.

Colica plethorica, S. sp. 8.

a. Haemorrhoidalis.

b. Catamenialis.

Colica pulsatilis, S. sp. 14.

Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

G. LX. C H O L E R A.

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul
dejectio frequens; anxietas; tormina;
furarum spasmoda.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Sag. G. 188.

Hoffm. II. 165.

Diarrhoea cholerica, Junck. 112.

Species idiopathicae sunt,

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida,
fine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. sect. IV. cap.

2. Cleghorn's Diseases of Minorca.

Cholera Indica, S. sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acribus
ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholerae symptomaticae sunt,

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

G. LXI. DIARRHŒA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 253. L. 187. V. 105. Sag. G.

189. Junck. 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109. Sag. G.

199.

Lienteria, S. G. 256. L. 188. V. 108. Sag. G.

191.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhœa, V. 112.

Lamb̄sma ventris fluxus multiplex. Amst. 1756.

Species idiopathicae sunt,

VOL. II.

H h

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercore naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliofa*) qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria catharticis, S. sp. 12.

Pituitaria, V. 111.

Leucorrhoid, V. 112.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea serosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus
specie chyli dejicitur.

Coeliaca chyllosa, S. sp. 1.

Coeliaca lactea, S. sp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingesta pa-
rum mutata celeriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies
seroso-cruenta, sine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.

Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.

Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21.

- Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.
 Diarrhoea choleriodes, S. sp. 17.
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.
 Coeliaca purulenta, S. sp. 2.
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.
 Lienteria scorbutica, S. sp. 31.
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 1.
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 15.
 Diarrhoea chilensis, S. sp. 12.
 Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

G. LXII. DIABETES.

Urinae plerumque praeternaturalis, copia
immunda, profusio chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. Sag. G.
 199. Junck. 99. Dobson, Lond. Med. Observa-
 tions, Vol. V. Art. 27. Home's Clinical Experi-
 ments, sect. xvi.

Dieuresis, V. 114.

Species idiopathicae sunt,

I. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris,
coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead on poisons.*

Essay 1. *Eiusdem Monita Med. Cap. IX. sect.*

2. Lond. Med. Obs. III. 26. *Dobson, in Lond.*

Med. Obs. Vol. V. Art. 27. Myers, Diff.
inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. *Sydenh. Epist. resp.*
*ad R. Brady *.*

* Quaeri potest, an diabetes febricosus SYDENHAMI ad diabetem mellitum, an ad insipidum referri debeat? Et simul quaeri potest, an urina in diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipida, cum SYDENHAMUS ipse nullibi de sapore urinae, in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad posteriorius respondere possum, quod, ex propria observatione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico nequaquam dulcem, et fere prorsus insipidam, esse, et diabetem febricosum SYDENHAMI ad diabetem mellitum ideo retuli; quod in simili senis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

II. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpi-
da non dulci *.

M. Lister Exerc. medicin. II. de Diabete.

* An hujusmodi diabetis species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, siisque non paucis, quae viderat WILLISIUS, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperae frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabetis idiopathicae et permanentis species revera detur. Affirmat autem LISTERUS; et ego ipse inter plures mellitas unicam insipidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes ARETAEI et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante WILLIUM quidem, vel prioris aevi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus WILLISII primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante WILLIUM de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectae, imputarem. Quod observatores, quibus diabetis exempla antea occurrabant, vel negligentes vel malaे fidei

Diabetes legitimus, S. sp. 1. *Aretaeus de Morb. diuturn. L. II. cap. 2.*

Diabetes ex vino, S. sp. 5. *Ephem. Germ. D. I. A. II. Obs. 122.*

Symptomaticæ sunt,

Diabetes hystericus, S. sp. 3. *Sydenh. diff. epist. ad G. Cole.*

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. *Sydenh. de podagra.*

Diabetes artificialis, S. sp. 4. *Malpigh. de liene.*

G. LXIII. H Y S T E R I A.

Ventriss murmura; sensus globi in abdome se volventis, ad ventriculum et fidei fuissent suspicor; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabeticis per renes transeunte prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinæ nihil monuisse, mirum videtur; sed, cum scripta WILLISII, SYDENHAMO fatis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

fauces ascendentis, ibique strangulantis ;
sopor ; convulsiones ; urinae limpidae.
copia profusa ; animus, nec sponte, va-
rius et mutabilis *.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219. Sag. G.
242.

Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck. 36.
Affection hysteria, Willis de morb. convulsiv. cap.
5. 10. 11. Sydenh. diff. epist. ad G. Cole. Whytt
on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathi-
ca, dicere non possum, nec, ut opinor,

* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina
facienda quadam tenus exercitatus, quam difficile sit
inter dyspepsiam, hypochondriacum, et hysteriam
semper accurate distinguere. Genera autem vera, et
satis a se invicem distincta, indicasse mihi video :
Recte autem, an secus, fecerim, aliis dijudicandum
relinquo. Morbos affines facile inter se misceri
probe novi ; et, in quocunque casu, quisnam eorum
pro primario sit habendus, per characteres nosologi-
cos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Poste-
ri, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

recte dixit SAUVGESIUS. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

A. Ab emanfione mensium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. *Raulin. cap. 13.*

B. A menorrhagia cruenta.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3. *Raulin. Sydenham,*
Diff. epist. ad G. Cole.

C. A menorrhagia serosa, sive fluore albo.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. *Raulin, cap. 14.*

D. A viscerum obstruktione.

Hysteria emphraetica, S. sp. 5. *Raulin, cap. 5.*

E. A vitio stomachi.

Hysteria stomachica, S. sp. 7. *Raulin. cap. 4.*

F. A salacitate nimia.

-iv Hysteria libidinosa, S. sp. 6 *.

Manifesto symptomatice sunt,

Hysteria verminosa, S. sp. 1. *Delii Amoenit. Academ.*

Hysteria febricosa. S. sp. 8. *Wedel. in Ephem. German. D. I. A. II. Obs. 193.*

G. LXIV. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem

* In speciebus hysteriae recensendis, egregius SAUVAGESIUS RAULINUM, theoriae subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysteriae species indicasse videtur SAUVAGESIUS, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, censeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viventes, sanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

pharyngis dolentem crientis, fastidium et horror; plerumque ex mortu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Sag. G.* 343. *Boerh.* 1138. *Junck.* 124. *Mead* on poisons. *Desault* sur la rage. *Sauvages* diff. sur la rage. *James* on canine madness. *Dalby*, Virtues of cinnabar and musk against the bite of a mad dog. *Nugent* on the hydrophobia. *Choisel*, Nouvelle methode pour le traitement de la rage. *Journal de Medecine*, passim. *Lond. Med. Obs. and Inquir.* Vol. III. Art. 34. Vol. V. Art. 19. 26. and App. *Lond. Med. Transf.* Vol. II. Art. 5. 12. and 15. *Edinb. Med. Eff.* V. Art. 51. *Heysham*, Diff. Inaug. de rab. canin. *Edinb.* 1777. *Parry*, Diff. inaug. de rab. contagiose canin. *Edinb.* 1778. *Soc. Royale* I. Mem. p. 105. 146. *Andry*, Recherches sur la rage, 1780. *Soc. Royale* II. Hist. p. 229. 230. 456. III. Hist. p. 167. *Vaughan*, Cases of hydrophobia, second edit. 1778.

Species sunt,

I. Hydrophobia (*rabiosa*) cum morden-

di cupiditate ex morsu animalis rabi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

II. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. Edinb. Med. Eff. I. 29.

O. IV. VESANIAE*.

* *Vesaniarum* ordinem hic instituere velim, quae cum classe *VOGELII* nona, *Paranoiae* inscripta, eadem omnino sit; sed a classe *Vesaniarum SAUVAGESII* et *SAGARI* in eo diversa, quod horum auctorum ordines *Hallucinationum* et *Morositatum* prorsus excludat; itidemque a classe *Mentalium* apud *LINNÆUM* diversa, quod hujus auctoris ordines *Imaginiorum* et *Patheticorum* etiam omittat.

A classe *Vesaniarum* autem tum *Hallucinationes* tum *Morositates* exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum *Vesaniis* stricte dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrignum vel Bulimiam, vel aliam *Hallucinationem* sine *Morositatem*, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adsunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes *SAUVAGESII* et imaginarios *LINNÆI* ad morbos

Mentis * judicantis functiones laesae sine pyrexia vel comate.

Paranoiae, V. Cl. IX.

Deliria, S. Cl. VIII. O. III. *Sag.* Cl. XI. O. III.

Ideales, L. Cl. V. O. I.

G. LXV. A M E N T I A.

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscuntur.

Amentia, S. G. 233. V. 337. *Sag.* G. 346.

Morofis, L. 106.

morbos locales olim detuli; et nunc morositates **SAVAGESII** et patheticos **LINNAEI**, antea a nobis omnino omisso, ad locales etiam deferendos esse censui.

* In priore Nosologiae nostrae editione, has functiones simpliciter mentis esse dixi, minus autem recte; nam perceptio falsa sive *hallucinatio*, et appetitus erroneus sive *morofitas*, quodammodo ad mentis functiones pertinent; cum vero utrasque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunc mutare, et mentis judicantis functiones dicere.

Stupiditas, morofis, fatuitas, V. 336.

Amnesia *, S. G. 237. Sag. G. 347.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Memoriae debilitas, Junck. 120.

Species sunt,

I. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morofis, S. sp. 8.

Amentia microcephala, S. sp. 6.

II. Amentia *senilis* ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, immunitis.

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

III. Amentia *acquisita* a causis externis,

* Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriantur, et amnesia ingravescens ad amentiam semper ducat.

evidentibus in hominibus sanae mentis
superveniens.

Amnesia febrifera, S. sp. 8.

Amentia a quartana, S. sp. 11.

Amnesia cephalalgica, S. sp. 6.

Amnesia plethorica, S. sp. 4.

Amentia rachialgica, S. sp. 10.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amnesia a pathemate, S. sp. 5.

Amentia a venenis, S. sp. 3.

Amentia a temulentia, S. sp. 7.

Amentia ab ictu, S. sp. 9.

Amnesia traumatica, S. sp. 3.

Sequentes SAUVAGESII species in Noso-
logia methodica nequaquam recensi-
debent, cum causae internae a quibus
characteres desumuntur, per signa ex-
terna nequaquam dignosci possint.

Amentia serosa, S. sp. 2.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia a hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a siccitate, S. sp. 7.

Amentia calculosa, S. sp. 12.

G. LXVI. MELANCHOLIA.

Insania * partialis sine dyspepsia †.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. Sag.

G. 347. Boerh. 1089. Junck. 121.

Daemonomania, S. G. 236. Sag. 348.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, Hoffm. III. 251.

* Insaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem existentur.

† Hypochondriasis et melancholia non semper distingui possunt. Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.

Erotomania, L. 82.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338. Junck.

125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia,

P. I.

Variat pro varietate rerum de quibus homo delirat. Ita est

1. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levibus caufis periculoſo; vel de statu rerum suarum tristi metuendo.

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

2. Cum hallucinatione de statu rerum suarum jucundo.

Melancholia moria, S. sp. 5.

Melancholia enthusiastica, S. sp. 13.

Melancholia saltans, S. sp. 8.

3. Cum amore vehementi sine satyriasi vel nymphomania.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Erotomania, L. 82.

4. Cum superstitione futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

5. Cum aversatione motus et omnium vitae officiorum.

Melancholia atonita, S. sp. 6.

6. Cum inquietudine et status cuiusvis impatientia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

7. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglicā *, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

6. Cum hallucinatione de sua speciei natura.

* Apud Anglos fortassis taedium vitae non semper a morbo pendet.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia scytharum, S. sp. 10.

DÆMONOMANIAM nullam veram esse censeo*, et nostra sententia species sub hoc titulo a SAUVAGESIO recensitae sunt, vel,

i. Species melancholiae sive maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. sp. 5.

Daemonomania Indica, S. sp. 7.

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemonum potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. sp. 4.

Daemonomania Polonica, S. sp. 8.

Daemonomania a cardiogmo, S. sp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania sagarum, S. sp. 1.

* Ita censeo, quia daemonum in nostra corpora, vel hisce temporibus in mentes nostras, potentiam ullam esse pauci jam credunt.

Daemonomania vampirismus, S. sp. 2.

Daemonomania simulata, S. sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2.
partim simulati, ut 3tio, recensiti, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

G. LXVII. M A N I A.

Infania universalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. Sag. G. 349.

Boerb. 1118. *Junek,* 122. *Battie* on madnes.

Paraphrofyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

I. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate
mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud *Preysingerum* de diagnosi morborum capit. ex terrore, apud *Löcherum* de mania; ex amore apud *Ephem. Nat. Cur. Dec.* II. A. X. Obs. 126.; ex ira apud *Hoffman.* III. p. 263.

2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

a ulcere fuccato *Amat. Lusitan. Cent. II. cur. 67.*

a resecta plica, *Hoffm. tom. III. p. 263. Ephem.*

N. Cur. Cent. I. Obs. 35.

a represso herpete, *Locher de mania.*

a menstruis retentis *Schenck. Obs. p. 142.*

a femine retento, *Schenck. ibid.*

a represso scabie, *Lorry de melancholia, tom. II.*

P. II. cap. 3.

a graviditate, *Lorry, P. I. cap. 7.*

a parciore lactis et lochiorum fluxu, *Puzos, 3.*

Mem.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

3. Mania (*obscura*) praegresso nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.

Mania periodica, S. sp. 6.

Maniae species symptomaticae sunt,

PARAPHROSYNE, S. G. 232. Sag. G. 345.

1. Paraphrofyne a venenis,

Paraphrofyne temulenta, S. sp. 1.

Paraphrofyne a datura, S. sp. 2.

Paraphrofyne ab opio, S. sp. 3.

Paraphrofyne a conio, S. sp. 4.

Paraphrofyne magica, S. sp. 5.

2. Paraphrofyne a pathemate, S. sp. 7.

Paraphrofyne hysterica, S. sp. 12.

3. Paraphrofyne febrilis.

Delirium, L. 65. V. 330.

Paraphrofyne febricosa, S. sp. 10.

Paraphrofyne critica, S. sp. 11.

Paraphrofyne calentura, S. sp. 9.

Paraphrofyne puerperarum, S. sp. 8.

G. LXVIII. ONEIRODYNTIA.

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. G. 221. L. 77. Sag. G. 333.

Hypnobatasis, V. 340.

Noctambulatio, Junck. 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163. Sag. 245.

Incubus, V. 211. Junck. 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulismus catalepticus, S. sp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1.

Ephialtes stomachica, S. sp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. sp. 6.

Ephialtes tertianaria, S. sp. 5.

Ephialtes verminosa, S. sp. 4.

Ephialtes ex hydrocephalo *, S. sp. 3.

* Cum hydrocephalus per signa extēra nō semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcunque referri possit.

CL. III. CACHEXIAE.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII. Sag. Cl. III.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I. Sag. Cl. III. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXIX. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309. Sag. G. 100.

Species sunt,

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica,

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Variat sede; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

Tabes a stomacho, S. sp. 14.

Tabes a pericardio, S. sp. 7.

Tabes catarrhalis*, S. sp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10.

Tabes mesenterica, S. sp. 9.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cum pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

Atrophia infantilis, S. sp. 13.

Atrophia rachitica, S. sp. 8.

Tabes rachialgica, S. sp. 16.

3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia febrisequa, S. sp. 16. ad tabem
purulentam, vel ad genus atrophiae,
pertinet.

G. LXX. ATROPHIA.

Marcor et asthenia, sine pyrexia * hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. Sag. G.
102. Junck. 41.

Marasmus, L. 211.

Species sunt,

* Atrophia fortassis nunquam sine pyrexia, saltem
sine pulsu solito frequentiori, adest; sed absentia py-
rexiae hecticae, (pag. 80.) fere semper atrophiam a
tabe distinguit.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione
nimia.

Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.

Atrophia a vomitu, S. sp. 9.

Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.

Tabes nutricum, S. sp. 4.

Atrophia nutricum, S. sp. 5.

Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

Tabes dorsalis *, S. sp. 1.

Tabes sudatoria, S. sp. 6.

Tabes a sanguifluxu, S. sp. 2.

Sanguinis inopia III. Lieutaud. synops. univ.
med. vol. I. pag. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento
deficiente.

Atrophia lactentium, S. sp. 3.

* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam
debilium, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi vide-
tur, et ad posteriorem referre mallem. *sed si ex hoc*

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, 12.

Tabes syphilitica, S. sp. 11.

Tabes a hydrope, S. sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1.

Atrophia lateralis, S. sp. 15.

Atrophia senilis, S. sp. 11.

etnamur s. (concepere) siqna
compositio

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum
tumens.

Intumescentiae, S. Cl. X. O. II. *Sag.* Cl. III. O. II.
Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXXI. *POLYSARCIA.*

Corporis pinguedinosa intumescentia mo-
lesta.

Polysarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540. *Sag.* G.
106.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polysarcia adiposa, S. sp. 1. Lond. Med. Obs. III.
9. V. 21. 22. Med. Transf. II. 18.

Sect. II. FLATUOSÆ.

G. LXXII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumescentia tensa, elasta, sub
manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391. Sag. G. 107.

Emphysema, S. G. 13. L. 288. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Combalusier de flatulentis corporis humani affec-
tibus.

Species sunt,

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa ma-
nifesta.

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot. Lond. Med.

Obs. VI. 19.

2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere
thoracis.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Lond. Med. Obs.

II. 2. III. 4. 35. 36. *Cheston*, chap. 1.

Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.

3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1:

4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3:

G. LXXIII. T Y M P A N I T E S.

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. Sag.
G. 118. Boerh. 226. Junck. 87.

Affectio tympanitica, Hoffm. III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inequali, et cum refectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.

Tympanites intestinalis, S. sp. 1. Edinb. Med. Eff.

I. 31.

Tympanites enterophysodes, S. sp. 3.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus abdominalis, S. sp. 2.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

2. Tympanites *abdominalis* cum resonitu
evidentiore, tumore magis aequabili, et
emissione flatuum rariori et minus le-
vante.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

Ascites flatulento-peritoneus, S. sp. 28.

Tympanites Stewartii, S. sp. 6.

G. LXXIV. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio fi-
datur et sedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290. Sag. G. 117.

Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

Physometra sicca, S. sp. 1.

Tympanites uteri sicca, *Astruc*, sur les malad.
des femmes, L. II. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc*, loc. cit.

Sect. III. AQUOSÆ SIVE HYDROPSÆ.

G. LXXV. ANASARCA.

Corporis totius vel partis ejus intumescen-
tia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Sag. G.*
108. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.
Monro on the dropsy, 1765. *Milman*, Animad-
versiones de hydrope, 1779.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerb.* 791.

Species sunt,

i. *Anasarca (serosa)* a retento fero ob e-
vacuationes solitas suppressas, vel ab
aucto fero ob ingestam aquam nimiam.

Anasarca metastatica, S. sp. 1.

a. *Anasarca periodica*.

b. Anasarca ab adiapneustia.

Phlegmatia lactea, S. sp. 3.

Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.

Anasarca urinosa, S. sp. 11.

Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.

2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5.

Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.

Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.

Angina Loweriana, S. sp. 2.

Angina oedematoso, Boerb. 791.

3. Anasarca (*exanthematica*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3.

Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.

Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.

Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.

Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

4. Anasarca (*anaemia*) a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.

Anasarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anasarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis caufis.

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anasarca a febribus, S. sp. 4.

Anasarca hysterica, S. sp. 2.

Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.

Anasarca rachialgica, S. sp. 8.

Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

Anasarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anasarcam referri potest.

G LXXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescientia mollis, inelastică, hi-
antibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. Boerh. 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2 *. Lond. Med.

Obs. V. 13. Med. Trans. II. 18. Edinb. Med.

Eff. III. 22.

G. LXXVII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis,
exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagni de sed. XII.*

9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXVIII. HYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata;
urina parca; decubitus difficilis; subita
et spontanea ex somno cum palpitatione
excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. *Boerb. 1219.*

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum,
ad Apoplexiā, sub nomine Apoplexia hydrocepha-
licae, jam supra reūli.

Hydrothorax febrifugens, S. sp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque sedes, per signa externa dignosci queat.

Hydrothorax chylosus, S. sp. 1. *Willis*, Pharm. rat. P. I. sect. 1. Cap. 13.

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. 5. *Morg.* de sed. XVI. 33.

Hydrothorax mediastini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. p. 337. *Bergeron*, diff. de hydrope pectoris.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morg.* de sed. XVI. 34. 35. *Senac de coeur*, tom. II. p. 349. *Edinb. Med. Eff.* V. 56. 58. 59.

Minus recte a SAUVAGESIO hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

G. LXXIX. A S C I T E S.

Abdominis intumescientia tensa, vix elastica, sed fluctuosa.

Ascites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Sag.* G. 115.
Boerb. 1226. *Hoffm.* III. p. 322. *Junck.* 87.
D. Monro on the dropfy, 1765. *Med. Transf.*
 II. 17. *Milman*, Animadversiones de hydrope,
 1779.

Species sunt,

I. Ascites (*abdominalis*) cum tumore totius abdominis aequali, et cum fluctuatione satis evidente.

Ascites vulgatior, S. sp. 1.

Variat ratione causae.

A. Ab oppilatione viscerum.

Ascites ab oppilatione, S. sp. 2.

Ascites ab hepate, S. sp. 3.

Ascites a liene, S. sp. 4.

Ascites scrophulosus, S. sp. 5.

Ascites artificialis, S. sp. 10.

B. A debilitate.

Ascites ab exanthematis, S. sp. 8.

Ascites arthriticus, S. sp. 9.

Ascites febrilis, S. sp. 12.

Ascites ex quartana, *Werthof.*

Ascites scorbuticus, S. sp. 13.

C. A tenuitate sanguinis.

Ascites a sanguifluxibus, S. sp. 7.

Variat etiam ratione liquidi effusi.

Ascites purulentus, S. sp. 21 *.

Ascites urinofus, S. sp. 22.

Ascites chylosus, S. sp. 23.

Ascites oleofus, S. sp. 24.

2. Ascites (*saccatus*) cum tumore abdominis, saltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.

Ascites ab ovariis, S. sp. 6.

Ascites ovarii, S. sp. 19.

a. Ascites saccatus.

Hydrometra ovarii, S. sp. 6.

Ascites cruentus, S. sp. 20. Edinb. Med. Eff. V.

63.

* De hisce et pluribus aliis ascitis speciebus recentitis idem notandum est, ac in pag. 279.

Ascites stomachi, S. sp. 16.

Ascites omentalis, S. sp. 18.

Ascites intercus, S. sp. 14.

Ascites sanguineo-intercus, S. sp. 26.

Ascites sanguineo-peritonaeus, S. sp. 27.

Ascites purulento-peritonaeus, S. sp. 29.

G. LXXX. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescentis tumor, uteri figuram referens, pressu cedens fluctuantve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. Sag. G. 116. Boerh.

1224.

Species per externa signa distinguendae vix dari possunt; sed sequentes ex SAUVAGEO recensentur.

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

- Hydrometra hydatica, S. sp. 4.
Ascites uterinus, S. sp. 15.
Hydrometra sanguinea, S. sp. 3.
Ascites sanguineo-uterinus, S. sp. 25.
Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

G. LXXXI. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescentes, mollis, fluctuans, pellucidus.

- Oschocele, S. G. 41. V. 388.
Oscheophyma, Sag. G. 44.
Hydrops scroti, V. 389.
Hydrops testium, Boerb. 1227.

Species sunt,

- Oschocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb. Med. Eff.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's Operations and critical inquiry.* *Douglas* on the hydrocele. *Pott's remarks on the hydrocele.* *Le Dran, Operations de Chirurgie.* *Bertrandi* in *Mem. de l'Acad. de chirurgie*, Vol. III.
Oschocele hydatidosa, S. sp. 3.
Oschocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer, Amoen. exot. fasc.* III. obs. 7.

Sect. IV. SOLIDÆ.

G. LXXXII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325. Sag. G. 110,
Hypofarca, L. 218.

Species sunt*,

Physconia hepatica, S. sp. I.

Cl. *Cuffon*. Bonet. Sepulchr. de graviditate falsa, obf. 3. n. 8. 9. 10. Verduc Patholog. du rachitis.

a. *Schirrhodea*. G. Segeri M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obf. 142.

* Species sequentes nequaquam ad normam Nomenclature methodicae recensentur, sed accuratius physconiae species indicare difficile foret, saltem plus exegisset, quam quo nunc fruor otii. Interim *Cuffoni* doctissimi opus summae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

- b. *Calculosa Bonet.* Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.
- c. *Hydatidosa Winckeri* Disp. de hydatidibus apud Bonet. Med. Septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

- a. *Emphractica Haller.* Disp. pathol. T. IV. Disp. 109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.
- b. *Schirrhodea Bonet.* Sepulchr. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3.

- Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.
- a. *Calculosa Plater.* Obs. L. II. p. 449. *River,* cent. IV. obs. 34.
 - b. *Sarcomatico-cystica Haller.* Disp. pathol. Disp. 114.

Physconia uterina, S. sp. 4.

- Bonet.* Sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.

Physconia ab ovario, S. sp. 5.

Monro, Edinb. Med. Ess. tom. VI. Art. 74. obs. 1.

Physconia mesenterica, S. sp. 6.

- a. *Hydatidosa* *Greg. Horstii*, Lib. 5. obs. 33.
Tulp. obs. Lib. II. c. 34.
- b. *Strumosa* *Bonet.* ex *Rudnicio de ventr. tumore*, obs. X. n. 15. *Ambr. Pare*, L. VII.
- c. 21. *Scultet.* *Armam. chirurg.* obs. 38.
- c. *Schirrodea* *Marc. Donat.* *Hist. med. mir.* lib. VII. c. 15. *Claudin.* consult. Sect. II. consult. 134. *Trincavell*, lib. III. conf. 22. *Riolan.* *Anthropogr.* lib. II. c. 26. *Morgagni de sedib.* ep. 39. n. 2.
- d. *Sarcomatica* *Bonet.* *Sepulchr.* de falsa gravid. obs. 3. n. 1.
- e. *Steatomatosa*, *Barth. Cabrol.* Obs. 33. et 35.
Tulp. Obs. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechelii* apud *Bonet.* *Med. sept.* T. II. p. 486. *Idem Collect. acad.* tom. III. p. 585. *Hierne Collect. Acad.* tom. III. p. 226. Obs. 166.
- f. *Fungosa*, *Bonet.* *Sepulchr.* de gravid. falsa, obs. 3.

Physconia intestinalis, S. sp. 7.

- a. *Concreto-gloemerata*, *Morgagni*. de sedib. epist.
39. n. 21. 25.
- b. *Sarcomatica*, *Fontan.* Obs. med. selectiores,
obs. 11.

Physconia omentalalis, S. sp. 8.

Frid. Reebman Diff. de omento.

Physconia polysplachna, S. sp. 9.

- a. *Schirrhodea*, *Fabr. Hildani* cent. II. obs. 45.
- b. *Schirrhodea et sarcomatica*, *Huldenreich*, Misc.
Nat. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.
- c. *Schirrhodea et adiposa*, *T. Bartholin.* cent. III.
obs. 6.
- d. *Hydatidosa*, *Volch. Coiter.* Obs. anat. p. 117.
Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem,
Hippocr. de muliebr.
- e. *Hydatidosa et schirrhodea*, *Halleri* Disp. pathol.
Tom. V. p. 256.

Physconia visceralis, S. sp. 10.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. *Megalosplachnos Hippocrat. Marc. Donat.* Hist. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de lie-ne, Lib. III. Obs. 9. *Salmuth.* cent. I. obs. 21. *Bonet.* Med. sept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hist. hepat. T. I. p. 130.

Physconia externa lupialis, S. sp. 11.

Graham Transf. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Physconia externa scirrhodea, S. sp. 12.

Ger. Blas. Obs. med. VI.

Physconia externa hydatidosa, S. sp. 13.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. § 2. 3. 4. 11. &c. *Achotzii* apud Schenckium, Lib. III. de hydrope, obs. 4. et apud Scholtzium conf. 339. *Solenandri* conf. 15. Sect. V. *Riverii* Obs. communicat. ultim.

Physconia ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.

- a. *Simplex*, Cl. Lieutaud. Comp. med. J. Mich.
Febr. apud Bonet. Med. sept. T. I. p. 636.
b. *Syphilitica*, observante celeb. Fizes.

Physconia ab excrescentia, S. sp. 15.

G. LXXXIII. R A C H I T I S.

Caput magnum anterius maxime tumens ;
genicula tumida ; costae depresso-
dome tumidum ; caetera marcescen-
tia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. Sag. G.
120. Bœr h. 1480. Hoffm. III. 487. Zeviani
della rachitide.

Variat,

I. Simplex fine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

VOL. II. O o

Rachitis Britannica *, S. sp. 2. *Glossa de rachite.*

2. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6,

Neque rachitis *calmucana*, S. sp. 4. neque
rachitis *a castratione*, S. sp. 7. pro mor-
bo haberri potest.

* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur ra-
chitis *nodosa* et *Britannica*, cum non differant aliter
quam morbus incipiens et confirmatus.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V. Sag. Cl. III. O. V.

G. LXXXIV. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367. Sag. G. 121.

Struma, L. 284.

Species sunt,

i. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

Scrophula vulgaris, S. sp. i.

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum insolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*) simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. Scrophula (*Americana*) cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque scrophula *periodica*, S. sp. 6. neque scrophula *Moluccana*, S. sp. 8. ad genus scrophulae pertinere mihi videatur.

G. LXXXV. S Y P H I L I S.

Morbus contagiosus, post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeentes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319. Sag. G. 126.

Lues venerea, Boerb. 1440. Hoffm. III. 413. Junck.

96. Afruc de lue venerea

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis *Polonica*, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de Syphilide *Indica*, S. sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

G. LXXXVI. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectionem, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomachace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. Sag. G. 127. Boerb. 1148. Hoffm. III. 369. Junck. 91. Lind on the scurvy. Hulme de scorbuto. Rouppe de morbis navigantium, Med. Transf. II. 18. 21. Milman on the Scurvy. Ferris de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine, Ed. 1784.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d. Scorbutus lividus, Nitzsch, Theoret. pract. ab Handl. des Scharbockes, &c.

e. *Scorbutus petechialis*, *Nitzsch*, ibid.

f. *Scorbutus pallidus*, *Nitzsch*, ibid.

g. *Scorbutus ruber*, *Nitzsch*, ibid.

h. *Scorbutus calidus*, *Nitzsch*, ibid.

G. LXXXVII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321 *Sag. G.* 128.

Elephantia Arabum, V. 322.

Varietates sunt,

Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. *Lond. Med. Obs.*

Vol. I. Art. 19. *Soc. Royale I. mem.* p. 161.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.

Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.

Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

Fungi, mori, vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

*Elephantiasis Indica, S. sp. 9. **

G. LXXXVIII. L E P R A.

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pru-
riginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262. Sag. G. 129.

Lepra Graecorum, V. 320.

Varietates sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturienfis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

LXXXIX. F R A M B O E S I A.

* De Elephantiasi, Lepra, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

Framboesia, S. G. 229. Sag. G. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. Edinb. Essays,
Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. XC. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores,
in cirrhos et funiculos inextricabiles
implicati.

Trichoma, S. G. 311. Sag. G. 137.

Plica, L. 313.

Plica sive Rhopalofis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. XCI. ICTERUS.

Flavedo cutis et oculorum; faeces albidae;
urina obscure rubra, immissa colore lu-
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. Boerh. 918. Junck. 90.

Aurigo, S. G. 306. Sag. G. 132.

Cachexia icterica, Hoffm. III. 301.

Species idiopathicae sunt,

1. Icterus (*calculosus*) cum dolore in regi-
one epigastrica acuto, post pastum au-
to, et cum dejectione concretionum bi-
liosarum.

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Med. Et. I.
33. II. 28. 29. Med. Trans. II. 10.

2. Icterus (*spasmodicus*) sine dolore, post
morbos spasmodicos et pathemata men-
tis.

Aurigo hysterica, S. sp. 13.
Species quaedam, quae a SAUVAGESIO sub titulo
Auriginis a venenis, recensentur.

3. Icterus (*hepaticus*) sine dolore, post
morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. sp. 11.

Aurigo ab obstructione, S. sp. 6.

Aurigo purulenta, S. sp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) sub graviditate
oriens, et post partum abiens. *Van Swiet.*
ad *Boerh.* Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. sp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud
diu post natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. sp. 12.

Icteri sequentes, siquidem recte icteri di-
cantur *, symptomaticae sunt,

Aurigo febrilis, S. sp. 1.

* Flavedo cutis oriri potest, vel a bile non, ut folet,
excreta, sed in vasa sanguifera excepta, et inde subter
cuticulam.

- Aurigo febriſa, S. sp. 8.
Aurigo accidentalis, S. sp. 2.
Aurigo typhodes, S. sp. 10.
Aurigo rachialgica, S. sp. 14.
Aurigo a venenis, S. sp. 4.

Aurigo Indica, S. sp. 3. five quarundam
gentium color naturalis, nequaquam
pro morbo haberri potest.

cuticulam effusa; vel a fero sanguinis saepe flaveſcente, subter cuticulam, ut in ecchymosi, effuso. In quibusdam casibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum caſarum oriatur, apud medicos non semper conſtat; ſed tantum ex prima ieterum genuinum, et ab altera morbum diuersum, quiqe, quantum fieri poſſit, diſtingui debet, oriri cenfemus.

CL. IV. LOCALES*.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia † S. Cl. I. L. Cl. XI. V. Cl. X. Sag. Cl. I.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. Sag. Cl. II.

Morbi organici *Auctorum.*

* Fortassis aliquando ambiguum esse potest, utrum ad universales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerisque vero, utri classi referendi sint, satis obvium erit; et ex institutione hujus *Localium* clasibus, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum nosologorum systematibus, disponi posse contendimus.

† *Vitia* hic dixi, utpote sub hac classe *Localium* comprehensa; morbos vero multo plures comprehendit hic classis, ita ut vox *vitia* pro hujus synonymo nequaquam haberi potest, et idem de *Plagis* *SAGARI* dictum velim.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum
externorum vitio *.

Dysæsthesiae, S. CL. VI. O. I. *Sag.* Cl. IX.
O. I.

Hallucinationes, S. Cl. VIII. O. I. *Sag.* Cl. XIII.

O. I.

Privativi, L. CL. VI. O. III.

G. XCII CALIGO.

Vifus imminutus, vel prorsus abolitus, ob
repagulum opacum, inter objecta et re-
tinam, oculo ipso vel palpebris inhae-
rens.

Caligo, S. G. 153. V. 288. S. G. 259.

Cataracta, L. 109.

* Vereor ne in sequentibus aliquando species
recensuerim quae charaëteri ordinis non prorsus
respondeant, quasdam, scilicet, dysæsthesias quae
ex organorum externorum vitio non pendeant. Hu-
jusmodi species quidem aliquando recensui; sed
paucae omnino sunt, et feci, quia species affines, et
hic loçi expectandas, separare nolui.

Species sunt,

1. *Caligo (lentis) ob maculam opacam pone pupillam.*

Cataracta *, S. G. 152. L. 109. V. 239. *Sag. G.* 26.

Apud SAUVAGESIUM species sunt, verae vel spuriae :

Verae varietates sunt.

Cataracta vera, S. sp. 1.

Glaucoma Woolhoufii.

Cataracta antiglaucoma, S. sp. 2.

Cataracta glaucoma, S. sp. 3.

Glaucoma Maitre Jan et St Ives.

Spuriae varietates sunt,

Cataracta membranacea, S. sp. 4.

Cataracta secundaria, S. sp. 5.

* Non video quod, cum SAUVAGESIO, *Cataracta* pro diverso a *Caligine* genere haberi possit; et judicent petiti, annon ideo recte *Caliginis* characterem mutaverim, et *cataractam* pro ejus specie posuerim.

2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

Achlys, V. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5.

Caligo a leucomate, S. sp. 6.

Caligo ceratocele, S. sp. 10.

Caligo a staphylomate, S. sp. 11.

Caligo a pterygio, S. sp. 12.

Caligo hyposphagma, S. sp. 13.

3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupilam.

Variat pro varietate caufae.

Caligo ab ectasi, S. sp. 18.

Amaurosis a synchysi, S. sp. 6.

Amaurosis a myosi, S. sp. 7.

Caligo a synizesi, S. sp. 19.

Synizesis, V. 240.

4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defecatum humoris aquei.

Glaucoma, V. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaema, S. sp. 15.

Caligo lactea, S. sp. 16.

Caligo a rhytidosi, S. sp. 17.

Amblyopia hydrophthalma, S. sp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhaerens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum:

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1.

Caligo ab ancyloblepharo, S. sp. 2.

Caligo a blepharoptosi, S. sp. 3.

Caligo a pacheablepharosi, S. sp. 4.

Caligo a lupia, S. sp. 7.

Caligo a farcomate, S. sp. 8.

Caligo a cancro, S. sp. 9.

G. XCIII. A M A U R O S I S.

Vifus imminutus vel prorsus abolitus, sine
vitio oculi evidente; plerumque cum
pupilla dilatata et immobili.

Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238. Sag. G. 261.

Mydriasis, V. 237.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Species sunt,

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis congestionis in cerebro.

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2.

Amaurosis scrophulosa, S. sp. 3.

Amaurosis plethorica, S. sp. 4.

Amaurosis intermittens, S. sp. 13.

Amaurosis exanthematica, S. sp. 11.

Amaurosis venerea, S. sp. 10.

Amaurosis traumatica, S. sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5.

Amaurosis exhaustorum, S. sp. 16.

Amaurosis rachialgica, S. sp. 14.

Amaurosis arthritica, S. sp. 17.

Amblyopia absoluta, S. sp. 6.

3. Amaurosis (*spasmodica*) post causas et
cum signis spasmi.

Amaurosis a spasmo, S. sp. 8.

Amaurosis hysterica, S. sp. 15.

4. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto
vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12.

Amaurosis foricariorum, S. sp. 9.

G. XCIV. D Y S O P I A *.

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce,
vel ad certam distantiam, vel in certa
positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. G. 154. Sag. G. 258.

* Verbum *Amblyopia*, quo pro hujus generis no-
mine utitur SAUVAGESIUS, alio sensu intelligunt
tum veteres, tum LINNÆUS et VOGELIUS; ideo-
que hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

Species sunt,

1. Dysopia (*tenebrarum*) in qua non nisi
in magna luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dysopia (*luminis*) in qua non nisi in
obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dysopia (*dissitorum*) in qua longe di-
stantia non videntur.

Amblyopia dissitorum, S. sp. 3.

Myopia, L. 309.

Myopiasis, V. 515.

4. Dysopia (*proximorum*) in qua proxima
non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, L. 308.

5. Dysopia (*lateralis*) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia luscorum, S. sp. 5.

G. XCV. PSEUDOBLEPSIS.

Visus depravatus, ita ut quae non existant homo se videre imaginatur, vel quae existunt aliter videt ac revera se habeant.

Suffusio, S. G. 217. Sag. G. 329.

Phantasma, L. 73. V. 289.

Species sunt,

i. Pseudoplepsis (*imaginaria*) in qua quae non existunt conspicit videntur.

Variat pro varietate phantasmatis.

a. Suffusio myodes, S. sp. 1.

b. Suffusio reticularis, S. sp. 2.

c. Suffusio scintillans, S. sp. 3.

Marmaryge, V. 290.

d. Suffusio coloris, S. sp. 4.

Haemalopia, V. 239.

2. Pseudoblepsis (*mutans*) in qua objecta re-vera existentia aliquomodo mutata apparent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5.

b. Suffusio nutans, S. sp. 7.

c. Suffusio dimidians objecta, S. sp. 6.

d. Suffusio multiplicans.

Diplopia, S. G. 218. Sag. G. 330.

Dysopia, V. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causae remotae.

α . Diplopia pyrectica, S. varietas 1.

β . Diplopia a spasmo, S. Var. 2.

γ . Diplopia a paralyfi, S. Var. 3.

δ . Diplopia ab ancyloblepharo, S. Var. 4.

ϵ . Diplopia a catarrho, S. Var. 5.

ζ . Diplopia a debilitate, S. Var. 6.

- a. Diplopia a contusione, S. Var. 8.
- b. Diplopia a terrore, S. Var. 9.
- c. Diplopia a temulentia, S. Var. 10.
- d. Diplopia remotorum, S. Var. 7.

G. XCVI. D Y S E C O E A.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 246. Sag. G. 264.

Cophosis, S. G. 160. L. 112. Sag. G. 266.

Surditas, V. 247.

Species sunt,

i. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis sonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectae.

a. Dysecoea monotonon seu malorum, S. sp. 1.

b. Dysecoea a meatu obstructo, S. sp. 2.

Cophosis a meatu, S. sp. 1.

312 GENERA MORBORUM

- c. Dysecoea a myringae atonia, S. sp. 3.
- Cophosis a tympano, S. sp. 4.
- d. Dysecoea a myringae duritie, S. sp. 4.
- e. Dysecoea a myringa perforata, S. sp. 5.
- f. Dysecoea a tympani fistula, S. sp. 6.
- g. Dysecoea a hydrotympano, S. sp. 7.
- h. Dysecoea a tuba obstructa, S. sp. 8.
- Cophosis a tuba, S. sp. 3.
- i. Dysecoea syphilitica.
- Cophosis syphilitica.

2. Dysecoea (*atonica*) sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causae.

- a. Cophosis critica, S. sp. 2.
- Dysecoea febrilis.
- b. Cophosis a comate, S. sp. 7.
- c. Cophosis serosa, S. sp. 6.
- d. Cophosis a steatomate, S. sp. 9.

G. XCVII. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracufis, S. G. 159. *Sag.* G. 265.

Syrigmus, S. G. 219. *Sag.* G. 231.

Species sunt,

i. Paracufis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

a. Cum auditu gravi.

Paracufis barycoea, S. sp. 1.

b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracufis oxycoea, S. sp. 2.

c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracufis duplicata, S. sp. 3.

- d. Soni quos homo audire velit, nisi sono
alio vehementi simul excitato non au-
diuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni ex-
trinsecus non existentes ab internis cau-
sis excitantur.

Syrigmus, S. G. 219. Sag. G. 231.

Syringmos, L. 72.

Susurrus, V. 292.

Variat pro varietate soni percepti.

- a. Syrigmus sibilus, S. sp. 4.
b. Syrigmus susurrus, S. sp. 5.
c. Syrigmus bombus, S. sp. 11.

Variat etiam pro varietate causae remotac.

- d. Syrigmus a debilitate, S. sp. 1.
e. Syrigmus criticus, S. sp. 2.
f. Syrigmus plethoricus, S. sp. 3.
g. Syrigmus vertiginosus, S. sp. 10.

- h. Syrigmus cephalalginus, S. sp. 6.
- i. Syrigmus a ventriculo, S. sp. 7.
- k. Syrigmus catarrhalis, S. sp. 8.
- l. Syrigmus ab oxycoea, S. sp. 9.

G. XCVIII. ANOSMIA.

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248. Sag. 262.

Species sunt,

- 1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membra nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

- Anosmia catarrhalis, S. sp. 1.
- Anosmia a ficeitate, S. sp. 6.
- Anosmia a polypo, S. sp. 3.
- Anosmia ab ozaena, S. sp. 2.
- Anosmia syphilitica, S. sp. 4.
- Anosmia verminosa, S. sp. 5.

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae
narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

G. XCIX. AGHEUSTIA.

Gustus imminentia vel abolitus.

Agheustia, S. G. 157. Sag. G. 263.

Agheustia, L. 114.

Apogeusis, V. 449.

Species sunt,

1. Agheustia (*organica*) ob vitium in mem-
brana linguae, a nervis sapida arcens.

Agheustia febrilis, S. sp. 1.

2. Agheustia (*atonica*) sine vitio linguae
evidente.

Agheustia paralytica, S. sp. 2.

G. C. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel abolitus.

Anæsthesia, S. G. 161. L. 118. Sag. G. 267.

Anodynia, V. 274.

Sequentes species a SAUVAGESIO recensentur, et, cum de iis mihi non satis liqueat, nihil mutare volui.

Anæsthesia a spina bifida, S. sp. 1.

Anæsthesia plethorica, S. sp. 2.

Anæsthesia nascentium, S. sp. 3.

Anæsthesia melancholica, S. sp. 4.

O. II. DYSOREXIÆ*.

Appetitus erroneus vel deficiens.

Sect. I. APPETITUS ERRONEI.

Morositates, S. G. VIII. O. II. *Sag.* Cl. XIII.
O. II.

Pathetici, L. Cl. V. O. II.

Hyperaesthesiae, V. Cl. VII.

G. Cl. BULIMIA.

Appetitus esculentorum majori copia quam
quae digeri possit.

* *Morositates SAUVAGESII* minus recte ad *Vesparianarum* classem referri, supra dixi, et nunc ad locales detuli. Recte, ni fallor, cum dysorexiae fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem revera morbus sit, minime pro locali haberri potest; sed morbum incertum a caeteris dysorexiis separare non bene potui.

Bulimia, S. G. 223. L. 79. Sag. 335.

Bulimus, V. 296.

Addephagia, V. 297.

Cynorexia, V. 298.

Species idiopathicae sunt,

1. Bulimia (*helluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.

Bulimia esurigio, S. sp. 4.

Addephagia, V. 297.

2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.

Bulimia cardialgica, S. sp. 2.

Bulimus, V. 296.

3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.

Bulimia canina, S. sp. 1.

Cynorexia, V. 298.

Species symptomaticae sunt,

- Bulimia verminosa, S. sp. 3.
- Bulimia addephagia, S. sp. 5.
- Bulimia convulorum, S. sp. 6.
- Bulimia ab acidis, S. sp. 7.

G. CII. POLYDIPSIA.

Appetitus majoris solita copiae potulento-
rum.

Polydipsia, S. G. 224. L. 80. V. 275. Sag. G.
336.

Polydipsia fere semper symptomatica est, et
variat tantum pro varietate morborum
quos comitatur; hinc

- Polydipsia febrilis, S. Var. a.
- Polydipsia hydropica, S. Var. b.
- Polydipsia fluxuum, S. Var. c.
- Polydipsia a venenis, S. Var. d.

G. CIII. P I C A.

Desiderium non esculenti ingerendi.

Pica, S. G. 222. *Sag.* G. 334.

Citta, L. 78.

Allotriophagia, V. 299.

Malacia, V. 300.

A 1391 C 1 Y 109

Cum de speciebus *picae* mihi non satis liqueat, sequentes ex SAUVAGESIO recenfeo.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorofiantum, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

Pica abscorbuticorum, S. sp. 4.

Pica voluntaria, S. sp. 5.

G. CIV. S A T Y R I A S I S.

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. G. 228. L. 81. *Sag.* G. 340.

Satyriasis pro specie maniae habet VOGELIUS.

Species sunt,

Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate praeter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, S. sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. *Aretaei Cappad. Acut.*
Lib. II. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et Satyriasis venerea, S. sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, S. sp. 4. manifesto symptomatica est,

G. CV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris desiderium.

Nymphomania, S. G. 229. Sag. G. 341.

Satyriasis, L. 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet VOGELIUS.

Nymphomaniae species unica est, et gradu
tantum varians, hinc

Nymphomania salacitas, S. sp. 1.

Nymphomania furibunda, S. sp. 2.

Nymphomania fervor uteri, S. sp. 3.

Nymphomania pruriginosa, S. sp. 4.

G. C VI. N O S T A L G I A.

In absentibus a patria, vehemens eandem
revisendi desiderium.

Nostalgia, S. G. 226. L. 83. Sag. G. 338.

Nostalgiam pro specie melancholiae habet VOGELIUS.

Species sunt,

1. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostalgia simplex, S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

Sect. II. APPETITUS DEFICIENTES.

Anepithymiae, S. Cl. VI. O. II. *Sag.* IX. O. II.

Privativi, L. Cl. VI. O. III.

Adynamiae, V. Cl. VI.

G. CVII. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. G. 162. L. 116. V. 279. *Sag.* G. 268.

Omnis anorexia mihi symptomatica esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a SAUVAGESIO fuerant recensitae, ad genus dyspepsiae supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

Species sunt,

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculum gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Anorexia biliosa, S. sp. 6.

Anorexia a saburra, S. sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1.

Anorexia exhaustorum, S. sp. 8.

Anorexia melancholica, S. sp. 5.

Anorexia cachectarum, S. sp. 7.

Anorexia arthritica, S. sp. 12.

Anorexia febrilis, S. sp. 4.

Incertae naturae sunt,

Anorexia plethorica, S. sp. 3.

Anorexia mirabilis, S. sp. 10.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.

G. CVIII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio, sive fitis
feriatio.

Adipsia, S. G. 163. L. 117. V. 281. Sag. G. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est

Adipsia primaria, S. sp. 1.

Pro morbo habere nollem; omnemque adipsiam pro sympathica, sive symptomate morbi cuiusdam, sensorium commune afficientis, habeo; ideoque non ad locales referendi.

G. CIX. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164. Sag. G. 270.

Atechnia, L. 119.

Agenesia, V. 283.

Species verae sunt,

Anaphrodisia paralytica, S. sp. 1.

Anaphrodisia gonorrhœica, S. sp. 2.

Species spuriae, sive veneris rite exercendæ
impedimenta, sunt,

Anaphrodisia a mariscis, S. sp. 4.

Anaphrodisia ab urethrae vitio, S. sp. 5*.

Pro ficta et falsa habenda est

Anaphrodisia magica, S. sp. 3.

* Ad dyspermatismi genus pertinet.

O. III. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

Dyscinesiae, S. Cl. VI. O. III. Sag. Cl. IX. O. III.

G. CX. APHONIA.

Vocis plena suppressio, citra coma aut syncopen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253. Sag. G. 272.

Species sunt,

i. Aphonia (*gutturalis*) a tumefactis faucibus et glottide.

Aphonia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa Morbagni.

2. Aphonia (*trachealis*) a compressa tra-
chea.

Aphonia aneurismatica, S. sp. 5.

Aphonia pulmonica, S. sp. 9.

3. Aphonia (*atonica*) a nervis laryngis re-
sectis.

Aphonia traumatica, S. sp. 6.

Sequentes symptomaticae esse videntur,

Aphonia melancholica, S. sp. 1.

Aphonia paralytica, S. sp. 8.

Aphonia temulentorum, S. sp. 3.

Aphonia hysterica, S. sp. 7.

Aphonia ab antipathia, S. sp. 2.

G. CXI. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. G. 165. V. 257. Sag. G. 271.

VOL. II.

T 5

330 GENERA MORBORUM

Species sunt,

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel
vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4.

Mutitas a siccitate, S. sp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae laefis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate conge-
nita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomaticae sunt,

Mutitas a gloffocele, S. sp. 1.

Mutitas a narcoticis, S. sp. 3.

Mutitas spasmodica, S. sp. 6.

Mutitas proaeretica, S. sp. 7.

G. CXII. PARAPHONIA.

Vocis sonus depravatus.

Iesolda singulis ex linguis

Paraphonia, S. G. 168.

Cacophonia, Sag. G. 274.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

Species sunt,

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa paupertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviorem et ingratam mutatur.

Paraphonia puberum, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob siccitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstrutas nares, vox fit rauca, cum sonitu per nares sibilante.

Paraphonia nasalis, S. sp. 2.

Paraphonia a polypo, S. sp. 8.

Rhenophonia, V. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficienciem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Afaphia, V. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4.

Paraphonia sibilans, S. sp. 7.

- Clangor, V. 251.
 Leptophonia, V. 254.
 Oxyphonia, V. 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, sonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

G. CXIII. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138. Sag. G. 273.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

Species sunt,

i. Psellismus (*haesitans*) in quo sermonis verba, praesertim prima, non facile pro-



feruntur, et non nisi prima syllaba facilius repetita.

Psellismus ischnophonia, S. sp. 1.

Ischnophonia, V. 201.

Battarismus, V. 261.

2. Psellismus (*ringens*) in quo sonus literae R semper aspiratur, et quasi geminatur.

Psellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five blaefitas, V. 258.

3. Psellismus (*lallans*) in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.

Psellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Psellismus (*emolliens*) in quo literae durae in moliores mutantur, et litera S multum usurpatur.

Psellismus traulotes, S. sp. 4.

5. Psellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Psellismus balbuties, S. sp. 5.

Psellismus a ranula, S. sp. 11.

6. Psellismus (*acheilos*) in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Psellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Psellismus (*lagostomatum*) in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Psellismus lagostomatum, S. sp. 10.

Psellismus cotacismus, S. sp. 8.

G. CXIV. STRABISMUS.

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514. Sag. G. 222.

Species sunt,

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi prae altero, debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non com mode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3.

Strabismus spasmodicus, S. sp. 4.

Strabismus paralyticus, S. sp. 5.

Strabismus catarrhalis, S. sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situum vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1.

Strabismus caligantium, S. sp. 11.

Strabismus a crystallino, S. sp. 12.

Strabismus myopum, S. sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes.

Strabismus symptomaticus, S. sp. 7.

Strabismus lagophthalmos, S. sp. 8.

G. CXV. D Y S P H A G I A.

Molestia deglutitionem impediens sine respirationis laesione vel phlegmasia.

Dysphagia, S. G. 199. Sag. G. 216.

Acataposis, V. 149.

Species a SAUVAGESIO recensitae sunt,

1. Dysphagia spasmodica.
2. ——— hysterica.
3. ——— paralytica.
4. ——— pharyngea.
5. ——— oesophagea.
6. ——— lactentium.
7. ——— tussiculosa.
8. ——— hydrophobica.
9. ——— nauseofa.
10. ——— a deglutitis.
11. ——— a datura.
12. ——— a farcomate.
13. ——— ab schirro.
14. ——— canina.
15. ——— valsalviana.
16. ——— aneurismatica
17. ——— a labario.
18. ——— a ficitate.
19. ——— ab hypostaphyle.

G. CXVI. CONTRACTURA.

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299. Sag. G. 225.

Obstipitas, S. G. 11.

Caput obstipum, V. 513.

Digitum, V. 221.

Species sunt,

i. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2.

Contractura arthritica, S. sp. 7.

Contractura catarrhalis, S. sp. 8.

Obstipitas catarrhalis, S. sp. 3.

b. A musculis a spasmo rigidis.

Contractura spasmodica, S. sp. 11.

Obstipitas spasmodica, S. sp. 6.

Obstipitas renuens, S. sp. 1.

Obstipitas lateralis, S. sp. 5.

Contractura hypochondriaca, S. sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

340 GENERA MORBORUM

Contractura paralytica, S. sp. 4.

Contractura rachialgica, S. sp. 5.

Contractura Bohemica, S. sp. 6.

Obstipitas annuens, S. sp. 2.

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura ankylosis, S. sp. 9.

Contractura syphilitica, S. sp. 10.

Obstipitas gibbosa, S. sp. 4.

O. IV. APOCENOSES.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, foli-
to uberius profluens, sine pyrexia im-
petuve fluidorum aucto.

Apocenoſes, V. Cl. II. O. II.

Fluxus, S. Cl. IX. *Sag.* Cl. V.

Morbi evacuatorii, L. Cl. IX.

G. CXVII. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerb.* 218.

Ex sanguifluxibus, a SAUVAGESIO recen-
fitis, sequentes, ad hunc locum perti-
nere videntur.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

Haematemesis traumatica, S. sp. 3.

Haematuria traumatica, S. sp. 14.

Haematuria violenta, S. sp. 2.

Haemorrhagia ab hirudine, S. sp. 7.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

Haematemesis ab hirudine, S. sp. 4.

G. CXVIII. EPHIDROSIS*.

Sudoris praeter naturam evacuatio.

Ephidrosis, S. G. 258. *Sag.* G. 194.

Sudor, L. 208.

Hydropedesis, V. 121.

Species idiopathicae unica est,

Ephidrosis spontanea, S. sp. 1.

* Ephidrosis minus recte ad morbos locales relatam esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prorsus omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinibus morbis evacuatoriis recensui.

Ephidroses symptomaticae variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate fudoris eliciti, et quodammodo pro varietate partis maxime fudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3.

Ephidrosis febricosa, S. sp. 7.

Ephidrosis hectica, S. sp. 5.

Ephidrosis exanthematum, S. sp. 6.

Ephidrosis syncoptica, S. sp. 4.

Ephidrosis scorbutica, S. sp. 2.

Ephidrosis a faburra, S. sp. 18.

Ephidrosis lactea, S. sp. 9.

Ephidrosis mellea, S. sp. 10.

Ephidrosis vinosa, S. sp. 11.

Ephridosis viridis, S. sp. 12.

Ephidrosis nigra, S. sp. 13.

Ephidrosis lutea, S. sp. 14.

Ephidrosis urinosa, S. sp. 15.

Ephidrosis cruenta, S. sp. 16.

Ephidrosis caerulea, S. sp. 17.

Ephidrosis acida, S. sp. 19.

Ephidrosis arenosa, S. sp. 20.

Ephidrosis lateralis, S. sp. 8.

G. CXIX. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99. Sag. G. 195.

Ex speciebus a SAUVAGESIO recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi

Epiphora frigida, S. sp. 8.

Caeterae omnes symptomaticae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1.

Epiphora ophthalmica, S. sp. 3.

Epiphora calida, S. sp. 9.

Epiphora ex variolis, S. sp. 4.

Epiphora arthritica, S. sp. 12.

Epiphora cruenta, S. sp. 10.

Epiphora ex rhyade, S. sp. 2.

Epiphora ex aegilope, S. sp. 5.

Epiphora ab ectropio, S. sp. 6.

Epiphora ab anchylope, S. sp. 7.

Epiphora sebacea, S. sp. 11.

Epiphora lactea, S. sp. 13.

G. CXX. P T Y A L I S M U S.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103. Sag. G. 197.

Si quis ptyalismus idiopathicus sit, pro eo habere vellem

Ptyalismum a laxitate, S. sp. 4.

Sequentes omnes symptomatice sunt,

Ptyalismus nauseosus, S. sp. 1.

Ptyalismus hypochondriacus, S. sp. 3.

Ptyalismus gravidorum, S. sp. 14.

Ptyalismus a pyrofi, S. sp. 2.

Ptyalismus Lapponicus, S. sp. 3.

Ptyalismus febrilis, S. sp. 18.

Ptyalismus variolosus, S. sp. 6.

Ptyalismus arthriticus, S. sp. 9.

Ptyalismus phthisicus, S. sp. 10.

Ptyalismus scorbuticus, S. sp. 7.

Ptyalismus catarrhalis, S. sp. 15.

Ptyalismus aphthosus, S. sp. 13.

- Ptyalismus a carie, S. sp. 16.
- Ptyalismus purulentus, S. sp. 12.
- Ptyalismus a calculo, S. sp. 17.
- Ptyalismus syphiliticus, S. sp. 19.
- Ptyalismus viridis, S. sp. 11.
- Ptyalismus urinosus, S. sp. 20.
- Ptyalismus mercurialis, S. sp. 5.

G. XXI. ENUREYSIS.

Urina e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113. Sag. G. 200.

Species sunt,

i. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

Enuresis herniosorum, S. sp. 3.

Enuresis puerarum, S. sp. 5.

Enuresis, calculosa, S. sp. 7.

Enurefis a fistula, S. sp. 8.

2. Enurefis (*irritata*) a compressione vel
irritatione vesicae.

Enurefis gravidarum, S. sp. 4.

Enurefis catamenialis, S. sp. 6.

Enurefis a sparganosi, S. sp. 9.

Symptomaticae est,

Enurefis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberri potest

Enuresis infantum, S. sp. 1.

G. CXXII. G O N O R R H O E A.

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel
absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhoea, S. G. 258. L. 200. V. 118. *Sag.*

G. 204.

Species sunt,

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea pura, S. sp. 1.

Gonorrhoea benigna *Auctorum.*

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea syphilitica, S. sp. 4.

Gonorrhoea maligna *Auctorum.*

Hujus sequela est,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, post gonorrhœam impuram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.

Anglis, a GLEET.

3. Gonorrhœa (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erekctione, sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhœa libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhœa (*dormientium*) in qua liquor seminalis cum erekctione et libidine, in dormientibus, ex somnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhœa oneirogonos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit.

Gonorrhœa spuria, S. sp. 5. *Astruc*, lib. 3. cap. 3. § 2.

Gonorrhœa balani, S. sp. 6.

O. V. EPISCHESSES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Suppressorii, L. Cl. VIII. O. II.

Suppressiones, Sag. CL. VI.

G. CXXIII. OBSTIPATIO.

Deje^ctio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, L. 166. V. 128. Sag. G. 221.

Species sunt,

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis *Colicae 1mae, 2dae, 4tae, vel 7mae supra dictae.*

G. CXXIV. I S C H U R I A.

Urinae suppressio absoluta.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129. *Sag. G.*
212. *Home's Clinical Experiments*, sect. XV.
Lond. Med. Obs. V. Append.

Species sunt,

1. Ischuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molestia gravis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad minguendum stimulo.

Variat pro varietate caufae ; hinc *

* Doctissimi CUSSONI Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simil autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate SAUVAGESIANO inserui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species CUSSONI summatim hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt.

- a. *Nephritica*, a renum inflammatione, S. sp. 1.
- b. *Nephrolithica*, a renum calculo, S. sp. 2. Edinb. Med. Ess. II. 31.
- c. *Nephroplethora*, a plethora, S. sp. 3.
- d. *Lunatica*, periodica, S. sp. 4.
- e. *Nephrospastica*, spasmodica, S. sp. 5.
- f. *Nephremintica*, verminosa, S. sp. 6.
- g. *Nephrothromboides*, a sanguine congrumato, S. sp. 7.
- h. *Nephropyica*, a renum purulentia, S. sp. 8.
- i. *Nephrophlegmatica*, pituitosa, seu mucosa, S. sp. 9.
- k. *Nephroplegica*, paralytoda, S. sp. 10.
- l. *Suppleta*, ab alia evacuatione suppleta, S. sp. 11.

- 2. *Ischuria (ureterica)* praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Ureteritica*, inflammatoria, S. sp. 12.
- b. *Ureterolithica*, calculosa, S. sp. 13.
- c. *Ureterothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 14.

- d. *Ureterophlegmatica*, a pituita, S. sp. 15.
- e. *Ureteropyica*, purulenta, S. sp. 16.
- f. *Ureterostomatica*, ab orificii ureterum inferioris clausura, S. sp. 17.

3. *Ischuria (vesicalis)* cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Cystitica*, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. *Cystolithica*, a vesicae calculo, S. sp. 19.
- c. *Cystospastica*, a sphincteris vesicae spasmo, S. sp. 20.
- d. *Cystoplegica*, a vesicae paralyfi, S. sp. 21.
- e. *Polyurica*, a vesica distensa lotio diutius cohibita, S. sp. 22.
- f. *Cystopyica*, purulenta, S. sp. 23.
- g. *Cystothromboides*, a sanguinis grumo, S. sp. 24.
- h. *Cystophlegmatica*, a muco, S. sp. 25.
- i. *Ectopocystica*, a vesicae ectopia, S. sp. 26.
- k. *Cystoproctica*, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus, turgente, S. sp. 27.

1. *Hysterocystica*, ab utero, S. sp. 28.
- m. *Atretarum*, a menstruis in vagina retentis,
S. sp. 29.
- n. *Paradoxa*, S. sp. 30.

4. *Ischuria (urethralis)* cum tumore hypo-gastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate causae ; hinc

- a. *Perinaealis*, a perinaei tumore, S. sp. 31.
- b. *Urethrolithica*, a calculo urethrae impacto, S. sp. 32.
- c. *Urethrophlegmatica*, a muco urethram infarciente, S. sp. 33.
- d. *Urethrothromboides*, a sanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34.
- e. *Urethropyica*, a pure urethram obstruente, S. sp. 36.
- f. *Urethrohymenodes*, a membrana in urethram im-pacta, S. sp. 36.
- g. *Urethrelmintica verminosa*, S. sp. 37.
- h. *Urethritica*, ab urethrae inflammatione, S. sp. 38.
- i. *Carunculosa*, a morbis ut vocant urethrae, S. sp. 39.

- k. *Hydrocelodes*, ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40.
- l. *Cryptopyica*, a penis intra corpus retractione, S. sp. 41.
- m. *Peridesmica*, a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42.
- n. *Phimosica*, a phimosi, S. sp. 42.
- o. *Aspadialis*, ab urethrae clausura, S. sp. 44.

G. CXXIV. D Y S U R I A.

Dolorifica et quodammodo impedita urinae emissio.

Dysuria, S. G. 265. L. 57. V. 164. Sag. G. 213.

Stranguria Auctorum.

Species sunt,

i. *Dysuria (ardens)* cum ardore urinae fine morbo vesicae evidente.

Dysuria primaria, S. sp. 5.

Dysuria a cantharidibus ingestis vel applicatis.

Dysuria arsura, S. sp. 7.

Dysuria neonympharum, S. sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Dysuria hysterica, S. sp. 1.

Dysuria rachialgica, S. sp. 11.

Dysuria diabetica, S. sp. 17.

Dysuria nephralgica, S. sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13.

Dysuria a cystocele, S. sp. 8.

Dysuria ab hysteroloxia, S. sp. 10.

Dysuria atretarum, S. sp. 16.

4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammati.

Dysuria ab hysteritide, S. sp. 9.

Dysuria haemorrhoidalnis, S. sp. 6.

Dysuria venerea, S. sp. 4.

Dysuria a caruncula, S. sp. 5.

5. Dysuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.

Dysuria calculosa, S. sp. 12.

6. Dysuria (*mucosa*) cum excretione muci copiosa.

Glus, L. 200.

Pyuria mucosa, S. sp. 6.

Pyuria viscida, S. sp. 5.

Rarus vesicae morbus, Hoffm. T. IV. Consult.

Med. Centur. II. cas. XCIII.

Catarrhus vesicae Lieutaud. Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. sp. 9.

De dysuria ab infectis, S. sp. 15. mihi non satis liquet.

G. CXXV. DYSPERMATISMUS.

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Dyspermatismus, S. G. 260.

Sterilitas, L. 171. Sag. G. 211.

Agenesia, V. 283.

Species sunt,

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. sp. 1.
2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.
3. Dyspermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. sp. 3.
4. Dyspermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciente, S. sp. 4.
5. Dyspermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erekctione, S. sp. 5. Edinb. Eff. I. 35.
6. Dyspermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
7. Dyspermatismus (*apractodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.

8. Dyspermatismus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.

De dyspermatismo feroso, S. sp. 8. mihi non satis constat.

G. CXXVI. AMENORRHœA.

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciores, vel non omnino fluentes, circa graviditatem.

Amenorrhœa, V. 130.

Dysmenorrhœa, L. 168. Sag. G. 218.

Species sunt,

1. Amenorrhœa (*emansionis*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum, menses, non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidae adsint.

2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis,
quibus menses, quae jam fluere sole-
bant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses
parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficultis, S. sp. 1.

O. VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tumores protuberantes, L. Cl. X. O. V.

G. CXXVIII. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408. Sag. G. 35.

G. CXXIX. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407. Sag. G. 36.

G. CXXX. ECCHYOMA.

Tumor diffusus, parum emiens, livescens.

362 GENERA MORBORUM

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451. Sag. G. 5.

Sugillatio, L. 230.

G. CXXXI. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. Sag. G. 19.

Boerb. 392.

G. CXXXII. CANCER.

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali
moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. Boerb. 492. Sag.

G. 25.

G. CXXXIII. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368. Sag. G. 21.

Parotis, S. G. 17. V. 370. Sag. G. 22.

G. CXXXIV. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376. *Sag.* G. 28.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

G. CXXXV. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426. *Sag.* G. 30.

G. CXXXVI. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus sive Tylloma, V. 429.

G. CXXXVII. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,
non dolens.

Lupia, S. G. 37. Sag. G. 40.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

G. CXXXVIII. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXXIX. HYDATIS.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34. Sag. G. 38.

Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXL. HYDARTHROUS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthus, S. G. 38.

Anglis, a WHITE SWELLING.

Reimarus de fungo articulorum, Leid 1757.

Cheston Path. Inq. Chap. V.

Edinb. Eff. IV. 18. 19. 20.

G. CXLI. EXOSTOSIS.

Tumor durus ossi infidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417. Sag. G. 34.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII. E C T O P I A E *.

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI. *Sag.* Cl. I. O. VI.

G. CXLII. H E R N I A.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXLIII. P R O L A P S U S.

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera solertissimi CUSSONI, enumerata in primo hujus synopsis tomo, pag. 15. et seq. inveniri, et summo cum fructu perlegi possunt.

G. CXLIV. LUXATIO.

Os ex sua in juncturis fede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60. *Sag.* G. 67.

Diaftasis, S. 61. *Sag.* G. 68.

Luxatura, L. 237.

O. VIII. DIALYSES.

Solutio continua visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII. *Sag.* Cl. II.

Vitia dialytica et solutiones continuae, L. Cl. XI.
O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Dissolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXLV. V U L N U S.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a
corpo duro moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Sag.* G. 78.

Boerb. 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243. *Sag.* G. 79.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243. *Sag.* G. 86.

G. CXLVI. U L C U S.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorofa.

- Ulcus, S. G. 71. L. 249. *Sag.* G. 89.
 Exulceratio, S. G. 72. *Sag.* G. 90.
 Sinus, S. G. 73. V. 492. *Sag.* G. 92.
 Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Sag.* G. 91.
Boerh. 413.
 Cacoethes, L. 250. V. 485.
 Phagedaena, V. 488.
 Moma, L. 251. V. 489.
 Carcinoma, L. 252. V. 487.
 Ozaena, L. 253. V. 500.
 Achor, L. 265. V. 494.
 Crusta, V. 494.
 Therioma, V. 486.
 Sycosis, V. 390.

G. CXLVII. H E R P E S.

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregaria, serpentia, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443. *Sag.* G. 11.

G. CXLVIII. T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497. *Sag.* G. 131.

G. CXLVIX. PSORA.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Psora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444. Sag. G. 130.

G. CL. FRACTURA.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. Sag. G. 98. Boerb. 339.

G. CLI. CARIOS.

Offis exulceratio.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493. Sag. G. 94.

I N D E X.

CLASSIUM ET ORDINUM.

*Numeri post literas S. L. V. Sag. et M.
paginas tomis primi; post C. paginas tomis
secundi, indicant.*

A DYNAMIÆ, V. 183. M. 364. C. 198.
et 324.

Aerifluxus, S. 63. Sag. 293.

Agitatorii, L. 110.

Alvi fluxus, S. 59. Sag. 291.

Alvi fluxus non fanguinolenti, S. 60. Sag.
288.

Alvi fluxus fanguinolenti, S. 59. Sag. 287.

Anepithymiae, S. 43. Sag. 312. C. 324.

Anhelationes, S. 39. Sag. 306. M. 365.

Anhelationes oppressivae, S. 40.

- Anhelationes suppressivae, Sag. 307.
Apocenoses, V. 166. C. 340.
- Cachexiae, S. 65. V. 194. Sag. 267. M. 367. C. 266.
- Cachexiae anomalae, S. 81. Sag. 276.
- Clonici generales, S. 37. Sag. 303.
- Clonici partiales, S. 35. Sag. 301.
- Comata, S. 46. Sag. 315. C. 183.
- Concretiones, V. 224.
- Continentes, L. 90. C. 68.
- Continuae, S. 26. V. 151. Sag. 333. C. 66.
- Constrictorii, L. 116.
- Critici, L. 90. C. 44.
- Cystides, S. 13. Sag. 250.
- Debilitates, S. 42. Sag. 310.
- Decolores, L. 124.
- Defectivi, L. 105. C. 198.
- Deformationes, L. 136.
- Deformes, L. 122. C. 266.
- Deformitates, V. 226. Sag. 259.

- Deliria, S. 56. Sag. 343. C. 254.
Dialyses, C. 367.
Dialytica, L. 126.
Diffolutiones, V. 218. C. 367.
Dolores, S. 48. V. 171. Sag. 279. M.
358.
Dolorosi, L. 97.
Dolorosi extrinseci, L. 99.
Dolorosi intrinseci, L. 97.
Dysaesthesiae, S. 42. Sag. 310. C. 302.
Dyscinesiae, S. 44. Sag. 312. C. 328.
Dyforexiae, C. 318.
- Ectopiae, S. 14. Sag. 252. C. 365.
Efflorescentiae, S. 8. Sag. 244.
Emaciantes, L. 122. C. 266.
Epischeses, V. 170. C. 349.
Evacuatorii, L. 117. C. 340.
Exacerbantes, L. 91. C. 46.
Exanthemata, Sag. 318. C. 130.
Exanthematicae, S. 29. V. 154. C. 131.
Exanthematici, L. 87. C. 131.
Excrecentiae, S. 11. Sag. 248.

Exuberantiae, V. 212.

Exulcerationes, L. 128. C. 367.

Febres, S. 26. V. 149. Sag. 333. M. 349.
C. 44.

Fluxus, S. 58. Sag. 286. M. 356. C.
340.

Haemorrhagiae, V. 164. C. 153.

Hallucinationes, S. 54. Sag. 338.

Humoralia, L. 125.

Hydropses, C. 275.

Hydropses partiales, S. 66. Sag. 270.

Hyperaesthesiae, V. 191. C. 318.

Icteritiae, S. 80. Sag. 275.

Ideales, L. 101. C. 254.

Imaginarii, L. 102.

Impetigines, S. 79. Sag. 273. C. 291.

Inflammationes, V. 201. M. 354.

Intermittentes, S. 28. V. 149. L. 90. Sag.
336. C. 45.

Intumescentiae, S. 65. Sag. 268. C. 271.

Leipopsychiae, S. 45. Sag. 314. C. 198.

Locales, C. 301.

Macies, S. 65. Sag. 267. C. 266.

Maculae, S. 7. L. 138. V. 216. Sag. 247.

Marcores, C. 266.

Mentales, L. 101. M. 366.

Morositates, S. 55. Sag. 340. C. 318.

Motorii, L. 109. C. 210.

Neuroses, C. 182.

Paranoiae, V. 199. C. 254.

Pathetici, L. 102. C. 318.

Phlegmasiae, S. 29. Sag. 325. C. 82.

Phlogistici, L. 93. C. 83.

Phymata, S. 9. Sag. 246.

Plagae, S. 23. Sag. 261. C. 301. et 367.

Privativi, L. 107. C. 302. et 324.

Procidentiae, L. 135.

Profluvia, V. 164. C. 172.

Pustulae et Papulae, V. 214.

Pyrexiae, C. 43.

Quietales, L. 105.

Remittentes, S. 27. Sag. 335. C. 45.

Sanguifluxus, S. 58. Sag. 286. C. 153.

Scabies, L. 130.

Serifluxus, S. 61. Sag. 291.

Solutiones, Sag. 261.

Soporosi, L. 106. C. 183.

Spasmi, S. 34. V. 177. Sag. 399. M. 363.

C. 210.

Spastici, L. 109.

Suffocatori, L. 113.

Suppressiones, Sag. 295.

Suppressori, L. 113.

Tonici generales, S. 35. Sag. 300.

Tonici partiales, S. 34. Sag. 399.

Tubera, S. 78. Sag. 272.

Tumidosi, L. 123. C. 271.

Tumores, V. 202. C. 362.

Vesaniae, S. 54. Sag. 338. C. 251.

Vitia, S. 7. L. 125. V. 201. Sag. 243.

C. 301.

Vol. II.

B b b

INDEX GENERUM.

- A** BORTIO, V. 97 C. 39
Abortus, S. 245 L. 205. *Sag.* 180 C. 39
Abscessus, L. 233 V. 354 C. 7
Acatapofis, V. 149
Achlys, V. 242 C. 92
Achor, L. 265 V. 494 C. 145
Acrochordon, V. 426
Acyefis, V. 282.
Addephagia, V. 297 C. 101
Adiapneustia, *Sag.* 210
Adipsia, S. 163 L. 117 V. 281 *Sag.* 269 C. 108
Adynamia, V. 225.
Aedopsophia, S. 273 *Sag.* 208
Aegilops, V. 499
Aestus volaticus, V. 220
Agalaxis, V. 133
Agenesia, V. 283 C. 109, 125
Ageustia, L. 114 C. 99
Agheustia, S. 157 *Sag.* 263 C. 99
Aglaetatio, L. 170 *Sag.* 214
Aglutitio, L. 164
Agomphyafis, V. 482
Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286 *Sag.* 351
Algor, S. 191 *Sag.* 150
Allotriophagia, V. 299 C. 103
Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525 *Sag.* 138
Alvi fluxus, M. 356*.
Amatoria, V. 17
Amaurofis, S. 155 L. 110 V. 238 *Sag.* 261 C. 93

* Numeri post literam M. paginas tomii primi indicant.

- Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 *Sag.* 258 C. 93, 94
Ambustio, *Sag.* 97
Amenorrhœa, V. 130 C. 126
Amentia, S. 233 L. 67 V. 337. *Sag.* 346 C. 65, 67
Amnesia, S. 237 *Sag.* 349 C. 65
Amphemerina, S. 84 L. 20 *Sag.* 321 C. 3
Amputatio, *Sag.* 86
Amputatura, S. 70 L. 242 C. 144
Anacatharsis, S. 262 *Sag.* 198 C. 40
Anaesthesia, S. 161 L. 118 *Sag.* 267 C. 100
Anaphrodisia, S. 164 *Sag.* 270 C. 109
Anapleusis, V. 478
Anasarca, S. 281 L. 216 V. 313 *Sag.* 108 C. 75
Anatrophe, V. 280.
Anchyloblepharon, V. 504
Anchyloglossum, V. 507
Anchylomerisma, *Sag.* 76
Anchylops, V. 364
Anchylosis, L. 287 V. 508
Aneurisma, S. 32 L. 282 V. 408 *Sag.* 35 C. 127
Angina, S. 147 L. 46 V. 49 *Sag.* 217 C. 10
— convulsiva, V. 196
Angone, V. 196
Anhelatio, L. 157
Anoia, V. 337
Anodynna, V. 284 C. 100
Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 *Sag.* 268 C. 107, 45
Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 *Sag.* 262 C. 98
Anthrax, S. 19 L. 273 V. 353 *Sag.* 24 C. 7
Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285 *Sag.* 337

- Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134 Sag. 146
Apella, L. 312 V. 546 Sag. 73
Apepsia, V. 276 C. 45
Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253 Sag. 272 C. 110
Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 Sag. 298 C. 35
Aphthosa, V. 44 C. 35
Apnoea, V. 265.
Apogeusis, V. 249 C. 99
Apogeusia, V. 294
Apomytrosis, S. 127 Sag. 234
Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 Sag. 288 C. 42
Apoplectica, V. 72
Apostema, S. 39 Sag. 42 C. pag. 86
Aposyrrma, V. 477
Aquula, V. 445
Archoptoma, V. 395
Arctura, L. 262
Ardor, S. 192 Sag. 151
Argemon, V. 498.
Aridura, S. 278 L. 227 Sag. 104
Artetiscus, V. 554
Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 Sag. 142 M. 358 C. 24
Arthroace, S. 78 L. 257 Sag. 95 C. 7
Arthrodynia, C. p. 122
Arthropoisis, C. 25
Asaphia, V. 250 C. 112
Ascites, S. 288 L. 218 V. 314 Sag. 114 C. 79
Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 Sag. 281 C. 44
Affodes, V. 27
Asthenia, S. 172 L. 92 V. 223 Sag. 278,

- Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 Sag. 252 M. 365 C. 55
Atecnia, L. 119 C. 109
Atheroma, L. 286 V. 420 C. 137
Athymia, V. 329 C. 66
Atochia, V. 172
Atonia, L. 120 C. 43
Atreta, L. 313 V. 549
Atrophy, S. 277 L. 211 V. 308 Sag. 102 M. 367 C. 70
Attritio, V. 475
Aurigo, S. 306 Sag. 132 C. 91

B

- Bacchia, L. 271 Sag. 9 C. 7
Balbuties, V. 259
Batrachus, V. 80
Battarismus, V. 261 C. 113
Beriberia, S. 137 L. 140 Sag. 244
Blaesitas, V. 258
Blepharoptosis, S. 43 Sag. 46
Blepharotis, V. 342
Blestrismus, V. 135
Boa, V. 446
Bombus, V. 302
Borborigmus, L. 123
Bronchocele, S. 28 V. 369
Bubo, S. 16. L. 272 V. 368. Sag. 21. C. 132
Bubonocele, V. 396 Sag. 58
Bulimia, S. 223 L. 79 Sag. 335 C. 101
Bulimus, V. 296 C. 101
Bullosa, V. 41 C. 34

C.

- Cachexia, L. 221 V. 304
Cacoethes, L. 251 V. 485 C. 146
Cacophonia, *Sag.* 274 C. 112
Cacositia, L. 87
Caligo, *S.* 153 V. 288 *Sag.* 259 C. 92
Callus, V. 429 C. 136
Calvities, V. 529
Cancer, S. 20 V. 375 *Sag.* 25 M. 368 C. 132
Canities, V. 525.
Capistrum, V. 208 C. 49
Caput obstipum, V. 513 C. 116
Carcinoma, S. 296 L. 253 V. 487 *Sag.* 122 C. 145
Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157 *Sag.* 160 C. 45
Cardiogmus, S. 201 V. 152 *Sag.* 159
Carditis, S. 111 V. 54 *Sag.* 302 C. 13
Carebaria, V. 144
Caries, S. 77 L. 256 V. 493 *Sag.* 94 C. 151
Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330 *Sag.* 231
Carus, S. 181 L. 100 V. 231 *Sag.* 287 C. 42
Cataclasis, V. 202
Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 *Sag.* 282 C. 42
Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 *Sag.* 286 C. 42
Catapsyxis, V. 137
Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 *Sag.* 260 C. 92
Catarrhalis, V. 73
Catarrhexis, V. 91
Catarrhus, S. 186 V. 98 *Sag.* 145 C. 40
— suffocatus, V. 270
Catoche, V. 230

- Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 *Sag.* 229 M. 363 C. 48
Caufos, V. 20
Cedma, V. 168
Celsa, V. 303
Cephalaea, S. 194 V. 141 *Sag.* 153
Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140 *Sag.* 152
Cephalitis, S. 109 *Sag.* 310 C. 9
Cercosis, V. 535
Cerion, V. 496
Chemofis, V. 46 C. 8
Chilon, V. 366
Chiragra, V. 139.
Chlorosis, S. 309 L. 223 V. 305 *Sag.* 135. C. 47
Cholera, S. 253 L. 187 V. 110 *Sag.* 188 C. 60
Cholerica, L. 191 V. 28 C. 61
Cholofis, V. 536
Chorea, L. 139 V. 193 C. 51
Chylaria, V. 117
Cicatrix, L. 318 V. 509
Cillofis, V. 203
Cinclefis, V. 201
Cionis, V. 150
Circocele, V. 409
Citta, L. 78 C. 103
Clamor, V. 206
Clangor, V. 251 C. 112
Claudicatio, S. 131 *Sag.* 238
Clavus, L. 279 V. 142, 428 C. 136
Clitorismus, L. 299
Clunefia, V. 167 C. 7
Cocyta, L. 258

- Coeliaca, S. 255 L. 190 V. 109 *Sag.* 190 C. 61
Coilima, V. 373
Colica, S. 204 L. 50 V. 160 *Sag.* 162 M. 361 C. 59
Coloboma, V. 534
Colpocele, *Sag.* 61
Colpoptosis, *Sag.* 53
Coma, V. 232 M. 364 C. 42
Combustura, L. 246 C. 7
Condyloma, S. 24 L. 294 V. 378 *Sag.* 29
Contractura, S. 119 L. 300 *Sag.* 225 C. 116
Contufio, S. 66 V. 480 *Sag.* 83
Contufura, L. 239
Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 *Sag.* 235. M. 363
C. 50
Cophosis, S. 160 L. 112 *Sag.* 266 C. 96
Coryza, S. 260 L. 175 V. 100 *Sag.* 196 C. 40
Crampus, S. 120 V. 194 *Sag.* 226.
Crepitus, L. 195.
Crisforchis, V. 551
Crithe, V. 434
Crusta lactea, V. 495 C. 145
Cyasma, V. 461
Cynanche, S. 110 L. 33 *Sag.* 300 C. 10
Cynorexia, V. 298 C. 101
Cyphosis, V. 512
Cyrtoma, V. 405
Cyfrosis, V. 71
Cystorrhagia, V. 93 C. 39
Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 *Sag.* 309 C. 28
Cystocele, S. 56 V. 404
Cystoptosis, V. 394

D

- Dacryoma, V. 506
Dactylion, V. 510
Daemonia, L. 69 C. 66
Daemonomania, S. 236 *Sag.* 348 C. 66
Decimana, V. 9 C. 2
Deliquium, M. 364
Delirium, V. 330 L. 65
Deuteria, V. 132
Diabetes, S. 263 L. 198 V. 115 *Sag.* 199 C. 62
Diabrosis, V. 481
Diachalasis, V. 474
Diaphthora, V. 278 C. 45
Diaphragmitis, *Sag.* 304 C. 11
Diaria, L. 11 C. 4
Diarrhoea, S. 254 L. 188 V. 105 *Sag.* 189 C. 61
Diaftasis, S. 61 *Sag.* 63 C. 144
Digitum, L. 228 V. 221 *Sag.* 173 C. 116
Dionysiscus, V. 553
Diplopia, S. 218 *Sag.* 330 C. 95
Distortio, L. 303
Distrix, V. 526
Diuresis, V. 114 C. 62
Dolor capititis, M. 359
— ventriculi, M. 360
Duplicana, L. 18 C. 1, 2
Dyscoeca, S. 158 V. 246 *Sag.* 264 C. 96
Dysenteria, S. 248 L. 192 V. 107 *Sag.* 183 C. 41
Dyslochia, L. 169 V. 131 *Sag.* 215
Dyshaemorrhoidis, *Sag.* 220
Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170 *Sag.* 218 C. 125

C c c

- Dysodia, S. 274 V. 125 *Sag.* 109
 Dysopia, V. 291 C. 94
 Dyspepsia, V. 277 C. 45
 Dyspermatismus, S. 269 C. 125
 Dysphagia, S. 199 *Sag.* 216 C. 115
 Dyspnœa, S. 144 L. 160 V. 267 *Sag.* 251 M. 365
 C. 56
 Dystocia, S. 208 V. 171 *Sag.* 219
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164 *Sag.* 213 C. 124

E

- Ecchymoma, S. 6 V. 451 *Sag.* 5 C. 130
 Eclampsia, S. 133 V. 189 *Sag.* 240 M. 363 C. 53
 Ecphyse, V. 124
 Ecplexis, V. 334
 Ecstasis, S. 177 V. 333 *Sag.* 283 C. 42
 Ecthymma, V. 475
 Ecthymata, V. 360
 Ectropium, L. 297 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcosis, S. 313 *Sag.* 139
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 87
 Elephantiasis, S. 302 V. 321 *Sag.* 128 C. 87
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphysema, S. 13 L. 229 V. 392 *Sag.* 18 M. 367
 C. 72
 Empyema, S. 151 L. 159 V. 358 *Sag.* 257 M. 365 C.
 p. 107
 Enanthis, V. 430
 Encauma, V. 450

- Encaufis, V. 158, 347 C. 7
Encephalocele, S. 57 V. 383 Sag. 64
Encystis, V. 420 C. 137
Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57 Sag. 307 C. 16
Enterocele, S. 50
— ovularis, V. 400
Enthusiasmus, V. 335
Entropium, V. 519
Enurefis, S. 264 L. 196 V. 113 Sag. 200 C. 121
Ephelis, S. 3 L. 326. V. 438 Sag. 3
Ephemera, S. 79 C. 4
Ephialtes, S. 138 L. 163 Sag. 245 C. 68
Ephidrosis, S. 258 Sag. 194 C. 118
Epiala, V. 19
Epidosis, Sag. 75
Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188 Sag. 241 M. 363 C. 53
Epinyctis, S. 8 V. 441 Sag. 12
Epiphlogisma, V. 179
Epiphora, S. 259 L. 173 V. 99 Sag. 195 C. 119
Epiplocele, S. 51
Epiploitidis, S. 106 Sag. 308 C. 14
Epistaxis, V. 82 C. 36
Episthotonus, V. 182 C. 48
Epulis, V. 363
Erotomania, L. 82 C. 66
Errana, L. 19 C. 2
Erratica, S. 90 C. 2 Sag. 327
Erysipelacea, V. 68 C. 26
Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343 Sag. 296 C. 26, 7
Erythema, S. 11 Sag. 16 C. 7
Eschara, S. 76 L. 281 V. 483 Sag. 93
Efoche, V. 439

- Effera, S. 99 *Sag.* 297
 Exania, S. 47 *Sag.* 50
 Exarthrema, S. 60 *Sag.* 67 C. 144
 Excoriatio, S. 65 *Sag.* 82
 Excorjatura, L. 247
 Exoche, V. 440
 Exocyste, S. 48
 Exocystis, *Sag.* 51
 Exomphalus, S. 40 *Sag.* 43
 Exoneirosis, V. 120
 Exophthalmia, S. 42 *Sag.* 45
 Exostofis, S. 29 L. 291 V. 417 *Sag.* 34 C. 141
 Expectoratio, L. 179 C. 40
 Exulceratio, S. 72 *Sag.* 90 C. 146

F

- Fatuitas, V. 336 C. 65
 Favus, V. 496
 Febris continua, M. 349
 ——intermittens, M. 350
 ——remittens, M. 351
 ——exanthematica, M. 352
 ——Hectica, M. 353
 Fissura, S. 68 V. 469 *Sag.* 99
 Fistula, S. 74 L. 255 V. 491 *Sag.* 91 C. 146
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127 *Sag.* 207 C. 45
 Flemen, V. 425
 Fletus, L. 149
 Fluxus humoralis, M. 357
 Fractura, S. 67 L. 236 V. 468 *Sag.* 98 C. 150
 Framboesia, S. 299 *Sag.* 125 C. 89

- Frigeraria, *Sag.* 318
Frigus, V. 185
Fungus, V. 423
Furor uterinus, V. 331
Furunculus, S. 18 V. 352 *Sag.* 23 C. 7

G

- Galactia, L. 207 V. 122
Galactirrhoea, S. 270 *Sag.* 205
Galbulus, V. 559
Galiancon, V. 558
Ganglion, L. 288 V. 379 C. 138.
Gangraena, S. 314 L. 234 V. 327 *Sag.* 140 C. p. 87
Gastrica, L. 49
Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56 *Sag.* 306 C. 15
Gastrocele, S. 52 V. 410 *Sag.* 54
Gastrodynia, S. 203 *Sag.* 161 C. 45
Gelasmus, V. 210
Gibber, L. 301 V. 512
Gibbositas, S. 30 *Sag.* 70
Glaucoma, V. 241 C. 92
Gloffagra, V. 138
Glossocele, V. 197
Glossocoma, V. 198
Glus, L. 200 V. 117 C. 124
Gonagra, V. 139
Gongrona, V. 371
Gonorrhoea, S. 268 L. 201 V. 118 *Sag.* 204 C. 122
Grando, V. 435

Gravedo, L. 42 V. 126 C. 40

Graviditas, S. 284 L. 221 *Sag.* 111

Gryposis, V. 537

Gutta rosea, S. 4 C. 7

— rosacea, V. 437 C. 7

H

Haemalopia, V. 289 C. 95

Haemataporia, *Sag.* 103

Haematemesis, S. 242 L. 185 V. 89 *Sag.* 177 C. 39

Haematopedesis, V. 95

Haematuria, S. 243 L. 199 V. 92 *Sag.* 178 C. 39

Haemeropathos, *Sag.* 13

Haemodia, V. 146

Haemoptoe, V. 83 C. 37

Haemoptysis, S. 240 L. 180 V. 84 *Sag.* 175 C. 37

Haemorrhagia, S. 239 L. 174 V. 81 *Sag.* 174 M. 356

C. 36, 116

Haemorrhoidalis, V. 75

Haemorrhois, S. 247 L. 193 *Sag.* 182 C. 38

Hectica, S. 83 L. 24 V. 80 *Sag.* 320 C. p. 80

Hemalopia, V. 245

Hemerolopia, V. 244

Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143 *Sag.* 154

Hemiplegia, S. 179 L. 103 V. 228 *Sag.* 276 C. 43

Hemitritaea, L. 23 C. 1

Hepatalgia, S. 205 *Sag.* 163

Hepatica, L. 51

Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 *Sag.* 181 C. 61

Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 *Sag.* 312 C. 17

- Hepatizon, L. 324
Hepatocele, S. 53 V. 411
Hermaphroditus, V. 552
Hernia, L. 292 C. 142
Herpes, S. 7 L. 269 V. 443 *Sag.* 11 C. 147
Hidroa, S. 10 V. 446
Hieranofos, L. 144 V. 190 M. 363 C. 50
Hieropyr, V. 344 C. 7
Himantofis, V. 151
Hippos, L. 137 V. 199
Hirsuties, L. 315 V. 524 *Sag.* 77
Hordeolum, S. 27 L. 277 V. 434 *Sag.* 32 C. 7
Horror, V. 186
Humoraria, *Sag.* 317
Hydarthrus, S. 38 *Sag.* 41 C. 140
Hydatis, S. 34 *Sag.* 38 C. 139
Hydreterocele, V. 406
Hydroa, *Sag.* 15
Hydrocele, V. 388 C. 81
Hydrocephalum, V. 384 C. 76
Hydrocephalus, S. 285 L. 217 V. 384 *Sag.* 112 C. 76
Hydrocistis, V. 315
Hydrometra, S. 289 *Sag.* 116 C. 80
Hydromphalos, V. 387
Hydropedesis, V. 121 C. 118
Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 *Sag.* 343 M. 363
C. 64
Hydrophthalmia, V. 385
Hydrops, M. 367
Hydrops scroti, V. 389 C. 81
Hydrorachitis, S. 287 *Sag.* 114 C. 77

- Hydrothorax, S. 150 V. 311 Sag. 256 M. 365 C. 78
 Hygrofisfocele, V. 414
 Hypercatharsis, V. 123
 Hyperartetiscus, V. 557
 Hyperostosis, V. 418 C. 141
 Hypnobatafis, V. 340 C. 68
 Hypochondriafis, S. 220 L. 76 V. 218 Sag. 332
 C. 46
 Hypogastrocele, V. 403
 Hypophafis, V. 234
 Hypopyon, V. 356
 Hyposarca, L. 219 C. 82
 Hypospydiaeos, V. 547
 Hypostaphyle, S. 44 Sag. 47
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169 Sag. 166
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 Sag. 242 C. 63
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
 Hysterocele, S. 55 V. 413
 Hysteroloxia, S. 58 Sag. 65
 Hysterophyse, V. 317 C. 74
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393 Sag. 52

I

- Ictericodes, V. 32
 Icterus, L. 225 V. 306 M. 367 C. 91
 Illeus, S. 252 V. 162 Sag. 187 C. 59
 Iliaca, L. 186 C. 59
 Illosis, V. 200

- Impetigo, V. 462
 Incubus, V. 211 C. 68
 Inflammatio, L. 232 *Sag.* 20 M. 354 C. 7
 Intertrigo, L. 248 V. 502 C. 7
 Ionthos, V. 436
 Ischias, S. 213 V. 138 *Sag.* 170 C. 22
 Ischiatocele, V. 401
 Ischiocele, *Sag.* 60
 Ischnophonia, V. 260 C. 113
 Ischnotis, V. 541
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 *Sag.* 212 M. 361 C.
 124
 Judicatoria, *Sag.* 316

L

- Labarium, L. 310
 Labium leporinum, V. 522
 Laceratura, L. 243 C. 145
 Laetitia, V. 76
 Lagocheilos, V. 552
 Lagophthalmia, L. 306 V. 516
 Lagophthalmus, V. 516
 Lagostoma, L. 311 *Sag.* 72
 Languor, L. 91
 Laparocèle, *Sag.* 56
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222 *Sag.* 147
 Leiopodes, V. 545
 Leipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 44
 Leipyria, V. 24
 Lentula, L. 14 V. 79 C. 6

D d d

- Lentigo, L. 325 V. 455
 Leontiasis, S. 297 *Sag.* 123
 Lepra, S. 303 L. 263 *Sag.* 129 C. 88
 ——Arabum, V. 321
 ——Graecorum, V. 320 C. 88
 Leptophonia, V. 254 C. 112
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 *Sag.* 285 C. 42
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1 *Sag.* 1
 Leucophlegmatia, L. 215 C. 72
 Leucorrhœa, S. 267 L. 202 V. 119 *Sag.* 202. C. 39
 Leucorrhœis, V. 112 C. 38, 61
 Lichen, V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 189 V. 108 *Sag.* 191. C. 61
 Lipothymia, *Sag.* 279 L. 93
 Lippitudo, L. 267
 Lithiasis, V. 165 M. 361
 Lochiorrhœa, *Sag.* 203
 Lordofis, S. 31 L. 302 V. 512 *Sag.* 71
 Loxarthrus, S. 62 *Sag.* 69
 Lues Venerea, M. 368
 Lumbago, S. 212 V. 138 *Sag.* 169 C. 22
 Lupia, S. 37 *Sag.* 40 C. 137
 Luxatio, V. 472 C. 144
 Luxatura, L. 237 C. 144
 Lyngodes, V. 26

M

- Macropnoea, V. 266
 Madarofis, V. 530

- Malacia, V. 300 C. 103
Malacosteon, V. 523
Malis, S. 298 Sag. 124
Mania, S. 235 L. 68 V. 331 Sag. 349 C. 67
Marasmus, L. 212 C. 70
Marisca, S. 35 Sag. 37 C. 38
Marmaryge, V. 290 C. 95
Mastodynia, S. 210 V. 153 Sag. 167 C. 7
Mediastina, V. 52 C. 11
Melaena, S. 249 Sag. 184
Melanchlorus, V. 307
Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 Sag. 347 C. 66
Melasisterus, S. 307 Sag. 133
Melaſma, L. 323 V. 451
Meliceris, V. 420
Menorrhagia, S. 244 L. 203 V. 96 C. 39
Menſtrua, V. 11
Merocele, V. 399 Sag. 57
Mesenteritis, V. 60 C. 14
Meteorismus, S. 292 Sag. 119 C. 73
Metritis, S. 107 Sag. 315 C. 21
Metrorrhagia, Sag. 179 C. 39
Miliaria, C. 32
Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 Sag. 295 C. 32
Mola, L. 206 V. 560
Monſtrositas, V. 539
Morbilli, V. 453 C. 28
Morbilloſa, V. 36 C. 30
Morofis, L. 106 V. 336 C. 65
Morphoea, L. 320
Morsura, L. 245

- Morsus, *Sag.* 81
Morta, L. 1 C. 34
Mortificatio, M. 367
Mutitas, S. 165 V. 257 *Sag.* 271 C. 111
Mydriasis, V. 237 C. 93
Myocoilitis, V. 63
Myopia, L. 309 C. 94
Myopiasis, V. 515 C. 94
Myositis, *Sag.* 301 C. 22
Myrmecium, L. 280 V. 426

N

- Naevus, S. 5 L. 319 V. 538 *Sag.* 4
Natta, L. 289
Nausea, S. 250 L. 183 V. 159 *Sag.* 185 C. 43
Nebula, V. 464
Necrofis, S. 315 *Sag.* 141
Nefrendis, V. 555
Nephralgia, S. 207 *Sag.* 165
Nephritica, L. 56
Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65 *Sag.* 314 C. 19
Noma, L. 252 V. 489 C. 146
Nonana, V. 8 C. 2
Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 *Sag.* 338 C. 106, 66
Nyctalopia, L. 307 V. 243
Nymphomania, S. 229 *Sag.* 341 C. 105
Nystagmus, S. 124 *Sag.* 230

O

- Oblivio, L. 107 V. 338 C. 65
Obstipatio, L. 166 V. 128 Sag. 221 C. 123
Obstipitas, S. 118 Sag. 224 C. 115
Octana, V. 7 C. 2
Odaxismus, V. 147
Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 Sag. 157 M. 359
C. 23
Odontorrhoea, V. 86
Oedema, S. 12 L. 230 V. 382 Sag. 17
Oesophagismus, V. 217
Omentitis, V. 61 C. 14
Omphalocele, V. 398 Sag. 55
Oneirodynia, C. 68
Onychia, V. 346
Onyx, V. 355
Operatio, Sag. 85
Ophiasis, V. 529
Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 Sag. 155 C. 8
Ophthalmites, V. 47 C. 8
Ophthalmorrhagia, V. 88
Opisthotonus, V. 181 C. 48
Opodeocele, Sag. 59
Orgasmus, L. 133
Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 Sag. 253 M. 365
C. 56
Oscedo, S. 140 V. 263 Sag. 247
Oscheocele, S. 41 V. 397 C. 81
Oscheophyma, Sag. 44 C. 81
Oscitans, V. 31
Oscitatio, L. 151

- Osteocopus, V. 176
 Osteosarcofis, M. 367
 Ostocopus, S. 184 L. 61 *Sag.* 143 M. 359
 Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148 *Sag.* 156 M. 359 C. 7
 Otitis, V. 48
 Oteplatos, V. 102
 Otopuofis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 172 V. 87 *Sag.* 206
 Oxyphonia, V. 255 C. 112
 Ozaena, L. 254 V. 500 C. 145

P

- Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 *Sag.* 237 C. 54
 Panaritia, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264 *Sag.* 233
 Panophobia, S. 227 L. 75 *Sag.* 339 C. 66
 Papula, S. pag. 8 L. 276 *Sag.* 7 C. 7
 Paracentesis, *Sag.* 88
 Paracufis, S. 159 *Sag.* 265 C. 97
 Paracyifis, V. 326
 Paraglossa, S. 45 V. 365 *Sag.* 48
 Paralysis, S. 169 L. 104 V. 226 *Sag.* 275 M. 364
 C. 43
 Paraphymosis, V. 349 C. 7
 Paraphonia, S. 168 C. 112
 Paraphrenefis, S. 102 L. 26 C. 11
 Paraphrenitis, V. 55 C. 11
 Paraphrosyne, S. 232 L. 66 V. 330 *Sag.* 345 C. 67
 Paraplegia, L. 102 V. 227 C. 43

- Paraplexia, S. 171 *Sag.* 277 C. 43
Paronychia, S. 21 L. 259 V. 345 *Sag.* 26 C. 7
Parorchidium, S. 59 *Sag.* 66
Parotis, S. 17 V. 370 *Sag.* 22 C. 133
Parturitio, L. 204
Parulis, V. 362 C. 7
Pavor, V. 339
Pelada, V. 529
Pelioma, V. 451
Pemphigus, S. 93 *Sag.* 291 C. 34
Pemphingodes, V. 43
Periadynia, V. 155
Pericarditis, V. 53 C. 13
Perinaeocele, *Sag.* 62
Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 *Sag.* 311 C. 11
Peritonitis, V. 62 C. 14
Peritonoeorixis, *Sag.* 64
Pernio, L. 259 V. 350 C. 7
Pertussis, C. 57
Pestilentialis, V. 33 C. 27
Pestis, S. 91 L. 2 *Sag.* 289 C. 30
Petechia, L. 5 V. 452 C. 35
Petechialis, V. 38
Phagedaena, V. 488 C. 146
Phalacrotis, V. 528
Phalangofis, V. 533
Phantasma, L. 73 V. 287. C. 95
Phimosis, S. 22 L. 298 V. 348 *Sag.* 27 C. 7
Phlegmatia, S. 282 *Sag.* 109 C. 75
Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 *Sag.* 299 C. 7
Phlogofis, V. 220 C. 7

- Phlyctaena, S. pag. 9 L. 274 V. 442 *Sag.* 8 C. 139
Phlyxacion, V. 450
Phoenigmus, S. 308 *Sag.* 134
Phoxos, V. 511
Phrenismus, V. 45 C. 9
Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 *Sag.* 303 C. 9, 6
Phricasmus, *Sag.* 239
Phricodes, V. 25
Phthiriasis, S. 310 V. 324 *Sag.* 136
Phthisis, S. 276 L. 209 V. 310 *Sag.* 101 C. p. 158
Phygethon, V. 357
Phyma, V. 359
Physconia, S. 283 V. 325 *Sag.* 110 M. 367 C. 82
Phyocele, V. 416
Phyocephalus, S. 286 *Sag.* 113
Phyfometra, S. 290 *Sag.* 117 C. 74
Pica, S. 222 V. 301 *Sag.* 334 C. 103
Pinnula, V. 432
Piptonychia, V. 484
Pituitaria, V. 111 C. 61
Pityriasis, V. 476
Pladarotis, V. 431
Plancus, V. 545
Plautus, V. 545
Plethora, L. 226 *Sag.* 105
Pleuritica, L. 53
Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 *Sag.* 305 C. 11
Pleurodyne, S. 148 V. 138 *Sag.* 254 M. 360 C. 22
Plica, L. 314 V. 323 C. 90
Plicatio, V. 470

- Pneumatosis, S. 280 V. 391, 156 *Sag.* 107 C. 72
Pneumonia, C. 11
Pneumonica, L. 54
Pnigma, V. 270
Podagra, V. 175 C. 24
Podagrifica, V. 69 C. 24
Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295 *Sag.* 336 C. 102
Polymerisma, *Sag.* 74
Polypus, V. 377 C. 134
Polysarcia, S. 279 L. 214 V. 540 *Sag.* 106 M. 367
C. 71
Porrido, V. 476
Porrus, V. 427 C. 134
Presbytia, L. 308 C. 94
Pressura, L. 261
Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173 *Sag.* 227
Proctalgia, S. 214 *Sag.* 171 M. 362 C. 7
Proctica, L. 59 V. 167
Proctitis, L. 30 C. 7
Proctorrhoea, *Sag.* 193
Profusio, L. 240 C. 117
Prolapsus, L. 293 C. 143
Proptoma, S. 46. *Sag.* 49.
Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136 *Sag.* 149
Psellismus, S. 167 L. 138 *Sag.* 273 C. 113
Psellotis, V. 259 C. 113
Pseudoblepsis, C. 95
Psophos, V. 177
Psora, L. 266 V. 320 C. 149
Psoriasis, V. 174
Psydracia, S. 9 V. 442 *Sag.* 14

E e e

- Pterygium, S. 26 L. 296 V. 433 *Sag.* 31
 Ptilofis, V. 531
 Ptosis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261 L. 177 V. 103 *Sag.* 197 C. 125
 Pudendagra, S. 215 L. 58 V. 168 *Sag.* 172
 Punctura, S. 64 L. 244 *Sag.* 79 C. 145
 Puorrhœa, V. 106
 Puoturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 *Sag.* 292 C. 35
 —— scorbutica, V. 443
 Pustula, S. pag. 8 L. 275 *Sag.* 6 C. 7
 Pyrofis, S. 200 *Sag.* 158 C. 58
 Pyuria, S. 266 *Sag.* 201

Q

- Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 *Sag.* 326 C. 2
 —— duplex, V. 13
 —— triplex, V. 14
 Quintana, V. 4 C. 2
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 *Sag.* 324 C. 3
 —— continua, V. 15

R

- Rabies, L. 85 *Sag.* 344
 Rachialgia, S. 211 *Sag.* 168 C. 59
 Rachitis, S. 294 L. 213 V. 312 *Sag.* 120 C. 83
 Rachofis, V. 503
 Ranula, V. 380
 Raphania, L. 135 V. 192 C. 52

- Raucedo, L. 146 C. 40, 112
Raucitas, V. 252 C. 40, 112
Renchus, V. 271
Rhagas, L. 249 S. 75 V. 467 Sag. 96
Rhenophonia, V. 256 C. 112
Rheuma, S. 149 Sag. 255 C. 40
Rheumatica, V. 74
Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 Sag. 144 M. 358
C. 22
Rhicnosis, V. 542
Rochmos, V. 272
Rhoeas, V. 520
Rhopalosis, V. 323 C. 90
Rhysemata, V. 521
Rigo, S. 132 L. 141 V. 187
Rifus, L. 148
— fardonicus, V. 210
Rodatio, V. 532
Ronchus, V. 272
Rubeola, S. 94 L. 4 Sag. 293 C. 28
Ructus, L. 182 V. 215
Ruminatio, V. 216
Ruptura, S. 69 L. 238 V. 466 Sag. 84

S

- Saniodes, V. 550
Sarcocele, V. 415
Sarcoma, S. 23 L. 295 V. 376 Sag. 28 C. 134
Sarcoftosis, M. 367
Sardiasis, L. 125 V. 209
Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 Sag. 340 C. 104, 105

- Scabies, S. 304 V. 444 *Sag.* 130 C. 149
Scarlatae, V. 454
Scarlatina, S. 98 V. 39 *Sag.* 294 C. 29
Scelotyrbe, S. 136 V. 195 *Sag.* 243 C. 51
Schirrus, S. 14 L. 284 V. 374 *Sag.* 19 C. 131
Sclopetoplagia, *Sag.* 80
Scoliosis, V. 512
Scorbutus, S. 301 L. 224 V. 318 *Sag.* 127 M. 368
C. 86
Scotomia, L. 111
Screatus, L. 178
Scrophula, S. 295 V. 367 *Sag.* 121 M. 368 C. 84
Seisis, V. 512
Seline, V. 463
Septana, V. 6 C. 2
Serpigo, L. 268 V. 443
Sextana, V. 5 C. 2
Singultus, S. 141 L. 153 V. 212 *Sag.* 248
Sinus, S. 73 V. 492 *Sag.* 92 C. 146
Siriasis, V. 34 C. 9
Soda, L. 47 V. 154 C. 45, 58
Somnambulismus, S. 221 L. 77 *Sag.* 333 C. 68
Somnium, V. 339 C. 68
Somnolentia, L. 96 V. 233
Spanopogon, V. 556
Sparganofis, V. 372
Spasma, V. 479
Spasmus, L. 121
— oesophagi, V. 217
— cynicus, V. 209
— maxillae inferioris, V. 208
Sphacelismus, L. 32 C. 9

- Sphacelus, L. 235 V. 328 C. p. 87
Spina bifida, V. 386 C. 77
Spinola, L. 290 C. 77
Splenalgia, S. 206 *Sag.* 164
Splenica, L. 52
Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 *Sag.* 313 C. 18
Splenocele, S. 54 V. 412
Staphyloma, S. 36 V. 421 *Sag.* 39
Staphylosis, V. 422
Steatites, V. 390 C. 71
Steatoma, V. 420
Sterilitas, L. p. 104 *Sag.* 211 C. 125
Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204 *Sag.* 246
Stertor, S. 143 L. 156 V. 271 *Sag.* 250
Stigma, V. 457
Stomacace, S. 241 L. 176 V. 85 *Sag.* 176 C. 39
Strabismus, S. 116 L. 305 V. 514 *Sag.* 222 C. 114
Stranguria, L. 197 V. 163
Stridor, L. 136
Struma, L. 285 C. 84
Stupiditas, V. 336 C. 65
Stupor, S. 189 L. 105 *Sag.* 148
Stymatosis, V. 94
Subluxatio, V. 473
Subsultus, L. 134 *Sag.* 232
Sudamen, L. 322
Sudamina, V. 446
Sudor, L. 208 C. 118
Suffocatio, L. 158
——— hysterica, V. 196
Suffusio, S. 217 *Sag.* 329 C. 95

- Sugillatio, L. 231 C. 130
 Suppuratoria, V. 78
 Surditas, V. 247 C. 96
 Suspirium, L. 150 V. 262
 Sufurrus, V. 292
 Sutura, *Sag.* 87
 Sycosis, V. 490 C. 145
 Syncopalis, V. 29
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 *Sag.* 280 C. 44
 Synizesis, V. 240 C. 92
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 4 et 6
 Syphilis, S. 300 L. 6. V. 319 *Sag.* 126 C. 85
 Syrigmos, S. 219 *Sag.* 331 C. 97
 Syringmos, L. 72

T

- Tabes, S. 275 L. 210 V. 309 *Sag.* 100 C. 69
 Talpa, V. 420
 Tarantismus, S. 230 L. 84 V. 193 *Sag.* 342
 Tenesmus, S. 257 L. 194 V. 166 *Sag.* 192
 Terminthus, V. 381 C. 7
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 *Sag.* 325 C. 1
 ——— duplex, V. 12
 Testudo, V. 420
 Tetanus, S. 122 L. 127 V. 180 *Sag.* 228 M. 363
 C. 48
 Tetartophya, S. 86 L. 22 *Sag.* 323 C. 2
 Therioma, V. 486 C. 145
 Thlasis, V. 471
 Tinea, S. 305 L. 264 V. 497 *Sag.* 131 C. 147

- Tofus, V. 424
Torpor, V. 224
Tortura, L. 304
Trachelophyma, *Sag.* 33
Traulotis, V. 258 C. 113
Tremor, S. 129 L. 131 V. 184 *Sag.* 236 C. p. 196
Trichiasis, L. 317 V. 517
Trichoma, S. 311 *Sag.* 137 C. 90
Trismus, S. 117 L. 124 V. 207 *Sag.* 223 M. 363 C. 48
Tritaeophya, S. 85 *Sag.* 322 C. 1
Tritaeus, L. 21 C. 1
Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 *Sag.* 249 C. 40
Tylloma, V. 429 C. 136
Tympanites, S. 291 L. 220 V. 316 *Sag.* 118 M. 367
C. 73
Typhomania, S. 178 L. 97 V. 23 *Sag.* 284 C. 42
Typhus, S. 82 *Sag.* 319 C. 5

V

- Vaga, V. 10 C. 2
Valgus, V. 544
Varicella, V. 42, 448 C. 27
Variola, S. 92 L. 3 V. 447 *Sag.* 290 C. 26
Variofosa, V. 35 C. 26
Varix, S. 33 L. 283 V. 407. *Sag.* 36 C. 129
Varus, S. p. 9 L. 270 V. 436 et 543 *Sag.* 10 C. 7
Verruca, S. 25 L. 278 V. 426 *Sag.* 30 C. 135
Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293 *Sag.* 328
Vesania, L. 70 C. 66
Vibex, L. 321 V. 458
Vitiligo, S. 2 V. 459 *Sag.* 2

- Ulcus, S. 71 L. 250 C. 146 *Sag.* 89
Vociferatio, L. 147
Volatrica, L. 63 V. 178 C. 22
Vomica, L. 181 V. 104 C. p. 106
Vomitus, S. 251 L. 184 V. 214 *Sag.* 186 C. 45
Uredo, L. 8. C. 33
Urorrhoeas, V. 548
Urticaria, V. 361, 456 C. 33
Urticata, V. 40 C. 33
Vulneraria, V. 77
Vulnus, S. 63 L. 241 V. 465 *Sag.* 78 C. 145

X

Xirafia, V. 527

Z

Zoster, V. 344

C A T A L O G U S

Morborum a nobis omissorum, quos omis-
sisse fortassis non oportebat. *Vide Prae-
legomina, pag. xxi.*

Aglaëtatio, L.

Agalaxis, V.

Alopecia

Anchylops

Ægilops

Anchylosis, L.

Anchylosis, V.

Angina, S. et L.

Angina pectoris

Antipathia

Beriberia

Cardiogmus

Cephalaea

Cephalalgia

Distortio

Aglutitio

Acataposis

Oesophagismus

Dystocia

Parturitio et alii gravidarum et parturientium
morbi

Elcosis

Effera

Hemicrania

- Leucorrhœa ex vitio locali
Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis
partibus
Malis
Cocyta, L.
Melaena
Melaficterus
Melanchlorus, V.
Myocoilites
Necrosis
Odaxismus
Dentitio et alii infantum morbi
Paralyfis partis singularis ex vitio muscularum
Physocephalus
Pnigma
Catarrhus suffocativus *Aud.*
Pyuria
Puoturia
Sterilitas utriusque sexus
Acyifis, V.
Stymatofis
Tarantifmus
Venena
Vermes

I N D E X.

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numeri indicant paginam.

- Amaurosis a myofi, 304.
- Amaurosis a synchyfi, 304.
- Amblyopia hydrophthalmitica, 305.
- Amphimerina anginosa, 97.
- Amphimerina biliosa, 56.
- Amphimerina cardiaca, 53.
- Amphimerina catarrhalis, 173.
- Amphimerina epiala, 54.
- Amphimerina hemitritaeus, 49.
- Amphimerina humorosa, 54.
- Amphimerina hungarica, 55.
- Amphimerina paludosa, 56.
- Amphimerina peripneumonica, 102.
- Amphimerina phricodes, 54.
- Amphimerina pseudohemitritaeus, 49.
- Amphimerina semiquartana, 61.
- Amphimerina semiqvintana, 53.
- Amphimerina spasmodica, 62.
- Amphimerina syncopalis, 54.
- Amphimerina tussiculosa, 174. et 232.
- Angina spasmodica, 215.
- Aphonia paralytica, 194.

- Arthritis rheumatica, 128.
Ascites flatulento-peritonaeus, 274.
Ascites sanguineo uterinus, 283.
Ascites uterinus, 283.
Asphyxia a carbone, 188.
Asphyxia congelatorum, 189.
Asphyxia flatulenta, 190.
Asphyxia foricariorum, 188.
Asphyxia a fumis, 188.
Asphyxia hysterica, 192.
Asphyxia immersorum, 190.
Asphyxia a mephitide, 188.
Asphyxia a musto, 188.
Asphyxia a pathemate, 189.
Asphyxia fideratorum, 189.
Asphyxia spinalis, 185.
Asphyxia suspensorum, 190.
Asthenia a hydrocephalo, 187.
Asthma catarrhale, 228.
Asthma febricosum, 231.
Asthma a gibbo, 229.
Asthma metallicum, 230.
Asthma pneumodes, 228.
Asthma a polypo cordis, 230.
Asthma pulvulerentorum, 230.
Atrophia febrifeca, 268.
Atrophia infantilis, 268.
Atrophia rachitica, 268.

C

- Cardialgia inflammatoria, 111.
Cardialgia sputatoria, 233.
Catarrhus Bellinsulanus, 97.
Cephalaea febricosa, 64.
Cephalgia catarrhalis, 174.
Cephalgia inflammatoria, 91.
Cephalgia intermittens, 64.
Cholera sicca auriginosa, 237.
Convulsio Indica, 212.
Convulsio a nervi punctura, 215.
Convulsio raphania, 218.
Convulsio ab ustilagine, 219.

D

- Diarrhoea carnosa, 180.
Dysenteria a catharticis, 181.
Dysenteria a mesenterii vomica, 244.
Dysenteria Parisiaca, 181.

E

- Eclampsia febricosa, 50.
Eclampsia typhodes, 217.
Enteritis mesenterica, 110.
Ephemera Britannica, 77.

- Ephemera dichomene, 63.
Ephemera fudatoria, 77.
Epilepsia febricosa, 50.
Erysipelas ambustio, 85.
Erysipelas symptomaticum, 86.
Erysipelas a vespis, 86.

H

- Hepatalgia apostematoso, 116.
Herpes Zoster, 143.
Hydrometra ovarii, 281.
Hysteralgia febricosa, 64.
Hysteria febricosa, 50.

I

- Ischias ex abscessu, 129.
Ischias intermittens, 64.

L

- Lumbago apostematoso, 129.
Lumbago ab arthrocace, 129.
Lumbago psoadica, 129.

M

- Menorrhagia difficultis, 360.

- Miliaris nautica, 74.
Miliaris purpurata, 74.
Miliaris sudatoria, 78.
Mutitas a glossolyfi, 194.

N

- Nephralgia arenosa, 117.
Nephralgia arthritica, 117.
Nephralgia calculosa, 117.
Nephralgia febricosa, 64.
Nephralgia purulenta, 117.
Nephralgia rheumatica, 119.

O

- Ophthalmia febricosa, 64.
Orthopnoea hysterica, 226.
Orthopnoea spasmodica, 226.

P

- Phrenitis apyreta, 263.
Phrenitis inanitorum, 262.
Pleuritis hepatica, 115.
Pleuritis periodica, 51.
Pleuritis splenica, 116.
Pleurodyne parapleuritis, 104.
Pleurodyne verminosa, 106.

- Pleurodyne vomica, 106.
 Psydracia a vespis, 86.
 Pyuria arthritica, 357.
 Pyuria mucosa, 357.
 Pyuria viscida, 357.

M

Q

- Quotidiana deceptiva, 53.
 Quotidiana epileptica, 50.
 Quotidiana soporofa, 49.

S

- Scarlatina anginosa, 138.
 Scelotyrbe festinans, 216.
 Scelotyrbe verminosa, 216.
 Scrophula mesenterica, 267.
 Splenalgia suppuratoria, 116.
 Synocha catarrhalis, 174.
 Synocha miliaris, 79.
 Synochus dysenteriodes, 80.
 Synochus hiemalis, 70.
 Synochus pleuritica, 70. et 105.
 Synochus rheumatizans, 70.
 Synochus scorbutica, 71.

T

- Tabes dorsalis, 269.
Tabes a hydrope, 270.
Tabes nutricum, 269.
Tabes a sanguifluxu, 269.
Tabes sudatoria, 269.
Tabes syphilitica, 270.
Tetanus febricofus, 50.

V

- Variola lymphatica, 134.

F I N I S.



THE EXAPCILLOM

T

Type charters 200
Type's original 200
Type's beginning 200
Typescript 200

V

Variable 100

H I U

