


Rezultati popisa netopirjev med akcijo “BioJuriš” - Žejna dolina 2020

Primož Presetnik in Eva Pavlovič


Letošnje leto se je začelo zmešano zaradi COVID-19, zato ni bilo mogoče rezervirati stavbe, ki bi služila kot center akcije Bioblitz Slovenija. O namenu akcije si preberite prispevek v *Glej netopir!* iz leta 2017. Da bi omogočili čim širšo udeležbo, so organizatorji modro sklenili, da akcije ne omejijo na določen datum. Ponudili so časovno okno med 5. in 14. junijem, v katerem smo si lahko udeleženi sami izbrali najbolj ugoden dan za popisovanje. Kot območje popisa so določili Žejno dolino severno od Hotedršice (Slika 18). Skupne rezultate popisovanja vseh raziskovanih skupin (SHS) in seznam vrst s karto najdišč (CKFF) si lahko ogledate na spletnih straneh organizatorjev.

O netopirjih na očrtanem območju (Slika 18) ni bilo predhodno nobenega podatka. No ja, enega svatujočega samca dvobarvnega netopirja (*Vespertilio murinus*) bi mirno lahko pripisali tudi temu območju, saj točka njegovega opažanja iz podatkovne zbirke CKFF pade le 17 metrov izven meja območja. Znani so še mali podkovnjaki (*Rhinolophus hipposideros*) iz Revenovega brezna, ki leži 145 metrov izven meja. V enokilometrski okolici sta znani še kotišči malih podkovnjakov in usnjebradih uhatih netopirjev v cerkvi na Medvedjem Brdu, le malo dlje pa je v Pucovem breznu Griša Planinc videl nekaj velikih podkovnjakov (*R. ferrumequinum*).

Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je prvi možni vikend zvečer deževalo, pa tudi preko tedna je bilo zvečer bolj ali manj kislo vreme. Sta pa Teo Delić in Maja Zagmajster, ki sta iskala žužke po jamah, poročala o par opažanjih malih podkovnjakov. V petek, 12. junija, sva se le lahko odpravila na teren, Samo Grgurevič pa se nama je pridružil malo kasneje, saj je prej z avtom nenačrtno obiskal mnogo makadamskih cest v okolici popisnega območja.



SLIKA 17. a) Skupina brkatih netopirjev (*Myotis mystacinus* s. lat.) in b) zatočišče (foto: Primož Presetnik).



SLIKA 18. Mesta najdb netopirjev med akcijo "BioJuriš" – Žejna dolina 2020.

Sklenili smo, da nam jamski vhodi niso všeč in smo raje postavili mreže okoli mlake na severnem delu območja. Razpeli smo tudi nove društvene mreže, vsega skupaj kar 51 m mrež. In ...? Nič. Netopirjev ni bilo oz. popravek, ko smo sneli zadnjo mrežo, je en priletel, nam v posmeh, točno tja, kjer je še pred minuto stala mreža. Zvečer smo v okolici sicer lahko opazovali Savijevega netopirja med prehranjevanjem, vendar je tudi ta hitro izginil. Nato smo še z avtom malo križarili po cestah (Slika 18) in kljub temu, da aktivnost netopirjev ni bila zelo velika, smo z ultrazvočnimi detektorji slišali nekaj vrst. Malo več upov smo polagali na avtomatične snemalce, pa je eden, postavljen pred jamski vhod, odpovedal pokornost, drugi, postavljen na rob slavnega barja z ogroženo orhidejo Loeselijevo grezovko, pa je posnel le 21 mimoletov.

Tako da je bil višek naših uspehov najdba zatočišča brkatih netopirjev, ki smo jih tik pred sončnim zahodom videli viseti za opažem gospodarskega poslopja, blizu mlake, kjer smo mrežili (Slika 17b). Pet se jih je stiskalo v eni gruči (Slika 17a), med njimi je bila tudi ena samica, ki je lani že dojila, letos pa ni kazala znakov brejosti, en lanskoletni samec pa je visel sam na drugi strani stavbe.

Skupaj smo tako našli devet vrst netopirjev (zvezdica označuje tiste, ki jih je posnel avtomatski detektor ob rastišču grezovke): malega podkovnjaka (*Rhinolophus hipposideros*)*, brkatega netopirja (*Myotis mystacinus* s. lat.), navadnega mračnika (*Nyctalus noctula*)*, gozdnega mračnika (*Nyctalus leisleri*)*, malega netopirja (*Pipistrellus pipistrellus*)*, drobnega netopirja (*Pipistrellus pygmaeus*), belorobega/Nathusijevega netopirja (*Pipistrellus kuhlii/nathusii*), Savijevega netopirja (*Hypsugo savii*) in poznega netopirja (*Eptesicus serotinus*).

Očitno se bo v Žejno dolino še potrebno vrniti.

VIRI

CKFF: http://www.biportal.si/projekti_podatki.php

SHS: <http://bioblitzslovenija.weebly.com/bioblitz-slovenija.html>