

Fotoživ

Svoje fotografije za naslednjo izdajo lahko pošljete do 20. novembra 2024 na bilten.trdoziv@gmail.com. Avtorju fotografije sta pripisana še približen kraj in datum posnetka.



V žaru borbe samcev zelenca (*Lacerta viridis / bilineata*).
(foto: Rudi Kraševac, 28. 4. 2024, Krajinski park Lahinja)



Visokogorski kali so poleg mnogih drugih živali tudi življenjski prostor kačjih pastirjev in pupkov. Slika ponazarja iznajdljivost samice planinskega pupka (*Ichthyosaura alpestris*), ki je jajca ob odsotnosti vegetacije v kalu premeteno zavila v lev zelenomodre deve (*Aeshna cyanea*). Lev z jajci je bil za namen fotografije vzet iz vode. (foto: Nik Šabeder, 14. 7. 2024, Ratitovec)



Triglavski svišč (*Gentiana terglouensis*) je v svoji knjigi *Kranjske alpske rastline (Plantae alpinae Carniolicae)* leta 1782 kot novo vrsto opisal Balthasar Hacquet (1739/1740–1815), ki je rastlino opazil na pobočjih Triglava in jo poimenoval po naši najvišji gori.
(foto: Špela Pungaršek, 6. 8. 2014, Kanjavec)



Samec in samica barjanske deve (*Aeshna juncea*) sta v paritvenem koleslju poiskala trenutek počitka na vejici rušja (*Pinus mugo*). Še v prvi polovici preteklega desetletja so bile populacije vrste na Pohorju v dobrem stanju. Kako kaže barjanski devi v Sloveniji danes, ne vemo, saj se monitoring kačjih pastirjev pri nas žal ne izvaja. Drugod po Evropi odonatologi beležijo znaten upad njene številčnosti in razširjenosti.

(foto: Matjaž Bedjanič, 11. 9. 1999, Pohorje – Črno jezero)



Jamarski tim Garnim & Tim slavnega Društva za raziskovanje jam Ljubljana je v Breznu v Brdih nad Lipanco na minus 40 m globine našel navadno krastačo (*Bufo bufo*). Nič posebnega za jame, le da je to sedaj najvišji podatek o pojavljanju krastač pri nas, saj je jamski vhod na višini 1.913 m n. m. Leži tudi 300 m višje in 850 m zračne razdalje od najbližjega nam poznane mrestišča v kalu 100 m SSV od Blejske koče na Planini Lipanca.
(foto: Tomaž Kranjc, 19. 7. 2024)