


strani listnega peclja notranjih in zunanjih listov v rozeti, pege na listnih krpah in/ali delu lista, ki povezuje listne krpe, položaj zunanjih ovojkovih listov in njihove dimenzije, premer popolnoma odprtega koška, barvo prog na jezičkih cvetov, barvo brazde. Vsaj nekatere od omenjenih značilnosti lahko zabeležimo s fotografiranjem.

Pri nekaterih skupinah regratov so za določevanje potrebne tudi zrele rožke, kar prinaša dodatne težave. V času, ko regrat plodi, so rastline že preveč razvite za ustrezno nabiranje. Nezreli plodovi včasih med sušenjem še nekoliko dozoriijo; druga možnost je, da cvetoči primerki razvijejo plodove v vazi.

Avtorja opozarjata tudi, naj posušenih primerkov ne lepimo v herbarijsko polo. Pri določevanju je marsikdaj treba pogledati primerek tudi z druge strani. Prav tako odsvetujeta nabiranje več primerkov za eno herbarijsko polo. Na enem rastišču neredko raste skupaj tudi več vrst. Z opazovanjem nekaterih za regrate sistematsko pomembnih znakov, kot sta oblikovanost listov in položaj zunanjih ovojkovih listov, bomo hitro ugotovili, kateri skupaj rastoči regrati so si podobni in verjetno pripadajo isti vrsti, kateri pa se od teh razlikujejo. Včasih je prav zanimivo videti značilnosti, ki jih pri nabiranju za pomladansko solato spregledamo. Resnici na ljubo – regrat za solato navadno nabiramo pred cvetenjem. ✱



S puščicami so nakazani nekateri za določanje regratov pomembni znaki, kot so a) barva proge na jezičkih cvetov, b) barva brazde pestiča, c) oblika in velikost stožčastega podaljška telesa rožke, č) položaj zunanjih ovojkovih listov in prisotnost kožnatega roba na njih, d) dlakavost betve koška, e) oblika končne listne krpe in f) stranskih listnih krp listov, g) oblika povezave med listnimi krpami, prisotnost manjših krp ali zobcev med njimi, h) prisotnost peg na listih in njihova velikost, i) dlakavost listov in j) okriljenost listnega peclja. Zato je pomembno nabirati in herbarizirati rastline tako, da je te znake možno opazovati, stanja znakov, ki so pri herbariziranih rastlinah težje vidna ali sploh ne, pa zapisati že ob nabiranju svežih rastlin.

Trachemys scripta, kako ti je ime?

Besedilo: Gregor Lipovšek

Ime popisana sklednica se v Sloveniji uporablja za vrsto *Trachemys scripta*, v katero sodita podvrsti rdečevratka in rumenovratka. Ime se uporablja tudi v dokumentih državnih institucij. Eden zadnjih primerov so *Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica* (*Trachemys scripta*), ki jih je Zavod RS za varstvo narave pripravil marca 2018. Ker gre za terminološko popolnoma napačno uporabo rodovnega imena *Trachemys*, v praksi velikokrat prihaja do nejasnosti in zmede. Na to nakazuje na primer dejstvo, da ljudje sklepajo, da se lahko popisana sklednica križa z močvirsko sklednico (*Emys orbicularis*), saj ime napačno nakazuje, da sta obe sklednici. V naravi se rodova *Emys* in *Trachemys*

s svojimi predstavniki pojavljata na različnih celinah in med njima ni znanega križanja.

V Herpetološkem društvu za odpravo neskladja predlagamo, da se za rod *Trachemys* uporablja ime **gizdave želve**, ki se je v preteklosti že uporabljalo, za vrsto *Trachemys scripta* pa ime **okrasna gizdavka**. Podvrsti *Trachemys scripta scripta* in *Trachemys scripta elegans* naj obdržita svoji že splošno uveljavljeni imeni, torej **rumenovratka** in **rdečevratka**. Slovensko ime družine, v katero spadata oba rodova, – sklednice (*Emydidae*) – se ohrani. ✱