

PTICE NAŠIH KRAJEV

// ureja Al Vrezec

Naslov urednika rubrike za kopije objavljenih prispevkov:
Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana, Slovenija,
e-mail: al.vrezec@nib.si



Rdečegrli slapnik (*Gavia stellata*)


V novembру 2007 je osebek na Cerkniškem jezeru uspešno lovil rdečeperke, pri čemer je bil uspešen v treh od sedmih potopov v času 7 minut [Bordjan, D. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 173].
foto: Eva Vukelič



Polarni slapnik (*Gavia arctica*)

Na Blejskem in Bohinjskem jezeru ter na HE Moste prezimuje do 20 % vodnih ptic v SZ Sloveniji, med njimi pa sta v slovenskem merilu občasno zelo številna polarni slapnik in čopasti ponirek [Jančar, T. et al. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 141-157].

foto: Kajetan Kravos



Zlatouhi ponirek (*Podiceps auritus*)

Status vrste na jezerih Gorenjske je redek zimski gost, saj je bil med leti 1995-1996 opazovan le en osebek na Blejskem jezeru v decembru 1995 in en osebek na Bohinjskem jezeru v januarju 1996 [Jančar, T. et al. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 141-157].

foto: Edwin Winkel/Saxifraga



Labod grbec (*Cygnus olor*)

Gorenjska jezera, Blejsko, Bohinjsko in HE Moste, so za gnezditve vodnih ptic manj pomembna, saj tod gnezdite le dve vrsti, mlakarica in labod grbec, slednji le na Bledu in občasno na HE Moste [Jančar,

T. et al. (2007): *Acrocephalus* 28 (135):

141-157].


foto: Franc Vrtačnik



Raca žličarica (*Anas clypeata*)

Ob zimskem preštevanju vodnih ptic v januarju 2007 je bilo med racami naštetih največ osebkov do sedaj pri raci žličarici, mlakarici, konopnici in tatarski žvižgavki [Božič, L. (2007): *Acrocephalus* 28 (132): 23-31].

foto: Kajetan Kravos



Siva gos (*Anser anser*)

Doslej največja skupina na Cerkniškem jezeru, 54 ptic, je bila opazovana v decembru 2006, poleg teh pa so bile takrat še opazovane za območje največje jate žerjavov, rac žličaric, konopnic in prib [Kmecl, P. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 175].


foto: Ivan Esenko



Raca žličarica (*Anas clypeata*)

Ob zimskem preštevanju vodnih ptic v januarju 2007 je bilo med racami naštetih največ osebkov do sedaj pri raci žličarici, mlakarici, konopnici in tatarski žvižgavki [Božič, L. (2007): *Acrocephalus* 28 (132): 23-31].

foto: Kajetan Kravos



Tatarska žvižgavka (*Netta rufina*)

Samica se je v juliju 2007 zadrževala na Račkih ribnikih, kjer je v tem letu gnezdilo tudi precejšnje število čopastih ponirkov [Bordjan, D. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 173].

foto: Tomi Trilar



Kragulj (*Accipiter gentilis*)

V mestnem okolju Ljubljane se vrsta občasno pojavlja po do sedaj zbranih podatkih v zimskem času, tod pa najverjetneje ne gnezdi [Figelj, J. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 165-167].

foto: Leon Kebe



Sokol selec (*Falco peregrinus*)

Jesenji in pozimi se sokoli selci pogostejo pojavljajo v mestu Ljubljana, kjer plenijo večinoma domače golobe, zaradi česar je mestno okolje verjetno pomembno lovišče za vrsto, čeprav tukaj najverjetnejne ne gnezdi [Figelj, J. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 165-167].

foto: Janez Papež



Mali orel (*Aquila pennata*)

V maju 2005 je bil med ujedami, ki so se selile čez pobočje Krna nad planino Zapleč, opažen tudi pri nas redek mali orel, in sicer temna oblika [Bordjan, D. (2007): *Acrocephalus* 28 (135): 174].

foto: Borut Rubinič



