

PTICE NAŠIH KRAJEV

//ureja Al Vrezec


Naslov urednika rubrike za kopije objavljenih prispevkov:
Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: al.vrezec@nib.si



Sredozemski viharnik (*Puffinus yelkouan*)
Naše morje je pomembno prehranjevališče te vrste, saj se tu pojavlja do 1,5 % evropske populacije v jatah do 1000 osebkov [Vrezec A. (2006): str. 81-85 v: Aransay N. (ed.): Proceedings of the first symposium on the mediterranean action plan for the conservation of marine and coastal birds. Vilanova i la Geltrú, (Spain), 17-19 November 2005, RAC/SPA pub., UNEP - MAP - RAC/SPA, Tunis]. foto: Luc Hoogenstein



Rožnati pelikan (*Pelecanus onocrotalus*)
Drugi je bil opazovan v Sloveniji v gramoznici Vrbina pri Krškem konec septembra 2006 [Klenovšek D. (2006): *Dolenjski list* 57 (40): 27]
foto: Branko Franc Brečko




Velika bela čaplja (*Egretta alba*)
Prvič v Sloveniji je bila pri Ptiju v decembru 2004 opazovana vzhodna podvrsta *E. a. modesta* [Vogrin M. (2005): *Biota* 6 (1/2): 79-80].
foto: Tone Trebar




Siva gos (*Anser anser*)
Nova gnezdlka Slovenije – par je v letu 2007 uspešno gnezdel v Renških glinokopih, kjer je vzgojil sedem mladičev [portal DOPPS: http://www.ptice.org/?action=press&level_one=aktualno&level_two=press&level_three=izjave].
foto: Miha Krofel



Mandarinica (*Aix galericulata*)
Že več let se samec pojavi ob izviru Vipave [Naglost O. (2006): *Lavec* 89 (2): 94].
foto: Tone Trebar



Kanja (*Buteo buteo*)
K nam pozimi zadejo tudi kanje iz oddaljenih krajev, saj so bile pri nas najdene obročkane ptice s Češke, Slovaške, Avstrije in Finske [Božič I.A. (2006): *Lavec* 89 (7/8): 344-345].
foto: Eva Vukelič



Gozdni jereb (*Bonasa bonasia*)
Sodeč po podatkih lovske statistike se je številčnost gozdnega jereba v Sloveniji od konca 60. let naprej drastično zniževala vse do danes [Galjot B. (2006): *Lavec* 89 (10): 468-471].
foto: Tomaž Mihelič

Prepelica (*Coturnix coturnix*)

Različni osvetljeni objekti so lahko tudi pogubna past za nočne selice, kakršna je denimo prepelica. Več osebkov je poginilo ob osvetljeni tovarni pri Novem mestu v oktobru 2005 [Hudoklin A. (2006): *Acrocephalus* 27 (128/129): 102]. foto: Janez Papež

**Kozača** (*Strix uralensis*)

Medvrstna teritorialnost kozače proti manjši lesni sovi je dokaj visoka in verjetno pomembno prispeva k prostorskemu ločevanju vrst v gorskih gozdovih, čeprav se je sicer v raziskavi na Krimu izkazalo, da je v splošnem vokalna aktivnost kozače dokaj nizka [Vrh P. & Vrezec A. (2006): *Razprave IV. razreda SAZU XLVII* (3): 99-105]. foto: Miha Krofel

**Mała čigra** (*Sternula albifrons*)

Edina slovenska gnezdkila, uvrščena na seznam Stredoziemskega akcijskega načrta, ki danes gnezdi zgolj še v Sečoveljskih solinah. [Vrezec A. (2006): str. 81-85 v: Aransay N. (ed.): Proceedings of the first symposium on the mediterranean ... of marine and coastal birds. Vilanova i la Geltrú, (Spain), 17-19 November 2005, RAC/SPA pub., UNEP - MAP - RAC/SPA, Tunis]. foto: Piet Munsterman/Saxifraga

**Veliki skovik** (*Otus scops*)

Oglašanje samcev je individualno značilno in zato spektrografska analiza njihovih klicev omogoča ločevanje posameznih osebkov, kar je zlasti pomembno pri natančnem določanju števila samcev v kljalnih skupinah [Denac K. & Trilar T. (2006): *Razprave IV. razreda SAZU XLVII* (3): 87-97]. foto: Iztok Škornik

**Lesna sova** (*Strix aluco*)

Sove se odzivajo tudi na oglašanja drugih vrst sov. Tako se na primer lesna sova odzove tudi na oglašanje kozače, še bolj pa kozača na oglašanje lesne sove, kar kaže na posebej močan negativen odnos med vrstama [Vrh P. (2005): Dipl. delo, Biotehniška fakulteta, Univ. v Ljubljani, Ljubljana]. foto: Ivan Esenko

**Čuk** (*Athene noctua*)

Na popisu na Krasu, Vrheh in delu slovenske Istre pod Kraškim robom je bilo v letu 2007 preštetih 41 čukov [Race H. (2007): *Primorske novice* 24.03.2007: 14]. foto: Tomaž Mihelič

**Mała uharica** (*Asio otus*)

Male uharice se nerjedko pozimi klatijo ali celo selijo, in tako sta bili dve sovi, obročkani v okolici Ljubljane, kasneje najdeni prva ob sredozemski obali Francije, druga pa pri italijanskem kraju Valmarino [Božič I.A. (2005): *Lövec* 88 (2): 68-69]. foto: Dušan Klenovšek

**Belohrbti detel** (*Dendrocopos leucotos*)

Glede na druge žolne in detle ima belohrbti detel najožjo nišo, ki se najbolj prekriva s triprstim detлом, najmanj pa s črno žolno, in sicer v gozdnih sestojih z veliko odmrlje lesne mase nad 900 m nadmorske višine [Perušek M. (2006): Mag. delo, Biotehniška fakulteta, Univ. v Ljubljani, Ljubljana]. foto: Tomaž Mihelič

Pegam (*Bombycilla garrulus*)

V januarju 2005 se je pri Mozirju v Zgornji Savinjski dolini med večjo ohladitvijo pojavila jata kaksnih 50 pegamov, ki so se tam zadržali vse do prve otoplitve v februarju [Cerar M. (2005): *Lövec* 88 (4): 201]. foto: Tone Trebar

**Mali muhar** (*Ficedula parva*)

V dinarskih kočevskih gozdovih je vrsta ena največjih specialistov glede izbora habitata, saj ima izredno ozko nišo. Najdena je bila le nad 800 m n.v., zlasti v vlažnih vrtcačah s sklenjenim gozdom v fazi debeljaka, kjer prevladujejo listavci [Perušek M. (2006): Mag. delo, Biotehniška fakulteta, Univ. v Ljubljani, Ljubljana]. foto: Piet Munsterman/Saxifraga

**Pinoža** (*Fringilla montifringilla*)

V Sloveniji so bile do danes ugotovljene invazije kar 19 vrst ptic, med njimi v zadnjem času črne žolne, pegama, močvirške sinice, brgleza, rožnatnegra škorca, šoje, pinože, čizka, krivokljuna, dleska in kalina [Vrezec A., Tome D. & Denac D. (2006): *Ujma* 20: 125-136]. foto: Darinka Mladenovič

**Skalni strnad** (*Emberiza cia*)

V mrzlem januarju 2006 se je osebek dokaj redno prehranjeval po tleh v vaškem okolju v Zgornji Savinjski dolini [Cerar M. (2006): *Lövec* 89 (5): 261]. foto: Tomaž Mihelič