

PRESEK

List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

ISSN 0351-6652

Letnik 4 (1976/1977)

Številka 4

Strani 197–199

Danijel Bezek:

PODVOJITEV KOCKE

Ključne besede: matematika.

Elektronska verzija: <http://www.presek.si/4/4-4-Bezsek.pdf>

© 1977 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

PODVOJITEV KOCKE

V zapuščini grške matematične misli je tudi problem "o podvojitvi kocke".

S pomočjo šestila in neoznačenega ravnila konstruiraj rob kocke, ki ima dvakrat večjo prostornino kot enotska kocka.


Danes vemo, da je ta problem s klasičnim orodjem nerešljiv. Bralec pa si dokaz zanj lahko poišče v knjigi : I. Vidav - Rešeni in nerešeni problemi matematike.

Obstaja pa, podobno kot za nekatere druge probleme, neklasična konstrukcija te naloge.

Poiskati moramo rob kocke x , za katero bo veljalo:

$$x^3 = 2 \quad \text{ali} \quad x^3 - 2 = 0 \quad (1)$$

Konstrukcija



Točka C leži na krožnici enotskega kroga tako, da je $\angle BCS = 60^\circ$.

Na premici (B, C) poiščemo točko P s pomočjo označenega ravnila s premikanjem po premici, da so A, D, P kolinearne točke in je $\overline{DP} = 1$. Potem je daljica $\overline{BP}$ iskani rob x !

Dokaz

Po izreku o potenci točke na krog velja

$$\overline{PA} \cdot \overline{PD} = \overline{PC} \cdot \overline{PB}$$

$$\text{ali} \quad \overline{PA} = (x + 1) x \quad (2)$$

Izraz (2) kvadriramo in $\overline{PA}^2$ nadomestimo z vsoto kvadratov obeh katet ($\overline{AC} = \sqrt{3}$ in $\overline{CP} = x + 1$) pravokotnega trikotnika ACP .

$$(\sqrt{3})^2 + (x + 1)^2 = (x + 1)^2 x^2$$

Enačbo uredimo in dobimo

$$(x^3 - 2)(x + 2) = 0 \quad (3)$$

Od realnih pozitivnih rešitev te enačbe (3) pride v poštev le

tista, ki je skrita v podčrtanem delu enačbe, to pa je rešitev, ki smo si jo postavili za cilj pod (1).

Oglejmo si še "posplošeni problem o podvojitvi kocke". V tem primeru iščemo tako daljico x , ki zadošča enačbi:

$$x^3 = ba^2 \quad (4)$$

pri čemer zahtevamo, da je $a > b$. Če temu ni tako, lahko vedno najdemo tak $k \in \mathbb{N}$, da to dosežemo:

$$x^3 = b/k^2 \cdot (ak)^2$$


Enačbo (4) pomnožimo prvič z $x:x^4 = ba^2x$; in drugič z $b:bx^3 = a^2b^2$ in dobljeni enačbi seštejemo:

$$x^2(x^2+bx) = a^2(b^2+bx) \quad (5)$$

V enačbi (5) izraza v obeh oklepajih zapišemo kot razliko dveh kvadratov: $x^2((x+b/2)^2 - b^2/4) = a^2((b+x/2)^2 - x^2/4)$. Podčrtani del prenesemo na levo stran enačbe in obe strani enačbe korenimo s kvadratnim korenem in preuredimo v naslednje razmerje:

$$\sqrt{(x+b/2)^2 + (a^2-b^2)/4} : (x+2b) = a/2 : x \quad (6)$$

Konstrukcija količine x :



Narišemo pravokotni trikotnik s hipotenuzo a in kateto b . Na nosilki katete b poiščemo točko R ($\overline{QR} = 2b$); P je razpolovišče hipotenuze a . Skozi Q potegnemo vzporednico k premici (P,R) . Označeno ravnilo pomikamo po nosilki katete b tako, da so S, T, P kolinearne točke in je $\overline{ST} = a/2$. $\overline{SQ}$ je potem iskani rob x .

Dokaz

$\overline{P_1}$ je srednjica pravokotnega trikotnika s hipotenuzo a in kateto b : $\overline{P_1} = \sqrt{(a^2-b^2)/4}$

Iz slike razberemo naslednje sorazmerje:

$$a/2 : x = \overline{SP} : \overline{SR}$$

$\overline{SP}$ je hipotenuza $\triangle SP_1P$ in zato velja:

$$a/2 : x = \sqrt{(x+b/2)^2 + (a^2-b^2)/4} : (x+2b)$$

To pa je izraz, ki smo ga dobili pod (6) in x je res iskani rob kocke!

Naloga Konstruiraj rob kocke, ki bo prostorninsko enaka kvadru z robovi $a < b < c$!

Rešitev Osnovno ploskev kvadra spremenimo v ploščinsko enak kvadrat s pomočjo Evklidovega izreka v pravokotnem trikotniku. Tako pridemo do posplošenega problema o podvojitvi kocke in nalogo znamo rešiti!

Daniželj Bezek
