

ustanovljeno vajino toli že sedaj hvaljeno bralno in izobraževalno društvo. Tam se bodejo seveda učili kmetje sejati, orati, drva sekati, krmo sušiti, seveda vse le v senci. Razven tega pa jim bodejo še celo časniki na razpolago, kakor „Gospodar“, „Fihpos“, „Celjska reglača“, „Kranjski pankert“ itd. Oh, zares svitlejši dnevi nas pričakujejo! Toda nikdar jih ne smemo pričakovati od teh listov, pač pa od tega, da se je začelo razvijati pri nas tudi prav lepo naše naprednjaštvo. „Bit če dana“ . . . Bog daj, da bi bilo tako! Neustrašeni občani.

Razne stvari.

Vinsko sejme. Mestna občina v Gracu naznanja, da se bode vršilo 9. vinsko sejme (Weinmarkt) dne 16., 17., 18. in 19. sušca (marca) tega leta. Vsi vinorejci se opozarjajo na to sejme. Prodavalo se bode naravno vino in šampanec štajerskega pridelka, razven teh še stroji, ki se rabijo pri vinoreji in kletarska priprava. Javiti se je pri mestnem komiserijatu v Gracu in sicer do 6. t. m.

Gospodarske in gospodinske stvari.

Kmet, skrbi za pomladansko setev. Ako hočeš, da se ti bode pomladanska setev dobro razvijala in da bode potem letna žetev obilna, moraš skrbeti najbolj za to, da ne bode tlom zmanjkalo redilnih snovi, katerih potrebujejo rastline. Prebitek teh snovi je že zaradi tega potreben, ker rastline večkrat vsled neugodnega vremena v rasti zaostanejo. Žalibog pomanjkuje skoraj vsem našim tlom takozvane fosforjeve kisline. To kislino potrebujejo skoraj vse naše koristne rastline, zato je nujno potrebno, da se spravlja na naša polja in na travnike ta kislina in sicer se to zgodi najložje z takozvanimi umetnimi gnoji. Najboljši umetni gnoj, kateri ima v sebi mnogo te kisline, je takozvana Tomaževa žlindrasta moka (mela). Gnojenje njiv in travnikov s to moko se priporoča ravno sedaj v spomladi najbolj, ker se ravno sedaj gnoj z obdelano zemljo vsled vremenskih uplivov najboljše zmeša. Tomaževa žlindrasta moka se dobi proti primeroma majhnim stroškom povsodi. Kdor je skusil enkrat s tem umetnim gnojem, ta se je gotovo že prepričal, kolike važnosti in koristi je za kmeta. Mi opozarjamo na dotično oznanilo (inserat) v tem našem listu.

Koliko jajc smeš podložiti koklji? Za valenje treba ti je odbrati samo mirne koklje. Pure se dajo uporabiti tudi za valenje kokošjih in račjih jajc, vendar večkrat kakor dvakrat v letu naj se jim ne pusti valiti. Jajca, ki so namenjena za valenje, moraš hraniti na hladnem in suhem, toda ne premrzlem prostoru. Najboljše je, ako jih položiš v pleve ali pa v reznico. Nigdar pa jih ne smeš postaviti pokončno (na špico) marveč položno. Če so jajca zamazana, moraš jih oprati v mlačni vodi, da se na ta način otvorijo luknjice v lupini, skozi katere potem diha mlado pišče. Kokoši položiš lahko v prvi spomladi (ob koncu zime)

največ 11, bolj pozneje do 14 jajc. Če je koklja bila, smemo to število povečati do 17. Puri lahko podložimo tudi 25 kokošjih jajc; zamogla bi jih sig greti še večjo število, toda mladičev ne bi mog bolj pozno lahko pogrinjati. Iz kokošjega jajca izle pišče v 20 do 23 dneh. Purinih jajc zamora g pura samo 15, k večjemu 20. Iz njih izlezejo mlad v 27 do 30 dneh. Goska zamore greti 12 do jajc in jih vali 28 do 32 dni. Ravno toliko časa v raca, nji pa smemo položiti do 19 jajc. Golob gos samo 2 do 3 jajce in sicer 7 do 10 dni. Gol gnejzdi po 6 do 10 krat v letu.

Vinorejci skrbite za pokončevanje peronospor Od štajerskega deželnega odbora dobili smo sled naznanilo. Pretečeno leto uničila je peronospora m gim posestnikom celo trgatev. Temu je bilo krivo zakasnjeno nenatančno škropljenje, ali nepravilna stava bakreno-apnene zmesi ali pa tudi poraba st raztopnine. Vinorejci se tedaj s tem opozarjajo pravočasno in temeljito škropljenje proti peronos ktera se ne loti le nežnih delov loze, kakor vršič in listja, temveč tudi nežnih zarodkov grozdja. Pri roča se pri tej borbi ravnati se po naslednjih na dilih: 1. Neposredno po rezi namazati je to leto narezane čepe, reznike, šparone, kakor tudi ost dele trsa se štiriodstotno raztopnino bakrene galice apna. K temu služi navadni čopič. Skosi to dele prepreči razvitek takozvanega zimskega trosovja p nospore, ki se nahaja na trsu. V vinogradih, kjer peronospora že lansko leto silno močno nasto priporoča se odstraniti in sežgati vse odpadke od kakor tudi listje, ki ga je veter nanosil po jarkih v katerem se nahaja kar kupoma trosovje od p nospore. 2. S prvim škropljenjem je započeti hitro se pokaže grozdje, toraj že pred cvetom in se m pri tem temeljito poškopiti ne le listje, temveč svo grozdje (grozdni zarodki). Tudi ako se gro nahaja že v cveti, je vendar le naprej škropiti. Š pljenje med cvetom nikoli ne škodi. 3. Drugo škropljenje ima vršiti neposredno po cveti. Tudi pri tem morajo temeljito poškopiti vsi veršički, vso listje ako mogoče tudi grozdje. 4. Tretjokrat se škropi razvitjem grozdja, meseca julija. Še večkrat škro je potrebno le takrat, ako se peronospora na li vnovič prikaže. 5. Po toči se morajo vinogradi tor močno poškopiti. Poškodovanih delov trte loti se ronospora namreč mnogo raji nego zdravih. Privišjih sestavljanju bakreno-apnene zmesi za škropljenje vz se na 100 l vode le 1 kg bakrene galice in nekoalija več kakor 2 kg novovgašenega apna. Apno m biti mastno, peska prosto. Več dni stare raztop se nikakor ne smejo rabiti za škropljenje, marve mora potrebna množina vsak dan na novo sestav Škropiti se pa mora tako, da pride tekočina po noma enakomerno, v podobi rose, na površino l in grozdja. Ako neposredno po škropljenji začne žiti, tak se nezasušena bakreno-apnena zmes iz in treba je škropljenje takoj ponoviti. Kdor se tem navodilu ravna, mu ne bo peronospora nare nobene znatne škode, če je le bakrena galica, k